


50460/B

SYDENHAM, T.





THOMAS SYDENHAM.

J. G. Seiller Sculpsit

THOMÆ
SYDENHAM

MED. DOCT.

AC PRACTICI LONDINENSIS

Celeberrimi

OPERA MEDICA;

in Tomos duos divisa.

EDITIO NOVISSIMA aliis omnibus quæ præcesserunt multò emaculatioꝛ, & novis Additamentis ditioꝛ. Imò Indice Alphabetico locupletissimo in locum ELENCHI RERUM suffecto, utilissimè ornata.

TOMUS PRIMUS




GENEVÆ,


Apud FRATRES DE TOURNES.

M. DCC. LVII.

THE JOURNAL OF THE
 ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
 OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
 VOLUME 10 PART 1
 1900

THE JOURNAL OF THE
 ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
 OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
 VOLUME 10 PART 1
 1900





BIBLIOPOLÆ
LECTORI.



Ræclarissimi Viri, Thomæ Sydenham, Medicinæ Doctoris, & Practici quondam Londinensis longè Celeberrimi, Opuscula quotquot hætenùs seorsùm prodire omnia, unico Volumine comprehensa, sub variis formis, jam pluries Tibi tradidimus, LECTOR HUMANISSIME, & jam hic duobus Tomis in 4°. comprehensa de novo damus, eaque multò quàm in aliis omnibus quæ præcesserunt Editionibus, correctiora, ac Indicibus locupletissimis condecorata. Unde jam habebis Observationes Medicas, in Constitutionibus Epidemicis Londinensibus annorum 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673,

B I B L I O P O L Æ

1673, 1674, & 1675. occurrentes, quales Illæ evulgatæ fuere in Nobilissimi Authoris nostri Operum Londinensi Editione, anni 1676. & alias præterea quæ in Constitutionibus annorum 1676, 1677, 1678, 1679, 1680; Imò ex parte ad annum usque 1685. se obtulerunt; Item Dissertationes Epistolares super Lue Venereâ, Affectione Hystericâ, & Hydrope; quales itidem in Accuratissimi hujus Authoris Operum Editione Londinensi quartâ, ann. 1685. superadditæ sunt: Et præterea Schedulam Monitoriam de Novæ Febris ingressû, & Febre Putridâ Variolis Confluentibus superveniente, cum Dissertatiunculâ de Mictu Sanguineo à Calculo renibus impacto, & Processibus integris, in Morbis ferè omnibus curandis, in filii gratiam à Fœlicissimo hoc Practico conscriptis, annexo etiam de Phthisi Tractatulo: Quæ jam omnia in Nostrâ anni 1696. Editione inclusa fuere. Utinam tam Sedulus Vir quicquid ad Medicam Praxim ulteriùs perficiendam, pari, quàm quæ ab ipso perscripta sunt, diligentia, typis mandâisset! Sic sanè abundè instruerentur Medicorum Filii, iis auxiliis quibus securius, magno Ægrorum suorum beneficio, in morbis curandis progredierentur. Verùm cum tot tantaque ab unius Viri, etiam laboriosissimi, ævo, quantumvis protracto, expectari nullatenus debeant, & à plurium tantum laboribus adjunctis sperari queant: A Doctore Medico, Nobis Amicissimo, impulsu fuimus ut in eorum quæ deficiebant aliquale supplementum, selectiora quædam undiquaque ex Accuratio-

LECTORI.


ac ea præprimis quæ Methodo Sydenhamianæ maximè affinia forent, Nostræ anni 1715. Editioni infereremus; quò scilicet, si non integram prorsùs Medicam Praxim, illam saltem minùs mancam sisteremus. Cujus Clariss. Viri Consiliis lubenter admodum annuentes, id omne quod præ manibus ipsi fuit, pergrato à nobis animo acceptum, Tibi tum læti tradidimus, Ea autem quæ tum addenda accepimus, duplicis fuere generis: Illorum scilicet partem, Dissertatiunculæ & Tractatuli plures conficiebant: Aliam verò Epidemicæ Constitutiones, in Italiâ, Germaniâ, Hungariâ, Helvetiâ, & aliis locis, (ad normam quam olim Magnus Hippocrates suo suaserat exemplo, quamque Sibi Excellentissimus Noster Sydenham, prudentissimè in pleniorrem Artis Medicæ perfectionem, à Systematicis Authoribus non parum retardatam, præstituerat) ab innumeris Viris Doctis, magnâ diligentîâ eventilatæ ac examinatæ componebant. Partis Primæ Articulos, suo quosque loco, nunquam satis laudandi Authoris Nostrî Textui annexos, & Argumentis pro istiusmodi connexionis ratione indicanda, munitos dedimus. Partis verò Posterioris Constitutiones Epidemicas quas tum in duo membra divisas, & minùs sedulò, quasi discerptas, duobus in locis collocaveramus, quasque in Editione anni 1723. sine ulla ordinis vitiosi reformatione, pauculis in majus complementum adjectis, exhibueramus; jam permultis novis associatas, in unum Corpus coactas, ac ut ita dicamus, conglobatas,

BIBLIOPOLÆ LECTORI.

tas, unà cum Clariff. Guilhelmi Musgrave, de Arthritide Symptomaticâ & Anomalâ Tractatibus, ad Tomum nostrum II^{dum} rejicimus. Atque sic de Nostrâ hâc Editione satis.



THOMÆ
SYDENHAM,
MED. DOCT.
OBSERVATIONES
MEDICÆ,
CIRCA
MORBORUM
ACUTORUM
HISTORIAM
ET CURATIONEM.



A MICISSIMO VIRO
 DOMINO
 JOHANNI MAPLETOFT,
 M. D.
 In Collegio Greshamensi
 APUD LONDINENSES
 PROFESSORI,

Nec - non Societatis Regiæ ibidem Socio.



UO omninò sunt (*Humanissime Vir*) de quibus hìc mihi tecum agendum est: Primum ut causas exponam, quibus impulsus Tractatum hunc meum in publicum edo; alterum, quamobrem eundem Tuo potissimum nomini dicandum cen- seo. Primum quod attinet, tricesimus jam agitur annus, à quo Londinum petens, ut inde Oxonium denuo proficiscerer, (à quo pri- mi belli calamitas me ad annos aliquot distinuerat) in virum Doctissimum & maxime ingenuum Dominum D. Thomam Coxe, (qui per eos etiam annos, atque ad hunc usque diem Medicinam magna cum celebritate facti- tavit) Fratri meo tunc ægrotanti consulentem, auspicatò inciderem; qui quidem *Vir*, pro nota sua humanitate suavitateque morum me perconta- tus est, cui me demum *Arti*, intercisà jam repetens studia, sumptâque togâ virili,

virili, pararem addicere. Ego verò incertus adhuc animi, & de medica Arte ne vel somnians quidem, tanti viri hortatu atque authoritate permotus, nescio quo fato meo, me ad eam seriò accinxi. Et sanè si quando hæc nostra conamina vel minimum in publica commoda cesserint, illi grato animo accepta referenda erunt, quo Promotore atque Auspice ea studia primùm sum aggressus. Post annos aliquot in Palæstra Academica insumptos Londinum reversus, ad Praxim Medicam accessi, quam cùm intento admodū oculo omnique adhibita diligentia curiosè observarem, mox in eam veni sententiam, quæ mecum ad hodiernum usque diem crevit; Hanc scilicet Artem haud rectiùs perdiscendam esse, quàm ab ipsius Artis exercitio atque usu; veroque admodum esse simile, quòd qui ad naturalia morborum Phænomena oculos animumque accuratissimè maximeque diligenter adverterit, in eliciendis Curativis Indicationibus veris ac genuinis maximè pollere debeat. Huic itaque me Methodo totum tradidi, satis securus, quòd Naturam si sequerer Ducem, etiam Avia terrarum peregrans loca, nullius antè Trita solo, nusquam vel latum unguem à recto tramite discederem. Hoc me filo regens, primò ad pressiores Febrium observationem animum appuli, & post devoratum haud mediocre tædium, & molestissimas mentis agitationes, quibus me ad annos aliquot fatigandum permisi, tandem in methodum incidi, quæ istæ possent sanari; quam etiam amicis flagitantibus, in lucem promendam jam dudum concessi. Cùm vero ab illo tempore novas Febrium species, mihi hætenus incognitas, sibi invicem jugiter succedentes animadverterim, statui apud me quæ ad eas pertinebant singula, vel ab eisdem pendebant, summâ quâ possem diligentia in unum congerere: quo tandem aliquando prioris cæpti mei tenuitatem atque angustias paulò accuratiori ac magis absoluta horum morborum Historiâ pensare valerem. Sed dum hæc animo versarem, atque indagarem sedulò, & proinde jam in eo totus essem, ut pro multifariis Naturæ mutationibus & versatili ingenio Medendi, Methodum, ceu Gladium Delphicum, procuderem omnibus parem, statim didici me ideò tantum aperuisse oculos, ut pulvere, haud quaquam verò Olympico, iidem complerentur, atque his quidem, proprii cerebri phantasmata, illis, nullum me prorsus habere ducem benè viderer. Quamvis optassem Lucubrationes hæc meas non nisi annorum porrò aliquot experienciâ auctas & confirmatas typis evulgasse, contumeliis tamen ac sannis procacissimi cujusque

E P I S T O L A

4

Ardelionis tandem plus satis delassatus, amicis eo usque morem gessi (inter quos cum honore mihi semper nominandus est sagacissimus Vir Dominus Doctor Gualterus Needham, tam Medicæ Artis, quam rei Literariæ decus, & laus) ut mihi tandem consulerem, ac justam pararem Defensionem; ea nempe facta prodens scriptis publicis quæ ingenuos, quod spero, omnes mihi Patronos conciliabunt. Cæteros quod attinet, expectabo scilicet, quemadmodum acutè Romanus Philosophus, ut quicquam Calumniæ sit sacrum, cui nec Rutilius sacer fuit, nec Cato? Si qui itaque reperiantur, quos præ immanitate quadam ac asperitate naturæ convitiandi libido adhuc incesserit, rectène an secus scripserim haud æstimantes æqua lance, qui vitio statim vertunt, si quis novi aliquid, ab illis non prius dictum, vel etiam inauditum, in medium proferat, hujusmodi ego homines æquo me animo laturum spero, certè convitiarum ferram neutiquam recipiabo. Illud tantum opponam, Viro Christiano sanè perdignum, quod olim Titus Tacitus, obtrectanti Metello regeffit: Facile est in me dicere, cum non sim responsurus: Tu didicisti maledicere; Ego Conscientiâ Teste, didici maledicta contemnere. Si tu linguæ tuæ Dominus es, ut quicquid lubet effutias; Ego Aurium meum sum Dominus, ut quicquid obvenerit audiant inoffensæ. Atque hæc sunt, quorum victus pondere Librum hunc luce donandum esse sentiebam.

Tibi verò (Charissime Vir) eundem dedicatum volui, tum ob mutuam quâ nos invicem complectimur Amicitiam Benevolentiamque; tum etiam quia nemo te melius judicare valeat, si quo in loco aut pretio habendæ sint quas hîc trado Observationes, cum per septennium, quod jam ultimò excurrit, plura è præcipuis atque insignioribus, quæ sequentes exhibent pagellæ, Tute etiam oculis usurpaveris. Uti verò eâ tu es morum integritate probitateque notissima, ut religio tibi sit fictis insinuationibus alios in errorem pellicere, (maximè ubi de Corio humano agitur) ita ea etiam polles sapientiâ atque eruditione, quæ tibi à me imponi, si id seriò agerem, nullatenus paterentur, multo minus tu tibi imposueris istis experimentis, quibus in tuis etiam ægris nonnullorum, quæ vel hîc descripsi, vel tibi aliàs affirmavi veritatem comprobasti. Nosti præterea, quàm huic meæ Methodo suffragantem habeam, qui eam intimiùs per omnia perspexerat, utrique nostrum conjunctissimum
Dominum

Dominum Joannem Lock, quo quidem Viro, sive ingenio judicioque acri & subaëto, sive etiam antiquis, hoc est, optimis moribus, vix superiorem quenquam inter eos qui nunc sunt homines, repertum iri confido; paucissimos certè pares. Verùm non opus est, ut ulterius tuam fidem sollicitem, de qua jamdiu persuasissimus sum. Cæteros quod attinet, jacienda alea est, qua utcunque ceciderit, sortem haud gravatè feram. Cùm enim jam senex sim, & summi Numinis favore, tantum mihi sit Viatici, quantum restat viæ, de reliquo dabo operam, ut nec ipsi mihi, neque aliis molestus eum assequar felicitatis modum, quem ita eleganter depinxit Vir magnus:

Felix ille animi, Divisque simillimus ipsis,
 Quem non mendaci resplendens Gloria Fuco
 Sollicitat, non fastosi mala gaudia Luxûs.
 Sed tacitos finit ire dies, & paupere cultu
 Exigit innocuæ tranquilla silentia vitæ.

Quod restat, exorandus mihi es, ut hoc propensi in te animi, & quo te prosequor, Honoris pignus æqui bonique consulas; præsertim cum nullo jure Tibi imputari possint quotquot in hoc Opere navi ac σφάλματα comparuerint, quorum omnium in me solùm cudenda est faba; nec tu plectendus, si quâ ego forte deliravero. Quamlibet neque ejus quem exantlavi laboris omnis mihi fructus perierit, cùm vel ex erroribus & hallucinationibus meis ansam nactus fuero, quâ omnibus palam faciam, quanta te colam amicitia, & quod ex animo sim

Tibi semper addictissimus

THOMAS SYDENHAM.



P R Æ F A T I O.



Uemadmodum à natura ita comparata est humani corporis Fabrica, ut nec præ jugi particularum fluxu sibi semper constet, nec præ externarum rerum vi sui juris ubique permaneat, unde multiplex ægritudinum cohors terris ab omni ævo incubuit; sic procul omni dubio à multis jam sæculis ante natum non *Græcum* modò, sed (qui mille annis hunc antecessit,) *Ægyptium* *Æsculapium*, hominum ingenia investigandæ medelæ necessitas exercuit. Et profectò, ut quis primus ædificiorum, aut vestimentorum usum ad depellendam cœli inclementiam instituit, nemo facile dixerit, ita & *Artis Medicæ* Natales, ut *Nili* fontem, indigitare nequimus; cùm ars medica perinde ac cæteræ artes, in usu nunquam non extiterit, licet nunc diligentius, nunc frigidius exculta, pro vario temporum ac regionum habitu. Quantum *Veteres*, ac inter primos *Hippocrates*, præstiterunt, abunde notum est; quibus scilicet, ac eorum scripta compilantibus maximam *Therapeuticæ* solertiæ partem acceptam ferimus. Quin & succedentibus deinde sæculis emicuit nonnullorum industria, qui aut *Anatomia*, aut *Pharmacis*, aut *Methodo* *largi* operam navando, *Medicinæ* pomœria ampliare pro virili sategerunt: ut taceam nec in hac nostra *Britannia*, ipsoque hoc seculo defuisse, qui in omni scientiarum genere, quo res Medica adaugeri possit, optimè meruerunt; quorum quidem laudes impari calamo non attingo. Cæterùm quantacunque fuerint aliorum conamina, semper existimavi mihi vitalis auræ usum frustra datum fore, nisi & ipse in hoc stadio versatus, symbolum aliquod, utcunque exiguum in commune *Medicinæ* ærarium contribuërem. Quo circa post diuturnam meditationem, ac diligentem fidamque annorum aliquam multorum observationem tandem aliquando decrevi; Primò sententiam meam in medium proferre, quâ demum ratione Medendi scientia ulterius promoveri possit: Deinde meorum in hoc negotio conatum specimen aliquale in lucem dare.

Sentio autem nostræ *Artis* incrementum in his consistere, ut habeatur (1) *Historia*, sive *morborum* omnium descriptio, quoad fieri potest, *graphica* & *naturalis*, (2) *Praxis* seu *Methodus* circa eodem *stabilis* ac *consummata*. Sanè morbos crassè depingere satis obvium

vium est : atqui Historiam eorum ita conscribere , ut evitetur Censura , quam *Clariss. Verulamius* , in nonnullos ejusmodi Promissores vibravit , longè majoris est negotii : *Satis scimus* (inquit Vir Nobiliss.) *haberi Historiam Naturalem , mole amplam , varietate gratam , diligentia sæpius curiosam . Attamen si quis ex ea fabulas , & authorum citationes , & inanes controversias , Philologiam denique & ornamenta eximat (quæ ad convivales sermones , hominumque doctorum Noctes potius , quàm ad instituendam Philosophiam sint accommodata) ad nil magni res recidet . Longè profecto abest ab ea Historia , quam animo metimur . Similiter etiam & morborum curationes pro more facillimè proponuntur ; Atqui hoc ita præstare , ut verba in facta transeant , atque eventus promissis respondeant , magis ardui moliminis illi judicabunt , qui vident haberi apud Scriptores Practicos morbos complures , quos nec illi ipsi Scriptores , nec quispiam hætenus Medicorum sanare valuerunt .*

Quod autem spectat ad *Historiam Morborum* , si quis rem attentius perpendat , facile videbit scribentem ad multò plura animum debere advertere , quàm vulgo existimatur . Quorum pauca hæc impræsentiarum attingere suffecerit .

Primò , expedit ut morbi omnes ad definitas ac certas species revocentur , eadem prorsus diligentia ac *ἀκριβεία* quâ id factum videmus à *Botanicis* scriptoribus in suis *Phytologiis* . Quippe reperiuntur morbi , qui sub eodem genere ac Nomenclatura redacti , ac quoad nonnulla symptomata sibi invicem consimiles , tamen & naturâ inter se discreti diversum etiam medicandi modum postulant . *Cardui* quidem nomen ad plures herbarum species extendi nemo nescit : at verò parum accuratè faciet rei herbariæ scriptor , qui generalem hujus plantæ descriptionem , in quâ scilicet à cæteris stirpibus discrepat , proponere contentus ; propria interim & peculiaris cujusque speciei signa & characteres , quibus ab invicem discriminantur , contempserit . Eodem planè modo nec satis est scriptori communes duntaxat morbi alicujus *πολυειδές* apparentias annotasse . Esto sanè non omnibus morbis eandem contingere varietatem ; tamen complures esse , qui alicet ab authoribus sub eodem titulo citra ullam speciei distinctionem tractentur , dissimillimâ sint indole , in sequentibus pagellis , uti spero , palam fiet . Imò etiam ubi distributio in species reperitur , id fit plerumque , ut *Hypothesi* alicui , quæ veris Phænomenis substruitur , suus reservetur honos ; ac proinde ejusmodi discriminatio non tam ad morbi , quàm ad Authoris ingenium , philosophandique theoriam accommodata est . Quantum Medicinæ obfuerit *ἀκριβεία* hac in parte defectus , ostendunt multorum morborum exempla : quorum nempe curationes hodiè non desideraremus , si scriptores ,
dum

dum Experimenta & Observationes Medicas benevolo saltem animo communicarint, unius scil. speciei morbus pro alio speciei diversæ substitutus non fefellisset. Atque hinc etiam arbitror profectum esse, quod materia Medica in sylvam tam immensam, sed fructu perexiguo, excreverit.

Porro autem in scribenda morborum Historia, seponatur tantisper oportet quæcunque *Hypothesis Philosophica*, quæ scriptoris iudicium præoccupaverit; quo facto tum demum morborum *Phænomena* clara ac *naturalia*, quantumvis minuta, per se accuratissimè adnotentur; exquisitam *Pictorum* industriam imitando, qui vel nævos & levissimas maculas in imagine exprimunt. Enim verò dici vix potest, quot erroribus ansam præbuerint *Hypotheses* istæ *Physiologicae*, dum scriptores, quorum animos falso colore illæ imbuerint, istiusmodi Phænomena morbis affigant, qualia, nisi in ipsorum cerebro, locum nunquam habuerunt, debebant autem in conspectum venire, si Hypothesis, quam ipsi pro concessa ac rata habent, constaret veritas. Adde quod si quando symptoma aliquod, quod cum dicta Hypothesi appositè quadret, revera morbo competat, cuius typum delinaturi sunt, tum illud supra modum evehunt, ac planè reddunt ἐν μὲν ἐλεφάντει, quasi in hoc scilicet totius negotii cardo verteretur, sin Hypothesi minùs congruat, aut prorsus silentio, aut levi saltem pede transmittere consueverunt, nisi fortè beneficio subtilitatis alicujus Philosophicæ in ordinem cogi, ac quoquo modo accommodari possit.

Expedit autem tertio, ut in describendo aliquo morbo peculiaris & perpetua Phænomena seorsim ab accidentalibus & adventitiis (qualia sunt, quæ non tantum ob ægrotantium temperiem & ætatem, sed etiam ob rationem medendi diversam variè se habent) enarrentur. Nam sæpè accidit, ut facies morbi variet pro vario medicandi processu, ac nonnulla symptomata non tam morbo quàm Medico debentur; adeò ut eodem morbo laborantes, sed variâ methodo tractatos, varia etiam symptomata exerceant. Unde nisi cautela adhibeatur, necesse est, ut admodum vagum & incertum sit circa morborum symptomata iudicium. Prætereo, quòd *Casus oppidò rari* ad morborum Historiam propriè non pertineant; quemadmodum & in descriptione *Salviæ*, v. g. Erucarum morsus inter signa discriminantia istius plantæ neutiquam recensentur.

Denique *Anni tempestates*, quæ scilicet cuivis morborum generi potissimum faveant, diligenter observandæ sunt. Non inficior nonnullos esse omnium horarum; alii tamen, nec pauciores, occulto quodam Naturæ instinctu, annorum tempora, non secus quàm quædam aves aut plantæ, sequuntur. Sæpè quidem
subiit

subiit mirari hoc morborum quorundam ingenium, fatis obvium, à paucis tamen fuisse hætenus observatum, cum quo sydere stirpes, aut pecudes solemmniter procreentur plurimi curiosius adnotârint. Sed quæcunque sit hujus oscitationis causa, pro certo statuo tempestatum, in quibus ægritudines ingruere consueverunt, notitiam multum Medico prodesse, tant ad speciem morbi diagnoscendam, quàm ad ipsum morbum extirpandum; atque horum utrumque minus feliciter evenire, ubi istiusmodi observatio negligitur.

Hæc quidem etsi non sola, saltem insigniora sunt, quæ in scribendâ morborum Historia observari convenit. Cujus *Historiæ* utilitas ad Praxim, omnem æstimationem excedit: ac præ qua subtiles Disquisitiones, ac argutiolæ, quibus Neotericorum libri ad nauseam ferè infarciuntur, nullo in numero sunt habendæ. Quâ enim aut compendiosiore aut etiam aliâ viâ, vel causæ morbificæ, quibus obviam eundum est, deprehendi, vel indicationes curativæ elici possunt, quàm certâ ac distinctâ peculiarium symptomatum perceptione? Neque enim ulla est circumstantia tam levis aut exigua, quæ nos usus ad utrumque non habeat. Nam ut demus aliquid varietatis à temperamento individuorum, & tractandi ratione proficisci, nihilominus adeò æquabilis ac sibi ubique similis est naturæ ordo in producendis morbis; ut in diversis corporibus eadem plerumque reperiantur ejusdem morbi symptomata; ac illa ipsa, quæ in *Socrate* ægrotante observata fuerint, etiam generaliter ad *Hominem* quemcunque eodem morbo laborantem transferri possint, non secus ac universales plantarum Notæ ad omnia cujusque speciei individua ritè se diffundunt. Qui v. g. *Violam* accuratè descripserit quoad colorem, saporem, odorem, ac figuram, cæteraque id genus; omnibus ubique terrarum *Violis*, quæ sub ea specie continentur, Historiam illam in plerisque ferè omnibus convenire faciliè animadvertet.

Et quidem existimo, nos ob eam potissimum causam accuratio-ri morborum Historiâ ad hunc usque diem destitui, quia scil. plerique eos pro confusis inconditisque Naturæ, malè se tuentis & de statu suo dejectæ, effectis tantum habuere, ac proinde laterem lavare crederetur is, qui justam eorundem enarrationem moliretur.

Sed ut ad rem revertamur. Non minus certò etiam à minutissimis morbi circumstantiis Indicationes curativas possit Medicus desumere, quàm ab iisdem sumpsit Diagnostica. Atque adeò non semel mihi in mentem subiit, quòd si morbi cujuslibet Historiam diligenter perspectam haberem, par malo remedium nunquam non scirem adferre, variis ejusdem Phænomenis viam, quâ mihi

incedendum foret, haud dubiam permonstrantibus; Quæ quidem Phænomena, si inter se sedulò conferantur, manu quasi ducerent ad Indicationes illas maximè obvias, quæ ex intimo naturæ sensu, non verò Phantasiæ erroribus depromuntur.

Atque his sanè gradibus, & ut ita dicam, his adminiculis ad cœlum ascendit, ad medicinæ nempe fastigium, Medicorum ille *Romulus*, nunquam satis laudatus *Hippocrates*, qui hanc Arti Medicæ insuper struendæ solidam ac inconcussam substernens basin, viz. *νέστων φύσεως ἰστέον*, i. e. *Naturæ morborum medicatrices*, id egit, ut morbi cujuslibet Phænomena apertè traderet, nullâ Hypothesi adscitâ, & in partes per vim adactâ: ut in ejus libris *Morbi*, de *Affectionibus*, &c. videre est. Regulas etiam quasdam tradidit ex observatione methodi istius, quâ utitur natura tam in morbo provehendo, quàm in eodem amoliendo, natas, cujusmodi sunt *Coacæ Prænotiones*, *Aphorismi*, & reliqua id genus. Atque in his ferè stetit magna illa Divini senis *Σύγγραμματα*, non ab irritò lascivientis Phantasiæ conamine desumpta, ceu vana ægrorum insomnia, sed legitimam exhibens Historiam earum Naturæ operationum, quas in hominum morbis edit. Cùm verò dicta *Σύγγραμματα* nihil esset aliud, quàm exquisita naturæ descriptio, par erat omnino, ut in praxi eò tantum collimaret, ut eidem laboranti, quibus posset modis subvenire contenderet; unde etiam non aliam Arti mandat provinciam, quàm ut deficienti naturæ succurrat, effrænem coercet & in ordinem redigat; utrumque verò hoc, tum passu illo, tum etiam methodo, quibus natura morbum expellere satagit atque amovere: Animadverterat nempe sagacissimus Vir, quod sola Natura *τὰς νόσους κρίνει, καὶ ἐξαρκίει τὰ πάντα πᾶσι*. Atque hæc omnia peragit Natura paucissimis simplicissimisque adjuncta remediorum formulis, alicubi etiam prorsus nullis.

Altera ab hac Methodus, quâ Ars medendi, si quid ego judico, possit ulterius provehi, in eo potissimum cardine vertitur, ut certâ aliqua, & consummata undique ac fixa *Methodus medendi* in publica commoda tradatur, eam intelligo, quæ satis magno Experimentorum numero corroborata suffultaque, huic vel illi morbo devincendo suppar invenitur. Neque enim satis esse arbitror, ut successus particulares, sive Methodi cujuslibet, sive etiam Remedii, scriptis prodantur, si neque illa universaliter atque in omnibus scopum attingere deprehendatur, (positis saltem his vel illis circumstantiis.) Contendo verò ego nos æquè certò scire debere, hunc illumve morbum expugnatum iri, si huic aut alteri intentioni satisfecerimus, ac certò jam scimus, nos hoc aliove remedii genere huic aut alteri intentioni satisfacere posse; quòd quidem licet non semper & ubique, frequentissimè

tamen, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ votis respondet exhibentium, ita *sennæ foliis* v. gr. alvum subducimus, *Papavere* invitamus somnum. Non is sum, qui negem, debere Medicum animum diligenter advertere ad particularia, tum Methodi, tum Remedii eventa, quibus est usus in morborum curatione, & in usus suos reponere, tam ad sublevandam memoriam, quàm ut ansas inde arripiat, quibus paulatim peritior evadat Medicus, tandemque post diutina, & repetita sæpius experimenta, Methodum sibi figat firmetque, à quâ in hujus aut illius morbi curatione ne hilum sibi recedendum putet. Observationes autem particulares in lucem dare, non ita magnam, me iudice, adfert utilitatem. Nam si id tantum agit *Observator*, ut nos doceat hunc morbum semel, vel etiam sæpius huic remedio cessisse, quid mihi, obsecro, profuerit, si infinitæ ferè medicamentorum decantatissimorum copiae, quâ jamdiu obruimur, adhuc aliud mihi hætenus inauditum accrescat? Quod si repudiatis cæteris omnibus remediorum formulis, huic me unicè addixero, annon innumeris ferè experimentis probanda mihi venit ejus vis, innumeræ etiam circumstantiæ trutinandæ, tum ægrum, tum ipsam Methodum spectantes, antequam ex observatione solitaria fructum aliquem queam decerpere? Si *Observatori* nunquam non responderit Medicamentum, quare in particularibus versatur, nisi aut sibi diffidat ipse, aut minutatim potius quàm in solido imposuisse orbi videri præoptet? Quàm verò in proclivi sit densissima hujus generis volumina conscribere, nemo vel mediocriter in praxi versatus ignorat; uti nec econtra quàm sit illud difficile, perfectam & confirmatam undique Medendi Methodum in quovis morbo condere ac stabilire. Si vel unus tantum per singula mundi sæcula hoc modo unicum tractaverit morbum, Medendi Ars (quæ Medicorum est provincia) à multis retro annis ad ἀμύλῳ pervenisset, omnibus absoluta numeris, saltem in quantum fert mortalium fors. Quæ verò fundi nostri est calamitas, jamdiu ab antiquissimò & peritissimò duce *Hippocrate*, & priscâ Medendi Methodò, causarum conjunctarum (utpote quæ certò se prodant) cognitioni superstructâ, descivimus; unde est, ut quæ hodie exercetur, à Logodædalis conficta, confabulandi magis sit Ars, quam Medendi. Sed ne hanc ego dicam temerè imegisse videar, fas mihi sit è via parumper deflectere, quò scilicet evincam Causas illas remotiores, in quibus assignandis & in lucem extrahendis hominum Curiosorum & περιεργῶν vanæ speculationes unicè desudant triumphantque, prorsus esse ἀνεπαλήπτης ac inscrutabiles; solas verò proximas & conjunctas à nobis posse cognosci, atque ab his solis indicationes curativas esse mutuandas.

Observandum est itaque, quòd si Humores vel diutiùs, quàm par est, in corpore fuerint retenti, (quia sc. Natura eosdem concoquere nequeat, ac deinceps expellere) vel ab hac aut illa aëris Constitutione labem morbificam contraxerint; vel denique contagio aliquo venenato infecti in ejusdem castra transierint; his inquam modis & his similibus, dicti Humores in formam substantialem, seu *speciem* exaltantur, quæ his aliisve Affectibus cum propria Essentia convenientibus se prodit; quæ quidem symptomata, licet minus cautis videantur oriri, vel à natura partis, quam humor obsedit, vel à natura humoris ipsius, antequam hanc induerat speciem, nihilominus reverà Affectus sunt ab essentia dictæ speciei in hunc gradum recens evectæ, pendentes. Adeò ut quilibet *morbus specificus* Affectio sit ab hac vel illa specifica Exaltatione, vel specificatione succi cujusdam in corpore animato ortum ducens. Sub hoc genere potest comprehendi maxima pars morborum, qui certum aliquem typum ac formam agnoscunt. Et profectò haud minus se natura methodo astringit in his tum producendis, tum maturandis, quàm in *Plantis*, sive etiam *Animalibus*. Quinimò ut cuilibet sive Plantæ, sive Animali proprii quidam ac peculiare Affectus competunt, ita se res habet in qualibet succi cujuscunque Exaltatione, ubi semel in *speciem* proruperit. Exemplum hujus rei satis luculentum quotidie nobis ingerunt, & ob oculos ponunt variæ istæ Excrecentiarum species, quas Arbores, Fruticesque emittunt, vel ob succi Nutritii perversionem & depravationem, vel alias ob causas, in forma scil. *Musci*, *Visci*, *Fungorum*, aliorumque id genus: quæ omnia *Essentiæ* sunt sive *Species*, à parente, seu Frutice, diversæ planè atque distinctæ. Et sanè qui seriò atque ad amussim pensitaverit *φαινόμενα* illa, quæ Febrem v. g. *Quartanam* comitantur: Quòd viz. ferè semper sub Autumno ingreditur; quòd certum ordinem ac typum ubique servat, revolutiones periodicas quarto quoque die non minus certò repetens, quàm suas repetit Horologium, sive aliud quoddam ejusmodi *αυτόματον*, (nisi ab accedente aliquo extrinsecus adveniente hic ordo perturbetur) quod cum rigore ac notabili frigoris sensu aggreditur, quem excipit caloris perceptio non minus sensibilis, quæ tandem in sudore effusissimo terminatur; quod denique morbus hic, quemcunque demum invaserit, vix ante *Vernum Æquinoctium* abigi poterit & fugari; Qui hæc, inquam, omnia pensiculiùs trutinaverit, haud minus firmis rationibus inducetur, ut credat, morbum hunc *speciem* esse, quàm sunt illæ, ob quas credit Plantam esse speciem, quæ parem semper ad normam è terra nascitur, floret, interitque, atque in reliquis afficitur pro ratione Essentiæ suæ; neque facile comprehendi

di potest, qui fiat ut hic *morbus* oriatur à combinatione sive principiorum, sive qualitatuum evidentium, cum *plantâ* substantia ac species distincta in rerum natura ubique agnoscat. Illud interim non diffitemur, quòd cum species sive Animalium sive Plantarum singulæ (demptis perpaucis) per se subsistant, istæ Morborum Species ab iis dependent humoribus, à quibus generantur.

Tametsi verò ex jam dictis constare videatur morborum plerorumque causas inscrutabiles prorsus esse, ac ἀνεξιχνύτης, non tamen insolubilis erit illa quæstio, *Quo pacto sanari possint?* cum de causis remotioribus nos hoc asseramus: Nemo autem est qui non videat curiosos istos speculatores in causis primo primis ferè ac remotissimis indagandis, ac in lucem (ut ut invitâ Minerva ac reclamante naturæ sensu) protrahendis operam perdere; immediatas verò & conjunctas, seu ante pedes jacentes, contemnere, qua tamen necessario debent cognosci, & possunt etiam, sine ficulneis hujusmodi adminiculis, cum Intellectui se apertè sistant, vel proprii sensûs testimonio, vel Anatomicis Observationibus ab aliis jampridem factis, resectæ. Atque ut impossibile planè est, ut Medicus eas morbi causas ediscat, quæ nullum prorsus cum sensibus habent commercium, ita neque est necesse, abundè enim sufficit, ut sciat, undè immediatè oritur malum, talesque ejus effectus atque symptomata, ut inter hunc aliumque morbum hujus non dissimilem, valeat accuratè distinguere. In *Pleuritide* v. g. diu atque incassum se fatigabit aliquis, nec tamen mente assequetur pravam illam Crasin & malè coherentem sanguinis texturam, quæ prima est hujusce mali origo; qui verò causam à quâ immediatè producitur rectè cognoverit, & ab aliis morbis quibuscunque ritè valeat distinguere, non minus certò curandi scopum attinget, etiam neglectâ otiosâ istâ atque inutili remotissimarum causarum indagine. Sed hæc
ὡς ἐν παράδειγματι.

Jam verò si quærat aliquis, an ad prædicta in Arte Medica desiderata duo (Veram scilicet & Genuinam morborum *Historiam*, & certam confirmatamque medendi *Methodum*) non etiam accedat tertium illud, Remediorum nempe *Specificorum Inventio*? Assentientem me habet & in vota festinantem. Etsi enim *Methodus* sanandis morbis *Acutis* maximè accommodata mihi videatur, quibus exigendis cum natura ipsa certum aliquem Evacuationis modum statuerit, quæcunque *Methodus* eidem fert opem in promovenda dicta evacuatione, ad morbi sanationem necessario conferet; optandum est tamen, ut beneficio *specificorum*, si quæ talia inveniri possint, æger rectiori semitâ ad sanitatem proficeret; & [quod majoris etiam momenti est] extra aleam malorum, quæ sequuntur aberrationes istas, in quas sæpe invita dilabitur Natura in morbi causa

expellenda, (ut ut potenter & doctè ei ab assistente Medico subveniatur) possit collocari.

Verùm quod ad morbos *Chronicos* sanandos attinet, licet nihil dubitem ultiores in medendo profectus vel à sola *Methodo* posse sperari, quàm qui in primam statim cogitationem incurrant, attamen plùs satis constat deficere illam in curatione *Chronicorum* aliquot vel maximè spectabilium inter eos, quibus homines urgentur; quod ob hanc præcipuè causam usu venit, quia scil. Natura in hujuscemodi morbis non habet Methodum tam efficacem, quàm materiam morbificam foras ejiciat, (perinde atque in *Acutis*) quò nos cum eadem manus jungentes & ad debitum dirigentes scopum, morbum debellare valeamus. In vincendo itaque morbo *Chronico* is demum jure meritoque Medici nomen sibi vindicat, penes quem est ejusmodi medicamentum, quo morbi *Species* possit destrui: non qui id tantum agit, ut è primis secundisque qualitatibus nova aliqua introducatur, & prioris subeat vicem; quod fieri quidem potest non extinctâ specie: v. gr. calefieri potest, aut refrigerari, qui *Podagrâ* laborat, vigente adhuc *podagrâ*, nedum devictâ. *Methodo* hâc, quâ diversæ tantùm qualitates introducuntur, morbi *Specifici* non magis immediatè perdomantur, quàm ignis gladio extinguitur. Quid enim, obsecro, Calor, Frigus, Humidum, Siccumve, aut è secundis qualitatibus, quæ ab his pendunt, alia aliqua ad morbi curationem faciet, cujus essentia in harum nullâ consistit? Si quis hîc objecerit, satis magnum Remediorum *Specificorum* numerum jam diu nobis innotescere, hunc ipsum, si examen paulò diligentius instituerit, in oppositas partes facile transiturum confido, cùm unicus *Cortex Peruvianus* à suis militet. Toto enim cœlo distant, quæ huic aliivæ *Indicationi Curativæ* specificè respondent Medicamenta, cui si faciamus satis morbus abigitur; & quæ hunc aliumve *Morbum* specificè atque immediatè persanant, nullo habito respectu ad hanc aut illam *Intentionem* sive *Indicationem Curativam*: v. gr. *Mercurius* & *Sarsæ radices* in *Lue Venerea* *specificæ* vulgò audiunt, quæ tamen pro *specificis* propriis atque immediatis non debent haberi, nisi argumentis satis validis atque irrefragabilibus possit confici, *Mercurium* nullâ excitata *Salivatione*, *Sarsæ* verò radices sine motis *sudoribus* tam egregiam operam præstitisse. Ad hanc pariter normam alii etiam morbi aliis *Evacuationibus* curantur, cùm tamen quæ adhibentur Remedia, non magis propriè competant immediatæ curationi istorum morborum, qui eis sanantur *Evacuationibus*, quibus faciendis ejusmodi remedia maximè propriè designantur, quàm *Scalpellum Phlebotomum Pleuritidi*; quod tamen nemo opinor *Specificum* hujus morbi facile appellaverit.

Specifica proinde medicamenta, si ad hanc mentem nostram restringantur, non cuivis homini contingunt, neque oscitantibus temerè se ingerunt; nullus tamen dubito, quin in exundanti illa plenitudine, quâ turget natura diffluitque, ita jubente *Optimo Maximo* rerum omnium *Conditore*, in singulorum præservationem prospectum pariter sit de curatione malorum magis insignium, quæ homines vexant; idque pro foribus, & in patrio cujuslibet solo. Et sanè dolendum est, *Plantarum* naturam nondum magis exploratò nobis innotescere; quæ mihi videntur reliquæ omni, quâ patet, *Materiae Medicæ* palmam præripere, & quæ inveniendorum, de quibus jam diximus, Remediorum uberrimam nobis spem faciunt: Cum *Animalium* partes cum humano corpore nimium convenire videantur, nimium dissidere *Mineralia*; unde est quod Mineralia Indicationibus potentiùs respondere, quàm vel plantas vel ex animalibus desumpta, lubens fateor; at non specificè tamen mederi, eo quo diximus sensu ac modo. Me quod spectat, non hîc aliud mihi sumo præter laborem ac tædium hæc atque hujusmodi diu multumque jam per aliquot annos animo versandi, necdum mihi tam feliciter cessit, ut cum prudenti fiducia, quæ de iis cogitaverim, in publicum dare ausim.

Quantumlibet verò mihi præ cæteris arrideant *Plantæ*, non tamen is sum, qui eximia illa Medicamenta ex alia tribu desumpta, quæ vel hoc, vel alio aliquo sæculo hominum industriâ atque labore Intentionibus aptè respondentia reperta fuère, contemnam. Inter quæ primum sibi locum vendicant quæ nomine *Guttarum Doctoris Godard* insigniuntur, & à Viro *Doctissimo & solertissimo* tam Methodi quàm Remediorum indagatore, *Domino Doctore Goodall* præparantur; quarum vim ac efficaciam in attingendo, ad quem vulgo diriguntur, scopo, cæteris quibusque *Spiritibus Volatilibus* jure præfero.

Coronidis loco, cum in hac introductione fuerim pollicitus, me daturum specimen eorum, quæ in hujus Artis augmentum utcunque conatus sum; fidem liberare jam tentabo in tradendis *Historiâ Curationeque Acutorum Morborum*. Qua in re licet satis advertam, me supinis atque ignorantibus fructum omnem eorum, quos per meliores vitæ annos corpore animoque exantlavi laborum, expositurum, malum tamen pessimi hujus sæculi genium satis habeo perspectum, ut non aliam ex hac semente, quàm convitiarum atque contumeliarum messem expectem: Meque tamæ meæ longè melius consuluisse, si inanem aliquam atque inutilem speculationem commentatus fuissém. Hoc verò mihi perinde est: Mercedem aliunde præstolor. Si quis hîc objiciat alios æquè in hac arte versatos non idem mecum de his rebus sentire; meum non est, quid sentiant alii; disquirere, sed meis observationibus adstruere fidem, quod ut faciam,

faciam, Lectoris patientiam desidero tantum, non favorem. Res ipsa etenim brevi loquetur, an fideliter & sincero animo hîc egerim, an è contra ad instar sceleratissimi hominis morumque profligatissimorum, homicidam me præstiterim vel in terra defossus. Illam tantum mihi veniam peto, quod minus accuratè quàm proposueram morborum Historiam ac Curationem descripsero; cum non tam metam figam, quàm animos iis addam, qui feliciore ingenio præditi ad hoc opus posthâc se accingent, quod jam ego imperfectè molior.

Unum adhuc restat, de quo monendus est Lector, mihi in animo non esse, sequentes paginas infinito particularium observationum numero distendere, quibus Methodo ibidem traditæ fidem astruam: Frustra enim & cum tædio Lectoris repeterentur ista singulatim, quæ in summas contraxi. Satis autem ad calcem Observationis cujuslibet Generalis (saltem quæ ad annos nuperos spectat) Particularem hîc illic adnectere, quâ Methodi præcedentis medulla contineretur. Hoc interim spondeo, nullam à me Methodum Generalem fuisse evulgatam, quæ experienciâ reiteratâ non est stabilita, atque confirmata.

Sed & spe frustrabitur, qui ingentem Remediorum, seu Formularum sylvam hîc expectaverit, cum Medici judicio permittatur, ut pro re natâ iis utatur; mihi sufficit innuisse, quibus Indicationibus satisfaciendum est, quo etiam ordine & tempore; Etenim in eo præcipuè stat Medicina Practica, ut genuinas Indicationes expiscari valeamus, non ut remedia excogitemus, quibus illis satisfieri possit; quod qui minus observabant, *Empiricos* armis instruere, quibus Medicorum opera imitari queant.

Quod si quis objecerit, me in aliquibus non tantum medicamentorum pompæ renunciassè, sed ea insuper remedia proposuisse, quæ ad materiam medicam vix possint referri, adeò sunt simplicia atque inartificiosa; vulgaribus tantum opinor ac plebeis animis hac in re displicebo. Norunt enim Sapientes, Bona ea esse omnia quæ sunt utilia, atque *Hippocratem*, dum Folium usum in *Ileo* sanando proponit, & in *Cancro* nihil prorsus agendum præcipit, [atque ejusmodi alia quæ in singulis ferè pagellis scripta leguntur] non minus benè de re medica meruisse, quàm si pomposis remediorum formulis omnia implevisset.

In animo erat & *Chronicorum* morborum Historiam tradere, eorum saltem, quos frequentissimè tractaveram, sed cum operosius id sit, cumque harum, quas jam edo, Lucubrationum fortunam experiri primum libuerit, impræsentiarum supersedendum mihi esse duxi.



AUTHORI, IN TRACTATUM EJUS DE FEBRIBUS.

*F*ebriles æstus, victumque ardoribus orbem
 Flevit, non tantis par Medicina malis.
 Nam post mille artes, Medicæ tentamina curæ,
 Ardet adhuc Febris, nec velit arte regi.
 Præda sumus flammis; solum speramus ab igne,
 Ut restet paucus, quem capit urna, cinis.
 Dum quærit Medicus Febris causamque modumque,
 Flammarum & tenebras, & sine luce faces;
 Quas tractat patitur flammæ, & Febre calescens,
 Corruit ipse suis victima raptâ focis.
 Qui tardos potuit morbos, artusque trementes
 Sistere, Febrili se videt igne rapi.
 Sic faber exesos fulsit tibicine muros,
 Dum trahit antiquas lenta ruina domos.
 Sed si flamma vorax miseras incenderit ædes,
 Unica flagrantibus tunc sepelire salus.
 Fit fuga, tectonicas nemo tunc invocat artes,
 Cum perit artificis non minus usta domus.
 Se tandem Sydenham Febrisque Scholæque furori
 Opponens, Morbi quærit, & Artis opem.
 Non temerè incusat tectæ putredinis ignes;
 Nec fictus, Febres qui fovet, humor erit.

Non bilem ille movet , nulla hic pituita : Salutis
 Quæ spes , si fallax ardeat intus aqua ?
 Nec doctas magno rixas ostentat hiatu ,
 Queis ipsis major Febribus ardor inest.
 Innocuas placidè corpus jubet urere flammæ ,
 Et justo rapidos temperat igne focos.
 Quid Febrim extinguat , varius quid postulet usus ,
 Solari ægrotos quâ potes arte , docet.
 Hactenus ipsa suum timuit Natura calorem ,
 Dum sæpè incerto , quo calet , igne perit :
 Dum reparat tacitos malè provida sanguinis ignes ,
 Prælusit busto , fit calor iste rogos.
 Jam secura suas foveant præcordia flammæ ,
 Quem natura negat , dat Medicina modum.
 Nec solùm faciles compescit sanguinis æstus ,
 Dum dubia est inter spemque metumque salus ;
 Sed fatale malum domuit , quodque astra malignum
 Credimus , iratam vel genuisse Stygem.
 Extorsit Lachesi cultros , Pestique venenum
 Abstulit , & tantos non finit esse metus.
 Quis tandem arte novâ domitam mitescere Pestem
 Credat , & antiquas ponere posse minas ?
 Post tot mille neces , cumulataque funera busto ,
 Victa jacet parvo vulnere dira Lues.
 Ætheriæ quanquam spargant contagia flammæ ,
 Quicquid inest istis ignibus , ignis erit.
 Delapsæ cælo flammæ licet acrius urant ,
 Has gelida extinguere non nisi morte putas ?
 Tu meliora paras victrix Medicina , tuusque ,
 Pestis quæ superat cuncta , triumphus erit.
 Vive liber , victis Febrilibus ignibus ; unus
 Te simul & mundum qui manet , ignis erit.

J. LOKC A. M. Ex ÆDE
 Christi Oxon.

OBSER-



OBSERVATIONUM
 MEDICARUM
 CIRCA
 MORBORUM ACUTORUM

Historiam & Curationem
 SECTIO PRIMÆ.

CAPUT PRIMUM.

De Morbis Acutis in genere.



ICTAT ratio, si quid ego hic judico, Morbum, quantumlibet ejus Causæ humano corpori adversentur, nihil esse aliud quàm Naturæ conamen, materiæ morbificæ exterminationem, in ægri salutem omni ope molientis. Cùm enim hominum genus, ita volente supremo rerum omnium arbitro ac moderatore *Deo*, variis impressionibus, forinsecus advenientibus, excipiendis aptum natum sit, fieri non potest quin idem variis etiam malis fuerit obnoxium: quæ quidem partim ab istis aëris particulis nascuntur, quæ, cùm corporis humoribus malè convenientes in idem se insinuaverint, nudo sanguini permistæ, corpus omne morbifico afflant contagio; partim à variis fermentationum generibus, vel etiam putrefactionibus humorum, qui in corpore ultra justum tempus ideò sint commorati, quia scilicet iisdem digerendis primùm, dein excernendis, vel ob nimiam eorundem molem vel qualitatem incongruam, suppar idem non fuit. Hisce rerum circumstantiis ita intimè essentiæ humanæ intertextis complicatisque, ut nemo quisquam se ab aliis in solidum queat liberare, Na-

tura de ejusmodi methodo, ac symptomatum concatenatione sibi prospexit, quibus materiam peccantem atque alienam, quæ totius Fabricæ compagem aliter solveret, è suis finibus possit excludere. Quamlibet autem frequentius longè quàm fieri cernimus, illum, ad quem remediis hisce ingratis collimat, sanitatis scopum attingeret, nisi ab ignaris à recto, quem tenet, cursu detorqueretur; verum tamen cum sibi relicta vel nimio opere satagendo, vel etiam sibi deficiendo hominem letho dat, ferreæ illi atque insolubili mortalitatis legi obsequitur, cui debemus nos nostraque. Rectè enim *Boëthius*, atque ex rerum sensu.

Constat eternâ positumque lege est,

Constet ut genitum nihil.

Sed ut instantiâ unâ alterâve jam dictorum veritatem asseramus; Ipsa *Pestis* quid, obsecro, aliud est, quàm Symptomatum complicatio, quibus utitur natura ad inspiratas unâ cum aëre particulas *μικρομορδεις*, per emunctoria, apostematum specie, vel aliarum eruptionum operâ, excutiendas? Quid *Arthritis*, nisi Naturæ providentia ad depurandum senum sanguinem, atque expurgandum corporis profundum, ut cum *Hippocrate* loquamur? Poteſt & idem affirmari de plerisque aliis morbis perfectè formatis.

Jam verò nunc hoc munere celerius fungitur natura, nunc verò tardiùs, pro variâ methodo, quâ causam morbificam deturbare nititur. Nam cum *Febris* opem deposcit, quâ adjutricè particulas inquinatas à sanguine divellat, divulſasque prògressu adhuc ulteriori per Sudores, Diarrhœam, Eruptiones, aut aliam istiusmodi evacuationem expellat; cumque in sanguinis massâ corpore pertenui ac fluido res omnis peragatur, idque motu partium violentiore; necesse omninò est, non solum ut subito vel in salutem ægri, vel in mortem determinetur (prout sc. Natura vel materiam morbificam criticè norit solvere, vel ab eâdem oppressa fatiscat) sed etiam ut pejora vehementioraque symptomata se ubique comites adjungant. Atque hujusmodi planè sunt morbi isti quos *Acutos* appellamus, qui velociter sc. atque cum impetu & periculo ad statum moventur. Quamvis, si minùs accuratè, haud tamen minùs verè loquamur, isti etiam morbi pro *Acutis* sint habendi, qui, licet respectu Paroxysmorum, si omnes simul sumantur, tardius moveant, respectu tamen Paroxysmi cujuslibet particularis, citò atque etiam criticè ad finem perveniunt; quales sunt Febres intermittentes omnes.

Ubi verò continens morbi materia ejus est indolis, ut febrem in partes suas pertrahere non valeat ad dictæ materiæ separationem universalem; aut cum hujusmodi materia parti alicujus affigitur, quæ eidem explodendæ prorsus est impar, sive ob propriam conformationem (uti se res habet in materiâ Morbificâ *Paralyticorum* nervis impactâ, in materiâ item suppuratâ in cavitate Thoracis *Empyicorum*) vel ob defectum caloris naturalis & spirituum, (ut cum Pituita in pulmones decidit, vel Senio vel Tussi diuturniore labefactatos) vel denique ob continuum materiæ novæ affluxum, quâ sanguis viatus & ad ejusdem eliminationem unicè dispositus, partem obruit gravatque:

que: In his, inquam, casibus, vel tardè admodum ad coctionem pervenit materia, vel non omninò; adeoque morbi ab hujusmodi materiâ inconcoctili provenientes **CHRONICI** & nuncupantur & sunt: A duobus his itaque principiis sibi invicem contrariis, de quibus modò egimus, morbi alii *Acuti*, alii verò *Chronici* exurgunt.

Acutos quod spectat, quos impræsentiarum tractare mihi est animus, eorum alii à secretâ atque inexplicabili Aëris alteratione, hominum corpora inficientis, gignuntur, neque à peculiari sanguinis & humorum crasi omnino dependent, nisi quatenus occulta aëris influenza dictis corporibus eandem impræsserit. Hi durante arcanâ illâ aëris constitutione nec ultra pergunt lacefere, neque alio tempore invadunt. *Epidemici* hi dicti sunt.

Acutorum alii, ab hac vel illa particulari corporum particularium ἀνομαλίᾳ oriuntur, qui cùm à causâ magis generali non producantur, ideò neque plures simul corripunt. Hi insuper Acuti quibuslibet annis & quolibet anni tempore indifferenter invadunt; exceptis tamen iis quæ dicemus, ubi de genere hoc peculiariter agetur. Hos ego *Acutos Intercurrentes* sive *Sporadicos* appello, quia nullo non tempore contingunt, quo *Epidemici* grassantur. Ab *Epidemicis* primum exordium mihi sumam, generalem eorundem historiam ante omnia proponens.

CAPUT II.

De Morbis Epidemicis.

Nihil quicquam, opinor, animum universæ quâ patet Medicinæ pomœria perlustrantem tantâ admiratione percellet, quàm discolor illa & sui planè dissimilis Morborum Epidemicorum facies, non tam quâ varias ejusdem anni tempestates, quàm quâ discrepantes diversorum ab invicem annorum *Constitutiones* referunt, ab iisque dependent. Quæ tam aperta prædictorum morborum diversitas tum propriis ac sibi peculiaribus symptomatis, tum etiam medendi ratione, quam hi ab illis disparem prorsus sibi vendicant, satis illucescit. Ex quibus constat, Morbos hosce, ut ut externâ quadantenus specie & symptomatis aliquot utrisque pariter supervenientibus convenire paulò incautioribus videantur, re tamen ipsâ, si benè adverteris animum, alienæ admodum esse indolis, & distare ut *Æra Lupinis*. Haud equidem satis scio, an diligentius examen (quali ritè instituendo vix unius hominis brevis ætas par esse videatur) nos edoceret, Epidemicorum alios continuâ quadam serie, ceu facto circulo, alios semper excipere; an verò omnes indiscriminatim nulloque servato ordine, pro occulta Aëris diathesi & inexplicabili temporum ratione, mortales incessere. Hoc saltem pro comperito habeo ex multiplici accuratissimarum observationum fide, prædictas morborum species, præsertim Febres continuas ita toto, quod aiunt, cœlo differre, ut quâ Methodo currente anno ægrotos liberaveris, eâdem ipsâ an-

no jam vertente forsitan è medio tolles : quodque, ubi semel in genuinam medendi rationem, quam hæc vel illa Febris species sibi vendicat, auspicato inciderim, ad eundem scopum collimans (favente, ut fit, optimo Numine) metam quasi semper attingam, respectu ad temperamentum, ætatem & reliqua ejusmodi usquequaque habito, donec extincta illa specie novoque gliscente malo, anceps rursus hæreo, qua mihi via insistendum ut ægris subveniam, ac proinde nisi ingenti adhibitâ cautelâ, intentisque omnibus animi nervis, vix ac ne vix quidem possum efficere ne unus aut alter eorum, qui se primi meæ curæ commiserint, vita periclitetur, donec investigato jugiter tandemque perspecto morbi genio, ad eundem perdomandum recto pede & intrepidus denuò procedam.

Quamvis autem diversas diversorum annorum habitudines, quoad manifestas aëris qualitates, maxima qua potui diligentia notaverim, ut vel exinde causas tantæ Epidemicorum vicissitudinis expiscarer, me tamen ne hilum quidem hæcenus promoveri sentio; quippe qui animadverto annos quoad manifestam aëris temperiem sibi planè consentientes, dispari admodum morborum agmine infestari, & vice versâ. Ita enim se res habet. Variæ sunt nempe annorum *Constitutiones*, quæ neque calori, neque frigori, non sicco humidove ortum suum debent, sed ab occulta potius & inexplicabili quadam alteratione in ipsis terræ visceribus pendent, unde aër ejusmodi effluviis contaminatur, quæ humana corpora huic aut illi morbo addicunt determinantque, stante scilicet præfatæ Constitutionis prædominio, quæ exacto demum aliquot annorum curriculo faceffit atque alteri locum cedit. Unaquæque harum Constitutionum generalium propria ac peculiari sibi Febris specie funestatur, quæ extra illam nusquam comparet, cujusmodi Febres idcirco *Stationariæ* nobis audiunt.

Ad hæc sunt & particulares quædam ejusdem anni, ut ita dicam, *Crales*, in quibus licet secundum manifestas aëris qualitates, ejusmodi Febres quæ generalioris anni Constitutionem sequuntur magis minusve Epidemicè grassentur, vel seriùs ocysusque ingruant; præ cæteris tamen ejusmodi Febres, quæ omnibus in universum annis competunt (quas ideò *Intercurrentes* voco) ab hoc, illove manifesto aëris temperamento ortum ducunt; verbi gratiâ, *Pleuritis*, *Angina*, & reliquæ ejusdem farinae, quæ à subito calore, intensius ac diuturnum frigus statim excipiente, plerumque invadunt. Potest itaque fieri, ut sensibiles aëris qualitates ad illas quidem Febres producendas faciant, quæ in qualibet constitutione se exerunt; non verò ad istas alias quæ certæ alicui constitutioni quasi propriæ ac peculiæres existunt. Fatendum tamen est, prædictas aëris qualitates corpora nostra ad hujus illiusve morbi Epidemici generationem magis minusve disponere; quod & de quocunque errore circa *sex res non naturales* dictum volo.

Animadvertendum autem est, Epidemicorum alios in hoc aut illo anno regulariter & eodem semper modo se habere, iisdem planè phænomenis & conformi symptomatum agmine in plerisque ferè omnibus quos adoriuntur, stipatos,

pato, atque eadem prorsus viâ sibi fugam & exitum parantes. Ex his itaque tanquam in suo genere perfectissimis, verâ & certa Morborum Epidemicorum Historia ediscenda est atque tradenda.

Sunt verò alii, aliorum annorum Morbi, qui licet Epidemicorum insigniantur nomine, enormes tamen sunt & perquam *anomali*, ut potè qui nulli Typo patiuntur astringi; & reverà mali sunt moris, tum quoad incertam symptomatum varietatem certissimamque dissimilitudinem, tum quoad methodum quâ se ipsi expediunt & amoliantur. Hæc tanta illorum disparitas exinde oritur, quòd scilicet quælibet Constitutio morbos parit, à morbis ejusdem generis, qui alio tempore grassabantur, multum ablucentes, quod non tantum in Febribus locum habet, sed in plerisque aliis Epidemicis.

Neque hîc finitur *Orestes*: restat enim & aliud paulò subtilioris *sewēias* luxuriantis, si fas est dicere, naturæ lusus; quòd nempe idem morbus in ipsissima anni constitutione varia sæpè & dissimili se facie ostendat, quod ad tempora attinet Principii, Status, & Declinationis; quod quidem tanti potest esse momenti, ut pro ejus arbitrio Curativæ Indicationes ponendæ, sumendæve fuerint.

Porro observandum est, Epidemicos quoscunque in duos omninò ordines dispesci; *Vernos* dico, & *Autumnales*: & quamvis fieri potest, ut aliâ quâlibet anni tempestate subnascentur, ad illam tamen sunt relegandi, Ver Autumnusve fuerit, quàm proximè contingunt: Accidit enim nonnunquam, aeris temperiem cum Epidemicorum aliquo intantum conspirare, ut, eo fauore, ante tempus sibi debitum miseros invadat, & è contra est, ubi tam parum illis inter se convenit, ut corpus prædispositum non nisi aliquandiu post aggrediatur. Cùm itaque *Ver* dico vel *Autumnus*, non de ipso statim *Æquinoctio*, sive *Verno* sive *Autumnali*, ad amissim loquor.

Epidemicorum, qui *Verno* tempore grassantur, alii maturè admodum se ingerunt, mense scilicet *Januario*, & exinde pedetentim increbrescentes circa *Æquinoctium Vernale* ad Statum perveniunt, à quo sensim imminuti circa *Solstitium Æstivum* evanescent, nisi quòd paucissimi postea forsitan hunc illumve petant. In horum numero sunt *Morbilli*, ut & *Febres Tertianæ Vernales*, quæ, licet seriùs aliquandò emergant, *Februario* nempe, tamen appetente *Æstivo Solstitio* pariter se subducunt. At verò alii *Vere* orti, & de die in diem invalescentes non nisi sub *Æquinoctium Autumnale* statum indipiscuntur, quo præterlapso paulatim cedentes, tandem adventante brumali frigore vertuntur in fugam; hujusmodi sunt *Pestis* ipsa, & *Variolæ*, istis annis quibus eorum utervis aliorum morborum prædominio fuerit potitus.

Cholera Morbus ex Epidemicorū Autumnalium familia mens. *Augusto* exorsus intra angustos unius mensis cancellos conclusus percurrit sua tempora. Sunt tamen alii qui eadem tempestate prognati usque ad hyemem excurrunt, v. gr. *Dysenteria*, *Febres Quartanæ*, & *Tertianæ Autumnales*. Hi omnes, utut eorum aliquos quos semel invaserint longiori vel breviori tempore affligant, plerumque

que tamen intra duorum mensium spatium, & nomen & Epidemicorum naturam prorsus amittunt.

Febres autem speciatim quod attinet, observandum est, maximam earum partem, quæ *Continuæ* sunt nulla huc usque nomina, in quantum à Constitutionis generalis Influentia pendent, obtinuisse, appellationes autem quibus dignoscuntur ab insigni aliqua alteratione sanguini impressa, vel evidentiori symptomate mutuari. Hac ratione *Putridæ* dicuntur, *Malignæ*, *Petechiales*, &c. Quandoquidem verò singula ferme constitutio præter has quas parturit *Febres*, ad alium morbum aliquem magis Epidemicum eodem tempore propagandum proclivis est celebrioris nominis, cujusmodi sunt *Pestis*, *Variolæ*, *Dysenteria*, &c. non satis video, cur istiusmodi *Febres* non potius sortirentur nomina à Constitutione, quatenus horum morborum alterutri producendo favet, eodem illo tempore quo comparebant, quam à qualibet sanguinis alteratione, vel symptomate particulari, quæ diversæ speciei febribus pari jure possunt competere. *Intermittentes* verò nomina sibi desumunt ab intervallo Paroxyismi interjecto, atque hoc quidem caractere satis discriminantur, si variarum etiam anni tempestatum quibus contingunt, Veris sc. & Autumnii, habeatur ratio. Licet nonnunquam earum aliqua de Intermittentium naturâ reverâ participant, nullo caractere admodum visibili easdem prodente. Ut cum præmaturæ, *Julio* mense, v. gr. Intermittentes Autumnales ingrediuntur atque increbrescunt, non statim genuinum Typum induunt, (quod Intermittentibus Vernis quidem solemne est) sed continuas *Febres* ita per omnia imitantur, ut nisi castigatissimo utrasque examine trutinaveris, ab invicem discriminari non possint, ac retuso paulatim Constitutionis impetu, & frænata vi, jam in Typum regularem migrant, atque exeunte Autumno, larvâ abjectâ, Intermittentes se esse, quales ab initio reapse fuerunt, palam fatentur, sive Quartanæ illæ fuerint, sive Tertianæ; quod si non diligenter animadverterimus, cum magno ægrorum nostrorum malo medicantes hallucinabimur, dum hujusmodi *Febres*, quæ ex Intermittentium numero sunt, pro Continuis veris & genuinis habeantur.

Porro, quod sedulo advertendum, quum plures aliquot horum morborum eundem fatigent annum, unus eorum aliquis reliquorum prædominio potitur, cæteris in ejus quasi ditionem redactis, & parcius id temporis favientibus, ita ut illo augescente imminuantur hi, eodemque rursus imminuto, mox recrudescent. Atque ita vicissim mortales lacessunt, prout anni genius & sensibilis aëris temperies huic aut illi magis suffragantur. Qui verò morbus circa Æquinoctium Autumnale maximopere furit & cumulatissimam edit stragem, totius anni Constitutioni nomen impertit suum; quisquis enim fuerit morborum, qui ea tempestate præ cæteris invaluerint, principatum omnium qui isto anno invadunt, obtinuisse facile deprehendetur, cujus ingenio Epidemici, quotquot sunt *σύγχεροι* se accommodant, in quantum eorum fert natura; v. gr. cum *Variolæ* eo tempore latissimè depopulantur, Febris toto anno sparsim oberrans ejusdem planè inflammationis est particeps, quæ

Variolas parit. Uterque nempe Morbus ad eandem ferè normam adoritur, maximaque inter maximè propria utriusque Symptomata intercedit cognatio, (exceptâ Variolarum eruptione, & reliquis, quæ ab illa pendent) ut ex ingenti illo tum ad spontaneos sudores, tum ad salivam excernendam propensione, in quâ utrique convenit, abundè constat. Pariter, cum *Dysenteria* dicto tempore præcipuè fuerint grassatæ, Febris, quæ eo anno infestat, earundem indolem non leviter æmulatur, nisi quòd illæ causam morbificam per sedes eliminant, & pauca alia exinde nascantur symptomata, quod tum à consimili utriusque morbi insultu, tum etiam quòd utroque malo correpti Aphthis similibusque invicem symptomatibus admodum sint obnoxii, satis evincitur. Et sanè *Dysenteria* de quâ agitur, ipsissima illa Febris est; hoc tantum discrimine, quòd introvertatur & in intestina se exonerans per eandem viam sibi faciat. Notandum autem est, Epidemicorum illum principem, qui sub Æquinoctio Autumnali, ceu rupto aggere torrens, omnia straverat, ingruente hyemis frigore intra suum se alveum condere: cum ex adverso Epidemici inferioris ordinis, qui sub eo merentur, tunc temporis præsertim ingravescant & rerum potiantur, donec dictus anni princeps eorum vires denudò frangat & deleat nomen.

Postremò observandum est, quoties Constitutio aliqua varias Epidemicorum species parit, singulas has species genere ab illis differre, quæ cum idem planè nomen sortiantur, aliâ tamen Constitutione generentur. Quotcunque sint autem Species illæ peculiare, quæ in unâ eademque Constitutione invadunt, in communi unâ atque generali causâ singularum productrice, omnes conveniunt, hæc scilicet aut aliâ aëris Diathesi peculiari; & ex consequenti, quantocunque ab invicem, quoad Typum & Formam specificam, intervallo distent. Constitutio tamen omnibus communis subjectam singularum materiam ad ejusmodi conditionem atque statum effingit formatque, ut præcipua symptomata, quæ ad particularem evacuationis modum nihil attinent, omnibus paria sint; singulis etiam in hoc conspirantibus, ut eodem pariter omnes tempore & intendant sævitiam & remittant. Notandum est insuper, quibus annis variæ illarum species grassantur uno eodemque tempore, eas omnes modo quo primùm aggrediuntur, atque invasionis symptomatis, consentire.

Hinc itaque cernere est, variam admodum & accuratam naturæ methodum, quam ad morborum generationem adhibet, quam nemo hominum, arbitror, hætenus pro rei dignitate satis observando est assecutus. Atqui ex pauculis hisce omninò conficitur (cum specificæ Popularium morborum differentiæ, nominatim Februm, arcanæ annorum constitutioni innitantur) incassum defudare illos, quotquot diversarum Februm rationes à causâ morbificâ in humano corpore aggestâ deducunt; nam liquido patet, quemlibet, pancreaticè licet valentem, si certa quædam hujus nostræ regionis loca adeat, Febre ibidem grassante intra dies aliquot laboraturum; vix autem credibile sit, manifestam aliquam *mutationem* ab aëre præfati viri humoribus tam brevi impressum iri. Neque minùs difficile est, generales regulas Febris his debel-

landis accommodare, & certos aliquos limites figere, quos ultra citraque progredi, aut in iisdem consistere, non liceat. In hac itaque tam spissâ rerum caligine, nihil mihi prius est, quam quando novæ Febres grassari incipiunt, cunctari paulisper, & ad magna præsertim remedia non nisi suspensio pede ac tardius procedere; diligenter interim illarum ingenium atque morem observare; quibus itidem præsidiorum generibus ægri juventur vel lædantur, ut quamprimum his repudiatis, illis utamur.

Verbo dicam, Epidemicorum Species omnes juxta Phænomenon suorum varietatem in classes redigere, ac characteres cuiusque idiopathicos enucleare, nec non propriam medendi rationem unicuique sigillatim accommodare, ut res est multi otii ac summè ardua, ita etiam cum nullo certo (aut saltem nondum explorato) annorum ordine emergant, ad justum de iisdem observationum apparatus congerendum fortasse unius Medici ætas non suffecerit. At verò hic labor, ut ut improbus, prius est exantlandus, quam nos aliquid memoratu dignum in extricandâ tam multifariâ horum morborum serie præstitisse jure possimus gloriari.

At verò quibus demùm modis, rationem reddemus distinctarum specierum *Epidemicorum*, qui non tantum, quatenus saltem nobis liquet, fortuito incurfant, sed etiam qui uno anno aut certa aliqua annorum serie ejusdem sunt generis, anno alio specie ab aliis alii distinguuntur? Nulla hîc mihi unquam methodus æquè commoda est visa atque illa, quæ per sufficientem annorum numerum protensa, eodem illos ordine describeret, quo se invicem excipiebant & insequiebantur. Quod ut jam pro meo modulo efficiam, Historiam & Curationes Epidemicorum, qui ab anno 1661. ad Annum usque 1676. [per 15. videlicet annorum spatium] depopulabantur, ex accuratissimarum, quas mihi facere licuit, observationum fide orbi erudito tradam. Cum mihi impossibile plane videatur, effectum id dare, vel causas eorundem exortus assignando à manifestis aëris qualitibus desumptas, vel multò etiam minùs à particulari aliqua dyscrasi in sanguine atque humoribus, nisi in quantum secretæ aëris influentiæ illa deberetur. Quin & magis adhuc, si fas est dicere, impossibile fuerit Variorum Epidemicorum Species tradere, qui à specificis aëris alterationibus oriuntur, quantumvis in proclivi illud esse videatur, istis videlicet qui Febrium nomina attexere norint notionibus, in speculatione istarum alterationum, quæ in sanguine humano atque sejus humoribus per hanc illamve principiorum degenerationem fieri possunt, malè fundatis. Quo quidem pacto, cum non naturam sequamur, optimam semper ducem, sed conjectandi libidini indulgeamus, tot nobis erunt morborum species, quod comminisci placuerit: Eam nobis interim arrogamus licentiam, quam nemo facile Botanico concesserit, à quo in describendâ Plantarum Historiâ sensum requirimus testimonium, ac fidem, non rationis Commentationem, quantumlibet ista polleat, atque aliis longè antecellat.

Haud equidem tantum mihi sumo, ut me in his, quæ jam trado, omnem absolvisse numerum existinem, fortè ne in recensendâ quidem universâ
Epidemi-

Epidemicorum familiâ; multo minus in me recipio, ut qui morbi elapsis, de quibus nobis sermo est, annis, ordine infra dicendo se mutuò exceperunt, venturis sæculis eundem perpetuò servaverint. Unum hoc molior, ut quo pacto hæc se res habuit nuper, astipulante paucorum aliquot annorum observatione, enarrem, quod ad has scilicet regiones spectat, & hanc in qua degimus Urbem; ut meum, quale quale sit, symbolum conferam ad opus inchoandum, quod, si quid ego judicando valeo, in maximum humani generis emolumentum cedit, ubi tandem à Posteris, quibus integrum Epidemicorum curriculum venientibus annis sibi invicem succedentium intueri dabitur, ad umbilicum perducetur.

CAPUT III.

Constitutio Epidemica annorum 1661, 62, 63, 64. Londini.

ANno 1661. Febres Autumnales Intermittentes, quæ jam ab aliquot retrò annis obtinuerunt, de novo vires redintegrabant (*Tertiana præsertim mali moris*) sub initio Julii, & quotidie increbrescentes, mense Augusto quàm immaniſſimè debacchabantur, inque multis locis, correptis ferè integris familiis, maximam hominum stragem edebant; dein verò sensim decreſcentes superveniente hyemis frigore extinctæ sunt, perpaucos Octobris mense aggressæ. Quæ dictæ Tertianæ famulabantur Symptomata, illa ab Intermittentium Tertianarum aliorum annorum Symptomatis, his præsertim discriminabantur. Ægri Paroxysmus atrocior, lingua magis nigra siccaque, extra paroxysmum *ἀσυγξία* obscurior, virium & appetitûs prostratio major, major item ad paroxysmum ingeminandum proclivitas, omnia summam Accidentia immaniora, ipseque morbus quàm pro more Febrium Intermittentium funestior. Si quando ætate proveciores, aut etiam Cachecticos invasisset, quibus pariter vena secta, aut aliæ quævis evacuationes minuissent vires, nunc ad duos nunc ad tres menses perdurabat. *Quartanæ*, rariores licet, Febres jam descriptas comitabantur, utrisque verò primum brumæ impetum non sustinentibus (neminem enim, ante intactum, feriebant) subsecuta est *Febris continua*, ab intermittentium Autumnalium genio in hoc tantum abhorrens, quòd hæc statis solum temporibus, illa continenter urgebat. Etenim eodem fermè modo ægrotos adoriebantur; qui utrisque pariter vehementer laborabant, vomituriabant, cum partium externarum siccitate, siti, linguæ nigredine, & sudoribus sub morbi finem materia morbifica in utrisque promptissimè exterminabatur. Quin imò vel hinc liquebat, Febrem hanc ad Autumnalium Intermittentium classem attinere, quod rarò admodum surgente anno compareret. Dicta itaque Febris Continua Intermittentium quasi compendium quoddam: & è contra singuli earum Paroxysmi compendium hujusce mihi videbantur; atque adeò discrimen in hoc maximè versari, quod *Continua* conceptam semel effervescentiam *εὐρεχάς* eodemque

semper tenore perficerent; *intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eisdem defungerentur. Quanto autem jam tempore prædicta *Febris continua* invaluerat dicendo non sum, quum mihi hætenus satis fuerat ad generalia Februm Symptomata attendere; utpote qui nondum vel juxta varias annorum crases, aut ejusdem anni varia tempora easdem distinguere posse animadverteram. Hoc saltem scio, unicam fuisse *Continuæ* Febris speciem usque ad annum 1665. ac *Intermittentes Autumnales*, quæ ad illum usque annum frequentes incurrabant, jam deinceps occurrisse.

Sed ut ad rem redeamus: *Febris illa Tertiana*, quæ dicto anno omnia longè latèque fuerat prædata, eodem elapso intra angustiores limites se continuit: infrequentibus verò Autumnis *Quartanæ* Epidemicis reliquis prædominabantur, stante hac aëris Constitutione. Quartanis semper post Autumnum vela contrahentibus, *Febris continua* (quæ per hoc omne tempus, parcius licet se immiscuerat) jam inclementius debacchabatur ad usque ver, quo tempore *Febres Intermittentes Vernales* succedebant, quibus ad Calendas Maii pariter fatiscientibus, *Variolæ* hinc & inde sparsim se ostendebant, quæ denuò ad conspectum *Epidemicorum Autumnalium* (Febrem continuam volo & quartanas) terga dabant victoribus. Hoc ordine Morbi Epidemici integram hanc aëris Constitutionem pervadebant, & se mutuò insequiebantur. De his mihi sermo erit in specie, & nominatim tum de Febre hac, tum etiam de *Intermittentibus*, sive Ver sive Autumnum attinerent, quibus hæc constitutio præ cæteris infamabatur.

Telam ordiar ab hac *Febre Continua*, quæ aliarum, quotquot sunt, omnium præcipua & Coryphæa mihi videtur, eo quod Natura in hac præ aliis quibuscunque uniformiter & ad eandem ferè normam tum Materiam Febrificam ad debitam Concoctionem perducit, tum coctam certo ac præfinito tempore exigit eliminatque. Ad hæc, quandoquidem illæ annorum constitutiones, quæ *Intermittentes Autumnales* promovent, communibus annis multò sæpius recurrant, quam illæ, quæ ad cæteros Epidemicos faciunt, necessario sequitur, ut quæ illas comitatur *Febris Continua* frequentius accursaret.

At præter Symptomata, quæ cæteras Febres stipabant, dicta *Febris* sequentibus insuper urgebatur: Eger plerumque animam tantum non agebat, vomituriebat, lingua sicca & nigra, ingens ac subitanea virium consternatio, & partium externarum siccitas. Urina ubique vel crassa, vel tenuis, utraque æquo cruditis indicium. In morbi declinatione, *Diarrhœa*, nisi fortè Medicus principio obstitisset, superjungebat, unde Morbus pervicacior redditus diutius affligebat. Sed suoapte ingenio ac propria indole vix ultra diem 14. vel 21. perdurabat, quo primum tempore, oborto sudore vel potius leni madore, morbus solvebatur. Neque prius *Urinae* Concoctionis signa prodibant, quod jam ut plurimum eveniebat. Quin & alia superveniebant Symptomata, quoties hic morbus minus peritè tractabatur. At verò tum hæc, tum etiam omnis morbi genius clariùs elucescent, ex peculiari Me-

thodo, quam olim huic Febri accommodaveram, quam itaque hanc transferam, (saltem quod ad rem nostram apprimè faciat) prout jamdudum typis evulga-
veram. Quò quidem tempore nondum mihi innòtuerat, aliam aliquam Fe-
bris speciem in rerum natura inveniri.

CAPUT IV.

Febris Continua Annorum 1661, 62, 63, 64.

Primò quidem adverto inordinatam illam massæ sanguineæ commotio-
nem Febris hujus seu causam, seu comitem, à natura concitari, vel
ut heterogenea quædam materia in eadem conclusa, ac ipsi inimica secernatur;
vel ut sanguis in novam aliquam diathesim immutetur.

Atque in hoc negotio magis arridet latius & generalius *Commotionis* vocabu-
lum, quàm vel *Fermentationis*, vel *Ebullitionis*; quippe quod inanis λογισμίας
occasionem præscindat, quam fortassis istiusmodi voces (quæ etiam si expli-
cationem non incommodam admittant, tamen minus propriæ, ac non ni-
hil duriores nonnullis videntur) hæud satis caverent. Quamvis enim Cruo-
ris in Febribus *commotio*, liquorum vegetabilium aliàs *fermentationem*, aliàs
etiam *ebullitionem* æmuletur; non desunt nihilominus, qui eandem non
uno modo ab utraque plurimum differre arbitrantur. De *Fermentatione*
unum alterumve ab illis sumatur exemplum. Primò, licet fermentescentia
liquida vinosam quandam indolem ita nancisci soleant, ut spiritum ar-
dentem ex iisdem destillatio eliciat, atque in acetum facile desciscant, quod
ipsum insigni acore pollet, & spiritum acidum destillando exhibet: neu-
tram tamen ejusmodi mutationem in sanguine hæctenus observatam fuisse
contendunt.

Deinde adverti volunt, quod cum in liquoribus vinosis *fermentatio* & *de-
puratio* eodem tempore peragantur, & quasi paribus passibus procedant, *de-
puratio* tamen sanguinis in Febribus ejusdem *æstuationem* non comitetur, sed
consequatur, id quod in paroxysmo febrili per sudores soluto, vel oculo-
rum testimonio, patere existimant.

Quod autem ad *Ebullitionem* attinet, difficilior illis hæc videtur analogia,
quæque experientiam habet summopere refragantem, in multis nimirum casu-
bus, quoties non adeò effrænis est cruoris orgasmus, ut *Ebullitionis* appellatio-
nem mereri possit. Verum utut sit, (neque enim hisce controversiis me ullatenus
immisceri patiar;) quandoquidem *Fermentationis* & *Ebullitionis* vocabula apud
recentiores Medicos plurimum invaluerunt, ego quoque eadem subinde usur-
pare non dubitaverim, quum modo ex jam dictis satis constet voces istas in hoc
Tractatu clariori solummodo dicendorum explicationi inservire.

Porro febrilem hanc sanguinis commotionem ob materiæ cujusdam hete-
rogeneæ, ipsique naturæ adversantis, secretionem ab eadem concitari, omne
genus febrium, quæ eruptionibus stipantur, testatum facit, utpote in quibus

istius ebullitionis sanguinis beneficio, fit excretio ad cutim excrementi in eodem latitantis, & pravâ qualitate affecti.

Quin imo nec, meâ quidem sententiâ, minus liquet, febrilem sanguinis commotionem sæpè (ne dicam sæpius) non alio collineare, quam ut ipse sese in novum quendam statum, & diathesin imminuet, hominemque etiam, cui sanguis purus & intaminatus perstat, febris corripì posse; sicuti in corporibus sanis evenire, frequenti observatione compertum est, in quibus nullus apparatus morbificus, vel quoad plethoram, vel quoad caochymiam fuerit, nulla insalubris aëris anomalia, quæ febris occasionem subministraret. Nihilominus etiam huiusmodi homines, præcedente insigni aliquâ aëris, victus, cæterarumque rerum non naturalium [ut vocant] mutatione, eisdem febre corripiuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum, & conditionem adipisci gessit, qualem ejusmodi aër aut victus postulaverint; minimè verò quòd particularum vitiosarum in sanguine stabulantium irritatio, febrem procreet. Etsi nequaquam dubitem materiam in sanguinis despumatione post febrilem commotionem, solemniter excretam, vitiosam esse, quamvis sanguis laudabilem antea diathesin obtinuerat (id quod vix magis mirandum est, quam quòd esculentorum portiones aliquot corruptæ & foetidæ evadant, postquam insignem in corpore alterationem subierint, ac jam à reliquis segregatæ fuerint.)

II. Secundò ita mecum reputo, Indicationes veras, ac genuinas, quæ in hoc morbo confurgunt, in eo versari, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem, sistatur; eâ nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa symptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat, quo pacto vel materiæ morbificæ protrusio impediretur, vel sanguinis novum statum affectantis labefactarentur conatus. Adeò ut sive materiæ heterogeneæ irritanti, sive cruori res novas molienti febris ortus debeat, Indicatio utrobique eadem existat. Hisce positis fundamentis Therapiæ methodum hoc ritu instituo.

Quoties mihi cum ægris res est, quorum sanguis vel per se imbecillior existit, (uti fere in pueris) vel justâ spirituum copiâ destituitur (ut in decliviori ætate, atque etiam in juvenibus diuturno aliquo morbo confectis) à venæ sectione manum tempero. Enimverò si Phlebotomiam his imperarem, sanguis etiamnum circa ejusmodi imminutionem plus satis debilis, despumationi suæ obeundæ prorsus impar redderetur; unde totius massæ perversio, ac proinde forsân ipsius ægri interitus sequeretur (quemadmodum si cerevisiæ aut alius cujusvis musti fermentatio intempestivè sistatur, liquores illi vitium plerumque contrahunt.) Quippe particularum, quas semel exterminare coeperit, quæque, tametsi dum reliquæ cruoris massæ æquabiliter immiscerentur, puræ extiterant, jam verò putredinem deterrimam acquirere, & cæteros humores gravi inquinamento inficere habiles evaserint, consortium natura ferre amplius non potest. Quanquam haud me latet ægros temeraria sanguinis missione multatos, convenientium Cardiacorum usu aliquando servari, sanguinemque ad tenorem defæcationi suæ peragendæ idoneum restitui posse. Sed præstiterat plagam non infligi, quam sanari.

Attamen

Attamen ubi in contrariæ indolis sanguinem incido, qualis in juvenibus athletico habitu & temperamento sanguineo præditis reperiri consuevit, primum in curatione locum Phlebotomiæ attribuo; quæ præterquam in casibus inferius memorandis sine salutis periculo hæc omitti nequit. Nam alias non solum præ nimia sanguinis ebullitione, Phrenitidum, Pleuritidum, aliarumque id genus inflammationum periculum immineret, sed præ copia etiam, impedio omnimoda Circulationis, & totius massæ quasi strangulatus consequeretur.

Mensuram quod attinet, mihi solemne est eam dumtaxat sanguinis quantitatem detrahere, quantum conficere liceat, quæ ægrum ab incommodis, quibus immodicam ejusdem commotionem obnoxiam esse diximus, incolumem præstet. Æstuationem verò illam deinceps rego ac moderor, Phlebotomiam vel repetendo, vel omittendo; Cardiacis calidis vel insistendo, & denique alvum vel laxando, vel compescendo, prout motum illum vel efferari, vel languere animadverto.

Post Venæ sectionem (siquidem ipsa juxta casus præmemoratos necessaria fuerit) sollicitus sedulusque inquiror, nunquid ægrum vel vomitus, vel inanis aliqua vomendi propensio sub Febris initium interturbaverit. Id si contigerit, omnino medicamen *Emeticum* præscribo, nisi vel ætas tenella, vel insignis aliqua debilitas ægri ab eo temperandum suaserit. Sanè Vomitorium propinare, ubi istiusmodi prægressa est vomendi proclivitas, adeo est necessarium, ut nisi humor ille expellatur, in sentinam complurium malorum difficultium sit abiturus, quæ crucem figent Medico toto durante medicationis tempore, ægrumque in haud leve periculum conjicient. Ex horum præcipuis, & maxime solitis est *Diarrhæa*; quæ ut plurimum in defervescentia Febris consequitur, quotiescumque Emetica, quando ea suadebat indicatio, omissa fuere. In febris quippe progressu, ubi malignum in ventriculo humorem nonnihil subegerit Natura, & ad intestina amandaverit, illa ab acri humore ex hoc in stomacho fonte perpetim scaturiente usque adeo corroduntur, ut non possit insequi *Diarrhæa*. Observavi nihilominus in Febribus inflammatoriis, quæ malignæ vulgò habentur, omissionem Vomitorii, tametsi talis vomendi propensio præcesserit, *Diarrhæam*, quemadmodum in hac Febre, necessariò non inferre, sed de ista re plura in sequentibusq; memorandis ibidem sibi munus

Jam autem in eo versatur istiusmodi *Diarrhææ* periculum, quod æger satis jam morbo debilitatus, enervatur ulterius, & præterea (id quod majoris est in ipsius noxam momenti) in febris declinatione, quo tempore contrahere se sanguis, ac viam suam exerere debebat ad despumationis officium peragendum, penitus præpeditur hac emissionē.

Jam verò ne quid dubites humorem hunc in ventriculo nidulantem nisi fortè vomitu eliminetur, hanc Tragoediam (*Diarrhæam* dico) quasi ex insidiis aliquanto post daturum, inquisitione instituta nunquam ferè non comperies, si quando Febrim hanc *Diarrhæa* comitetur, ægrum in morbi principio in vomitum proclivem fuisse, nec tamen Emeticum fuisse propinatum. Porro

etiam compertum habebis, etiamsi proclivitas illa ad vomendum jampridem præterierit; Diarrhœam tamen quamprimùm Vomitorium exhibueris plerumque cessaturam; dummodo Emetico ferendo pares fuerint ægri vires: Sæpiùs autem observavi Diarrhœâ semel oborta, medicamenta adstringentia vel nihil omninò, vel parum admodum ad eandem sistendam conferre, sive intro sumpta, sive exterius applicata.

Emeticum, quale passim à me propinatur, hujusmodi ferè est: *℞. Infus. Croc. Metall. ʒvj. Oxytel. Scillit. & Syr. Scabios. comp. āā ʒß. M. F. Emet.* Quod hauriri jubeo tempore pomeridiano, duabus horis post leve prandium. Verùm quò tutius, ac felicius vomitio subsequutura succedat, illud etiam in mandatis habetur, ut *Zythogalæ ℥vj.* vel viij, sint in promptu, quippe quòd periculosa sint ista medicamenta, nisi copiosè diluantur: Ideoque quoties vomuerit æger, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumendus erit haustus: quo factò, & inania illa tormina præcaventur, & vomendi conatus auspiciatò procedunt.

Sæpe miratus sum dum fortè materiam vomitu rejectam aliquando curiosè contemplabar, eamque neque mole valde spectabilem, nec pravis qualitatibus insignem, quò factum fuerit, ut ægri tantùm levaminis exinde senserint; Nempe vomitu peractò, sæva illa symptomata (nausea, v. g. anxietas, jactationes, suspiria luctuosa, linguæ nigredo, &c.) quæ & ipsos excruciarant, & adstantes perterrefecerant, mitigari solent ac solvi, quodque morbi reliquum est *ὑπόμωτος* tolerari.

Illud hîc loci non omittendum erit, si ægri conditio utrumque auxilium postulaverit (Venæ sectionem intelligo, & Vomitorium) tutum omnino esse, ut Venæ-sectio Emetici exhibitionem præcedat; aliàs enim dum vasa sanguine distenta sunt, periculum imminet, ne ex violentis illis vomendi conatibus, vel rumpantur vasa pulmonum, vel Cerebrum lædatur, affuso cum impetu sanguine atque effuso, adeoque æger Apoplexia correptus pereat. Cujus rei quamvis historias aliquot commemorare possim, illis tamen hîc supersedere visum est, monuisse contentus maximâ hac in re cautela utendum esse.

Si quis autem quærit, quo tempore Febris Vomitorium exhiberi velim, dico, In ipso planè Febris initio, siquidem optio daretur, Emeticum propinarem: ita enim fiet, ut ab horrendis illis symptomatibus, ex humorum in ventriculo, locisque vicinis delitescentium illuvie ortum ducentibus, ægrum præmuniamus; imo verò & fortasse in ipsis quasi incunabulis opprimamus morbum, qui aliàs cum ægroti periculo grandescet, ac longævus evadet; nutritus nimirum dictis illis humoribus, qui vel substantia sua in penitiores corporis partes transmissi cum sanguinis massa commiscentur, vel ex ipsa mora pejores facti, atque venenata pravitate inquinati, ex foco suo jugiter pertranseunti sanguini malignam auram afflabunt. Hujus rei (ne longius abeamus) Cholera morbus exemplum nobis exhibet; fit enim aliquando ut intempestiva opera vomitum in illo morbo cohibere fatagentes [sive illud Laudano fiat, sive adstringentibus medicamentis] eo cohibito non minus periculosa

culosam malorum catervam invehant. Humores enim acres corruptique, quorum exclusionem tantisper permittere oportuerat ut satis evacuantur, hoc pacto repulsi vires suas, ac sævitiam in sanguine exercent, febremque accendunt, quæ ut mali moris, & gravibus symptomatis stipata esse solet, ita nisi propinato Emetico, tolli vix potuerit, etiam ægro jam nequidem vomitu-
riente.

Quod si nobis (ut sæpe fit) serò accersitis non licuerit Emeticum propinando, ægrorum saluti sub febris initium consulere, certè tamen convenire existimaverim, ut quovis morbi tempore illud fiat, modò vires eo usque morbus non attriverit, ut Emetici vim ferre jam amplius nequeant. Equidem ego die febris duodecimo vomitum imperare non dubitavi, etiam cum ægre vomiturire desiisset, neque sine fructu; Eo namque Diarrhœam sustuli, quæ sanguinem in peragenda despumatione impedivit; quin & seriùs idem facere minimè dubitarem, nisi virium attritarum ratio prohiberet.

Vesperì, celebratâ jam vomitione, semper illud ago, ut tumultum ab Emetico id humoribus excitatum consopiam, & quietem conciliem; ideoque sub noctem, vel hora somni Paregoricum quempiam haustum exhibere jubeo. Ex g. ℥. *Aqu. papav. rhæad.* ℥ij. *aq. Mirab.* ℥ij. *syr. de mecon.* & *syr. papav. errat. an.* ℥ss. *M. F. Haustus.*

At si vel ob copiosam sanguinis jacturam, quam curationis decursu passus est æger, vel ex vomendi frequentia, dejectionibusque in Emetici hujus usu facti, vel ex præsentì ejusdem ἀνωρεξία, vel ex debilitate ejus, vel ex Febris jam declinantis vetustate, nullum jam supersit in posterum concitandæ nimix Ebullitionis periculum; tum metu procul habito, vice haustus præscripti, Diascordii satis largam dosin, vel impermixti, vel aquæ alicui Cardiacæ sociati exhibere jubeo. Præclarum sanè Medicamentum, modò ea quantitate exhibueris, quæ remedii potius quam tituli mensuram impleat.

Hic autem loci, priusquam de Emeticis dicendi finem faciam, prætereundum non est, omnino tutum non esse (saltem in hac Febre) Vomitoria ex infus. *Croc. Metall.* parata, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis vel minima quantitate exhibere. Optarem equidem, ut illius loco alia nobis tutiora, sed satis interim efficacia suppeterent, quæ humorem hunc in febris declinatione ferè semper Diarrhœam minitantem radicitùs extirpare possent, vel saltem ut medicamento aliquo idoneo acrem istam materiam, ejusque vim corrosivam ita mutare liceret, ac retexere, ut commovere Diarrhœam nequiret. Sæpius profectò mihi molestum illud accidit, quòd ad infantes, puerosque febre correptos accersitus, indicationem conspexi, quæ quidem medicamento usum suavit, cujus ope extra periculum collocari potuissent, quod tamen exhibere, veritus infelicem exitum, non sum ausus. Verùm in adultis nullam inde noxam hætenus observavi, modò cum cautionibus prædictis Emeticum propinetur.

Vomendi exantlato negotio, illud mecum ulteriùs disquirere soleo, utrum evacuationibus prægressis non obstantibus, sanguis etiamnum adeò exæstuet,

ut illius effervescentiæ limites adhuc ponendi sint, ac sufflumen addendum; an verò eo usque elanguerit ut indigeat incitamento; vel denique, an Fermentatio ad gradum idoneum, ac debitum reducta permitti sibi absque ægri periculo possit. De horum singulis nonnulla mihi dicenda sunt.

1. Itaque si sanguis eò usque exæstuet, ut meritò adhuc suspicari liceat, ægrum vel Phrenitidi, vel alii alicui molesto symptomati, ex nimia sanguinis ebullitione prognato, obnoxium esse, postridie Emetici exhiberi *Enema* præscribo. Ut *℞. decocti communis pro Clystere ℥j. Syr. Violarum & Sacchari culinaris aa. ℥ij. M. F. Enema.* Idemque repeti, pro re nata jubeo, quo sæpe fit ut sanguine nonnihil ventilato refrigeratoque, illius effervescentia satis compefcatur. Interdum tamen usu venit, ut Venæ sectionem etiam semel adhuc atque iterum repetere necesse sit, nempe in temperamentis admodum sanguineis, & ætate florentibus, aut in iis, qui nimio vini usu inflammatoriam quandam diathesin sanguini suo impresserunt. Verùm plerumque tanto, tamque insigni remedio (quale quidem est repetita Venæ-sectione) non opus est; ac proinde de, si prædictos casus exceperis, effervescentiam illam Enematum adminiculo satis reprimemus. Quare si sanguis nimium æstuet, atque effervescat, singulis, vel alternis diebus, prout res postulaverit, Clysterem injici jubeo, idque ita fieri ad decimum usque morbi diem vel circiter. Verum tamen si magna vis sanguinis amissa fuerit, vel æger sit ætate provectâ, tunc temporis Enemata nulla impero, etiamsi sanguis multum efferbuerit. In his etenim casibus, uti metuendum non est, ne omissis Clysteribus, ebullitio concepta eò usque procedat, ut insignis alicujus, & infesti symptomatis periculum immineat; ita certissimum est, eorundem usu sanguinis robur, ac vim, atque (ut ita dicam, etsi minus propriè) tonum relaxari, eatenus quidem, ut in senibus præcipuè (neque enim illis Enemata tam prosperè, ac juvenibus cedere solent) Naturæ opus interturbetur, atque impediatur. Quod si vena secta quidem fuerit, sed non multum sanguinis emissum, tunc, uti dixi, Clysteres ad usque decimum, plus minus diem impero; nonnunquam etiam ad usque duodecimum; quod in illis præsertim obtinet, quibus sanguinem demere non audeo. Sunt enim, qui post intermittentes Autumnales (sive Tertianæ fuerint illæ, sive Quartanæ) febribus continuis, ex purgationis, in præcedentis morbi fine, defectu, corripiuntur; His si sanguinem miseris, periculum est, ne sedimentum illud, quod prægressa fermentatio deposuerat, in massam sanguineam resorbeatur, novasque turbas excitet. Venæ sectionis itaque loco, rebus ita se habentibus, Clysteribus utor, & quidem ad diem usque duodecimum, modò æger sit juvenis, atque fermentatio nimis exaltata.

2. Verum è contrario, si Venæ-sectionem adhibueris, si miseris, si sanguinis effervescentia nimis elanguescat, adeoque stimulo egeat, ne Naturæ juvandæ impar fuerit, tunc equidem sic Clysteribus etiam ante diem decimum, multoque magis eo præterlapso, prorsus abstinendum arbitror. Quorsum enim jacentem jam, & nimis elanguidam fermentationem ulterius compefcere atque reprimere conaremur? Quod si verò post tempus illud, in
mor-

morbi nempe declinatione, Clysteribus utaris, profecto non minus absonum id fuerit, atque ab omni ratione alienum, quam si quis effervescenti Cerevisiæ nimis amplum spiraculum aperuerit: Etenim aperto illo spiraculo præpeditur Natura, quo minus ad morbificæ materiæ separationem unitis viribus incumbat. Postquam igitur vel mediantibus evacuationibus idoneis, atque opportunis, æger *ἔξω βελών* positus fuerit, quantum ad illa symptomata attinet, quæ ex nimia ebullitione nascuntur, vel morbus jam declinaverit, quanto magis astrictam illi alvum præstitero, tanto magis eam extra periculi aleam colloco; nempe febrili materia ad sui concoctionem suaviter, ac blandè propendente. Quocirca si præcedentes evacuationes, sanguineæ massæ quasi laxitatem quandam induxerint, vel inducere minentur, vel æger ante debitum tempus febre levatus fuerit, vel etiam febris ad ultimam suam periodum pervenerit, non solum Enemata procul haberi volo; sed & Cardiacorum opem atque auxilium suggerendum arbitror, atque mox ad alvum adstringendam memet accingo.

Cardiaca verò quod spectat, quoniam usu mihi compertum est, eadem propere nimis exhibita non contemnendam noxam inferre (vena scilicet nondum secta metuendum est, ne materia cruda adhuc existens in Cerebri membranas, &c. aut pleuram decumbat) ideo curæ mihi semper est, ne Cardiacæ exhibeantur, dummodo vel nihil omnino, vel parum sanguinis emissum, nulla-que alia insignior evacuatio facta fuerit, aut æger ætatis vigorem nondum exegerit, neque enim video, quorsum sanguis ejus per se satis locuples, ulterius in ipsius perniciem ditesceret: Locuples autem atque opulentus satis est, neque succendiculis eget, quamdiù evacuationes insignes calorem ejus insitum non prostraverint. Hujusmodi ægris domi nascuntur Cardiacæ, & quæ foris adduntur, aut frustranea sunt, aut etiam damnosa: quapropter ego vel nulla omnino, vel saltem levissima permiserim. Interim verò si æger ex profusis evacuationibus lassus & languidus, vel ætate fuerit provectus, solemne mihi est, Cardiacæ vel in ipso febris initio propinare; Morbi autem die duodecimo, negotio tunc temporis ad secretionem vergente, medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo, imo paulo maturius idem fieri potest; modò non metuendum sit, ne febrilis materia in partes principes præceps agatur; Namque hoc tempore quò magis calefecerim, eò magis concoctionem acceleravero. Neque reverà cogitando assequi possum, quid sibi velint Medici, cum sua præcepta toties ingeminant, de remediis ad promovendam febrilis materiæ concoctionem administrandis, id quod in morbi initio accersiti sæpè faciunt; nihilominus tamen eodem ipso tempore medicamenta ejusmodi imperare non dubitant, quæ febrim scilicet attemperare possint. Profectò enim est Febris ipsa Naturæ instrumentum, quo partes impuras à puris secernat: hoc illa modo planè imperceptibili præstat ab initio, atque etiam in *ἀρχῇ* morbi, verùm in ejusdem declinatione apertius, atque manifestius idem opus aggreditur, id quod ex urina cernere licet. Materiæ febrilis *concoctio* nihil aliud reverà significat, quam peccantis materiæ à sana separationem. Hanc igitur

ut acceleres, non satagendum nescio quibus attemperantibus, sed Febris effervescentia tamdiu permittenda est, quamdiu salus ægrorum passa fuerit, cum autem finem spectat, atque declinationem, secretionem jam conspicuam, tunc quidem calidioribus medicamentis illam à tergo insequemur, ad rem eò celerius ac certius perficiendam. Atque hoc re ipsa est, febrilis materiæ concoctionem promovere; cum evacuationes & refrigerantia moras nectant, & curationem impediant, ipsamque sanitatem jam appropinquantem abigant, uti sæpius à me fuit observatum.

Si fermentatio satis progrediatur, despumatio circa diem decimum quartum peragetur: Verum si refrigerantia quælibet ferius adhibueris, atque ita eorum ope effervescentia sufflaminetur, mirum non est, si febris ad diem vicesimum primum, quin & in effœtis corporibus malè tractatis multò longius excurrat.

Illud porro observatu dignum est, quandoque accidere, ut æger Clysterum aliorumve cathartorum usu circa declinationem morbi intempestivè præscriptorum, parùm alleviari videatur, imò nonnunquam apyrexiam omnimodam frui, post diem autem unum alterumve senties, non tam pristinam febrem vires suas redintegrasse, quàm novam accendi, rigor nimirum, atque horror subito invadet, quem mox excipiet calor atque febris, idem stadium (nisi forsan in intermittentium classem se reponat) decursura, quod in præcedentibus monstratum fuit. Cum ita se res habeat, non aliter tractandus est æger, quàm si antea febre non detentus fuisset, verum quoad res agendas calcata jam vestigia repetenda; despumatio enim, quæ coeptæ jam ebullitioni debetur, non nisi prædicti temporis, scilicet 14. dierum spatio peragetur, utcunque molestum fuerit ægro, à prægresso morbo satis jam debilitato, eo usque sanitatem expectare.

Cardiaca, quæ adhibeo, passim sunt ejusmodi, quæ statim subindicabo, quorum *moderationibus* utor in morbi principio, æstuatione maximè fervente; gradatim ad usum calidiorum, juxta morbi progressum, vel ebullitionis gradus pergens; semper memor licere, siquidem multum sanguinis missum, vel æger senex fuerit, ut *Cardiaca* fortiora administrentur, quàm cum vel nulla præcesserit *Venæ sectio*, vel æger ætate floruerit.

Moderata autem illa quæ dixi, *Cardiaca* fiunt ex aquis stillatitiis [ver. gr.] Borag. Citr. Scord. compos. fragor. Theriacal. cum admixtis Syrup. Melissophyl. Fernel. Caryophyl. & de succo Citr. &c. fortiora verò ex pulver. è Chel. Cancror. Comp. Bezoar. Confect. de Hyacinth. Theriac. Androm. aliisque ejusdem indolis. Quæ sequuntur in frequenti usu sunt.

℞. Aq. borag. citri, Scordii compos. & cerasor. nigr. aa. ℥ij. aq. cinnamomi hordeati ℥j. margarit. præparat. ℥ij. sacchari crystallini q. s. Misce, sumat cochl. iiij. sæpius in die, præcipuè in languoribus.

℞. Aq. totius citri, & fragor. aa. ℥iiij. aq. cord. frig. Saxon. ℥j. aq. theriac. stillat. syr. melissophyl. Fernel. Caryophyl. & de succo citri, aa. ℥℔. Misce f. Julapium, de quo capiat sæpius.

℞. Pulv. è chelis cancrorum compos. lap. bezoardici Oriental. & Occident.

tal. contrayervæ, aa. ℥j. fol. auri n. j. Misce, f. pulvis subtilissimus : Capiat ad quant. gr. xij. quoties opus fuerit, ex syr. è succo citri, & Caryophyll. aa. ℥ij. superbibendo cochl. aliquot Julap. præscript.

℥. Aq. theriac. stillat. ℥iiij. semin. citri ℥ij. contundantur simul & f. Emulsio. Colaturæ adde sacchari perlati q. s. ad gratum saporem, sumat cochl. 2. ter in die.

Plures verò formulas recensere supervacaneum arbitror, & quoniam & innumeræ sunt, aut esse saltem possunt, & in morbi decursu juxta varia ejus tempora, ac diversa symptomata variandæ sunt.

3. At si Fermentatio neque nimium æstuet, neque langueat, eam in isto gradu relinquo, nec ullis remediis utor, nisi ægrorum, vel amicorum quibus stipantur, importunitas à me aliquid extorqueat, quod ipsis citò instituti, & scopi mei fraudem placeat.

Atque hoc loco non prætermittam, me sæpius ad *tenuis conditionis homines*, quorum crumena prolixo apparatus Medico ferendo non erat, accersitum, nil fecisse aliud post Venæ sectionem, & vomitionem peractam (siquidem eas postulasset indicatio) nisi quod ipsis præscriberem, ut toto morbi tempore lecto defixi, non nisi juscula avenacea, & hordeacea vel similia haurirent; tenuem cerevisiam (dempto frigore) moderatè biberent ad sitim sedandam; Enema ex lacte Saccharato singulis, vel alternis diebus usque ad diem decimum, vel undecimum injici curarent; & versùs febris finem, coeptâ jam separatione, siquidem segnior esset, ad eam juvandam fortiolem subinde potum Cardiacorum loco, bibere ipsis permisi. Atque ita sine ulteriore aliquo apparatu, nisi quod leve Catharticum in fine morbi addere soleam, eos salvos, & incolumes dimisi.

Sed ut ad institutum meum revertar, si prædicta methodus sollicitè observata fuerit, usitato circa 15. diem, tum ex laudabilis in Urina separationis signis, tum etiam ex manifesta omnium symptomatum remissione, principio tempestivum tunc esse potionem purgantem exhibere, quæ sedimentum è prægressâ fermentatione hic illic depositum subducat; quod nisi tempestivè factum fuerit, periculum est ne in sanguinis massam remigret, ejusdemque febris recidivam conciliet, vel etiam suâ in partibus naturalibus, ad quas amandatum fuit, morâ, in mineram tenacium deinceps in corpore malorum feracem abeat. Nimirum separatione jam factâ, humores crassi ac impuri ex arteriis sanguini in venis refluxo immixti, regressum ejus faciliè impediunt, ex quo varia obstructionum, ac tandem fermentorum genera nascuntur.

Ubi tamen animadvertendum, non adeò planè necessarium esse post febres Vernales, atque post Autumnales purgationem celebrare; idque propterea, quod sedimentum à Vernalibus depositum, tum copiâ, tum qualitate terreâ, malignaque ab autumnali superetur. Quod ipsum etiam in Variolis obtinet, multisque morbis aliis Vernò tempore grassantibus, in quibus purgantium omissio non tam grave periculum (quod ego quidem observaverim) quàm in casibus priùs memoratis inferre solet.

Et sanè non multum is à veritatis scopo aberraverit, qui affirmaret ab hoc capite [purgandi scil. post morbos Autumnales omissione] plurium morborum colluviem, quàm ab ullo alio, quo demum cunque causarum fonte, dependere.

Si valdè debilis sit æger, vel alioquin perfecta adeò depuratio facta non fuerit, ut audacter possim purgans exhibere die decimo quinto, rem differo ad decimam septimam, quo tempore sequentem, vel similem, pro ratione ægri virium, potionem propino. *℞. Tamarind. ʒ℥. fol. sennæ ʒij. rhabarb. ʒi℥. Coq. f. q. aq. Colaturæ ʒiij. dissolve mannæ, & syr. rosac. aa. ʒj. Misce, f. potio cap. mane.*

Purgatione peractâ, ægrum, hætenus lecto, ex præscripto meo defixum, surgere, & paulatim ad pristinam victûs rationem reverti jubeo. Ea quippe, quam ad hoc usque tempus præscripsi, eadem propemodum est cum illa, quam modò commemorabam; Uti juscula avenacea, & hordeacea, panatellæ ex pane & vitello ovi, in aqua cum saccharo confectæ; juscula tenuia ex decocto pulli, Cerevisia tenuis lupulata, cui quandoque æstuante ardore Febrili, immisceri potest succus Aurantium recens expressus, & super ignem ad cruditatis tantummodò sublationem coctus, & his similia, quamvis juscula avenacea sint instar omnium. Negare verò cerevisiam tenuem, quæ subinde in mediocri quantitate sumatur, severitas est minimè necessaria, imò sæpenu-merò etiam detrimentosa.

Accidit interdum (maximè in senibus) ægrum Febri jam curatâ, & corpore satis jam superque purgato, nihilominus valdè debilem esse; & quandoque tussi, interdum etiam scretu, magnam glutinosi, viscosique phlegmatis copiam expectorare: quod symptoma non tantum ægro terrorem iniecit, sed & ipsi Medico, præsertim minus cauto, imposuit, eumque in opinionem induxit, quasi affectus iste Phtisi viam sterneret; licet observaverim ego, rem adeò periculosam non esse. Hoc in casu ægrum jubeo Vinum Melaganum, annosum, vel Falernum, sive Muscatum, cum pane tosto ei immisso bibere, quod crasin sanguinis multum prægressa æstuatione debilitati (proindeque nuper ingestorum succis assimilandis imparis) corroborans, symptoma illud paucorum admodum dierum spatio abigit, ut crebra experientia mihi constat.

Hac ipsa, quam proposuimus ratione, ægrum à multis affectibus, symptomatibusque, quæ malignitati tribui solent, tutum præstabimus; cum nihil magis solitum sit Medicis in arte sua minus exercitatis, quàm quando medicamentis nimis refrigerantibus, vel usu Enematum intempestivo, crasin sanguinis ita relaxarint, Naturamque in perficienda sanguinis depuratione adeò debilitarint, ut animi deliquia, aliaque symptomata (quæ genuina sunt ejusmodi impedimentorum arte positorum effecta) contingant, *malignitati* culpam transcribere: at si diuturnitas, in quam abierit morbus, eum ab hoc vitio vindicet, tùm quicquid eos in medela deinceps fatigat, id *Scorbuto* acceptum referunt: quamvis re ipsa neque symptomata, quæ accidebant, quamdiu vige-

bat morbus, *malignitatis* erant effecta, neque ea, quæ contigerunt in declinatione ejus *Scorbuti*, sed utrumque rei malè gestæ debetur, quemadmodum crebrò id à me observatum est.

Non quòd ego, aut quisquam alius, qui Morborum historiam vel delibaverit, nescius esse possit, Febres esse, quæ non intemperie sola, aut putrido tantum calore, sed etiam maligna qualitate (cujus signa evidentissima in ægris non possunt non apparere) consent: vel etiam quod inficias eam, complicari aliquando cum Febre *Scorbutum*, & complures illos morbos posse; hoc tantum dico, has affectiones immeritò sæpè in litem vocari.

Si fermentatio sanguinis ritè processerit, fiet omninò materiæ morbificæ despumatio intra tempus modò dictum. At si remedia refrigerantia, vel Ene-mata ferius exhibita fuerint, multò longius excurret Febris, præcipuè in hominibus grandævis, malè à Medico curatis; ad quos quandoque accersitus, postquam Febri per quadraginta dies & amplius laboraverant, nihil non expertus fui, quo despumationem sanguini inducerem: sed nempè usque adeò debilitatus erat sanguis, partim senio, partim Enematibus, & medicamentis refrigerantibus, ut neque Cardiacis, neque ullis aliis corroborantibus remediis scopum meum assequi possem; sed vel illorum Febris virium suarum tenax permanebat, vel alioqui, si adesse videretur *ἀνυπεξία*, vires ægrorum admodum prostratæ erant, & tantum non emortuæ.

Aliorum autem remedium successu frustratus aliò consilium vertere sæpè coactus fui, cum successu non vulgari; nempe adolescentulorum vivum vegetumque calorem ægris applicando. Nec est quòd quis multum miretur, hac methodo, licet inusitata, ægrum tantoperè corroborari, naturamque debilitatam juvari, ut semet à materiæ secernendæ, eliminandæque reliquiis exoneret; cum proclive sit intelligere, insignem effluviorum vegetorum copiam à sano, & athletico corpore in corpus ægri exhaustum transfundi. Neque unquam comperi iteratam calentium linteorum applicationem ullatenus id præstare valuisse, quod modò præscripta methodus præstitit, ubi calor applicatus tum magis est humano corpori congener, tum simul blandus, humidus, æqualis, perennisque. Atque hæc ratio, spiritus, & halitus, forsitan Balsamicos, in ægri corpus immittendi, ex quo ipse illam adhibui tempore, licet aliena primum videretur, ab aliis cum successu felici fuit adhibita: neque profectò me pudet hujus remedii meminisse, tametsi petulci quidam homines, atque arrogantes, omniaque vulgaria ingenti supercilio contemnentes, me forsitan hoc ipso nomine aspernabuntur. Ego enim proximi mei commodum, ac salutem vanis illorum opinionibus longè antefarendam censeo.

Methodus hæctenus enarrata, si quis illam prudenter, & cum destinato animi consilio observaverit, ægros, si non ab omnibus, saltem à plerisque molestis illis symptomatibus immunes præstabit, quæ hanc Febrem vel comitari, vel eidem supervenire solent, quæque Medicum animi ancipitem, atque sæpe in curationis decursu consilii penè expertem reddunt, imò & illius curæ commissos non rarò è medio auferunt, etiamsi morbi natura [mortem
non

non interminari visa sit. Sed quandoquidem vel ægrorum culpa Medicum non satis opportunè accersentium, vel ipsius Medici minori sive peritia, sive cautela, ejusmodi accidentia sæpissimè oborta cernuntur, non gravabimur peculiarem eorundem curam summam hinc attingere; verum ad ea tantum symptomata me restringam, quæ, tametsi sæpenumero præverti potuerint, modo via atque ordine prædicto quis usus fuisset; cum tamen semel acciderint, diversam quandam, sibi quæ propriam curam postulant.

Atque (ut hinc ordiar) si æger, vel calidiora medicamenta nimis propere atque intempestivè sumendo, vel calido nimis temperamento sua natura fretus, in * *Phrenitidem* prolapsus fuerit; vel [quod proximè illuc accedit] si non omninò dormiat, sæpè exclamet, aut inconditis vocibus utatur, si vultu ac loquela ferociat, si medicamenta, potumve communem avidè & quasi raptim bibat, vel denique urinam habeat suppressam; in hoc, inquam, casu, liberaliori manu, quàm supra indulsi, ad venæ sectionem, clysteres, ac medicamenta refrigerantia me accingo, verno tempore præsertim, [quo etiam, aliàs symptomate hoc non apparente, juvenes atque vegeto calore præditi, ejusmodi auxilia sine multo discrimine admittunt] atque talibus remediis utens, ægrum eo usque sustinere conor, donec in diuturnitatem aliquam affectus excurrat, quo tempore non admodum difficile erit eum & à morbo & à symptomate una eademque opera liberare: id quod fiet *Narcoticum* aliquod medicamentum in largiori paulò dosi exhibendo. Quamvis enim febre vigente, quæ *vagabunda* vi prædita sunt non omninò prosint, neque destinatum à Medico scopum feriant, tamen opportunè, & in declinatione morbi adhibita, præclaros effectus edunt: antea verò prodesse non possunt, partim quia fermentationem vi atque impetu procurrentem sistere nequeunt, etiam in maxima dosi exhibita, partim verò (quod quidem majoris adhuc momenti est) materiæ peccanti tunc temporis massæ sanguineæ æquabiliter admistæ, neque versùs separationem adhuc vergenti ab exhibito hujusmodi medicamento manus injicitur, adeoque depuratio illa tantopere expetenda impeditur. Verum sive hæc ratio sit hujusce phænomeni, sive alia aliqua magis abstrusa, judicent illi quibus animus atque otium est talia speculari. Interim ex fideli atque idoneo observationum plurimarum complexu rem ipsam certissimam esse pronuncio. *Laudanum*, vel alia quævis Narcotica in principio, augmento, vel statu hujus febris ad symptoma hoc levandum, vel non prodesse omninò, vel, quod sæpe accidit, etiam obesse; verum in ejusdem morbi declinatione eadem mediocri dosi adhibita non sine successu usurpari. Semel equidem Narcotico die morbi duodecimo usus sum, nec frustra; citius autem nunquam prosperè exhibitum novi. Quod si autem illius usum ad decimum quartum usque diem distuleris, tantò magis proficuum evadet, separatione nempe perfectiori tum facta. Neque verò hæc mora, tametsi forte astantes magnopere perterrefaciet horrendum hoc symptoma, mortem statim subinfert; cum sæpe observaverim, hanc rem plerumque inducias ferre posse ac solere, donec ad Narcotica descendere fuerit

* *Phrenitis*.

opportu-

opportunitatem; saltem si caveatur, ne *Cardiacis*, calidisque medicamentis adhibitis, intemperies coepta accendatur uberius, quo casu ægri subito pereunt. Narcotica, quibus ego uti soleo; sunt vel *Laudanum Lond.* ad gr. i. β. vel sequens. *Rec. fl. Paralys. M. i. Coq. f. q. aq. cerasor. nigr. Colaturæ* ℥iij. *Dissolve syr. de meconio* ℥β. *succi limoniorum Cochl. β. Misce.* vel *Rec. aq. Cerasor. nigr. ℥iβ. aq. Epidemicæ* ℥ij. *laudani liquidi gutt. xvj. Syr. Caryophyll. ℥j. misce.*

Illud unicum hic addere placet, quod ad hanc rem observasse non incon- sultum arbitror; nempe si symptoma hoc eo usque inducias ferat, & Febris adeò in diuturnitatem abeat, ut æger ante assumptum Narcoticum commodè purgari possit, medicamentum illud tanto foelicius effectum suum editurum. Quocirca ego imperare soleo *Pil. coch. maj. ℥ij. in aq. Betonicæ dissolut. at- que hoc 10. vel 12. horis ante Narcotici exhibitionem.* Neque metuendum est à tumultu illo, quem calidior illa massa pil. alias excitare solet; subsequen- tis enim Narcotici vis pensabit illas turbas, & quietem suavissimam, blandis- simamque inducet.

Quod si vigilæ ultra febrem excurrant, cessantibus aliis symptomatibus, observavi, linteum in aqua rosar. immersum, & frigidè sincipiti, ac tempori- bus applicatum, plus quàm Narcotica quævis prodesse.

Sæpe accidit ægrum per totum morbi decursum * *tussi* molestâ divexari; nimirum commota vehementer ac tumultuante sanguinea mole, omnibus jam ad seditionem & partium studia spectantibus, fit ut humores quidam soluti diffuentesque è massa sanguinis per vascula pulmonaria, vel etiam per diape- desin in trachæ membranam internam, teneriorem scilicet atque exquisito sensu præditam, transferantur: hinc *tussis* oboritur, quæ primò sicca est, quo- niam tenuis adhuc materia vim expultricem eludit; mox crassescit, atque ex- pectoratu difficilis evadit, eò quod sensim febrili calore torreatur, atque asse- tur: hinc fit, ut suffocationis metu percellatur æger, utpote cui vires de- sunt ad lentam hanc viscidamque materiam tussi eliminandam. Ego in hoc affectu rarò alio aliquo medicamento utor, præter *oleum amygdalarum dulcium* recenter expressum, nisi forsan acciderit, (accidit autem aliquoties) ut ægro- tus oleum prorsus aversetur; tunc enim vulgaribus illis pectoralibus, ut li- cet, opem ferre conamur. Interim oleum illud amygdalarum, siquidem illo per ægrum uti licuerit, Bechicis aliis anteponendum censeo, ob eam causam præcipuè, quòd cum necesse sit hæc liberaliùs, & majori quantitate ex- hibere, modò prodesse velimus, hoc pacto ventriculum jam satis superque de- bilem & ad nauseam proclivem oneramus; nonnunquam etiam eadem opera præpedimur, ne reliqua, eodem ipso tempore transigenda, procuremus. Ne- que verò satis, aut intellectu assequor, aut experientia eò ductus sum, cur ab hujus olei, quod jam diximus, usu in febribus abhorreamus, eò quod scilicet inflammabile sit, adeoque metuendum, ne febrim adaugeat. Fac enim illud sua natura calidum esse, certè tamen calor ille tantus non est, ut aliundè non abundè pensetur: præ cæteris manifesta vi pectori conducit, aperit.

* *Tussis.*

F. que

que vias, ac lenit, adeoque expectorationem promovet, qua (præsertim si copiosior acciderit) tum exoneratur sanguis à molesto humore, commodè jam excreto, tum eâdem operâ nonnihil refrigeratur, adeoque me non admodum malè habet, si quando viderim symptomata hoc intercurre, cujus beneficio non parum etiam ægro beneficii accedit. Illud unicum nunc moneo, unâ eâdemque vice tutum non esse, totis cochlearibus hoc oleum exhibere; periculum enim est, ne & ventriculo nauseam & alvo fluxum inducamus; parè itaque sed frequenter interdii noctuque propinandum erit, quo non solum expectoratione facta tussim leniemus, verum etiam, quod alicujus momenti est, attritas ægri vires blando nutrimento nonnihil solabimur.

Fit nonnunquam, ut * hæmorrhagia narium superveniat; sive quòd medicamenta nimis calida in morbi initio fuerint exhibita, sive quòd ebullitio non satis coercita fuerit, ægro nempe vel in florenti ætate constituto, vel anni tempestate coadjuvante. Hoc si fiat, non admodum juvabunt ea quæ ad sistendum sanguinis motum vulgò fieri consueverunt, qualia sunt venæ sectiones, ligaturæ, medicamenta adstringentia, atque agglutinantia, vel etiam sanguinis acrimoniam contemperantia, &c. quamvis enim pro Medicorum consilio, ac prudentiâ, his atque hujusmodi aliis uti liceat; in eo tamen cardo rei vertitur, ut idoneo aliquo medicamento sanguinis ebullitioni frænum imponatur, quod sistat, figatque illius impetum in præcipitia quæque ruentem. Verum quidem est, si symptoma seorsim spectetur, ea quæ supra enumeravimus (ac venæ sectionem potissimum) accommoda satis esse, nec ego ipse dubitarem iisdem uti; sed nempe symptomatis hujus causam (saltem si phlebotomiam exceperis) non satis attingunt, quam profectò non majori ratione per prædicta tollere, quam si gladio ignem extinguere satageres. Ego itaque in hoc casu, frustra aliis tentatis, tale quiddam adhibere soleo, quale nunc subnectam. *Rec. aq. portulacæ, & papaveris erratici aa. ℥i℥. syr. de meconio 3vj. syr. paralyseos ℥ss. M. f. haustus.* Nolim autem hæc ita intelligi, quasi hæmorrhagiam quamlibet ita statim curari velim, quin potius illa sæpe permittenda est, atque ægro plurimum prodesse potest, partim nimiam ebullitionem reprimendo, partim etiam criticè aliquando morbum solvendo. Atque reverà parum proderit huic symptomati frænum prædictum aptare, priusquam illud aliquantisper excurrerit, vel etiam priusquam vena in brachio secta fuerit. Illud diligenter advertendum est, hanc ipsam, atque alias omnes immodicas hæmorrhagias peculiare illud obtinere, quod quamprimum illæ quomodocunque sedatæ fuerint, nisi leniens aliqua purgatio celebretur, metus est ne recidivam æger patiatur; proindeque purgandum erit, quamvis (si Febris tempora spectentur) seriùs aliquanto id fieri soleat, atque debeat, nisi symptoma hoc accesserit.

Hoc symptoma plerumque senibus accidit post copiosas evacuationes, vel per secessum ex diarrhoea, vel maxime per vomitiones, atque sæpenumero mortem præ foribus adesse denunciat. Ingenuè fateor, me mihi met ipsi de † Singultus causa disquirenti satisfacere non posse; nihilominus observavi

* Narum hæmorrhagia. † Singultus.

sæpe

sæpe illum ex turbis, ac tumultu ab asperioribus medicamentis in ventriculo, locisque vicinis excitato, ortum ducere, quibus sedandis atque in pristinam pacem reducendis cum naturæ vires non suffecerint, sit ut ingens periculum immineat: proindeque consentaneum existimavi curam eò dirigere, ut quod natura per se nequibat, artis adminiculo suffulta perficeret. *Diascordium* igitur larga dosi exhibitum, nempe ad ℥ij. à scopo meo non aberravit, cum *semine anethi*, aliisque, quæ tanquam specifica decantantur, usus nihil profecissem.

Si in morbi hujus decursu * *Diarrhœam* obortam conspexeris, quæ (uti jam alicubi supra notavimus) accidere tum solet, cum in morbi initio vomitorii propinandi indicatio se obtulit, neque tamen illud propinatum fuit: dico in hoc casu convenire, ut quovis morbi tempore (nisi vires contra indicaverint) *emeticum* exhibeatur, etiamsi jampridem illa ad vomendum propensio præterierit. Quoniam autem hac de re satis opinor in superioribus pagellis à nobis dictum est, illud hoc in loco duntaxat annectam, quid facto sit opus, si exhibito licet emetico nihilominus *Diarrhœa* supervenerit. Quod tamen oppidò rarum est, nisi in Febre inflammatoria, ubi vomitorium, hoc symptoma non solum non impedit, sed quandoque creat, quod notatu dignum est. Itaque cum sic se res habuerit, præ quibuscumque astringentibus hujusmodi clysterem profuisse comperi. *Rec. Cort. granator. ʒss. ros. rubr. p.ij. Coq. in lactis vaccini s. q. Colaturæ lb̃ss. dissolve Diascordii ʒss. M. F. Enema.* Non suaferim ut majori quantitate Clysterem injicias, quamvis enim propria vi adstrictionem polliceatur, metuendum tamen est, ne sua mole laceffat intestina, adeoque fluxum alvi, quem consopire animus erat, uberius provocet.

Sed forsitan objiciet his aliquis, magis è re videri, ut, præsertim declinante morbo, *diarrhœam*, si quidem acciderit, permittas potius quam sistas, quandoquidem fluxus ille alvi nonnunquam criticus est, morbumque solvit. Respondeo, me non inficias iturum, fieri aliquando, ut Febris per hanc portam sibi viam faciet, atque effugiat; verum illud rarius accidit, quam ut illius spe quicquam moliamur: quin & ratio illa, quæ de medelâ Februm universim loquuti fluxus hujusce sistendi necessitatem ostendere conati sumus, etiam hic omnino locum obtinet. Nunc autem illud addendum est, meâ quidem sententiâ animadversione non indignum, nempe ad genuinam sanguinis depurationem non tantum necessariam esse illam quarundam partium secretionem, quæ per *fæces* fit, sed requiritur etiam ut secernantur aliæ, tanquam *flores*, id quod in aliis etiam liquoribus opulèntis atque heterogeneis quotidie cernimus. Itaque si *Diarrhœa* nimium indulseris, mediam solummodò depurationem, tantoperè expetitam, procurabis, atque etiam forsan, quod postremo in loco rejiciendum erat, primò excernetur. Fateor equidem separatione illâ per flores jam factâ (quæ, ut obiter id attingam, sensim, & sine sensu peragi solet, atque plerumque paulò pleniori *diarrhœâ* potius, quam sudore manifesto) *Diarrhœam*, si fortè acciderit, periculi non multum interminari: Sciendum tamen est, illam tum non aliunde accidere, quam quod purgatio subducendis fæci-

bus dicata, non opportunè exhibita fuerit, quæ quidem fæces morâ suâ fermenti alicujus maligni indolem adeptæ, intestina jam ad excretionem irritant, stimulantque; ut omittam dicere, liquidissimam illam excrementorum consistentiam (tali enim formâ plerumque visuntur) satis indicare ea pro criticâ morbi solutione habenda non esse.

Forſan etiam inter symptomata Febris supervenientia recenseri potest * *Iliaca passio*, eo quod vomitus enôrmes qui initio Februm accidere solent, huic occasionem quandoque subministrant.

Horrenda hæc affectio est, & huc usque omnium fere judicio funesta, ex intestinorum motu inverso, ac præpostero originem ducens. Nimirum intestinorum fibræ, quæ à superioribus versus inferiora contrahi debent, contrahuntur ad superiora, & quæcunque in intestinis continentur non versus alvum, sed ventriculum protruduntur, & impetu facto ad os regurgitant; adeo ut Enemata, quantumcunque acria, Emetica evadant, ubi etiam Cathartica per os assumpta per vomitum subito excernuntur. Et, mea quidem sententia, exquisitus ille, ac intolerandus dolor huic morbo superveniens, non aliunde oritur, quam ex præpostero intestinorum motu modo dicto. Cum enim finis illi, quos multiplices intestinorum circumvolutiones constituunt, ita à naturâ formati sint, ut ad descensum fæcum quam aptissimè conducerent, cum inquam, motui suis fibris contrario cedere cogantur, exoritur inde prædictus dolor; qui quidem uni parti instar terebelli infigitur, cum aut valvula quæ ad initium coli apposita excrementorum ad ileon regressum impedit, aut alia quavis membrana ad finem pertinens, vim hujus præposteri impulsus sola sustinet.

Hujus verò inversionis, unde dolor ille exoritur, duplicem causam assignare licet. Obstructionem nempe, vel irritationem.

Primò igitur quæcunque intestina vehementer obstruunt, ut nihil per inferiora descendere valeat; hunc contrarium in intestinis motum ut producant necesse est, & nemini non notum. In horum censum ab Authoribus referri solent fæces induratae, flatus crassi magnâ copîâ collecti, ac intestina velut in nodum convolventes, constrictione intestinorum in hernia, inflammatio denique aliique tumores magni, qui cavitatem internam intestini occludunt. Interim verò haud negandum, quod motus contrarius hisce causis originem debens, potius ingestorum, quam intestinorum motus habendus; neque hæc totius intestinorum ductus inversio est, sed illorum tantum, quæ supra sedem istius obstructionis sita sunt. Quam ob causam *affectio iliaca* hinc profecta à me *notha* appellatur.

Secundò verò opinor, quod in affectu iliaco causa inversionis peristaltici intestinorum motus ut plurimum ita se habet. Nimirum ex tumultuante sanguine in Febre nuper concepta, in ventriculum & proxima intestina deponuntur humores acres & maligni, ex quibus ventriculus primò motum suum invertere, ac violento impetu materiam molestantem in eo contentam per os rejicere cogitur: Ventriculi tandem motui validiori intestina tenui ipsi conti-

nua jam debilitata cedunt, & cum his demum *majora* in consensum trahuntur, vomituri venter quasi choream ducente. Hunc affectum *verum ileum* voco, & ille hujus loci est. Methodus eum curandi hactenus ferè incognita fuit, quicquid nonnulli jactent de usu *argenti vivi*, & *globulorum*, quæ præterquam quòd parum conducunt, noxam sæpè haud contemnendam inferunt. Ego cum felici successu hanc methodo utor.

Quando liquet ex Clysteribus per os rejectis & aliis signis verum esse ileum, tunc in hæc tria enitor : 1. Ut contrarius iste ventriculi motus, qui similem motum in intestinis efficit, impediatur. 2. Ut intestina acri humore debilitata corroborentur. 3. Ut ventriculus ac intestina ab istis humoribus liberentur. Quibus indicationibus ut satisfaciam, curationem hoc ritu instituo : Primo *salis absinthii* ℞j. ex cochleari uno *succi limonum* mane, & serò sumendum præscribo, intermediis verò temporibus *aquæ menthæ stillatitiæ* sine saccharo, aliove quovis additamento cochlearia aliquot bis quaque horâ propino, cujus vel solius repetito usu & vomitus & dolor ex eo natus subito evanescent. Dum hæc fiunt *catulum viventem* nudò ventri indefinenter accumbere jubeo. Postquam verò dolor cum vomitu per spatium bidui triduive omnino cessaverit, tum *pil. cochl. maj.* ℞j. in *aquæ menthæ* dissolutam exhibeo, quam etiam aquam (quò certius vomitus recursum prævertam) toto catharseos tempore sæpius sumendam injungo. Neque catulus removendus, antequam usum pilularum æger aggrediatur.

Observavi frustra pilulas istas, vel quodvis aliud catharticum, utcumque forte propinari, donec ventriculo corroborato, atque adeò ad motum naturalem reducto intestina etiam ad proprium motum æquè reducta fuerint. Alias enim cathartica omnia intus assumpta emetica evadent, & plus damni quam commodi inferent. Inde est quod remediis purgantibus viam facere non aggredior, donec per spatium quoddam medicamentis istis ventriculum respicientibus usus fuerim.

Victum valde tenuem ægro præscribo, ita ut nonnisi cochlearia aliquot jusculi ex pullo Gallinaceo parati sorbenda bis vel in die permittam. Interim verò ut per totam ægrotationem in lecto decumbat jubeo, donec perfectæ sanationis signa appareant, ac etiam post sanationem per longum tempus in prædictæ aquæ usu persistere & laneis duplicatis ventrem a frigore bene defendere impero, quò minus recidiva fiat, cui hic affectus præ omnibus aliis est obnoxius.

Pauca hæc universam meam in curando hoc affectu methodum exhaustiunt, quam à nemine consulto ob simplicitatem suam & splendidioris sive verborum, sive pharmacorum apparatus defectum, aspernatum iri confido.

Atque hæc sunt illa symptomata, quæ in febre hac occurrere solent. Sunt autem & alia quædam, quibus memorandis nunc supersedebimus, partim quidem, quoniam ea minoris momenti sunt, partim verò, quòd peculiarem nullam curationem postulent, febre enim ritè tractatâ sponte sua cessant.

De Febre continua hujus Constitutionis, ac de symptomatibus ejus hactenus.

CAPUT V.

Febres Intermittentes Annorum 1661, 62, 63, 64

QUandoquidem, ut jam sumus præfati, quæ prædictos annos omnes Constitutio pervasit, producendis omnium generum *Intermittentibus* tam egregie favit, quas tum de illis feci observationes haud indiligentes, hic impertiam: Addam insuper & quæ de paucis illis intermittentibus observavi, quæ ab illo deinceps tempore sporadicè contigerunt, quò minus orationis filum insequentium deinceps annorum historiam complectentibus, cogat intercidere.

Primo loco quò naturam illarum atque genium conjectura saltem assequamur, advertendum est, quòd in paroxysmis Febrium intermittantium hæc tria tempora spectanda sunt. 1. Tempus *Exhorrescentiæ*. 2. Tempus *Ebullitionis*. 3. Tempus *Despumationis*. Et quidem ad *exhorrescentiam* quod attinet [ut de his rebus summam loquar] ego illam exinde oriundam arbitror, quòd materia Febrilis, quæ nondum turgescens à massa sanguinea utcunque assimilata fuerat, jam tandem non solum inutilis, verum & inimica naturæ facta, illam exagitat quodammodo atque laceffit, ex quo fit, ut naturali quodam sensu irritata & quasi fugam molita, *rigorem* in corpore excitet atque *horrorem*, averstationis suæ testem & indicem. Eodem plane modo, quo potiones purgantes à delicatulis assumptæ, aut etiam toxica incaute deglutita, horrores statim inferre solent, aliaque id genus symptomata. Natura itaque hoc pacto irritata (ut ad tempus *ebullitionis* jam transeamus) quò facilius hunc hostem à suis cervicibus depellat, *fermentationem* aggreditur, solemnem nempe machinam, quā in Febribus & quibusdam aliis acutis morbis uti consuevit, cum sanguinis molem ab intestinis inimicis liberare conetur: hujus enim effervescentiæ beneficio disjunctæ peccantis illius materiæ partes, quæ sanguini æquabiliter admixtæ fuerant, aggregari quodammodo incipiunt, atque adeo leviori operâ subigi possunt, ut ad *despumationem* opportuna evadant. Et quidem ut hoc fiat, vel ex eo plurimum referre constat, quod qui ex Febribus Intermittentibus moriuntur, siquidem in paroxysmo pereant, in primo illo tempore (*exhorrescentiæ* scilicet) fato fungantur, nam si ad tempus effervescentiæ pertigerint, saltem pro illa vice non moriuntur. Atque per hæc duo tempora res ægrorum in angusto versantur; quibus elapsis, tertium tempus, quod *despumationi* dicatum est, insequitur, quo succedente symptomata omnia primo leviora sunt, atque tandem plane evanescunt. *Despumationis* autem nomine nihil aliud significatum volo, quam materiæ Febrilis jam subactæ, & quasi devictæ, expulsionem, seu separationem; atque illud quod separatur, partim (ut in aliis liquoribus cernere licet) *florum*, partim *fecum* rationem & sortem obtinet.

His ita positis, videamus quomodo fiat, ut redeat Paroxysmus, quando quidem ægrorum fors in yado jam constituta videtur. Nimirum Febrilis materia

teria nondum tota emigravit, sed quemadmodum apum Embrya statim temporibus sensim succrescunt, ita latens hæc materia pro typhorum ratione denuò caput effert, ac novum negotium naturæ faceffit, idem stadium decurrens, quod in præcedentibus modò ostendimus. Nunc autem si quis à me causam quæsierit, cur fomes ille delitescens effervescentiâ præcedenti non satis subactus, ac proinde cum reliqua materia peccante non expulsus, proindeque novas tragœdias daturus. non eodem modo in omni Febre intermittenti progrediatur (nam nunc unum, nunc duos, nunc tres dies exigit, priusquam ad maturitatem perveniat, novumque Paroxysmum excitet,) de hac re, inquam, si quis mihi negotium exhibeat, ego planè me nescire fateor. Neque verò quisquam alius, quod sciam, in hac causa tam præclarè se gessit, ut arcanum hoc opus naturæ satis enarrâsse videatur. Ego Philosophi nomen non ambio, & qui titulum illum se mereri existimant, atque me fortassis hoc nomine culpandum putabunt, quod in hæc penetralia non irrumperè conatus sim, moneo illos, ut in aliis naturæ operibus, quæ ubique nobis observantur, vires suas experiri velint, antequam aliis dicam scribant. Libenter enim quæsierim, cur *equus* ad *ακμὴν* suam pertingat septem annorum spatio, *homo* 21. cur in *plantarum* regno, hæc mense *Mai*, illa *Junio*, ista alio florere soleat, ut innumera alia nunc fileam. Quod si doctissimos quoque viros non pudeat suam ignorantiam in his rebus palam fateri, non video, cur mihi vitio verti debeat, si in re non minus difficili, atque forsitan prorsus inexplicabili, manus ab *αἰτιολογία* abstineam: quippe cum persuasissimus sim, naturam non minus hîc loci quam in aliis quibuscunque, methodo quadam certa atque ordine progredi: *quartanosa* enim (ut sic dicam) ac *tertianosa* materia non minus naturæ legibus subjacet, iisque regitur, quam alia corpora qualiacunque.

Cum rigore atque horrore in universum *Intermittentes* omnes incipiunt, cui mox calor succedit, atque huic deinceps sudor; Per utrumque paroxysmum, tum illum quo friget æger, tum quo plus satis incalescit, vomiturit ut plurimum, vehementer ægrotat, cum siti & linguâ aridâ, &c. Quæ quidem Symptomata, iisdem omnino gradibus recedunt, quibus provehitur sudor, quo uberius prorumpente Paroxysmus solvi videtur. Satis rectè valet qui modò ægrotabat, donec Paroxysmus periodo sibi consueta denuò recrudescat; in *Quotidianâ* scilicet quolibet *ὡρῃ*, in *Tertianâ* alternis diebus, in *Quartana* tertio quoque die, calculatione videlicet facta ab unius Paroxysmi initio, ad initium subsequens. Licet haud raro ingeminentur posteriores duo, ita ut *Tertiana* quolibet die invadat, *Quartana* per duos dies continuos, tertio quidem ab initio libero manente; quandoque etiam ter tribus diebus continuis infestet, cum *Triplex Quartana* est, morbo ab isto, quem primum assumpsit, Typo nomen fortiente.

Quæ sanè Paroxysmorum reduplicatio nonnunquam à materiæ Febrilis excessu activitateque nimia producitur, quo in casu Paroxysmus *adventitius primarium* antevertit; nonnunquam etiam virium prostratione, cum in *Ægro* nempe nimium illæ fuerint dejectæ, & paroxysmi vigor retusus, sive re-

frige-

frigeratione intensiore, five etiam evacuationibus præter modum effusis : in hoc verò casu cum Paroxysmus adventitiis primum insequitur, mitius insuper, neque ita prorsus diu atque alter ægrum affligit. In prior instantia, materiæ turgescencia five ὀγκασμός tardius revertentem & sibi debitam periodum nequaquam præstolatur, ac proinde aliquantò præmaturius despumatione sua defungitur : in posteriore autem cum sanguis non jam ea vi polleat, quæ materiæ Febrili uno impetu excutiendæ sufficiat, mox alium de novo Paroxysmum substituit, quo ejus reliquias è sinu suo exturbet. Quinimo è duabus hisce causis sibi invicem adversantibus fortè etiam pendet tam Paroxysmorum Anticipatio in Febre Intermittente ordinaria atque regulari, quàm eorundem tardior accessio ; quarum utraque in his Febribus frequenter occurrit, quæ ἰσχυρόμερον omne percurrunt, vel solitum Paroxysmi tempus anticipantes, vel eò serius accedentes.

Febrium autem Intermittentium quædam *Veris* sunt, quædam *Autumni* : quamvis enim in tempestatibus intermediis nonnullæ oboriantur, quoniam tamen illæ & minus frequentes sunt, & ad prædictas reduci possunt (illas nempe quibus magis appropinquant,) idcirco omnes sub duobus hisce generibus, *Vernalibus* nempe, atque *Autumnalibus*, complectar. Tempora ad quæ particulariter ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν referuntur, menses sunt *Februarii* atque *Augusti* ; licet quandoque maturius invadant, tardius etiam nonnunquam ; prout scilicet uberior parciorve in aëre apparatus, vel ad easdem producendas facit, vel officit, & ex consequenti magis etiam minusve Epidemicè deprædantur. Cujus rei exemplum habemus satis obvium in Febribus Intermittentibus Autumnalibus Anni 1661. quo anno memini foeminam quandam ædibus meis vicinam primo Quartanæ suæ Paroxysmo, ipso scilicet *Johannis festo* correptam fuisse. Et complures alii circa idem tempus præmaturum Febribus illis correpti fuere, quæ postmodum adeò Epidemicæ evaserunt ; quod argumento est magnum tum fuisse in istâ quæ tunc obtinebat aëris temperie, ad istos morbos apparatus, qui deinceps procedente anno stipatioribus grassabantur.

Et quidem usque adeo necessaria est hæc Febrium distinctio, ut nisi eandem in praxi sedulò contemplemur, neque de earum duratione prognostico aliquo rite facto quicquam pronunciare, neque quomodo regimine ægrorum corpora curare poterimus, habita tum tempestatum, tum naturæ Febrium diversæ ratione. Verum quidem est Febres utriusque tempestatis ingenium non plane dissimile nancisci, five modum spectes primi insultus, qui cum horrore primum incipit, mox in calorem erumpit, ac tandem per sudorem solvitur ; five typorum discrimina, quorum respectu quædam *Tertianæ* sunt, tum *Vere*, tum etiam *Autumno*. Interim tamen dubito, quin Febres istæ totâ suâ naturâ five essentialiter distinguantur.

Atque ut de * *Vernalibus* primò dicam, illæ ferè omnes vel *Quotidianæ* sunt, vel *Tertianæ*, & vel serius, vel ocys ingruunt pro vario tempestatis apparatu. Nam per brumale frigus spiritus concentrati vires in suo recessu sibi

ac

* *Intermittentes Vernales.*

acquirunt, quos appropinquantis postea solis calor jam vegetos evocat, qui cum viscidis humoribus (minùs tamen viscidi sunt hi, quàm quos in Autumno prægressi fervores excoxerunt ac torrefecerunt) commissi, quos durante hyeme natura in sanguinis massâ congesserat, dum avolare nituntur, implexi detinentur, & quasi irretiti, adeoque vernam hancce ebullitionem concitant. Eodem planè modo, quo vasa cerevisia repleta atque in arena vel cella frigida diutius reposita, si igni admoveantur, tumultum statim concipiunt, & liquor ad volatum pronus est. Sanguis hoc modo affectus purgationem sui molitur, atque spirituum volatiliu[m] ope negotium hoc sat citò peragit, nisi forte nimia viscidorum succorum vi instructus fuerit, qui fermentationem coeptam remorentur, & licet hoc ipsum accadat, effervescentia tamen verna rarò continua, sui que similis manet, verum dissilire atque in diversos Paroxysmos quasi findi solet. Sanguine enim opulenti hisce spiritibus jam turgido, natura negotium suum quasi præcep[s]s aggredditur, & quarundam partiu[m] secretionem ad modum perfectæ solutionis per Paroxysmos particulares peragit, priusquam universali separatione defungatur. Atque hæc mihi quidem ratio non inidonea videtur, quod verna tempestate, præsertim illa, quæ æstatem propius attingit, paucae Febres continuæ occurrant, nisi forte constitutio fuerit Epidemica. Fermentationes enim tunc temporis obortæ vel subitò consopiantur, vel ad intermissionem properant; vel denique partes humorum ad separationem proniores, præmaturè & cum vi quadam aliò transferuntur; ex quo mox *Anginæ, Peripneumoniæ, Pleuritides*, aliæque id genus pestes succrescunt, quæ desinente potissimum Verè caput suum exerunt.

Animadverti * *Febres Intermittentes Vernales* rarissimè fuisse diuturnas, semper verò salutare[s]; ita ut vel maximè senex, vel debilis quispiam, officiosissima damnosissimaque imperitissimi cujuscunque *περιεργία* modò probus is fuerit, è medio vix queat tolli. Contigit mihi tamen videre *Tertianas Vernales*, quæ ob Phlebotomiam, & Catharsin indebite celebratas, & regimen insuper cum morbo malè quadrans, moras traxere etiam usque ad tempus illud quo Autumnales solent invadere; quæ tempestas cum hujus morbi genio sit admodum contraria, eundem continenter extinguit; Ægro interim frequenti Paroxysmorum reduplicatione, & duratione longiore ita penè confecto, ut in extremis versari videatur; quæ nihilominus (quatenus mihi hætenus observare licuit) semper est eluctatus. Neque in convalescentibus ab hoc morbo mihi adhuc subiit videre gravissima illa symptomata, quæ, ut infra dicetur, intermittentes Autumnales diuturniores sequuntur; *Lethalem* intelligo *tonsillarum inflammationem*, *ventrem induratum*, *tumores Hydropicos*, &c. Plus semel tamen adverti ægros à morbi diuturnitate, & Paroxysmorum ingeminatione (accedentibus ad malorum cumulum evacuationibus repetitis) ad summam debilitatem redactos, ubi primùm coeperint convalescere, in *Maniam* incidisse, quæ pari cum illo passu recessit, quo eorundem vires de novo redintegrabantur.

Intermittentes verò Autumnales longè aliter se habent. Primò enim

* *Intermittentes Vernales.*

G

Ter-

Tertiana, licet quibus annis Epidemica non est, & sanos invadit, citò nonnunquam se proripit, neque pluribus stipatur Symptomatis, quàm quæ Verno tempore contingere solent *Tertianæ*; ubi tamen Epidemice grassatur, & ætate provectiores, aut pravo corporis habitu præditos ferit, haud vacat periculo; quin etiam ad menses duos, vel tres, forte etiam in sequiturum usque Ver tyrannidem exercet. Deinde *Quartanæ* & periculosiores sunt, & obstinatiorès longè quàm sũnt illæ de quibus ultimò diximus: Ubi enim natu grandiores impetunt, eisdem paucis adhuc Paroxyfmis multatos quandoque jugulant; quo in casu æger tempore *exhorrescentiæ*, ineunteque adeo Paroxyfmo ut plurimum moritur, quod jam dictum. Quod si æger in senectutis tantum fuerit confinio, nec dum ejus limen prætergressus, licet non in eodem versetur discrimine, ne inter Paroxyfmos primò laceßentes luce privetur, haud tamen facile à Febre hac elabetur, nisi vertente anno, appetenteque illo tempore quo primò corripiebatur. Nonnunquam etiam *hæret lateri lethalis arundo*, nec nisi à morte, languescenti decutitur. Quartana interim Typum subinde variat, plurima etiam parit Symptomata, *Scorbutum* v. gr. *Ventrem induratum*, *Hydropem*, &c. Juniores verò ferendo huic morbo pares sunt, à quo nonnunquam circa *Solstitium Brumale* liberantur, frequentius tamen non nisi adveniente *Verno Æquinoctio*, vel etiam Autumno insequenti, ubi sc. venæ sectionem aut Catharsin admiserint. Sæpe non sine stupore sum intuitus, infantes tenellos cum hoc morbo per totos menses sex commissos, nec oppressos tamen, sed de eodem, *Herculis* instar pueri, in cunis triumphantes.

Hic notandum, quod cujuscunque demum ætatis aut temperamenti fuerit is qui Quartanâ corripitur, si quolibet alio vitæ tempore (vel etiam ab hoc remotissimo) eadem semel laboraverit, non diu admodum eum secunda hac vice fatigabit morbus, sed post paucos aliquot Paroxyfmos sponte sua solvetur, quod scitu dignum erat.

* *Intermittentium* autem *Vernalium* curationem quod spectat, licet illas suo semper arbitrio permittendas existimaverim, & nihil prorsus movendum, cum nemo quisquam, quod sciam, earum unquam opera fatis concesserit; atque ex adverso, qui illas abigere sategerunt, remediis præsertim evacuantibus, id tantum egerint, ut morbus inde confirmatior pertinacius obfisteret, si tamen importuna ægri impatientia medici opem obnixè efflagitet, *Intermittentes Vernales* variis modis, & quidem cum optato exitu aggredi licet, uti mihi non infrequenti observatione abunde constat.

Nonnunquam *Emeticum* tempestive propinatum, ut nempe ante Paroxyfmi negotio suo defungi possit, foelicissime successit; præsertim si quantitatem mediocrem *Syr. de Meconio*, vel cujuscvis Narcotici post finitam Emetici operationem, exhibueris immediate ante Paroxyfmi insultum.

Est ubi sanitatem videas restitutam per *diaphoretica*, quæ sudorem in Paroxyfmi solutione obortum promoveant, ægro interim optimè stragulis cooperito, id quod tantopere, ac tamdiu faciendum est, quamdiu vires ægri patiantur.

tur. Atque hoc in Veris Intermittentibus, præcipuè Quotidianis, sæpe obtinuit: humoribus enim in hac tempestate non admodum crassis existentibus, solutio aliàs imperfecta futura, in perfectam adolescit, quod quidem in Autumno nunquam accidit.

Quid quod Clysteris in diebus intermittentibus per triduum vel quatrimum adhibiti beneficio, Tertianas aliquando curaverim.

Interim si ob Phlebotomiam liberiori manu celebratam (quo tempestas ipsa parum cautos faciliè inclinat,) vel ob ægri debilitatem antecedaneam, spiritus illi qui subito ad despumationem se accingerent, pauperiores facti minùs valeant accidere potest, ut hujusmodi Febres Vernales auxiliis quibuscunque frustratentatis, Autumnalium diurnitatem æmulentur. Sed sanè non solent illæ eo usque durare, quippe quæ vel sponte sua desinant, vel leviori remedium ope facile in fugam vertantur.

* *Intermittentes autem Autumnales* non tam levi opera se amoveri patiuntur. De illis igitur nonnulla mihi dicenda sunt. Si autumnalis Constitutio fuerit Epidemica, circa *Junium* adultum solent invadere. Sin minus, *Augustum* præstolantur, & *Septembris initium*: in subsequens verò mensibus rarius occurrunt.

Cum earum ingens aliquod agmen simul invaserit, observare licebit earum paroxysmos plerumque una eademque diei hora contingere, accessionibus nunc prævertentibus, nunc postponentibus, simili planè modo, atque eodem tenore, nisi quod accidere queat ut ordo ille medicamentis adhibitis, quæ retardandi vel præcipitandi vi pollent, in quibusdam corporibus immutetur vel pervertatur.

Observandum est etiam quod in principio Febrium Intermittentium (Epidemicarum præcipuè quæ Autumno contingunt) haud ita in proclivi est Typum sub primis Invasionis diebus rite distinguere, quandoquidem Febre continua adscita primum adoriuntur, neque facile est aliquandiu, nisi diligenter adverteris animum, quicquam aliud præter aliqualem morbi remissionem deprehendere: quæ tamen paulatim in perfectam desinit Intermissionem, & Typum anni tempestati aptè respondentem.

Typorum ratione vel *Tertianæ* sunt, vel *Quartanæ*. Atque de Quartanis quidem illud meritò affirmari potest, eas genuinam esse Autumnis sobolem. Utræque profectò ea affinitate inter se connexæ sunt, ut sæpenumero vices permutare, saltem ad tempus, deprehendantur, mox fortassis ad pristinum genium redituræ. Sed *Tertianæ Vernales Quartanarum* typos nunquam induunt, cum toto (ut ita dicam) coelo à se invicem distinguantur. Neque porro observavi unquam hac tempestate Quotidianam contigisse, nisi quis *Tertianam* duplicem, vel triplicem *Quartanam* hoc nomine censuerit, ἀνυπολόγως appellandam.

Has autem Febres intermittentes eo fere modo suam originem nancisci arbitror, quem nunc summam attingemus; Nempe anno surgente atque progressu, sanguis etiam pro rata proportionem exaltatur (haud secus ac vegetabilia quævis augmentis atque declinationibus suis anni cursum referunt)

* *Intermittentes Autumnales.*

G 2

donec

donec ad *ἀνϋλὴν* suam, ultimumque vigorem pervenerit; hinc parallelis motibus cum tempestatibus anni pergens, eo declinante relaxari tandem & ipse incipit; ac tum præcipuè cum ab accidentali aliqua causa promotus fuerit, puta sanguinis immodicâ jacturâ, frigore admissio, cibis crudis atque excrementis, balneorum usu intempestivo aliisque non paucis. Jam verò sanguis in hoc decidentiae statu constitutus impressioni morbificæ, cuicunque obnoxius est, quam in illum faciet quælibet, aëris constitutio, quæ hoc tempore dictis Intermittentibus est Epidemica. Atque huc spectat ebullitio mox inducta, qua liquorem sanguineum quandoque valde degenerem corripiente, Febris inde oriunda mali moris esse solet, & malignis atque horrendis symptomatibus plenissima. Illud utcunque accidit ut sanguis spiritibus suis magnam partem exutus, & ab æstate præcedenti plurimum adustus, ebullitione sua non nisi tardissimis motibus defungatur, suæque despumationi longissimam periodum postulet.

Jam verò ut manifestum evadat, quàm difficulter hæc Febres (Autumnales puta) curationem admittant, hoc loco perpendendum est: Continuarum hujus tempestatis, atque intermittantium discrimen in eo maximè versari, quod *Continuæ* conceptam semel effervescentiam *σωρῶσιν* unoque tenore perficiant; *Intermittentes* autem partitis vicibus ac diversis temporibus eadem defungantur. Interim in utrisque fermentatio naturæ ductu peragitur spatio horarum 336. aut circiter, neque enim citius aut tardius massa sanguinea in humano corpore ordinario repurgatur, si negotium naturæ permiseris: haud secus ac pomatium suam, vinum atque cerevisia suam, ac peculiarem habet periodum, quâ depurentur. Quamvis autem in Febribus intermittentibus sanguis nonnunquam (ut in Quartana contingit) sex mensium spatio despumationem suam moliatur, ac tandem perficiat; non tamen (si ritè calculum ponas) plus temporis in eadem absolvenda impenditur, quàm quod in continuis impendi naturaliter solet; quatuordecim enim *ῥυθμιεῖα*, sive dies naturales efficiunt horas 336. tribuendo nempe horas quinque cum dimidia cuilibet Paroxysmo Quartanarum, habebis in Quartana valorem 14. dierum, h. e. horas 336. Jam si quis dixerit quartanam, verbi causâ, (eadem enim reliquarum intermittantium ratio subintelligenda est) ultra sex mensium spatium aliquando excurrere, antequam periodum suam absolvat, respondeo, idem etiam non rarò in continuis Febribus hujus constitutionis spectari, quæ sæpe ultra dies quatuordecim protrahuntur: in utroque nimirum casu si effervescentiam (præsertim circa Febrium finem) ritè atque ordine decurrere, ac sustineri vegetam curaveris, despumatio intra prædicti temporis spatium, hoc est, quatuordecim dierum, vel 336. horarum peragetur: quòd si verò effervescentiam illam seu fermentationem refrigerantium medicamentorum, aut Clysterum usu tunc temporis (scilicet versus Febrium declinationem) importunè inhibueris, & quasi frænum illi injeceris, mirum non est, si in longum evagentur, ordine quippe naturæ perturbato. Namque hoc modo relaxatur quodam modo sanguinis humani tonus, unde se ad despumationem accingere cum

cum effectu nequit. Imò verò in Corporibus debilibus & effoetis idem aliquando vel sponte accidit, nisi cardiacorum ope naturam in illis languentem adjuves, quò sanguini despumando par sit.

Verùm illud hîc jam porrò notandum arbitror, ea quæ de fermentationis spatio atque continuatione supra tradidimus, de illis solummodo Febribus intelligenda esse, quæ statim quandam naturam atque habitum nactæ sunt. Sciendum enim est, neque me præterit, Febres quasdam esse, tum continuas tum intermittentes, quæ transeuntis & incerti genii sunt, neque in suis effervescentiis ad destinatum periodum pertingunt. Hujus generis sunt quæ à levi aliqua offensa ex sex rerum non naturalium, quas appellant, ut cibi, potûs, aëris, & his similibus, abusu, nonnunquam ortum ducunt, his enim morbis correpti subito sæpe convalescunt. Idem etiam adolescentulis, sanguine puro, ac multis spiritibus referto præditis, aliquando accidit: nimirum Febres illorum spirituosâ quâdam ac nimis tenui, volucrique materiâ, fermentationes suas citius perficiunt, ac celeri gradu spatia sua emensæ evanescunt. Ad fermentationem enim illud primò requiritur, ut materia fermentescibilis, sive illa sanguis sit, sive vinum aut alius aliquis liquor quilibet, eâ tenacitate & viscositate polleat, ut spiritus implexos, atque irretitos eatenus detinere valeat, ut in liquoris massa moveri atque agitari possint, eodem ferè modo, quo aves visco captæ, aut muscæ atque apiculæ melle detentæ, motitare quidem, & murmura sua peragere possunt, avolare interim non valentes. Neque tamen, (ut obiter illud dicam) eam tenacitatem obtinere debent liquores memorati, ut spiritus prorsus obruant opprimantque, adeò ut non omnino moveantur.

His jactis fundamentis (quæ quidem nescio an aliis, mihi certè ratione non contemnendâ niti videntur) mirum non erit, si illis non aliam medendi methodum superstruam, quam quæ in Febribus continuis ad despumationis debitum opus ritè perficiendum, adhibenda videatur: cum nimirum illæ à continuis nullo discrimine sejungantur, si ordinem spectes, quo natura earundem materiam expellere solet, scilicet per effervescentiam certâ periodo comprehensam. Etsi quod ad earum speciem, atque naturæ proprietatem attinet, illas & à continuis, & à se invicem plurimum differre non diffitear. Itaque vel methodum, quâ se natura liberare ab hoc morbo solet, cautè sollicitèque observando indicium sumere oportet, quo fermentationem abortam acceleremus, atque ita ad sanitatem ægros perducamus: vel in ipsam causam specificam penetrando, danda erit opera, ut remediis efficacibus ac specificis morbo obviam eatur. Ab horum alterutro indicationes sumendæ sunt. Ego utramque viam ingressus aliquando fui, atque illæsam (uti opinor) verecundiâ profiteri possum, non sine summa cura atque attentione animi indefessa, sed nondum eam felicitatem adeptus sum, ut Autumnii Febres intermittentes certâ aliquâ praxi atque medicandi ratione tollere possim, antequâ statas illas Fermentationes (de quibus supra locuti sumus) peregerint, utcunque molestum hoc febricitantibus videatur; qui eousque sanitatem suam expe-

etare inviti coguntur. Reverà autem si quis inter mortales reperiatur, qui five methodo aliquà certâ, five remedio specifico adhibito; Febrium harum intermittantium cursum non solum inhibere, sed etiam omninò abrumpere novit, existimo eum omni jure teneri, ut humano generi rem illam summopere expetendam patefaciat: quod si non fecerit, ego illum nec boni civis, nec prudentis viri nomen mereri pronunciare ausim; neque enim civis boni est, illud in rem suam vertere, quod toti generi humano tam ingens beneficium apporet, nec viri prudentis, divinâ benedictione semetipsum privare, quam à summa bonitate liceret expectare, si ad publicum bonum promovendum se accingeret. Honoris autem ac divitiarum longè minor apud probos ratio habetur, quàm virtutis & sapientiæ.

Quantumlibet autem fuerit difficile, Intermittentes has Autumnales certò fugare, tradam tamen quicquid ad earundem curationem præ reliquis facere mihi visum est.

* Intermittentium Autumnalium curationem non sine ingenti discrimine per Catharsin tentari, (nisi eo, quem mox dicemus, modo instituantur) præsertim verò per Phlebotomiam, frequenti nimis observatione jam olim didici. Etenim in Tertianis (maximè si ea Constitutio admodum fuerit Epidemica) hâc methodo sanandis, nisi Chirurghi gladiolus eodem ictu, quo venam pertundit, ipsam etiam Febrem confodiat, dictæ Febres, etiam in vegetioribus & Athleticè cætera valentibus, non nisi longo temporis tractu expugnari se patiuntur: in proVectioribus autem diutinum Febris cruciatum tandem etiam mors excipit, quam præ foribus jam esse haud rarò denunciat lethalis illa Tonsillarum inflammatio, cujus fecimus mentionem. Adde, quòd Venæsectio alia etiam symptomata illa maturius accersivit, quæ Febres Autumnales Intermittentes in statu declinationis vel comitari diximus, vel à tergo sequi. Quartanariis verò in tantum obest Phlebotomia, ut Juvenes, qui à morbo alias intra sex menses fuissent liberati, per sex adhuc alios ab eodem detineantur: Ætateque proVectiores, qui nisi sanguinem detraxissent, intra annum poterant sanari, morbum etiam ultra statutum illud tempus alere periclitantur, ac denique ab eodem victi succumbere. Quæ de venæsectione jam dixi, levi operâ ad Catharsin possunt transferri nisi quod hæc non usque adeò perniciofa sit, nisi crebro repetita.

Intermittentes Tertianas Autumnales hoc pacto aggredior. Ægro in lectulo composito, & stragulis undiquaque cooperto, sudores provoco sero lactis Cerevisiato, cui Salviæ folia incocta fuere, quatuor circiter horis ante Paroxysmî adventum: quibus jam obortis mox præcipio, ut devoret ðij. *Pilularum Cochiarum majorum* solutarum in ʒj. sequentis misturæ. ʒ. *Aq. vitæ* lbj. *Theriac. Andromach.* ʒiij. *Croci Angl.* ʒj. *M.* stent simul pro usu. Hæc ubi assumpserit, in sudoribus continuè eliciendis persistat, donec elapsæ fuerint aliquot horæ ab illo tempore, quo Paroxysmus ingruere debuerat, magnâ cum cautelâ se muniens contra illas sudationis interruptiones, quas illi fortè creabunt dejectiones aliquot à medicamento Cathartico profectæ. Sæpius

* *Intermittentium Autumnalium Curatio.*

mihî

mihi ex animi voto cessit medicamentum hoc in fugandis Tertianarum Paroxyfmis, quàm usu receptum illud ad eundem scopum tendens, Decoctum sc. *Rad. Gentian. Summit. Centaur. &c.* cum paucâ *Sennæ* atque *Agarici* quantitatè. Cum enim duos illos contrarios sudandi ac dejiciendi motus eodem tempore excitet, eundem cum vulgari isto effectum obtinet, ordinatum scil. Paroxyfmi processum confundendo atque interturbando; idque efficacius, nec tamen tuto minus. Atque hac sanè niethodo Intermittentes Autumnales Tertianas benè multas pepuli; necdum præstantiorem alium experiri his annis mihi licuit.

In *Tertiana duplici*, quæ Typum variavit, ob Ægrum vel evacuationibus vel alio quovis modo debilitatum, sudor pari etiam modo provocandus, & pari temporis intervallo à futura Paroxyfmi invasione, vel medicamento jam laudato (omittantur verò *Pilulæ Cochleæ*, cum nec tutum sit, nec ad rem faciat, Cathartico jam ab eodem fractas ægri vires amplius dejicere, & Paroxyfmi ejusdem ope ingeminatis suppetias ferre) vel diaphoretico alio aliquo *Spasmodico* atque efficaci, quod etiam repeti potest Paroxyfmo genuino proximè subsequente: In summa ægri debilitatè à dicta Paroxyfmi ingeminatione Electuarium, quod jam sequitur, præscribo: *℞. conserv. fl. Borag. Buglos. an. ʒj. Conserv. Anthos. ʒʒ. cortic. citri condit. Nucis Mosch. cond. Theriac. Andromachi a. ʒiij. Confec. Alkermes ʒij. M.F. Opiata*, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ mane & vesperi, superbibendo cochl. 6. sequentis Julepi, *℞. Aquæ Ulmariæ & Theriacalis stillat. an. ʒiij. Syr. Caryophil. ʒj. M.* vel hujus loco Aquam aliam Epidemicam simpliciorem saccharo dulcoratam exhibeo, interdicto Enematum usu; ægro Juscula è pullorum carnibus, Avenacea, &c. concedo.

Quartanarum quod attinet Curationem, nemo est, opinor, in hac arte vel mediocriter versatus, qui nesciat quàm parum votis respondeant methodi istæ omnes, quæ huic medicorum opprobrio eluendo hætenus destinantur, si *Corticem Peruvianum* excipiamus, qui tamen inducias sæpius impetrat morbo, quàm eundem debellat, cum postquam ad septimanas duas vel tres delituerit, magno cum ægri emolumento, qui ab illo malè multatus paululum interim respirat, mox de novo recrudescentia haud segnius quàm prius laceffit, atque ut plurimum, quotiescunque demum repetatur illud medicamentum, non nisi longo temporis tractu expugnatur. Referam tamen quicquid de methodo ejusdem exhibendi habeo compertum.

Curandum est ante omnia ne præmaturè nimis hic Cortex ingeratur, ante sc. quam morbus suo se Marte aliquantisper protriverit (nisi collabescerent & jam fractæ ægri vires eundem temporis sumendum esse dictaverint). neque enim illud solum est metuendum, ne a præproprio ejus usu inefficax iste reddatur, & spem ægri fallat, sed etiam ne de ægri vita agatur, si sanguini omni fermentationis nisu se despumanti eam derrepente injiciamus remoram. Proximo loco, neq; Catharsi, multo minus Venæ-sectione, subducenda est materiæ Febrilis pars aliqua, quo liberius cortex suo fungatur munere: cum enim ab utraque

recrudescent Paroxyfmi, evanefcente femel pulveris vi. Mihi etiam magis è re fore videtur, ut fanguinem dicto medicamine fenfim, longioreque à Paroxyfmi intervallo leviter inficiamus, quàm ut uno omnino dicta Paroxyfmi jam infantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio conceditur, quò fuum opus plenius abfolvat, & evitatur quicquid id eft periculi, quod ægro poterit oriri ex fubito ifto atque intempeftivo nimis fufflamine, quo Paroxyfmi jam invalefcentem, atque omni fe ope exerentem conamur opprimere. Postremò brevibus iftis temporis intervallis repetendus eft pulvis, ut non protinus evanefcat prioris dofis virtus, antequam altera exhibeatur: crebrâ enim repetitione iftâ *αὐξία* tandem recuperabitur, profligato in folidum morbo. His adductis rationibus hanc ego methodum cæteris anrepono: *Peruviani corticis ℥j. cum Syrup. Rosar. rubr. ℥ij. mifceatur*; æger verò quantitatem Nucis mofchatae majoris manè & ferò quotidie devoret diebus à genuino Paroxyfmo vacuis, donec confectionem omnem abfumpferit. Repetatur porrò ad tres alias vices interjectis femper diebus quatuordecim.

Neque fortè cum minori fructu ufurpari poterit cortex hic in Tertianis, quâ Vernis, quâ Autumnalibus, quàm in Quartanis, adhibetur. Sed ut vera loquamur, nec *ἄνθος ἰσχυρὸς* oftentemus; Si harum Febrium alterutrâ correptus æger vel infans fit, vel ætate floreat, convenit omnino (quantum ego hætenus edoctus fum) nihil medicamentorum quorumvis ope, aut aëris, ac diætæ mutatione moliri: Nihil enim hinc mali natum hucusque intellexi, fi modò totam rem naturæ permiferim. Id quod ego non fine admiratione, præcipuè in infantulis, sæpe observavi; fanguine namque depuratione fuâ defuncto, Febres illæ fponfe fuæ evanuerunt. Quod fi autem è contrario vel ftrictiori aliquo regimine utaris, vel medicamenta purgantia fubinde adhibeas, (adhiberi fcilicet folent eo prætextu, ut obftructiones expediantur, atque humores in primis viis ftabulantes exturbentur) vel fi, quod præcipuum eft, in conftitutione Epidemica Venæ-fectio celebretur; fiet ut morbus in longiffimum tempus procurrat, atque interim ut ægri mille fymptomatis, iisque periculofiffimis exponantur.

Si verò febricitantes provectionis ætatis fint, ex utroque morbo (Tertianas dico Autumnales, ac Quartanas) non folum diuturnitatis, verum etiam ipfius mortis grave periculum imminet. Hic itaque Medicum illud agere oportet, fi neque cortice *Peruviano*, nec aliâ quâvis methodo morbum fubmovere valuerit, ut naturæ faltem fuppetias ferat, eamque illis adminiculis fublevet, quibus ad negotium fuum peragendum opus habuerit. Certè enim in effoetis corporibus, nifi fermentatio cardiacorum, & corroborantis diætæ, ut vini *absinthitis* ac id genus fimilium, beneficio fuffineatur, illud accidet, ut ægri incertis atque fruſtraneis Paroxyfmis divexati debilitentur, atque morbus eo ufque duret, donec languida prius natura Paroxyfmo aliquo graviore correpta, ad ebullitionis tempus perfingere non poffit, adeoque in ipfo exhorrefcentiæ tempore diem fuum obeant ægroti. Atque hoc in fenibus non raro

usu venit, qui longâ Catharticorum serie debilitati fuerunt, imò, ut aliquando visum est, in ipso vel primorum Paroxysmorum rigore penitus defecerunt cum exhibito cardiaco satis forti saltem ad tempus aliquod sustineri potuissent.

Cum sanguis tempus illud exegerit, quod ad despumationem suam perficiendam requiritur, necessarium est, ut provectioris ætatis ægri eodem ipso tempore, vel paulò antea insignem aliquam aëris mutationem subeant, sive (quod potius optandum esset) in calidiorē aliquam regionem commigrando, sive mutando saltem locum, in quo primum hoc morbo correpti sunt. Mirum sanè est, quantum valeat hæc aëris mutatio ad morbum hunc prorsus abigendum. Interim ut ante hunc temporis articulum aër mutetur, non tantum non necessarium est ad sanitatem ex hoc morbo restituendam; sed & minùs convenit. Etiam si enim quis in regionem quantuncunque Australem & calidam migraverit, sanguis tamen ejus in morbo hoc motu semel constitutus, depurationem suam ut peragat necesse est; quod quidem beneficii frustra expectabitur, ab inusitato novoque aëre, priusquam procedente atque adulto jam sanguinis motu, sanitatis recuperandæ capax fuerit. Insignis ergò illa aëris mutatio tum demum adeunda est, cum primum æger à Paroxysmo liberari potest: Exempli causa: In Quartana, quæ primum in Autumno invasit, non citius aër mutandus est, quàm circa Februarii initium. Interim si æger mutare locum vel nolit, vel commodè nequeat, oportebit ut hoc ipsius temporis articulo, forti aliquo medicamento utatur, cujus eæ sint vires, ut uno quasi ictu languescentem illam depurationem potenter promoveat; & si fieri poterit, perficiat. Ad hanc rem consulerem ego, ut *Electuarii de Ovo vel Theriacæ Andromachi sesqui drachma in aquæ Cælestis, vel aquæ Vitæ communis unciiis duabus dissoluta exhibeatur*, duabus scil. horis ante paroxysmum. Id quod à me, cum successu non infelici, in morborum hujusmodi declinatione factum est. Licet agnoscam calidiora hæc citius exhibita vel morbum duplicare, vel in Febrim continuam permutare, quod à Galeno jamdudum observatum est. Idem in juvenibus hoc morbo detentis fieri potest, cautelâ adhibitâ. Ut autem in puerili ætate idem fiat, non tantum non convenit, verum etiam periculo non vacare dudum observavi.

Priusquam huic argumento clausulam addamus, illud monendum venit. Ea quæ de Februm Autumnalium intermittentiū duratione, atque de tempore ad sanguinis despumationem requisito jam dicta sunt, ita intelligenda esse, ut nos solum illud nunc spectemus, quod Natura vulgaribus atque usitatis tantum medicamentis suffulta, præstare soleat. Nequaquam enim eo consilio de his rebus ita locuti sumus, ac si doctos ac solertes Medicos despondere animum velimus, atque vel de melioribus medendi rationibus excogitandis, vel nobilioribus remediis inveniendis spem totam abjicere, quorum ope hujusmodi morborum sanationem accelerent; tantum enim ego profectò ab hoc proposito absum, ut non desperem, vel à me ipso tale quidpiam sive methodi, sive remedii aliquando repertum iri.

Sublato morbo æger sedulò purgandus est; incredibile enim dictu, quanta

morborum vix ex purgationis defectu post Febres Autumnales subnascatur. Miror autem hoc à Medicis minus caveri, minus etiam admoneri. Quando-
cunque enim horum morborum alterutrum paulò provectioris ætatis homi-
nibus accidisse vidi, atque purgationem etiam omissam, certò prædicere potui
periculosum aliquem morbum eisdem postea adoriturum, de quo tamen illi
nondum somniaverant quasi perfectè jam sanati.

Omnino interim cavendum est, ne purgetur æger, nisi morbo penitus de-
pulso. Quamvis enim partes naturales illuvie istâ, quam in illas congeffit Fe-
bris, hoc pacto quadantenus sublevari videantur: nova tamen materia derepente
succrescet, Febre scil. à Cathartici impetu, atque humorum agitatione jam
revocata, eandem suppeditante; ac proinde id tantùm à Purgatione lucri fece-
rimus, ut morbus contumacior evadat. Quotidiana id nos docent eorum ex-
empla, qui in morbi *ἄρχῃ*, ut *Theoria* isti morem gerant, quæ in tollendis
obstructionibus, & evacuando humore melancholico, qui mali fons & ori-
go vulgò habetur, Curationis spem omnem ponit, repetitis purgationibus
miserè plectuntur; quibus sanè, quicquid id demum est humorum, quod
à corpore divellitur, atque eliminatur, compertissimum est nobis Febrem al-
tiores exinde radices agere, & pertinacius stationem suam tueri, quàm si non
fuerit proritata. Quapropter religio mihi est Catharticum propinare ante
tempus illud, quo non tantùm Paroxyfmi perceptibiles, sed etiam alteratio ista,
qualis qualis ea fuerit, quæ diebus illis, in quos Paroxyfmi incidere debue-
rat, persentiscitur, omninò evanuerint, atque unus insuper mensis fuerit elap-
sus, quo quidem effluxo Potionem aliquam ex Lenitivis vulgaribus præscri-
bo, atque eandem semel in septimana ad menses duos tresve subsequentes
repetendam impero; addito etiam singulis vicibus haustu aliquò Paregorico
horâ somni assumendo, finitâ jam medicamenti operatione; ut nempe Paro-
xyfmo se de novo ingerendi ansam præscindamus, quam aliter fortè arriperet ex
occasione tumultûs atque orgasmi, quos vel mitissima excitant Cathartica.

Purgationibus instituendis idcirco spatia ista ampla interpono, ut sc. æger
à recidivæ metu liberetur, quæ quidem à nimis crebra & confertim repetita
sanguinis atque humorum exagitatione, de facili poterat induci. At cùm jam
ista res vacet periculo, Apozema sequens frequenter usurpari poterit. ℞. Rad.
Rhabarb. Monachor. ℥ij. Rad. *Asparag. Brusci. Petrosel. & Polipod. quer. an.* ℥j.
Cortic. Median. fraxini, & Tamarisci an. ℥ss. fol. *Agrimon. Ceterach. & capill.*
Ven. an. M. j. Sennæ mund. ℥i℥. (irrotat. ℥iij. vini albi) *Epithim.* ℥ss. *agârici troch.*
℥ij. sem. fœnicul. ℥iiij. Coq. in aqua fontana ad ℥ss. sub finem adde succi auran-
tiorum ℥iiij. In colatura dissolve Syr. *Cichor. cum Rheo & Magistral. ad melan-*
choliâ an. ℥i℥. F. Apozema, de quo capiat ℥ss. singulis matutinis per triduum,
& repetatur quoties opus fuerit.

Ut tandem *Symptomata* illa memoremus, quæ Febres intermittentes in de-
clinationis statu comitantur, observandum est, Vernarum paucissima esse, si
ad illa comparentur, quæ Autumnalibus accidunt, tum quia non itâ diu hæ-
rent istæ, tum etiam, quia in humoribus non usque adeò terrenis, & minus
etiam malignis fundantur.

Primum hic sibi locum vendicat, subinde occurrens * *Hydrops*; unde primò quidem Crura intumescunt; deinde etiam venter; qui exinde nascitur, quòd scil. sanguis crebris illis fermentationibus, quas peperit morbi diuturnitas, (præcipuè in natu grandioribus) plures Spirituum manipulos prodegit, unde summâ eorundem inopiâ jam laborans, succos cum alimentis ingestos non amplius valet assimilare, quorum cruda adhuc indigestaque moles in crura tandem deponitur, atque his jam distentis, neque ulterius quicquam admittentibus, in ventrem etiam, unde verus *Hydrops* formatur. Rarò autem juvenes obsidet hæc malorum *Ilias*, nisi *Cathartica* per *Febris* decursum sæpenumerò iteratis eandem inconsultò nimis accersiverint.

Verùm *Hydrops* ex causa memorata superveniens aperientium & cathartico-
rum usu facile sanatur, si modò recens fuerit. Neque mihi molestum est, quo-
ties hunc natum morbum audio atque intelligo, nempe de rei exitu omnia bo-
na tunc temporis animo concipiens. Nonnullos enim usu *Apozematis* jam ap-
propriati persanavi.

Verum tamen observavi, frustra esse, si quis *Hydropem* ex *Febre* intermitten-
te natum, medicamentis purgantibus tollere conetur, *Febre* illâ adhuc durante:
Febris enim hoc pacto radices profundius agere deprehendetur, non autem
amovebitur *Hydrops*; expectandum itaque, donec *Febris* exulet, ac tum demum
negotium prosperè suscipiendum.

Verùm enim verò si tam importunè atque acriter instet symptoma hoc, ut
ejus curatio non eo usque videatur differenda, donec *Febris* recessus *Cathar-*
ticorum usum permittat, aggredienda omninò illa est *Infusionibus rad. Ra-*
phani rustici; *summitat. Absinthii*, & *centaurii min. baccarum Juniperi*, *Ci-*
nerum Genistæ, &c. in vino factis; quæ non solum huic symptomati obsistunt,
effoetas sanguinis vires de novo instaurando, sed naturæ etiam de morbo jam
triumphaturæ tempori subveniunt.

† Infantes autem post *Febres Autumnales* tum *Continuas*, tum *Intermit-*
tentes, *Hæctici* aliquando fiunt. Ventres eorum inflati, tumentes, ac duri eva-
dunt; sæpe etiam tussis, aliquaque tabidorum symptomata subnascuntur, quæ
Rachitidem planè mentiantur. Hos ego sequenti modo tractandos consulo. Pæ-
retur potio *Cathartica*, quam in *Febrium* continuarum fine assumendam præ-
scripsi. Hujus capiat infantulus *Cochl. j.* vel *ij.* plus minus pro ætate, mane
per 9. dies, uno atque altero die, si opus fuerit, intermisso. Interim verò pur-
gatio ita moderari debet ac regi, dosin vel augendo vel minuendo, ut ultra
5. vel 6. sedes singulis diebus non procedat. Post finitam catharsin totus ven-
ter inungatur linimento aliquo aperitivo per aliquot dies. Sequenti uti soleo
℞. Ol. lilior. & tamarisci an. ℥ij. Succì rad. brioniæ & apii an. ℥j. bulliant
ad succorum consumptionem, addendo unguenti de althæâ & butyri insulsi an. ℥j.
gummi ammoniaci in aceto soluti ℥ss. ceræ flavæ q. s. f. linimentum. Sanè quam-
plurimi infantes, etiam verâ *Rachitide* laborantes, hæc methodo à me liberati
fuerunt.

Veruntamen (ut ante monuimus) cavendum sedulò ne purgationem aggredi-

diamur, nisi Febre jam perfectè fugata; licet enim hoc pacto humoris in partes naturales amandati portio quædam evacuari non sine causa videri possit, nihilominus ab ipsa Febre nova subinde pravæ materiæ copia suggeretur, quæ non solum purgationem reddet frustraneam, verum & ipsum morbum diuturniorem præstabit, ob rationes antea memoratas.

Observatu non indignum est, quod cum Febres Autumnales teneram ætatem diu cruciarint, nulla spes sit easdem abigendi, donec abdominis regio, circa lineam præcipuè, indurari atque tumesceri occoeperit; iisdem enim gradibus quibus hoc symptoma supervenerit, Febris etiam fugam meditatur. Neque forte ex meliori aliquo prognostico morbum hunc brevi abiturum dixeris, quam si sedula animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris. Idem porro in crurum tumoribus obtinet, qui in adultis aliquando spectantur.

Ventris tumor qui Infantibus accidit post has Febres, quibus annis aëris constitutio Intermittentibus Autumnalibus progignendis Epidemice determinatur, tangentis digitum haud aliter ferit, ac si materiam aliquam continerent viscera in Scirrhum indurata; cum qui aliis annis simili licet *ποφάσει*, contingit, tactum ita afficit, ceu Tensio tantum foret Hypochondriorum à subjectis flatibus. Hinc nisi annis quibus intermittentes Autumnales prædominium habent, veræ Rachitides rarius occurrunt, quod observatu dignum.

Tonsillarum dolor & inflammatio post Febres sive Continuas, sive Intermittentes, cum deglutiendi primum difficultate & molestia, supervenientibus deinceps raucedine, oculis cavis, & Hippocratica facie, mortem certò imminentem præmonstrant, intercisa planè omni redintegrandæ sanitatis spe. Funesto huic symptomati producendo evacuationes justo copiosiores in ægris vi morbi jam ferè attritis, ut & longiorem Febris moram sociam operam ut plurimum commodasse observavi.

Multa alia sunt accidentia quæ morbos hosce consequi solent ob purgationem vel non omnino, vel non rite celebratam, quibus impræsentiarum enumerandis supersedebimus, cum curationis eadem fere ratio sit utrobique, nempe sedimenti ab effervescencia præcedanea depositi repurgatio, quippe quod sua mora malis huiusmodi materiam præbuerit. Quanquam licet hic loci non contemnendum symptomatis genus referre, quod non tantum purgationibus & evacuationibus aliis quibuscunque, Venæ-sectioni præsertim, cedere dedignatur, verum & ab illis vires sibi acquirit. Illud autem peculiaris quædam est ac sui generis * *Mania* Intermittentes diuturniores (Quartanas præcipuè) nonnunquam excipiens, quæ communem medicandi rationem aspernatur, & post evacuationes fortiores adhibitæ in miseram quandam stultitiam degenerans, non nisi cum ipsa ægrorum vita terminatur. Miratusque sæpe numero sum nullam huius rei mentionem ab Authoribus factam fuisse, cum non rarò accidisse viderim. Cum reliquæ Amentię species copiosis evacuationibus, & Venæ-sectione, & Catharsi ut plurimum persanentur, hæc neutram potest ferre. Sed cum jam æger in sanitatis limine est, si *vel* Enema ex lacte saccharato semel injeceris, statim de novo recrudescet malum. Et si

* *Maniæ species quædam.*

reiteratis Purgationibus, venæ sectioneque contra nitamur, ejusmodi evacuationes morbi quidem ferociam possunt domare, ægrum verò certissimè non tantum Fatuum, sed & incurabilem omnino reddent. Quod quidem nemo mirabitur, qui secum reputaverit, alteram Amentię speciem à nimis exalta- ta & vivida sanguinis crasi produci, hanc verò ab ejusdem debilitate, & ut ita dicam, vapiditate à diutina Fermentatione quam invexit Febris, qua median- te Spiritus functionibus Animalibus obeundis impares plane sunt.

Huic malo ad hunc modum mederi soleo. Ægro ter in die Cardiacum ali- quod è Generosioribus exhibeo dosi paulo liberaliori, e. g. *Theriacam An- dromachi. Elect. de ovo. pulverem Comitissæ. pul. Gualteri Raleigh*, vel similem in *Aq. Epidemicâ, Theriacali*, vel aliâ. Possunt etiam in aliâ quavis formâ exhiberi Cardiacâ medicamenta. Æger interim victu quidem moderato, Analeptico tamen, & potu generosiore reficiendus est; foras ne exeat, in lecto se diu multumque contineat. Alvus sub hoc regimine justo erit astrictior, unde ut etiam à calidiorum medicamentorum usu à Febre quis sibi metuat, sed vano prorsus timore; cum spiritus antecedente morbo pene exhausti novum dein- cept non valeant accendere. Post aliquot septimanas paulatim in melius proficiet, quo tempore omitti possunt Cardiacâ ad dies pauculos. Diæta verò Ana- leptica jugiter instituenda, & post brevem intermissionem repetendus est denuo Cardiacorum usus, atque in eo persistendum donec integra sanitate fruatur.

Diæta methodus *Maniam* etiam quæ has Febres minimè excepit, quando- que sanavit, frigidiori sc. atque infirmiori temperamento præditi. Anno nuper elapso *Sarisburiam* accersabar, ut cum Medico erudito & sagaci, mihiq; con- junctissimo, Domino Doctore *Thomas* sceminæ nobili consulerem, cui imagi- natio haud parum fuit læsa. Verùm adhibitis, etiam cum jam prægnans esset, remediis modò dictis, ad sanam omnino mentem rediit.

Attamen *Mania communis*, quæ vegetis hominibus atque etiam nulla Fe- bre prægressa, accidere solet, alius sanè profapiæ est, ac proinde longè diversa, quoad evacuationes, methodo tractanda, tametsi vel in hac specie, ea quæ ce- rebrum atque spiritus animales corroborant, haud omitti debent. Curationem autem ejus, etsi non sit hujus loci, obiter tamen prædictæ speciei subnectere non gravabor, ne quis fortè præ similitudine morborum in errorem illabatur.

In Junioribus ac sanguineo habitu præditi, mittatur sanguis ex brachio ad uncias octo vel novem bis vel ter, diebus tribus inter singulas venæ sectiones interpositis: Deinde semel extrahatur sanguis ex venis jugularibus. Ultra hunc modum repetitæ venæ sectiones ægrum potius in *stultitiam* ducunt, quàm cu- rationem absolvunt. Postea aggrediatur usum *Pil. ex duobus*, quarum drachmam semis vel scrupulos duos (pro ratione operationis) capiat semel singulis septi- manis statò die, ita ut si, verbi gratia, die lunæ primo *Pilulas* assumpserit, præ- cisè eodem ipso die, nec frequentius, sequentibus septimanis eadem repetan- tur per longum tempus, usque dum perfectè convaluerit. Hac methodo hu- mores qui in hoc morbo mentis arcem impetere solerent, sensim in inferiores sedes dilabentur, alia quasi potius eis inducta.

Diebus à purgatione liberis per totum decursum Electuario sequenti, vel alio medicamento eadem virtute prædito, utatur.

℥. Conf. Absinth. Rom. Anthos, & Theriac. Androm. aa. ℥j. conf. flaved. Aurant. Angelic. condit. nuc. mosch. condit. aa. ℥β. cum s. q. syrup. Caryophil. f. Electuarium, capiat ad magnitudinem nucis moschatae bis in die: superhibendo haustulum vini Canarini, cui fuerint frigide infusi Flores Paralyseos.

Febris Continua atque Intermittentes quas supra descripsimus, soli ferme erant morbi Epidemici, qui durante illa Constitutione quæ per annos 61, 62, 63, 64. regnabat, emicuisse; quot retrò annis eum obtinuerant principatum, non habeo dicere, id certò scio, quod ab anno 64. ad annum usque 77. rarissimæ omnino Londini caruere.

Dicendum mihi etiam erat de *Variolis*, quales - nam scilicet erant istæ quæ tum contingebant, respectu habito ad Constitutionem illam; quandoquidem (ut jam subindicavi) vario admodum se habent modo pro varia Constitutione qua incessunt: sed cum non satis attentè per id temporis animum ad eas adjecerim, missas jam facio: id tantum tradam illis peculiare, quod sc. iis annis labentibus, sub initio Maii, confertissimæ invadebant, supervenienti verò Epidemicorum Autumnalium cohorti (Febrem volo Continuum, atque Intermittentes) locum dare solebant. In pustularum summitate foveolæ quædam ad instar capitum acicularum minorum plerumque subsidebant; atque in discreto genere æger octavo maximè die periclitabatur, quo tempore, abrupto derepente qui hucusque dimanaverat sive sudore, sive madore, externa exarescebant, nec revocari poterat sudor Cardiacis quibuscunque; æger phenitide, atque anxietate insigni corripiebatur, cum magno dolore & ægritudine, urinam frequenter, at in parva quantitate, reddebat, ac intra paucas horas de magna spe decidens, ad plures migrabat.

SECTIONE CUNDA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica Annorum 1665, & 1666. Londini.

PRægressâ Hyeme frigidissima, & sicco gelu in veris usque tempora indefinenter perdurante, cum ex improvviso solveretur, fine sc. Martii, inunteque, ex Anglorum computo, Anno 1665. *Peripneumonia*, *Pleuritides*, *Anginae*, aliique id genus morbi Inflammatorii magnam derepente stragem edebant: quo ipso tempore caput etiam extulit *Febris* quædam *Continua Epidemica*, à Febrium Continuarum genio, quæ præcedenti Constitutione

vigebant, longè diversa; quarum vix ullæ ea anni tempestate solebant invadere. Dolor Capitis quàm in priore illa intensior, & vomitiones adhuc magis immanes ad hanc Febrem accedebant; in plerisque *Diarrhæa*, quam prius diximus assumpto Emetico præcaveri potuisse, jam ab eodem provocabatur, nec tamen cessabat Vomitus. Externa hîc pariter ac in Febribus Constitutionis præcedentis sicca reperiiebantur; attamen, præmissa maximè Venæsectione, æger in sudorem solvi poterat, quo provocato leviora mox Symptomata; atque hoc nullo non morbi tempore fieri potuit, cum in Febre prægressa nec tutò ante diem 13. vel 14. id tentaveris, nec facilè voti fueris compos. Sanguis sæpe Pleuriticorum, & Rheumatismo laborantium sanguinem colore referebat, non verò usque adeo Gelatina illa albescente qua illorum sanguis prætextitur. Hæc primò erant Phænomena hujus morbi *Διαγνωστικά*. Anno verò surgente ipsa *Pestis* irrupit magno symptomatum Pathognomicorum numero stipata, *Carbunculis*, viz. *Bubonibus*, &c. Hæc indies magis ac magis invalescens, circiter Æquinoctium Autumnale *ἀκμήν* attigit, quo jam instante unius septimanæ decursu octo plus minus hominum millia delevit; tametsi duo ad minimum Civium trientes ob metum contagii se in rus subduxerant; à quo tempore receptui canere coepit, & urgente Brumali Frigore tantum non evanuit, nisi quod sparsim unum atque alterum hinc inde feriret per omnem hyemem, & insequentis veris exordium; quo apparente & ipsa omnino est delata, mansit tamen *Febris*, quamvis non ita Epidemica, excurrente integro anno sequente, imò ad Verusque ortum Anni 1667. De his nonnulla hîc subnectam.

C A P U T II.

Febris Pestilentialis & Pestis Annorum 1665. & 66.

IN superioribus obiter admonui è febribus nonnullas in malignarum classe vulgo reponi, cum indomita symptomatum sævitia, quæ huic opinioni patrocinari videtur, non à venenosa morbi indole, sed à therapeia perpèram administrata proficiscatur. Nam cum ad morbi solutionem à natura destinatam haud satis attenditur, sed alia medendi ratio temerè instituitur, hinc perturbatâ totius corporis œconomia, ac omnibus suisque deque converfis, non modò tristissima rerum facies ultra consuetum morbi morem inducitur, verùm morbus jam à seipso alius, etiam anomalis accidentibus velut alienigenarum satellitio stipatur. Atqui *Febris verè maligna* non est omnium dierum morbus, utpote quæ ab aliis Febrium speciebus ob symptomatum anomaliam eâ nomenclaturâ utcunque insignitis, totâ suâ ideâ ac ingenio diffideat. Reverà enim cum ipsissimâ Peste specie convenit, nec ab ea, nisi ob gradum remissionem, discriminatur. Quocirca utriusque affectûs ortum ac curationem in eodem capite complectar.

Aëris massæ occultam ejusmodi sive crasin sive texturam obtingere, quæ diversarum

diversarum diversis temporibus ægritudinum anſa atque pararia exiſtat, nemini obſcurum eſt; qui modò animadvertit unum eundemque morbum certâ aliquâ tempeſtate infinitam mortalium vim corripere, ac Epidemicum fieri, alias tamen unum alterumve hominem afflixiſſe contentum, ulterius non graſſari. De variolis; ac imprimis de Peſte, huiusce capitis argumento, res eſt ſat ſuperque manifeſta.

At verò quæ qualisque ſit illa æris diſpoſitio, à qua morbificus hic apparatus promanat, nos pariter ac complura alia, circa quæ vecors ac arrogans Philoſophantium turba nugatur, planè ignoramus, quicquid ſit, hoc ſaltem nomine Dei Opt. Max. clementiam ac Bonitatem meritiffimo jure veneramur, quod æris conſtitutiones λοιμός est, id eſt, Peſtem malorum omnium immaniſſimum, ac humano generi maximè internecinum inferentes, rariùs evenire voluerit, quàm quæ cæteris affectibus minus exitialibus ſuſcitandis inſerviant. Unde ſit quod hunc orbem noſtrum *Britannicum* Peſtis vix frequentius quàm poſt annorum circiter triginta vel quadraginta intervalla (ſummo ſc. perniciæ vigore, ac tota furiarum acie) adoriatur. Quæ per annos aliquot Peſtem inſignioreſ ſubſequentes, ſparſim occurrunt peſtiferorum funera, paulatim imminui ac evaneſcere ſolita, Peſtilenti æris diathèſi etiamnum ex parte perfeverandi, nec dum in aliam ſalubriorem penitus immutata attribuenta ſunt, quippe quæ antegreſſæ meſſis duntaxat ſpicilegia reputari debeant. A quibus etiam nuperæ luis reliquiis, ſit ut Febres quæ anno poſt graviorem Peſtem uno aut altero paſſim graſſantur, Peſtilentes eſſe ſoleant; & licet aliquibus veræ Peſtis notis deſtitutæ, tamen ejuſdem naturam ac indolem quamplurimum referant, nec non conſimilem medendi rationem ſibi vindicent, quemadmodum inferiùs oſtendemus.

Verùm præter iſtam æris conſtitutionem, ceu cauſam communiorem, accedat oportet & alia procatactica, nimirum *μιάσματος* ſive ſeminii à peſtifero aliquo corpore, vel immediate ac propiore conſortio, vel mediate ac per fomitem aliunde tranſmiſſi, ſuſceptio. Hoc enim ſi inſtante qualem diximus æris diathèſi fieri contingat, ab exigua primum ſcintilla mox horribile erumpit incendium, ac denſatis undique funeribus, univerſo æri per iſtum terræ tractum à Peſte, tum laborantium halitibus, tum mortuorum cadaveribus, labes & contagium inducitur; adeò ut ad triſtiſſimæ ægritudinis propagationem jam non ampliùs vel fomite, vel perſonali conſortio opus ſit, verum quemcunque hominem, vel ſumma cura à Peſte correptis ſemotum, ipſe ær cum ſpiritu intro ſubiens per ſe ac ſuo Marte inſicere valeat, modo ille corpus habeat humoribus ad afflatum excipiendum paratis, refertum ſcilicet.

Quanquam autem hic morbus, cum duntaxat ſporadicus exiſtit, nullo tempeſtatis discrimine paucos aliquot, tradito quaſi per manus contagio, affligat, tamen ubi adeſt etiam Epidemica æris conſtitutio, reoritur circa eam anni partem quæ inter Ver ac Æſtatem ambigit, utpote quæ ad producendam ægritudinem, cujus eſſentia in humorum φλογώσεſ ſive inflammatione, ut poſtea oſtendemus, imprimis conſiſtit, maximè idonea atque accom-

commodata sit. Porro & sua habet Incrementi ac Declinationis tempora, non secus ac cæteræ rerum naturalium species. Nascitur eo quo diximus tempore, crescente anno adolescit, eodemque vergente collabascit, donec tandem aërem in diathesin huic morbo adversantem, glacialis bruma transmutet.

Quod si tempestatum anni vicissitudines in hunc affectum nihil imperii exercerent, verum seminium Pestilentiale, nulla aëris mutatione domabile de alio in alium perpetua propagationis serie transmitteretur, fieri non posset, quin ubi in frequentiore aliquam Urbem semel pedem intulisset, continuatâ strage funera usque & usque densaret, donec tandem nemo superesset, in quem Pestilentis miasmatis labes impingat. Atqui contrarium sæpè evenisse animadvertum est numero extinctorum, quos unica mensis *Sextilis* septimana ad aliquot millia extulerat, sub *Novembris* exitum valde imminuto ac propemodum nullo. Nec tamen diffiteor fieri posse, quod & nonnulli authores factum prodiderunt, ut Pestis aliis etiam anni tempestatibus caput primum exerat; hoc autem rariùs accidit, nec ejusmodi lues in populum admodum debacchatur. Interea, aëris dispositionem quantumvis νοσιμώδη pesti, suscitandæ per se impar esse vehementer suspicor, quin Pestilentia morbum alicubi semper superstitem aut per fomitem, aut per pestiferi alicujus appulsu, è locis infectis in alios deferri; ibidemque non nisi accedente simul idoneâ aëris diathesi popularem fieri. Alias enim non assequor, quâ fiat, ut in eodem coeli tractu dum unum aliquod oppidum Peste gravissimè affligitur, aliud non longè diffitum, omnem commercii necessitudinem cum loco contagioso cautè inhibendo, prorsus immune se præstiterit; quemadmodum non ante multos annos Pesti per universam ferè *Italiam* immaniter grassanti, *Magni ducis* cura atque prudentia aditum in *Hetruriæ* fines penitus interclusit.

Primus insultus rigorem ac horrorem, quemadmodum & Febrium intermittentium accessiones, ferè perpetuum habet comitem. Mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, ac si torculari premeretur, Febris ardens usitatâ symptomatum συνδρομῇ stipata, indefinenter ægròs divexant, donec aut mors ipsa, aut benigna *Bubonis* vel *Parotidis* eruptio, quæ materiam morificam foras ablegat, eos ab luctuosissimo discrimine liberet. Rariùs quidem accidit, ut circa ullam Febris præfensionem ingruat, ac homines de improvviso è medio tollat, *maculis purpureis*, præsentanei interitus nuntiis, etiam dum in foro versantur, erumpentibus. Quæ repentina exanimatio (quod animadvertione dignum) nisi in Pestis admodum funestæ exordio vix contingit, remittente ac refractâ jam lue, aut in annis, in quibus non existit popularis, nunquam observata est. Fit etiam nonnunquam, ut tumores prorumpant, nec Febre, nec graviore aliquo symptomate prægresso, quanquam suspicor rigorem; & horrorem leviusculum, ac minus perceptibilem semper præcessisse. Quibus autem hoc obtingit, iis integrum est per publicas plateas pro lubitu obambulare, ac communia vitæ munia, sanorum more, spretâ omni regiminis curâ obire.

Cæterum quod ad morbi essentiam spectat, eam enucleatè definire in me

non suscipio. Nec fortasse hominibus cordatioribus rem minùs importunam ille facere videbitur, qui à me postularit, quid hanc aut illam ægritudinis speciem constituat, quàm ego etiam facerem, si ab illo idem de *Equo* v. g. inter animalia, vel de *Betonica* inter stirpes vicissim sciscitarer. Nimirum certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto rerum omnium generationes natura parens exequitur, quæque uspiam è causarum gremio in actum ac quasi in lucem educit, eorum essentias, quidditates, ac differentias constitutivas, altissimis tenebris obvelat. Hinc unaquæque, morborum non minùs quàm animalium, aut vegetabilium species, affectiones sibi proprias perpetuas, ac pariter univocas ab essentia sua promanantes, sortita est. Neque interim magnopere urgebit ista Quæstio, Quì demum morborum medela administrabitur, dum causæ ipsorum nos latent? Quandoquidem non causarum, sed methodi convenientis atque experientiæ comprobatæ cognitione, affectuum plurimorum curatio absolvitur. Sed ut ad rem redeamus. Quoniam simularium omnium morborum ortus à qualitatibus vel primarum, vel secundarum vitio (quod solum in hac rerum caligine nobis licet) deducere solemus, propè est ut credam Pestem peculiarem ac sui generis Febrim esse, quæ à particularum sanguinis spirituosiorum *Inflammatione*, originem ducit, utpote ejus naturæ subtilissimæ, præ tenuitate sua, maximè proportionatæ ac adæquatæ videntur. Quod si subtilitate qua potest maxima pollet (ut in principio & statu constitutionis Epidemicæ videre est) subito ac quasi ex improvviso calorem nativum dissipat, & ægrum è medio tollit: Cadaveribus interim hujus morbi ferociâ tam subito extinctorum maculis purpureis undiquaque conspersis, atque foedatis; nempe Fibris cruoris præ intestini conflicti violentia diffilientibus, & compage ipsius prorsus dissoluta. Atque hæc tragœdia præ hujus quasi flammæ subtilitate eximia, etiam sine aliqua sanguinis Febrili ebullitione, vel alterius ægritudinis præsentatione, cietur. Secus quàm ut plurimum accidit, ubi causa morbifica minùs subtilis existit, & quasi obtusiori telo vitam impetit. Discriminis modus pinguiori exemplo sic adumbretur. Si acus vel quid aliud cuspidè graciliori præditum pulvinari supponatur, ac vi adigatur, illud, æquè ac obtusiore instrumento similiter adactò, in sublime non attollitur, sed perforatur. Verùm ejusmodi subitanea extinctio rarius occurrit, nec nisi (ut suprà innuimus) circa initium Pestis, vel incrementum. Etenim, ut in aliis Febris, plerumque rigor atque horror primum invadit, quem calor mox excipit, tantisper excurrit, donec particulæ cruoris inflammatae provido naturæ ductu ad Emunctoria amendantur, ac ibidem ad instar phlegmonum communium in pus vertantur. Jam si inflammatio adhuc remissior existat, Febres, quas pestilentes vulgò appellant, producere solet; ut in fine pestilentis constitutionis sæpenumero accidit, ac forsitan etiam uno alterove post anno, donec ista Februm species prorsus dispareat.

Certè, me judice, in inflammatione ista, quam Latini *Ignem Sacrum* appellant, quandam Pestis imaginem non obscuram intueri licet. Est enim morbus hic apud saniores Medicos Febris Continua à sanguinis parte tenuiori

corruptâ ac inflammatâ originem ducens, quâ ut natura se liberet, eam in corporis aliquam partem externam expellit, in qua tumor, aut potius (cum tumor adeò notabilis sæpe non appareat) Macula rubra, lata, dispersa, quam *Rosam* appellant, oritur. Solvitur autem ista Febris, postquam uno atque altero die ægrum afflixit, criticè per hunc tumorem, & proinde aliquando in glandulis sub alis, vel in inguinibus dolor, ut etiam in Peste fieri consuevit.

* Et ferè invadit hoc malum ut Pestilentia, cum horrore & insequenti calore Febrili, ita ut qui ipsum ante non sunt passi, existiment lue pestifera se corripi, donec tandem in cute aut alio loco sese affectus prodat. Quibus accedit quod & maligni aliquid huic morbo inesse nonnulli Authores suspicantur, ac proinde curationem in sudoriferorum atque alexipharmacorum usu constituunt. Hæc quidem flamma, ubi Ebullitionem commoverit, cujus ope particulæ sanguinis leviuscule ustulatæ ac quasi syderatæ brevi spatio foras ablegantur, sponte sua, nec ulteriorem noxam molita, extinguitur.

Verumtamen Ignis noster isto *Sacro* longe *divinior* est, ut qui summa qua pollet substantiæ tenuitate intimiores corporis recessus ad instar fulgetri permeare aptus natus sit spiritibus cruoris derepente profligatis, ipsiusque compage nonnunquam citius dissoluta, quam Natura præcipiti malo oppressa, Ebullitionem Febrilem (solemnem nempe machinam qua quicquid sanguini infestum est, suis è finibus amovere satagit) concitare valeat.

Quod si quis mihi hîc litem paret de eo quod hunc morbum ab inflammatione oriri existimem, is attendat non modo Febris præsentiam, sed & complura alia huic sententiæ suffragari, nempe sanguinis detracti colorem, qui Pleuriticorum ac Rheumatismo laborantium sanguinem planè æmulatur; adustam *Anthracum* faciem, Pyrotici actualis impressioni non absimilem; nec non *Bubones* ipsos, qui inflammationem æquè solemniter excipiunt, ac eandem alii cujuscunque generis tumores consequi solent, uti & inflammationes pleuræque omnes in abscessum terminantur. Quin & anni tempestas qua Epidemica Pests ut plurimum exoritur, ad hanc rem symbolum suum conferre videtur. Eodem enim tempore, nimirum quod inter vernum æstivumque medium est, *Pleuritides*, *Angina*, aliæque inflammati sanguinis affectiones populariter ingruere consueverunt: quemadmodum etiam nunquam frequentiores mihi visæ sunt, quam per aliquot septimanas, quæ nuperæ *Pestis Londinensis* exortum antecesserunt. Nec verò nullius est momenti illum ipsum annum tot millium strage funestum, alioquin mitissimum ac saluberrimum extitisse; omnesque qui a Peste immunes perstiterunt, nunquam meliori valetudine usos fuisse; quin & eos qui ab eadem convaluissent, cachexiæ aliisque affectibus à residua priorum morborum labe provenire solitis, non magis obnoxios deinceps vixisse. Quibus accedit, quod & quantæcunque latitudinis, *Apostemata* & *Carbunculi*, postquam inflammatæ particulæ unâ cum sanie decessissent, Chirurgicis auxiliis, iisque non admodum exquisitis, facillè sanata fuerint.

Verùm perquirat hîc fortasse aliquis, si Pests in inflammatione quadam consistat,

* Vid. Sennertum, lib. 2, cap. 26. de febr. Sympt. contin.

sistat, qui fiat ut medicamenta calidioris census, qualia sunt *Alexipharmaca* propè omnia, tam ad hujusce affectus *Therapeiam*, quàm *Prophylaxin* tanto cum fructu usurpentur. Cui respondeo, illa duntaxat per accidens auxilium præstare, nempe *Diaphoreses*, quam suscitant, beneficio, quo particulæ sanguinis inflammatae diffilantur, atque exterminantur. Quòd si fortè exhibita sudores commovere non valeant (ut persæpè accidit) mox sanguinis incendium ab additio calore magis efferatum, eorum noxam palàm proclamat. *Prophylaxin* ut verbo attingam, non sum nescius etiam ad illam *Antidotarium* calidorum usum passim deprædicari, at quo emolumento adhuc probandum restat. Imò vinum liberius ingurgitatum, aliquaque fortiora præservativa statim horis dietim assumpta, complures, qui alias salvi intactique verisimiliter permanissent, in hunc affectum coniecerunt.

Quod ad harum *Febrium Therapeiam* attinet, erunt fortassè, qui me temeritatis atque arrogantiae eo nomine infimulabunt, quod ab Urbe dum nupera *Pestis* grassaretur, maximam partem complurium milliarium intervallo semotus, adeoque observationum copiâ minus instructus, de hac re tamen disse-rere sustineam. Verùm cum Medicis illis longè peritioribus, quibus per totum calamitosæ huius decursum inter media pericula & mille mortis imagines commorandi animus ac fiducia non defuisset, tamen ea, quæ crebriori usu de hujusce morbi ingenio annotassent, in lucem edendi voluntas hætenus defuit, mitiorem, uti spero, de consilio meo sententiam laturos sunt omnes boni, quòd meam de truculentissimo affectu sententiam, paucis quidem, sed propriis observationibus superstructam, in medium expromam.

Ac primus quidem locus *Indicationibus curativis* debetur, quæ eò in universum dirigendæ sunt, aut ut naturæ ductum in exterminando morbo accuratè sequentes, eidem subsidiariam porrigamus manum; aut ut methodo, quâ natura in intestino hoc hoste debellando uti solet, minimè fidentes, diversam ac tutiorem ex nostro penu atque artificio vice illius substituamus. Nisi fortè hic aliquis regerat rem etiam satis feliciter per pestifuga alexiteria geri posse, quorum ingentem apud Practicos copiam reperire est. Verum enim verò an non auxilium quod præstant hujusmodi medicamenta, potius manifestæ ipsorum facultati, quâ sudores affatim proliciendo simul materiæ morbificæ exitum aperiant, quàm occultæ cuidam indoli, qua à Natura ad Pestilentis malignitatis labem delendam donata fuerint, referri debeat, magnam atque ancipitem habet disceptationem. Nec de hisce tantummodo, sed & de aliorum morborum Alexiteriis dubitare fas est, utrum evacuationem aliquam sollicitando, potius quàm virtute quadam specifica ægrotantibus non succurrant. Qui enim, v. gr. in *lue Venerea*, vel *Mercurium* vel *salsaparillam*, veneni in isto morbo reperi alexipharmaca objiciat, adducenda sunt ei curationum exempla, in quibus ille sine sputo aut secessu, hæc verò sine sudoris suscitatione sanitatem aliquando restituerit, quod ego quidem credo ei admodum difficile futurum. Mihi autem verisimile est, peculiare *Pestis* remedium, propriumque ipsius perniciæ alexiterium adhuc in naturæ sinu abditum delitescere, nec eandem nisi ratione quadam mechanica tolli posse.

Quo-

Quocirca ut intentionem illam priorem paulò plenius expendamus, quæ eò spectat, ut Naturæ in materiæ morbificæ exterminatione suo more & modo auxilium suppeditetur; advertendum venit, quòd in verâ Peste Natura, dum neque sponte sua aberrat, neque vi aliquâ transversim agitur, per *abscessum* aliquem in Emunctoriis erumpentem, unde materiæ exitus patescit, negotium suum exequitur. Atqui in Febre, quam Pestilentem nuncupamus, mediante diaphoresi per universam corporis superficiem idem efficitur. Unde colligere est, pro diversa, quam natura in utroque morbo præmonstrat, via ac ordine, etiam diversam medendi rationem institui debere. Nimirum si quis materiam veræ Pestis, ope sudoris amoliri satagat, is diversa à natura via insistit, utpote quæ id per apostemata molitur. Contra verò qui alias quam per sudores Febris Pestilentis materiam eliminare tentat, is cursum instituit cum naturæ ductu ac *πορῶν* nequaquam convenientem. Cæterum in Peste vera, quoniam idoneo ac certo remediorum genere naturalis morbificæ materiæ ejectio, id est, apostematum eruptio promoveri possit, nondum constat; nisi quis fortè victum corroborantem atque Cardiacæ ad illud conferre posse existimet; quæ tamen multum dubitarem ne ægrū, jamjam plus æquo calefcentem, in majorem æstum conjiciant. Certè sudores in hoc casu frustra esse compertissimum habeo; quanquam haud inficior post magnos sudores ad trium quatuorve horarum spatium productos, ac deinde abruptos, tumorem se in conspectum dare, quem ego à sudore proficisci minimè arbitror; utpote quo vigente, nullum appareat eruptionis indicium, finito quidem, veluti per accidens consequatur, nimirum cum jam aliquam sarcinæ partem, quæ naturam plus satis gravabat, sudores abstulerint, ac corpus à Cardiacis ad Diaphoresin suscitandam propinatis vehementius incalascit. Verum quam fallax & infida sit hæc peccantis materiæ per apostemata à sudoribus foras evocatæ, exterminatio, testor funestos eorum exitus, qui hoc modo tractati fuerunt, è quibus vix tertius quisque (ut modestissime dicam) medicationis ac morbi periculum evasit. E contra verò multi, quibus laudabili ritu tumores eruperunt, etiam dum negotiis suis intenti versarentur, nec ullius sive naturalis sive vitalis, sive denique animalis facultatis læsione perceptâ, sanitatem brevi recuperarunt; nisi qui malo suo fato in medicastrum aliquem incidentes, ejusque monitu, quantumvis corpore pariter ac animo optime valentes, ad sudandum in cubilibus compositi, ab eo ipso tempore deterius se habere inceperint, ac demum ingravescente ægritudine, inauspicati consilii noxam suo interitu comprobaverunt. Verum lubricam atque aleæ plenam in se esse hujusce morbi per tumores judicationem ex eo manifestum est, quod interdum *Bubo* qui primum laudabiliter ac cum symptomatum remissione protuberavit, postea ex improvviso disparere, ejusque loco *Maculæ purpuræ* certissimi mortis indices, succedant; cujus retrocessionis causa magnis illis sudoribus ad eruptionem promovendam destinatis, jure tribuenda videtur, ut qui bonam materiæ partem, quæ tumoris molem infarcire ac sustentare debuerat, aliò versum per ambitum corporis distrahendo ac dissipando leves in auras difflasserint. Ut ut sit, hoc sal-

tem planissimè constat, cæteris affectibus, à Dei Opt. Max. benignitate, certam amoliendæ causæ morbificæ rationem, huic autem, enormium delictorum flagello, non nisi lubricam admodum & versatilem adjunctam esse. Atque hinc fortasse non minus commodè, quàm à *malignitate*, ut loqui amant, eximæ perniciæ causa atque origo peti possit. Nam & in *Arthritide* aliisque morbis, qui exiguam habent malignitatis suspicionem, materiæ morbificæ recursus non minori certitudine fatum accersit. Ex quibus omnibus manifestò consequitur, Medicum, qui in aliorum morborum medicatione, naturæ ductum ac propensionem pressim, ac passibus æquis sequi tenetur, hîc ejusdem auspicis renunciare debere. Cujus effati veritatem, quia paucissimi hætenus perspexerunt, hinc numerus eorum, quos tumulo Pests intulit, haud paulò auctior evasit.

Quare cum minimè securum sit in exterminando hoc morbo naturæ vestigiis insistere, proximo loco dispiciendum venit, quâ demum arte secundæ quam diximus Intentioni satisfiat; nempe aliam atque à Naturali diversam, hujusce morbi solutionem aggrediendi. Hoc autem dupliciter omnino fieri posse existimo; scilicet vel per sanguinis missionem, vel per sudores. Priorem quod attinet, non sum nescius sacram apud plerosque audire in hoc morbo venæ sectionem. Verùm vulgi præjudicia parùm moratus, rationum in hac quæstione momenta, quâ par est æquitate atque candore, paulisper expendam. Ac primum quidem Medicorum, qui grassante nupera lue in Urbe perstitērunt, fidem appello. Numquis eorum, Phlebotomiam largâ manu ac repetitis vicibus, nec non tumore nullo adhuc protuberante celebratam, Peste laborantibus funestam esse animadvertit? Parcam quidem, vel tumore jam conspicuo, sanguinis detractionem semper damnosam esse, neutiquam mirandum est, Si quidem cum mediocris tantum quantitas cruoris adimitur, hinc Naturæ, quæ tumori protrudendo totas intendit vires, rei administratio è manibus eripitur, nec interea alia satis efficax materiam morbificam evacuandi, ratio substituitur. Apparente autem jam tumore, celebrata venæ sectio, cum à peripheria ad centrum trahat, motui naturæ, qui fit à centro ad circumferentiam, inducit motum planè adversantem. Nihilo minus vix quicquam frequentius factitatum videas, quàm Phlebotomiæ perverso hoc ritu administratæ, noxam, à contrariæ patronis universim ac in genere adversus sanguinis in hoc morbo detractionem validissimi argumenti loco torqueri; uti in *Diemerbroeckio* aliisque Observationum scriptoribus passim videre est. Quod ad me attinet, equidem eorum ratiocinationi assentire non possum, donec intellexero, quid Quæstioni superius propositæ respondeant. Sanè venæ sectionem in Peste convenire, complures, iique gravissimi scriptores jampridem senserunt, quorum præcipui sunt *Ludovicus Mercatus*, *Joannes Costæus*, *Nicolaus Massa*, *Ludovicus Septalius*, *Trincavelius*, *Forestus*, *Mercurialis*, *Altamarus*, *Paschalius*, *Andernachus*, *Pereda*, *Zacutus Lusitanus*, *Fonseca*, aliique. Verùm qui totum curationis negotium in copiosa, qualem nos postulamus, sanguinis detractione collocaverit, unus, quod sciam, reper-

tus est *Leonhardus Botallus*, Medicus superioris sæculi celeberrimus, quem, ne solus in hac palæstra versari videar, Lector accipiet suis ipsius verbis de hac re differentem. * Ego (inquit) ut uno verbo dicam, nullam Pestem esse puto, cui hæc non possit esse salutaris supra omnia remedia, modo opportunè & quantitate convenienti usurpata sit, propterea quod aut tardius aut parcius quàm opus esset, aut quod utroque modo circa eam usurpandam peccatum sit. Et paulò post hæc subjungit; At in tanta timiditate & parca detractioe qui fieri potest, ut quis rectè possit judicare quantum ea in Pestilenti morbo prodesse valeat, aut obesse? Non enim morbus pro cuius curatione requirebatur detractio librarum quatuor sanguinis, in quo una tantum detrahitur, si hominem interficiat, ideo interficit, quia sanguis est missus, sed quia non justo modo missus est, nec forte etiam opportunè. Verùm nebulones nequissimi & ignavissimi in id semper culpam convertere satagunt, non quod nocuit, sed quod per fas & nefas à cunctis vituperari exoptant. Aut si id nequitia non faciant, ignorantia tamen prave dispositionis efficiunt: utraque certè perniciosa, sed illa magis. Quæ omnia experientia confirmaturus, paulò inferius sic pergit; His observatis nemo rationis capax jure in his morbis vituperare missionem sanguinis potest, sed mirificè & tanquam divinum auxilium commendare, extollere, & confidenter usurpare; quod ipse profectò ab annis quindecim facio. Ideo in morbis Pestilentibus, in obsidione *Rupellarum*, & montibus *Hannoniæ* ab hinc quadriennium, & *Parisiis* toto biennio, & *Cameraci* anno proximè actò in omnibus meis ægrotis (qui innumeri fuerunt) nullum præsentius ac salutaris reperi ipsa largâ & tempestivâ sanguinis missione.

Deinde ad curationum exempla descendit, quæ brevitati studens, huc transferre supersedeo. Libet tamen rei in hac nostra *Britannia* ante aliquot annos gestæ historiam oppido raram ac à proposito nostro non alienam, hic loci apponere.

Cùm inter cæteras belli civilis calamitates, quæ hanc patriam nostram miserrimè affligerunt, pestis etiam multis in locis grassaretur, ac fortè in *Castrum Dunstar*, quod in provincia *Sommercetocensi* situm est, aliunde invecta, aliquot præfidiariis cum macularum efflorescentia derepente exanimatis, complures etiam alios corripuisset; Chirurgus quidam qui à longa in regionibus exteris peregrinatione redux tunc temporis stipendia inter alios faciebat, à præsidii Præfecto enixè rogat, ut sibi liceret commilitonibus suis truculento morbo correptis pro virili succurrere, quo annuente, singulis ægris, statim à primo morbi insultu, atque nullo adhuc tumore conspicuo, sanguinem ingenti copia detraxit, donec pedibus deficere inciperent, nam stantibus ac sub dio vena pertusa est, nec aderant vascula quæ cruoris in terram effluentis mensuram definirent. Hoc facto eos in tuguriola sua ad decumbendum dimisit. Et quanquam à Phlebotomia nullum omnino remedium adhibuit, tamen ex plurimis iis, quos hoc modo tractasset, mirum dictu, ne unus quidem desideratus est. Vir Nobilissimus juxta ac morum probitate atque fide spectabilis

bilis *D. Franciscus Windham*, militum Tribunus, ac prædicti castrî tunc temporis Præfectus, mihi hæc retulit, & etiamnum in vivis est, pro eâ quâ est humanitate rei gestæ veritatem cuilibet dubitanti confirmaturus.

Quid mihi met ipsi circa hanc rem singulare ac memoratu dignum aliquando observare contigit, Lector inferiùs accipiet, ubi pauca ea, quæ defæviente nupera Peste *Londinensi* à me usu atque experienciâ annotata fuerunt, inferiùs ostendam.

Hujusce autem praxeos utilitatem etsi non mente tantum ac judicio assequor, verum etiam re ipsâ atque editis experimentis dudum exploravi, tamen Pestilentis fermenti per diaphoresin dissipatio, præ ejusdem per Venæ-sectionem evacuatione mihi multis nominibus arridet; utpote quæ nec ægrorum vires æquè prosterнат, nec medicum infamiæ periculo objiciat. Atqui & hæc difficultatibus suis non vacat; primò enim, multis, ac præsertim calidioris temperamenti juvenibus, sudores ægriùs proliciuntur; cujusmodi ægrotos, quò hydroticis fortioribus, ac cumulationi tegumentorum pondere diaphoresin conciere satagas, eò in manifestius Phrenitidis periculum adduces; aut quod tristioris adhuc ominis est, vanâ spe aliquantisper lactatus, tandem pro sudoribus *Exanthemata Pestilentialia* elicies. Cùm enim præcipua hujusce mali labe in spirituosiori massæ sanguineæ parte resideat, unde crassiorum particularum exagitatio nonnihil languidior, quàm in aliis inflammationibus plerumque existat, tenuior illa portio novi caloris accessione in majorem rabiem acta, impetu demum facto omnes cruoris fibras ultra texturæ modum distensas prorsus frangit ac comminuit. A qua fibrarum sanguinearum dissolutione macularum Pestilentialium causam petendam esse censeo, quippe non secus ac *vibices* à plaga fortiore in partem aliquam corporis musculosam inflicta, primò intensius rubicundæ in cute efflorescunt, ac brevi post tempore livorem quendam aut nigredinem induunt.

Deinde verò, in corporibus quæ satis promptè in sudorem solvuntur si diaphoresis justo præmaturiùs (nempe totâ materiâ morbosâ nondum penitus dissipatâ) abrumpatur, bubonum, qui laudabiliter quidem sub finem sudoris prodire inceperant, postea deterior evadit conditio. Nam subductâ quæ eos in molem attollere deberet materiæ parte, aut de facili intrò remeant, aut saltem ad legitimos abscessus nunquam perducuntur, (quemadmodum etiam in Variolis accidere solet, quoties æger per primos dies impensius sudavit) recepto autem denuò intra muros hoste ferali, in sanguine cominotio excitatur, cujus operâ eò, quò superiùs innuimus, modò, sæpè ecchymata imminentis lethi indicia foras propelluntur.

Verum quibusnam modis his aliisque difficultatibus obviam iri possit, ut luculentiùs patefcat, quid in hoc morbo à me pro modulo meo factum observatumque fuerit, initiò à nuperæ lûis primordiis ductò, summâ fide edisserere lubet.

Nobilem foeminam ineunte *Majo* anno 1665. ætatis circiter 21. annorum, ac temperamento sanguineo præditam invisi. Præter Febrem ardentem, quæ paulò

paulò ante invaserat, vomitiones importunæ, aliaque symptomata febrilia ægram excruciant. Curationem à Venæ sectione auspicatus, postero die ad præcavendam Diarrhœam, (quæ, ut in hujusce Tractatus initio monuimus, ob omissam, quod postulabat in principio morbi vomendi propensio, Emetici exhibitionem, defervescente Febre supervenire consuevit) Vomitorium imperavi, quod satis commodè ventriculi saburram elicuit. Postero mane, cum ægram iterum adirem, ei alvum profluere intelligo, quæ res ab aliquot annorum usu insolentior visa, mihi non levem sollicitudinem iniecit. Exindè autem Febrem non vulgaris generis esse judicavi, (quemadmodum etiam eventus docuit) proindeque aliam ab ea quæ superius tradita est, quæque constanti successus serie hætenus à me usurpata fuisset, medendi rationem sibi vindicare. Quocirca adscito in negotii societatem medico alio seniore, venæ sectio, quam ægrotantis ætas, temperamentum, ac inordinata sanguinis ebullitio flagitare videbantur, ex communi nostro consilio iterum celebrata est; etiam cardiaca moderatè refrigerantia propinata, ac denique clysmata alternis diebus injecta sunt. Sub finem ægrotudinis, quoniam symptomata valdè anomala ac inconsueta (malignitatis egregiæ indicia vulgò habita) ingruebant, ex Alexipharmacorum classe fortiora aliquot præscripsimus. Quibus tamen omnibus nequicquam proficientibus, ægra circa diem decimum quartum è vivis excessit. Insolitum hujusce Febris ingenium per aliquot post dies animum meum variè exagitabat; ac tandem in memoriam revocans, summum ardorem, etiam post reiteratam venæ-sectionem in prædicta ægra perseverasse; ruborem genarum adfuisse: cruoris aliquot guttulas paulò ante mortem è naribus fluxisse; nec non sanguinem ipsius in acetabulis refrigeratum, ei qui à Pleuriticis detrahitur, non absimilem fuisse, quin & tussim aliquam & obscuros quosdam in partibus vitalibus dolores emicuisse; porro & eam anni tempestatem incubuisse, quæ finem veris ac initium æstatis complectitur, quæque Febribus continuis producendis minus esset idonea, (illæ enim hoc tempore sua spontè quasi diffiliunt, & in intermittentium classem se reponunt, vel in Pleuritides atque id genus alias inflammationes præcipites ruunt) denique Pleuritides eo ipso tempore admodum populares fuisse: His inquam omnibus ritè perpensis, in eam deveni sententiam, ut Febrim hanc, etsi pathognomicis Pleuritidis, aut etiam Peripneumoniæ signis destitutam, tamen symptomatis rationem habuisse judicarem, inflammationis cujusdam respectu circa partes spirituales delitescens, etiamsi nullus aderat lateris dolor, nulla insignis spirandi difficultas. Ut rem contraham, eò tandem deveni, ut eadem omninò mihi methodo procedendum fuisse in prædicto casu arbitrarer, quæ in Pleuritide sæpius cum successu singulari usus fueram. Quæ sententia deinceps feliciter atque ex voto cessit. Vocatus enim non multò post ad hominem consimili prorsus modo ægrotantem, reiteratis venæ sectionibus, quales ad Pleuritidem suprà laudantur, curationem commisi & absolvi. Circa mensis modò memorati exitum atque initium Junii, complures operam meam implorantes ab eadem Febre (quæ jam valdè populariter grassabatur) prædictæ

praxeos beneficio convaluerunt. Ab hoc tempore immaniter debacchari coepit calamitosa illa Pests quæ eo tandem truculentia devenit, ut septem dierum spatio totidem animarum millia in hac una urbe extinxerit.

Febri autem illi, de qua modò loquebar, an pests appellatio attribui mereatur, non ausim definitò pronuntiare. Hoc tamen exploratè cognitum habeo, omnibus, quos illo & aliquanto post tempore ipsissima Pests cum universo symptomatum sibi peculiarium apparatu, in mea vicinia afflixit, eandem tam in primo morbi insultu, quàm in decursu, accidentium συνδρομήν adfuisse. Cæterùm cùm proximo pariete ardente propiùs ædibus meis immineret periculum, ego tandem amicorum suasu numerosissimis fugientium turbis me adjunxi, familiâ etiam meâ ad aliquot ab Urbe lapides subductâ. Eò tamen vicinis meis maturiùs redii, ac dum calamitosæ illius luis in tantum perseveraret sævitia, ut fieri non potuit, quin meliorum medicorum penuriâ ad Pestiferorum auxilium advocarer. Nec multò post complures Febricitantes invisi, quorum Febrem, illius quæ ante decessum meum tam prosperis ægrorum rebus, à me tractata fuisset, morem atque genium æmulari non sine magna admiratione deprehendi. Ideoque propriâ experienciâ fretus ceu duce, quibuscumque præceptis umbratilibus anteponendo, Phlebotomiam similiter administrare non dubitavi.

Hunc autem ritum imminuendi liberalius sanguinem (cui etiam Ptisanæ ac diætæ id genus refrigerantis usus accessit) in multis ægris miro profectu continuavi, donec tandem in nonnullorum tractatione solito successu destitutus præ adstantium proterviâ, qui præjudiciis inanibus occupati debitam sanguinis quantitatem auferri non patiebantur, (magno ægrotantium malo, quibus, saltem dum in hoc cardine curandi scopus versaretur, sanguis aut sufficienti quantitate, aut non omnino detrahendus fuerat,) insignem obicem conatibus meis oppositum sensi, ac proinde alium à venæ sectione huic morbo occurrendi modum reperiri, magnopere ex usu futurum judicavi. Nocummenti quod aliquando insons dedi, non ex eo, quòd sanguinem ademerim, sed quòd ex voto eundem adimere impeditus fuero, exemplum hîc adducam; Vocatus ad juvenem quendam, temperamento sanguineo ac habitu athletico præditum, quem Febris vehementior cum doloribus capitis vertiginosis, vomitu enormi, aliisque id genus symptomatibus à biduo corripuerat, cum nulum adesse tumoris signum interrogatus responderet, statim liberali manu sanguinem emitti imperavi, cujus refrigerati superficies puriformem Pleuriticorum sanguinem referebat, præscriptâ etiam ptisanâ cum jusculis ac Julapiis refrigerantibus. A meridie pro secunda vice parem sanguinis jacturam subiit, quâ etiam sequente aurorâ similiter mulctatus est. Sub hujus autem diei exitu ægrum meum invisens, eum quidem multo melius se habere, & nihilominus amicos ejus adversus ulteriorem venæ sectionem animis vehementer obstinasse deprehendo; quam tamen ego denuò celebrandam esse enixè contendi, superesse alteram duntaxat venæ sectionem dictitans, quæ ægrum in sicco collocaret, fin

sin contra niti pergerent, satius fuisse, ut nullo omnino sanguine detracto curatio per sudores instituta fuisset; uno verbo, ægrum certò certius interiturum. Præfagium eventus confirmavit; nam dum hæc alteratio rei agendæ occasionem corrupisset, maculæ purpureæ postridiè eruperunt; nimirum materiæ peccantis reliquiis, quas radicitus evacuari oportuit, cum jam omnem abscessus spem Phlebotomia toties repetita abstulisset, morâ suâ universam cruoris massam pervertentibus, ejusdemque compagem subtilitate eximiâ disrumpentibus. Æger autem post aliquot horas fatis concessit. Cùm ergo frequentior hujusmodi obstaculorum occursum mihi molestiam faceret, magna cogitandi sollicitudine mecum agitavi, ecquis demum reperiri possit medendi modus, qui morbum non minus efficaciter abigeret, nec hominum offensionem æquè incurreret. Re diu multumque apud animum meum deliberatâ, tandem in hanc methodum incidi, quam nunquam non proficuum, ac omnibus numeris absolutam deinceps expertus sum.

* Primò, siquidem tumor nondum protuberaret, sanguinem pro ægrotantis viribus ac temperamento, moderatè detraxi, quo factò, Diaphoresis, cujus aliàs sollicitatio in nonnullis corporibus non modò summam habebat difficultatem, verum etiam majoris incendii, proindeque ecchymatum purpureorum periculum minitabatur, facilis erat atque expedita. Atque hanc sanguinis jacturam, quæ utut exigua aliàs gravissimum incommodum attulisset, diaphoreseos immediatè insequentis beneficium abundè compensavit. Post Venæsectionem (quam in lecto celebrandam curavi, cum jam omnia ad sudores proliciendos in promptu essent) ne vel minima interposita mora stragulis ægrum obrui, ac laciniam laneam sincipiti alligari jussi, quæ quidem capitis obtectio ad sudorem ciendum plus proficit quàm quis facile crediderit. Deinde, si vomitus non adessent, hæc & similia hydrotica exhibui; *R. Theriac. Androm. 3℔. Elec. de ovo. ʒj. pul. è chel. canceror. comp. gr. xij. cochinell. gr. viij. croci gr. iiij. cum s. q. succi. kermes. f. bolus, quem sumat sextâ quâque horâ, superbibendo Cochl. vj. seq. Julapii.*

R. Aq. Card. benedicti & scord. comp. an. ʒiiij. aq. theriac. still. ʒij. syr. caryophill. ʒj. misc. f. Jul.

Quod si vomitio interpellaret, ut in Peste ac Febribus Pestilentialibus sæpiissime accidit, medicamentum sudoriferum tantisper propinare distuli, donec solo tegumentorum pondere (nisi quod lintheaminis pars subindè ad colligendos halitus vultui superinduceretur) sudor promanare inciperet. Nam (quod quidem observatu summè dignum est) cum materiæ morbificæ radii versus ambitum corporis sese exporrigant, illico alvi profluvium & vomitiones, ab eisdem introrsum reflexis, ac in ventriculum & intestina decumbentibus provenientes, ultro sedantur; Adeo ut quantacunque stomachi subversio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probè retineantur, ac ad sudores ex voto proliciendos conducant.

Memini cum me aliquando Pharmacopola quidam ad fratrem suum ex

Febre Pestilentiali graviter ægrotantem vocasset, atque ego de medicamento ad sudorem suscitandum exhibendo, sermonem injicerem, retulit se jam varia eaque fortiora sudorifera incassum propinasse; siquidem æger omnia vomitu rejecerat. Cui ego, adduceret, inquam, ex omnibus iis quæ antea exhibuisset vel ingratissimum ac summè fastidiosum, me facillè effecturum ne illud deinceps evomeretur. Promissi fidem eventus liberavit, quippe æger, ubi à sola stragulorum mole paululum maduisset, largiorem *Theriace Veneræ* bolum deglutivit ac retinuit, cujus beneficio in copiosorem sudorem coniectus incolumitatem recuperavit.

Sed ut ad institutum redeam, inceptam jam diaphoresin haustibus *Zythogalæ salviæ alteratæ*, vel *cerevisiæ*, cui *macis* aliquantulum incoxerit, subinde repetitis, ad naturalis diei spatium continuari præcepi, abstersione interim omni religiosè interdictâ, imò nec infra quatuor ac viginti horas à sudoribus finitis indusium utcunque madidum ac immundum mutari permitto; Id quod summa cautela observari velim. Quod si sudatio angustiori temporis limite circumscribatur, recrudescit illico symptomatum sævitia, atque ægroti salus, quam proluxior diaphoresis extra aleam constituisset, in acie novaculæ relinquitur.

Et profecto *Diemerbroeckium* aliosque nequeo satis mirari, quoties adverto eos tam levi prætextu ad diaphoresin interpolandum adduci, ut scilicet ægrotantium viribus consulatur. Primò enim ægrum sudore diffluentem viribus melius quàm antea constare, nemini in hujus morbi medicatione vel tantillum versato non potest esse animadversum. Quid me in hac re usus atque experientia docuit, palam eloqui ac etiam propugnare non verebor. Multi me authore in 24. horarum diaphoresin coniecti tantum abest, ut se exinde debiliores factos quererentur, quin totius quantum supervacanei humoris sudando decessisset, tantundem novi roboris sibi accrevisse profiterentur. Circa horas autem aliquot posteriores, sæpè non sine stupore observavi erumpere sudorem quendam, priore illo, quem vis medicaminum expresserat, magis naturalem, genuinum, copiosum, quique multo plus de levaminis afferret, planè ac si verè criticus foret ac totius morbi eradicativus. Porro in summo sudoris vigore jusculis ac forbilibus confortativis ægrum reficere, quid secum trahat incommodi non video, ideoque ad nihilum recidit illa objectio de virium ad longos sudores perferendos impotentia. Si qua igitur defectio sub finem imminere videatur, jusculi ex pullo tantillum, vitellum ovi, vel his similia forberi permitto; quæ cum cardiacis & haustibus ad sudorem continuandum ex more destinatis, virium labefactioni abundè succurrunt. Cæterum in re adeò manifesta non opus est, ut plura argumenta adducam: Etenim, quod hujus præxeos utilitatem palam proclamat, videre est, quod quando æger sudore diffluit, benè se habere existimet, neque minus ex astantium judicio res tota in vado constituta videatur; Atqui quam primum corpus arefcere incipit ac sudor abrupitur, omnia in pejus ruant morbo quasi postliminio redeunte.

Per horas à finito sudore viginti quatuor, moneo ut frigus cautè vitetur, indu-

indusium sponte sua in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & Zythogalæ salvia alteratæ usus etiamnum continuetur. In sequenti luce commune Catharticum exhibeo, *ex infusione sc. tamarind. fol. sennæ. rhabarb. cum manna, & syr. rosar. fol.* Atque hac medendi ratione, anno à Peste proximo; complurimis febre Pestilentiali correptis sanitatem restitui, adeò ut ne unus quidem ex eo morbo mihi desideratus sit; postquam eandem exercere inceperam.

Verùm ubi tumor jam enatus fuerit, venam aperire, etiam in corpore ad sudandum quantumvis inhabili, hætenus non sustinui, veritus ne materia morbifica in depleta vasa confestim remeante, subitaneus ægri interitus destinatam diaphoresin anteverteret. Nihilominus fortasse satis tutò administrari poterit Phlebotomia, modò confestim ab ea peracta, ac nulla mora interjecta eliciantur sudores, qui ad spatium superius requisitum producti, omnem tumoris molem paulatim absumere ac dissipare valeant, idque longè minore salutis periculo, quàm si legitima apostematis maturatio, quæ in præcipiti affectu admodum incerta ac fallax existit, seriùs expectaretur.

Denique, ut ad calcem tandem perveniam, sicubi circa Theoriam me hallucinatum fuisse Lector deprehendat, errori veniam peto; verum quod ad Praxim attinet, profiteor me omnia ex vero tradidisse, nihilque uspiam proposuisse, nisi quod probè exploratum habeam. Sanè cum supremus vitæ meæ instabit dies, confido mihi adfuturam alacrem in præcordiis testem, me non solum ægrorum omnium, cujuscunque demum sortis, qui sese curæ meæ concrediderant, summâ fide ac diligentia salutem procurasse (quorum interim nemo à me alias tractatus est, quàm ego memet tractari cuperem, si mihi ex iisdem morbis ægrotare contingeret) verum etiam pro ingenii modulo omnes animi nervos in hoc intendisse, ut si quo modo fieri possit, morborum medela post cineres meos majori cum certitudine administraretur; ratus quantumcumque in hoc scientiæ genere accessionem, etsi nihil magnificentius, quàm *odontalgia* aut *clavorum pedibus* innascentium curationem edoceat, longè maximi faciendam esse, præ inani subtilium speculationum pompa, ac levicularum rerum notitia, quæ fortasse Medico ad abigendos morbos non magis ex usu futura est, quàm *Architecto* ad construendas ædes *Musicæ* artis peritia.

Unicam hanc annotatiunculam, ne quis forte sinistra interpretatione mentem meam detorqueat, aut eam saltem non satis assequatur, postremo loco subjungam. In præcedenti nempe Diatriba, *Naturæ* nomine sæpius utor, illique varios effectus attribuo, perinde quasi rem aliquam singularem & seorsim subsistentem, sed per totam hanc mundi machinam ubique diffusam sub hoc titulo mihi repræsentarem; quæ ratione aliqua & consilio freta corpora quævis regeret, ac moderaretur, quale quidpiam de *Mundi anima* nonnulli Philosophorum cogitasse videntur. Verùm ad me quod attinet, uti nec rerum, ita nec verborum novitatem affecto, adeoque antiquam quidem vocem, sed sensu (ni fallor) & sobrio, & à sanis omnibus non intellecto solum, verum

etiam usitato, in hisce pagellis usurpavi. Ego enim, quoties *Naturam* nomino, toties *causarum naturalium complexum* quendam significari volo; quæ quidem causæ brutæ licet, atque omni consilio destitutæ, non tamen sine summo consilio reguntur, dum suas quæque operationes edunt, suosque effectus exequuntur. Nimirum supremum illud Numen, cujus vi producta sunt omnia, & à cujus nutu dependent, infinita sua sapientia sic disponit omnia, ut ad opera destinata se certo quodam ordine atque methodo accingant, neque frustra quicquam molita; neque nisi quod optimum est, ac toti Rerum Fabricæ, suisque privatis naturis maximè accommodum, exequentia: perinde atque *automata* non pro suo, sed artificis consilio moventur.

SECTIO TERTIA.

CAPUT I.

Constitutio Epidemica Annorum 1667. & 1668. partim etiam Anni 1669. Londini.

ANno 1667. appetente Æquinoctio Verno, *Variolæ*, quæ durante illa, quæ proximè est prægressa, constitutione Pestilentiali, vel prorsus delituerant, vel rarissimè comparuerant, caput coeperunt attollere, jamque in dies latius grassantes, sub Autumno *Επιδημικώτατοι* factæ sunt; à quo tempore paulatim imminuta vi, superveniente brumali frigore parcius laceffebant; at proximo Vere adolescente, postliminio invaluit hic morbus viguitque, donec ab insequentis hyemis gelu, uti prius, retuso impetu coerceretur. Post hæc tertio demum cum Vere surgente increbuit, ac jam languidior, & succiso quasi poplite, minus latè dominabatur, quàm duabus quæ præcesserant æstati-
bus: Mense verò Augusto 1669. penitus intercudit, *Dysenterix Epidemicæ* locum cedens. Labente primo illo biennio, quo hæc *Constitutio* regnabat, *Variolæ* plures in Urbe aggrediebantur, quàm unquam alias, quantum ego memini, seu prorsum spectes, seu retro: Quo non obstante, cum genuinæ per id temporis fuerint, neque mali moris, paucos jugulabant, si ingentem laborantium numerum reputemus.

Quo primùm tempore *Variolæ* incessebant, & novum quoddam *Febris* genus exortum est, à *Variolis*, quales se tum gerebant, non multum abhorrens, si pustularum eruptionem demas, & quæ ab illa pendent, de qua in sequentibus speciatim agemus. *Febris* hæc licet multò pauciores invaderet quàm *Variolæ*, easdem tamen duratione æquabat: Hyeme verò cum jam illæ minuerentur, invaluit, atque, illis Vere novo invalescentibus, recessit, prædominium *Epidemicorum* hujus constitutionis hoc pacto illis relinquens; Nihilominus

minus per hæc tempora non planè defiit unquam, donec tandem cum Variolis mense Augusto 1669. omnino disparuit.

Binos hosce morbos Epidemicos & tertius comitabatur, ultima præsertim æstate, quam dicta Constitutio defamabat, *Diarrhæa* scilicet, æris Constitutione jam tum ad subsequenter *Dyssenteriam* vergente: Utut verò hæc se res habuerit, id saltem constabat, morbum hunc Febrem quæ tunc regnabat, ita proximè attingere, ut nihil aliud esse videretur, quàm ipsa Febris introversa & visceribus incumbens.

De tribus hisce morbis, qui soli in hac *Constitutione* Epidemicorum nomen sibi jure vendicabant, sigillatim jam agam, à *Variolis* initium faciens; quas idcirco paulò fusiùs tractabo, quoniam quæ per hos annos regnabant, mihi Genuinæ præ cæteris & *Regulares* maximè videbantur, utpotè eadem prorsus exhibentes *φαινόμενα*, & parili symptomatum agmine omnes, quotquot adoriebantur, ubique impetentes, & à quibus proinde, tanquam in suo genere perfectissimis, tum vera morbi *Historia*, tum etiam medendi methodus est desumenda. Notandum enim est, non tantum Febrim quandam propriam & peculiarem cuilibet peculiari constitutioni competere, sed peculiare etiam Variolarum genus, quæ hanc quidem speciem referunt durante hac annorum serie, aliam verò annis sequentibus, quantumlibet inter se convenire videantur quoad certa *φαινόμενα* omnibus communia. Ita ludit natura in morborum Epidemicorum generatione! Sed ut ad rem redeam; Variolarum hujus generis *Historiam* ante omnia præscribam; quas ideo *Regulares* mihi licebit indigitare, ut ab *Anomalis* subsequentium annorum valeam dispescere: Tum etiam methodum adjiciam, quæ mihi in earundem *ὑπερσπείρεται* ex animo votoque maximè cessit.

C A P U T II.

Variolæ Regulares An. 1667. 68. & partim 69.

Variolæ, quibus annis Epidemicè grassantur, si *Regulares* etiam sint atque mitiores, circa *Æquinoctium Vernal* (uti hæc, de quibus sermo nobis est) ingrediuntur; quibus verò annis non tantum grassantur Epidemicè, sed & *irregulares* atque periculosioris sunt generis, maturius nonnunquam mense puta *Januario*, invadunt. Integras familias contagio suo afflantes, nemini parcunt, cujuscunque demum ætatis is fuerit, nisi prius hoc morbo laboraverit; Neque tamen eximuntur illi, quos adulterinum Variolarum genus aliquod, ad hunc morbum nihil attinentium, prius obsederit. Duplex est harum species, (ut & Variolarum, quæ quibuslibet annis infestant) vel sunt enim *Distinctæ*, vel *Confluentes*; quæ licet essentialiter, ut aiunt, non differant, per illustriora tamen quæ hanc comitantur speciem, illam verò non item haud difficulter ab invicem discriminantur.

I. *Interdictæ* vel *Discretæ* cum rigore atque horrore invadunt, quos mox excipiunt calor intensus admodum, Capitis & dorsi vehemens dolor, vomituri-

mituritis, ingens in sudores propensio (quod de Adultis dictum volo, neque enim in infantibus hujusmodi *σιάδισσι* mihi unquam observare contigit, vel ante pustularum eruptionem, vel etiam post) doloris sensus in partibus, quæ scrobiculo cordis subjacent, si manu premantur, stupor etiam & somnolentia, in infantibus præsertim, nonnunquam & Paroxyismi Epileptici: Qui si infantes Dentitione jam perfunctos corripuerint, suspicor ego ubique, Variolas in procinctu stare, quæ intra pauculas horas se exerente Prognostico ut plurimum fidem conciliant, & authoritatem; ita ut si fortè infans insultum Epilepticum sub vesperam, quod fieri solet, partiatur, Variolæ sequente aurorâ in conspectum se dederint, & (quod sæpè sæpius observavi) quæ Variolæ infantes statim ab hujusmodi paroxysmo aggrediuntur, pustulas emittunt magnitudinis conspicuæ, mites etiam sunt, atque boni moris, & rarissimè confluunt. Atque hæc ferè sunt illa symptomata, quibus hic morbus sub initio stipatur, quæque eruptionem pustularum ut plurimum antecedunt. Quamvis interim hîc loci consentaneum fuerit subindicasse, in sanguine laxiori atque *ευμεταβλήτω* nonnunquam accidere, ut separationis periodus sensim atque gradatim sine insigni aliqua ægritudine transigatur, priusquam expulsio materiæ pustularum eruptione se prodât.

Variolæ discretæ quarto ut plurimum die, (si primum etiam incluseris) ab invasione erumpunt, nonnunquam feritius aliquantò, antè illum verò rarissimè, quo quidem tempore vel minuuntur admodum symptoma, quod plerumque fit, vel etiam penitus evanescunt, ac proinde iis affectus satis pulchrè sibi videtur valere, nisi quod adulti in sudores propensi vix ab illis possint cohiberi, utut leviter tegantur, quæ quidem *σιάδισσι* nonnisi pustulis jam maturationem attingentibus ægrum deserit, idque sua demum sponte. Eruptionem quod spectat, hoc ferè habet modo: Primò pustulæ subrubræ, tenuissimarum acicularum puncta æquantes magnitudine, sparsim se produnt, faciem imprimis occupantes, vel etiam collum & pectus, dein corpus universum. Per id temporis & fauces dolor infestat, qui unâ cum pustulis surgentibus augetur, quæ indies grandescunt, & in majus fastigium elevatae cutem carnesque vicinas rubore afficiunt atque inflammatione.

Circa enim *octavum* à primo insultu diem (quam in hoc morbo Epocham ubique servo) intervalla, quæ prius subalbebant, pro pustularum, quibus obsidentur, numero, rubere jam incipiunt, atque in molem attolli, non sine partium dictarum dolore tensivo & lancinante, qui in horas auctus inflammationi & tumori prædictis viam sternit; ita ut progrediente morbo palpebræ usque ad eò impleantur extendanturque, ut æger luce quandoque privetur, qui quidem palpebrarum tumor vesicam inflatam ac resplendescentem per eandem extensam non malè refert. Est etiam ubi temporius oculis capiuntur ægri, si nempe major pustularum vis à prima eruptione se in illos effuderit. Proximæ à facie intumescunt manus, digitique pro pustularum numero distenduntur. Usque ad hunc diem pustulæ quæ faciem obsederant, læves ad tactum suere atque rubræ, jam verò asperiores evadunt (quod quidem primum est inci-

pientis

piensis maturationis indicium) & subalbidæ ; paulatim insuper succum quendam luteum , colore à favo non abluidentem , evomunt. Faciei interim & manuum inflammatio ad summum evecta apicem , colorem exhibet in pustularum interstitiis satis floridum , & Rosarum Damascenarum æmulum. Et sanè quò mitiores sunt Variolæ & genuinæ magis , eò etiam magis tum ipsæ pustulæ , tum & cutis in earundem interstitiis dictum colorem ad vivum exprimunt , qualem jam descripsi. Uti verò quæ faciem occuparunt pustulæ , asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione ; ita è contra , quæ manus & reliquum corpus , minus asperæ , albæque magis conspiciuntur in dies.

Die *undecimo* , faciei tumor atque inflammatio satis apertè recedunt , & pustulæ tam faciei quàm reliqui corporis jam maturitatem , & justam magnitudinem adeptæ , (quæ his annis ad pisum grandiusculum ascendebat) exarescunt deciduntque ; atque , in hac variolarum specie , die *decimo quarto* vel *decimo quinto* ut plurimum funditis pereunt. Verumtamen manuum pustulæ , cæterarum partium pustulis pertinaciores plerumque , recentes adhuc albæque , diei unius aut alterius morâ illas vincunt. Faciei & reliqui corporis pustulæ desquamatione , at verò manuum quæ sunt , diruptione abutum sibi parant. Pustulis faciei succedunt squamulæ surfuraceæ , quas aliquando excipiunt foveæ cutis. Etenim ubi primum decidunt pustulæ , nulla adhuc in cute cernitur inæqualitas , at verò hujusmodi squamulis exurgentibus recedentibusque vicissim , tandem excavantur foveæ istæ , quæ sæpenumero in convalescentibus ab hoc morbo diu visuntur , quamvis rarò admodum *Variolæ Interstinctæ* ulla sui linquant vestigia ; atque illæ fermè solæ , quæ sex postremis anni mensibus invasere , cum quæ hos præverterint , nullas cuti notas imprimant , nisi fortè confluerint , ut postea dicetur. Decurrente morbo omni , æger vel constipatam prorsus habet alvum , vel saltem rarissimè dejicit. Atque hæc de Variolis *Discretis* dicta sunt.

2. Symptomata cum *Discretis* communia habet & illa Variolarum species , quas *Confluentes* appellavimus , nisi quòd hîc atrociora sint omnia : Febris scilicet , anxietas , atque ægritudo , vomituritio , &c. immaniùs affligunt , quibus signis Medico sagaci etiam ante eruptionem *Confluentes* se produnt. Nihilominus non ita promptè hîc in sudores dissolvitur æger ac in illo genere jam suprâ descripto , ubi magna , ut fit , ad eosdem propensio ut plurimum prænunciat variolas , quæ mox erumpent , minimè confluxuras : Diarrhoea insuper nonnunquam eruptionem præcedit , & ad diem unum alterumve post illam protrahitur ; quod quidem in *Discreto* Variolarum genere nondum mihi contigit observare.

Tertio ut plurimum die erumpit species hæc , ante illum aliquando , vix unquam post illum ; cum *Discretæ* vel ipso die *quarto* inclusivè à primo insultu morbi , vel postea , ante illum rarò admodum se monstrent. Quantoque magis quartum illum diem præverterint Variolæ , tantò etiam confluent magis. Quamvis autem , ut generaliter loquamur , *confluentes* diem quartum vix præstolentur unquam ; fit tamen , licet oppido rarò , ut ob atrocius aliquod

symptoma, ad quartum vel quintum usque diem differatur eruptio: Verbi gratiâ, acutissimus dolor nunc in regione lumborum, Paroxyfmi Nephritici æmulus, nunc in latere, qualis Pleuriticos vexat, nunc in artubus, ut in Rheumatismo, nunc denique in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu enormi ante eruptionem ægrum fatigat angitque. Hisce in casibus, licet infrequentes sint, Variolas solito seriùs erumpere animadverti, ut potè ab immani symptomatum dictorum violentiâ constrictas atque impeditas: Quæ quidem symptomata solitis vehementiora, cum agmen ducant, mihi satis aperte indicant secuturas Variolas, & è *Confluentium* genere esse, & periculo minimè vacare.

At verò (quod jam proximè dicendum) licet in *Discretis*, mox ab eruptione (uti dictum est) quæ morbi insultum comitabantur symptomata, nullum jam amplius faceffant negotium, in *Confluentibus* longè aliter se res habet: cum tam Febris quàm alia symptomata etiam ad multos dies à pustularum eruptione ægrum discrucient.

Variolæ dictæ nunc Erysipelatis ritu, nunc Morbillorum, erumpunt, à quibus nonnisi à Medico in his morbis versatissimo distinguuntur, saltem quoad faciem externam: Nam qui ad dispar in utroque morbo eruptionis tempus, aliasque circumstantias, quas utriusque historia longè ab invicem discrepantes exhibet, sedulò animum adverterit, haud difficulter hunc ab illo discriminaverit. Crescente morbo non in molem aliquam spectabilem, uti *Discretæ*, attoluntur, quæ faciem præsertim occupavere; at sibi invicem implicitæ primò se habent instar vesiculæ rubræ vultum omnem contegentis, quem maturius etiam in tumorem elevant, quàm solent *Discretæ*: dein ad instar pelliculæ albæ vultui agglutinatæ, solitam cutis superficiem non multum superantes. Præterlapso die *octavo*, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur iudice digito, & ad colorem fuscum, non verò flavum, ut in *Discretis* accidit, intenduntur indies tum asperitas, tum etiam cutis color, donec tandem pellicula dicta latioribus laminis desquamatur, quod in quibusdam faciei partibus, si morbus truculentior fuerit, non nisi post vicesimum diem solet contingere. Quantò atrociores fuerint Variolæ, tantò magis pustulæ maturescences ad colorem subfuscum vergunt, tantò etiam lentius, si suo utantur genio, abscedunt; ut e contra quantò minus confluxerint, tantò magis & flavescent, & se ocyus proripiunt. Pellicula hæc seu scabies omnia pervadens, ubi primùm deciderit, nullâ quidem scabritie vultu afficit, at verò mox illam excipiunt squamulæ furfuraceæ indolis perquam corrosivæ, quæ non modò patientiores excavant foveas, quàm solent Variolæ distinctæ, sed etiam faciem cicatricibus foedè deturpant. In *Confluentium* genere, si admodum sævierit morbus, humerorum etiam & dorsi cuticula nonnunquam deperditur, nudatis partibus subjectis expositisque.

Animadvertendum est autem, Morbum hunc magnum æstimari, non pro Variolarum frequentia, quæ reliquum corpus, sed pro earum numero tantum, quæ faciem obsedère, quæ si his tanquam injectâ arenâ ubique contegatur, utut paucæ atque *Discretæ* sint eæ, quæ in reliquo corpore cernuntur, haud minus

minùs periclitatur æger, quàm si membra omnia denso agmine pervaserint: Atque ex adverso quantumlibet spissè truncum & artus occupaverint, si in facie rariores comparuerint, magis in vado res est. Quod de numero diximus, & de Variolarum more potest affirmari, malusne scilicet is fuerit, an secus, vultus apertè indicat.

In *Confluentium* genere ubique observavi Pustulas manuum atque pedum majores fuisse, quàm reliqui corporis, & quo altiùs ab artuum extremitate truncum versus ascenditur eò sensim minores & contractiores semper extitisse. Atque hæc de *Pustulis* censui dicenda.

Sunt verò & alia symptomata duo, quæ Variolis *Confluentibus* accidunt, haud minoris momenti, quàm vel Pustulæ ipsæ, vel tumor; vel aliud quodlibet è prædictis; *Salivatio* nempe in adultis, atque in infantibus *Diarrhœa*. Horum prius ita perpetuum se comitem adjungit, ut unicum tantum viderim Variolis *Confluentibus* laborantem, nullâ superveniente Salivatione: Posterius autem, nempe *Diarrhœa*, infantes hac specie laborantes non ita certò discruciat. Utrum providens natura has evacuationes idcirco substituerit, quòd in pusillo hoc ac humili genere materia morbifica ita penitus nequeat exterminari, ac in pustulis istis majoribus ac magis fastigiatis generis *Discreti*, nullus definitio, cum Historiam tantum scribam, non solvam Problemata. Hoc certò scio, quod non solum Variolas *Confluentes* plerumque comitantur, sed etiam quod quæ per illas fit evacuatio tam est necessaria, quàm sunt vel Pustulæ, vel faciei & manuum intumescencia.

Dicta *Salivatio* nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit, nonnunquam non nisi postridie, biduove præterlapso. Materia primò tenuis excernitur, ac facilè ad tempus aliquod rejicitur, ægro interim multa linthea eadem nocte conspurcante. Neque sanè multum cedit Ptyalismus hic alteri illi qui ope *Mercurii* excitatur, nisi quod non ita malè oleat. Die autem ferè undecimo saliva viscidior jam facta, ægerrimè excreatur; siticulofus est æger, tussit subinde inter bibendum & potus per nares revertitur, atque ab hoc die cessat ut plurimum *Salivatio*; licet aliquando (rarius tamen id accidit) ubi per diem unum alterumve omnino cessaverit, tandem postliminio recrudescat. Dicto autem die, undecimo scilicet, tumor faciei unà cum Salivatione imminui incipit, ac tunc primum ejus loco manus intumescere solent, aut debent.

Diarrhœa non ita maturè infantes solet invadere, atque adultos *Ptyalismus*; quocunq; verò tempore ingruerit, nisi ante sistatur, singula morbi stadia decurrit.

In utraque Variolarum specie Febris à primo statim insultu ad eruptionem usque præcipuè dominatur; qua peracta inducias ferè dat usq; ad pustularum maturationem, & tempus in quo pus conficitur, quo demum elapso prorsus desinit.

Observavi semper in morbo vehementiori, ægrum sub vesperam quasi Paroxysmo laborasse, & funestiora symptomata vespertinis præsertim horis se ostendere, atque exacerbari.

En justam Variolarum hujus generis Historiam; vera ac genuina hujusce morbi Phænomena, prout scilicet naturaliter se habet, complectentem: De

Accidentibus Anomalis, quæ eidem, ubi minus rectè tractetur, superveniunt, jam proxime differemus.

Animadvertendum est itaque, ista quæ die *octavo* in genere *distincto* occurrunt Symptomata Anomala, & quæ *undecimo* die in *Confluente*, (facto semper à primo morbi insultu computandi initio) maximum ad ægri sive vitæ, sive interitum pondus habere, magisque ad amissum expendi debere, cum liquidò constet, maximam eorum partem qui utrolibet morbi (sc. jam *descripti*) genere intereunt, præfatis singulatim diebus defungi. Primò enim qui *Discretis* Variolis laborat æger, cum satis prompte sudoribus diffuat, (quod hîc in adultis fieri solere jam diximus) ac sibi omnia bona promittat, si morbi, ut sperat, virus per cutis poros hoc pacto amandaverit; (diligenter ideo huic methodo insistit, tum remediis Cardiacis intro assumptis, tum regimine calidiore; ut par est, adhibito) atque hæc eo facit lubentius, quod tum ab hac Methodo in principio sibi meliùs videatur habere, tum etiam ad malè fundatam Astantium opinionem propiùs accedat. Tandem verò eliminatis per *διαφύσιν* particulis illis quæ ad pustularem elevationem, atque intumescentiam faciei debuerant facere, die *octavo* quæ turgescere, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat facie, flaccida è contra reperitur, & albescent interstitia, licet interim rubescant pustulæ atque eleventur, etiam post ægri morem. Qui ad hunc usque diem nullo negotio manaverat sudor, jam subito suaque spontè evanescit, neque remediis ullis Cardiacis, vel etiam calidissimis, revocari potest. Æger interim Phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus; urinam parcè reddit, ac frequenter; ac tandem paucissimarum horarum spatium amicorum spem fallit, & ad plures migrat. Verum tamen hîc est notandum, quod, si paucæ compareant Variolæ, hyems si fuerit, æger ætate provectior, aut venæ sectio fuerit celebrata, regimen illud calidius in quod jam animadvertimus, non ita certò faciei turgescentiam impedit, & proinde mortem accersit, atque ubi confertæ Variolæ, Ver æstasve fuerit, æger ætate florens, neque sanguis detractus.

At verò in *Confluentibus* maximè periclitantur ægri, & plerique etiam moriuntur die *undecimo*; nam cum hoc fere tempore *Salivatio*, quæ ægrum hactenus in tuto posuit, soleat desinere sponte sua, nisi faciei intumescencia adhuc aliquantulum persistens, ac manuum insigniter jam incipiens ejus vicem subeat, necesse est ut pereat æger: Id enim est perpendendum, quod in hoc Variolarum genere, ubi pustulæ tam sunt exiguæ, non Salivatio tantum, sed faciei insuper & manuum intumescencia ad materiam morbificam ritè eliminandam omnino requiruntur, quarum utralibet, si vel non adsit, vel ante justum tempus recedat, ægro protinus moriendum est. Jam verò nimio sæpiùs evenit in morbo calidiori, ut sanguinis crasi à regimine præfervido disjecta fractaque, atque eo usque accensa ut particularum inflammatarum exterminationi sensim faciendæ non amplius competat, (ut quæ sudoribus importunè extortis debentur mala jam taceamus) hinc vel non omnino intumuerint facies manusque, vel tumor ille unà cum salivatione evanuerit, quam-

vis enim faciei tumor ipso hoc die aliquantisper debeat remitti, non debet tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere, manuum interim tumore persistente vigenteque, quo quidem vix aliud est minus fallax Convalescentiæ ἀπορυσσινόν, uti neque è contrario certum magis imminentis periculi indicium.

Sed utut id sit; materia Ptyalismi quæ ad hunc usque diem cruda fuit, tenuis, & facile excreabilis, viscida jam facta & tenax, ægro suffocationem intentat; Potus quem assumit in pulmones ferè dilabatur, unde cum Tussi violenta per nares rejicitur, voce est rauca; somnolentia & stupore corripitur ingentibus, oppressus undique vi morbi atque in hujusmodi agone ut plurimum extinguatur, eo quem jam diximus die.

Sunt & alia adhuc symptomata, quæ in quolibet morbi statu occurrunt; tam *Discreto* Variolarum generi, quàm *Confluenti* pariter communia.

Phrenitis, v. g. à nimia sanguinis ebullitione nonnunquam ægrum corripit, & caloris tam parum est patiens, ut magnis viribus, ac furibundo nisu injectas prehendentium & lecto incarcerationantium manus eludere conetur.

Aliquando eadem causa effectum longè diversum, seu contrarium, ut videtur, producit, Affectum sc. *Comatosum*; ita ut æger nunquam fermè evigilet, nisi continuo pulsu excitatus.

Est etiam ubi in hoc morbo, perinde atque in Peste, laxata, inflammationis vi, sanguinis compage, *maculæ purpureæ* se ostendant Pustulis interpersæ, mortis ferè semper Prænunciæ. Frequentius hoc evenit, ubi aëris Constitutio morbo isti Epidemico grassanti præ cæteris favet. Aliquando in pustularum summitate maculæ nigræ exiguæ, acicularum capita vix æquant, in medio verò subsidentes, se produnt variis in locis; quæ cum nimio fervori ortum debeant suum, tandem beneficio regiminis magis temperati fuscum colorem acquirunt, posteaque pedetentim subflavum illum, qui variolis genuinis, ac suum morem obtinentibus, naturaliter competit; quod satis liquidò cernitur in illa quæ circa morbum hunc versatur praxi, in quo omnia Symptomata eò sunt mitiora, quò magis pustulæ maturitatem adeptæ ad dictum colorem accedunt, atque è contra.

Adolescentum porro, & ætatis flore vigentium, (præcipuè si vino, aut alio quovis liquore spirituofo se nimium impleverint) usque adeo in hoc morbo nonnunquam sanguis accenditur furitque, ut per Arterias & vesicam viam sibi faciat, & qua data porta ruat; quo quidem *mictu sanguineo* vix aliud symptoma pejoris notæ atque ominis invenire licet, per omnem hujus morbi tragœdiam.

Ab eadem insuper causa nonnunquam, licet rarius, sanguis è pulmonibus ejicitur. Utraque verò Hæmorrhagia hæc sub morbi initio plerumque contingit, pustulis nondum erumpentibus, vel si in quibusdam locis se ostendant, in plerisque tamen aliis adhuc sub cute densæ latent, atque ejus sunt generis, quæ in maximè *Confluentes* adolescerent, nisi jam dictum symptoma ægri morte morbum finierit.

Aliquando etiam *Urinæ suppressio* totalis ad malorum cumulum accedit, in juvenibus præsertim, idque in statu, vel etiam declinatione *Discreti* generis.

Sunt & alia symptomata, quæ à *ποφάσει* aliqua jam dictis contraria interdum oriuntur, si nempe æger à frigore nimis intenso fuerit læsus, vel si præter jus fasque vena fuerit pertusa ad ingentem vim sanguinis amissionem, aut alvus nimia Catharsi subducta, unde pustulæ nonnunquam fastigiis cedunt & derepentè confidunt, superveniente insuper *Diarrhæa*, à qua ægro, (adultus si fuerit, ut suprâ innuimus) ingens est discrimen, & anceps morbi exitus, materia sc. Variolosa intro versa, ita ut natura eidem per cutis poros debite exterminando impar prorsus inveniatur. Huc accedit, quod faciei manuumque tumor ab his retunditur, non minus in boni ægri rebus est censendus quàm ipsa Pustularum eruptio, nisi eæ fuerint *perpaucae*.

Quæ verò à suscepto frigore pendent symptomata, rarò admodum occurrunt si cum illis conferantur quæ à contrario, calidiori nempe regimine, nascuntur; Cum enim morbus hicce inter calidissimos jure optimo habeatur, longè minùs ab hac parte peccatur, quàm altera.

Qualis verò sit hujus morbi essentia, ob naturalem & communem mihi cum reliquis hominibus Intellectus defectum, nescire planè me fateor; veruntamen prædicta symptomata pensculatim trutinata mihi videntur subindicare, *Inflammationem* eum esse (à cæteris tamen Inflammationibus specie diversam) tum sanguinis, tum reliquorum humorum, in qua amolienda, per dies priores duos tresve id agit natura, ut particulas inflammatas digerat coquatque, quas postea in corporis habitum ablegatas maturat adhuc, & sub Abscessulorum forma suis demum finibus expellit. Quapropter ut fundamento alicui medendi methodus superstruatur, notandum est, duo esse hujus morbi tempora, quorum primum *separationis* est, secundum *expulsionis*. Atque primum quidem illud tempus plerumque cum Febrili ebullitione transigitur, quod tribus vel quatuor primis diebus peragi solet, quorum decursu natura id satagit, ut partes ejusmodi inflammatas seligat congregetque quæ sanguinem laceffunt, atque etiam ut illas in carnosas corporis partes relegatas ibidem deponat, quo facto pristina quiete fruitur, sedato jam tumultu, qui, dum hoc ageretur, in sanguine ciebatur. *Separatione* sic ope ebullitionis, in sanguine peracta, *Expulsio* jam locum obtinet, quæ per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis illis *abscessibus*, in carne perficitur. Sicut enim à natura abscessuum sua specie non abluunt, ita parem cum aliis, cruditis, maturatæ, atque exarescentiæ statum percurrere solent; quæ omnia si ritè atque laudabili modo absolvant & exequantur, in tuto res est, cum exinde curationis summa dependeat, sin minùs, omnia pessum ruitura sunt. Et quidem postremum hoc negotium, priori illo *separationis* opere, tanto plus temporis sibi vendicat, quod prius illud in tenui fluidoque corpore transigatur, atque in ipso (ut sic dicam) naturæ foco; posterius autem denso spissoque theatro, atque à vitæ fonte paulò remotiori, partes suas exequi cogatur.

His ita præmissis, Indicationes exurgunt: I. Ut æquabilis ille tenor ebullitionis

litionis in sanguine conservetur, qui neque nimis properè separationem nimia sua vi perficiat, neque tamen torpido nimis motu eandem remoretur, vel non satis idoneam præstet. 2. Ut abscessuli, pustulæve summa cura sustineantur, quo debita tempora percurrentes, tandem contentam in se materiam omninò avehant, ipsæque etiam evanescant.

Ut itaque paucis de *primo* agamus; sollicitè in primis cavendum est, hoc tempore præsertim, ne nimium assurgat ebullitio, sive id fiat ex congestis stragulis, sive ex aëre loci in quo decumbit æger, igne nimium excalesfacto, sive ex calidorum medicamentorum & cardiacorum usu; præcipuè verò ab his cavere oportet, si æger in ætatis flore constitutus fuerit, vel sanguinem habeat generosiori potu nimis exaltatum, vel anni tempestas aut verna sit, aut saltem ultra ætatis initium non processerit. Hinc enim fiet, ut separatio, quæ sensim lentisque gradibus peragi debebat, ut ad universalem quandam despumationem opportunius pergat, præcipiti cursu feratur, atque ita vel non satis idoneus partium numerus congregetur, vel (quod fortè contingat) nonnullæ partēs ad secretionem damnentur, quas alias Natura illam subire noluisse; nisi quod ultra debitos limites excurrere coacta, noxam hanc sibi creet: secretis enim illis, quæ ad separationem minus opportunæ sunt, aliorum illuc propendentium motus, eorum commixtione impeditur, adeoque redduntur expulsionis minus accommodæ. Mihi quidem rationi consentaneum videtur, ut quo diutius natura *separationem* molitur, ac perficit; dummodo ebullitio non omnino torpeat, eo certius atque universalius eadem *separatio* absolvatur. Atque ex illa sic absoluta, curationis insequentis successus potissimum ut dependeat necesse est, uti ex methodo contraria, contrarius planè rei exitus; ex calido enim isto regimine nihil boni nascitur, sicut ex præcoci fructu, nihil frugis: cum frequenter usu veniat, ut vel in Phrenitidem æger prono lapsu ruat; vel (quod peioris notæ est) sudores ingentes oboriantur, ex quibus partes non secerni aptæ, neque *puris* naturæ respondentes (quod ipsum tamen pus genuina soboles est hujusce excretionis) eliminantur, vel ex cardiacis illis administratis, calidaque custodia, Variolæ nimis protusæ in unum confluant, fœdo certè spectaculo, tristemque eventum interminanti.

Atque hæc & hujusmodi symptomata ex his erroribus progigni solent, cum ex altera illa methodo nihil unquam mali observaverim. Natura enim sibi permissa negotium suum suo tempore exequitur, materiamque debito ordine ac via tum secernit, tum etiam expellit; ut (in Junioribus præsertim vegetisque temperamentis) nostra ope, nostris artificiis, atque auxiliis non indigeat, suis viribus optimè instructa, suis opibus locuples, suo denique ingenio satis edocta. Neque sanè vel ipse vidi, vel fando accepi, quenquam ex eo periisse, quod Variolæ primò non eruperint, etsi nimis multi perierint, quorum Variolæ primùm laudabiliter, & cum summa spe erumpentes, postea recedentibus pustulis præmaturè detumuerunt.

Quemadmodum autem inconsultum est atque periculosum, calidioris regimi-

nis vel cardiacorum ope coeptam ebullitionem nimis evehere; ita è contrario non minùs vacat periculo mediantibus venæ sectione, clysteribus, emeticis, catharticis, aut id genus aliis eandem minuere, cum hoc pacto partium separabilium commoda secretio plurimùm impediatur. Licet enim vulgare illud atque tralatitium argumentum quo adversus Phlebotomiam, aliasque evacuationes utuntur (nempè quòd non liceat à circumferentia ad centrum movere humores, cùm natura in hoc morbo contrarium affectare videatur) nullarum planè virium sit; eo quòd ex earundem usu contrarius omnino effectus, subitanea scilicet variolarum eruptio, sæpissimè consequi deprehendatur; aliæ nihilominus rationes in promptu sunt, quæ vehementer suadent, ut, siquidem ullo modo vitari possit, ab hac praxi manus abstineamus. Namque (ut earum præcipuas paucis attingamus) per hæc evacuationes, non tantùm ebullitio nimis imminuitur, cujus interim ope partes despumandæ accuratè secerni debuerant, verùm etiam illud ipsum subducitur, quod coeptæ secretioni quasi pabulum continenter suppeditaret; unde sæpenumero contingit, ut variolæ primùm laudabili impetu erumpentes (eoque fortasse melius, quòd evacuationes jam dictæ præcesserant) paulò post ex improvviso quasi percussæ detumescunt, idque ob eam potissimum causam, quòd materia desit, quæ quasi à tergo præeuntem insequeretur, atque agmen clauderet. His verò non obstantibus, si vel minimum suspicari liceat variolas mox erumpentes è Confluentium genere futuras esse, utile prorsus erit, ut non solùm sanguis quàm primum mittatur, sed & Emeticum propinetur, ob rationes alio in loco fusè dicendas.

Tandem ut ad secundam illam indicationem pedem promoveamus ad tempus *expulsionis* accommodatam; quo tempore materia separata, parvorum abscessuum sive pustularum ope, amandatur atque expellitur; nempe illud hîc agendum est, ut pustulæ debito modo sustineantur, quo ritè atque ordine destinatam periodum assequantur.

Sicut itaque suprà fatis, ut opinior, ostensum est, inprimis periculosum esse, si æger præsentì Febre, at pustulis vix dum apparentibus, in ipso *secretionis* tempore nimium calefiat; ita etiam non minori periculo plena res est, si idem quovis morbi tempore fiat, atque illo præsertim quod ad *expulsionis* initium vergit, crudis adhuc existentibus pustulis: Quamvis enim sanguis, peracta jam *separatione*, atque relegata ad carnosas partes materia, ab intestino tumultu magnam partem immunis sit, interim tamen tener adhuc, recensque, ac vix novo statu & quasi textura indutus, *ευπαθής* est, facileque vi caloris immodici undecunque appellentis afficitur, atque adeò levissimo momento irritatus flammam concipit, & in novam ebullitionem proclivis est; quæ quidem nova ebullitio, non, uti prior illa, *separationem* jam molitur (illam quippe peractam supponimus) verum illius loco non tantùm symptomatica superius memorata excitat, sed & coeptam per pustulas *expulsionem* interturbat, & contentam materiam exagitando noxam parit. Vel itaque partes jam secretæ, atque in corporis *ἔξω* depositæ, vehementi illo rapidoque sanguini-

sanguinis ebullientis cursu abreptæ in ejusdem massam resorbentur; vel partes carnosæ ultra gradum suppurationi debitum excalefactæ, minus commodè illam exequentur; vel denique fortassis oborta hac nova ægritudine, sanguinis œconomia, ipsarumque carniū tonus pervertitur, usque adeo ut materiam illam expulsam vincere, eamque solemnī more abscessuum coquere nequeat.

Interim non usque adeo nos illuc intentos esset oportet, quo ebullitionem nimiam in sanguine prævertamus, ut ægrum frigoris injuriis exponendo, pustularum eruptio impediatur. Gradus ille caloris ad harum expulsionem promovendam accommodatissimus, naturalis sit oportet, atque ejusmodi, quæ carnosarum partium temperiei conveniat, quique hunc excedit, aut ab eodem deficit, utrinque periculosus est.

Ex dictis itaque satis manifestum videtur, in quā incerto lubricoque sit loco, tum morbus ille, de quo loquimur, tum praxis medica, quæ eidem accommodanda est. Atque etiam exinde pronunciare ausim, illius famam, qui in medicando hoc morbo frequenter se se exerceret, in angusto versari; quandoquidem non vulgus solummodo mortis causam satagenti nimis Medico transcribere paratum sit, verum etiam ejusdem artis professores calumniandi ansam inde cupidè arripiant, atque coram iniquis Judicibus causam dicentes, severissimam sententiam facilè eliciant; eo scilicet consilio, ut ipsi pluris æstimentur, & super aliorum ruinis viam sibi sternant ad famam: id quod viris literatis indignum prorsus est, imò & vilioribus Artificibus, modò probitatem colant. Hinc porro cernere est, quod minus mirum sit, si nutricibus, per se nimium plerumque officiosis & satagentibus, res malè sæpenu-mero succedat; Nempe res ardua est, & quæ muliercularum ingenium atque judicium superat, gradum caloris huc requisiti definire, præsertim cum anni tempestas, ægrorum ætas, & vitæ ratio, aliaque huc spectantia simul pensanda veniant, id quod prudentem profecto atque sagacem Medicum omnino postulat.

Si contigerit, ut vel Phlebotomia minùs opportunè celebrata, vel admissio frigore pustulæ reciderint, vel facies ac manus detumuerint, Cardiacis utendum est. Sed cavendum tamen, ne in his exhibendis nimii simus: Quamvis enim sanguinem ademeris, fieri tamen potest, ut virium inde jacturam metuens, adeoque Cardiacis aut fortioribus aut sæpè repetitis utens, novam ebullitionem ex improvviso fuscites. Nimirum sanguis adhuc tenuior est, & vim calidioris stimuli facilè sentit; unde fit, ut sæpe repetitæ ebullitiones in eodem excitentur, quibus ægrorum mors majori jure tribuenda est quàm prægressæ venæ-sectioni. Atque hæc generatim de iis, quæ primariis Intentionibus satisfacere possint, dicta sunt.

* Jam ut calcata vestigia repetam, ac ad Praxin propiùs accedam: Quamprimùm manifesta hujus morbi indicia se produnt, ægro aura liberiore, vino, ac carniū esu interdico, cerevisiam verò tenuiorem pane tosto leviter tepesactam

M

pro

• *Curatio.*

pro potu ordinario, ac subinde pro arbitrio hauriendam concedo; pro victu etiam juscula avenacea, hordeacea, poma cocta, aliaque, quæ neque frigoris neque caloris vim aliquam egregiam obtinent, aut ventriculo concocturo molestiam exhibent, injungo. Nec vulgarem illam rusticamque diætam admodum improbo, nempe ut lacte cum pomo cocto & confuso vescatur, modò cautum sit ut eo per vices utatur, & modicè, dempto etiam lactis frigore. A regimine calidiore protinùs inhibeo, ut & ab usu medicamentorum Cardiacorum quorumcunque, quibus variolâs in cutem ante diem *quartum* qui eruptioni proprius est ac naturalis, temerè propellere nonnulli satagunt: Cùm pro certo habeam, eò magis universalem fore materiæ variolosæ separationem, quò tardiùs istæ prorumpunt, proinde & securiores possumus esse ne se denuò intro condant, & rectius maturescent, cùm, si ante tempus extrudantur, præcipitatur materia cruda adhuc atque inconcocta, quæ ad instar fructuum præcociorum inani spe lactat. Adde, quòd ab hac nimium festinata diligentia periculum est (in calidioribus præsertim temperamentis ac vegetioribus, quorum principia activa plus satis Cardiacorum suppleant vicem) ne natura nimis incitata coactaque, universam pene corporis substantiam in variolâs effundat; ita ut jam *confluant* illæ, quæ, nisi plus æquo properasses, in *distinctarum* ordine lætiori omine substitissent. Porro non ideò statim foras propellendæ sunt Variolæ, ubi primum aliqua morbi hujus suspicio oritur, quia sc. æger ante eruptionem vehementer ut plurimum laborat angiturque, cùm ne vel una quidem instantia possit ostendi, quempiam ideò interiisse, utut graviter ægrotaverit, quod non mox prodirent Variolæ, vel naturam iisdem feriùs ocyus extrudendis defuisse, nisi sicubi regimine calidiore & remediis cardiacis, præmaturè ingestis, fuerit impedita. Etenim non semel observavi in junioribus & temperamento sanguineo præditis, regimen calidius, & Cardiacâ eo animo exhibita, ut Variolâs ante justum tempus exturbent, ita parum eruptionem accelerasse, ut eidem è contra obicem ponerent: Sanguine enim his modis excalescèto, & in motum violentiorem, quàm qui materiæ variolosæ separationi ritè peragendæ par esset, concitato, certa tantùm quædam morbi indicia se prodidere, latentibus intra cutim pustulis, neque se ultra efferentibus, quibuscunque demum Cardiacis sollicitarentur, donec tandem sanguine ad moderatam debitamque temperiem redacto, concessa sc. Cerevisia tenuiori, demptoque partim stragulorum, quibus torrebatur onere, pustulis exiturientibus commodam viam stravi, atque ægrum intuto, favente Numine, collocavi. Neque magis, si quid ego judicando valeo, ab illis stat Ratio, qui ægrum ita pertinaciter ante diem *quartum* lecto addicunt, modo cubiculi ambitu se contineat, quàm ab his, qui adeo præmaturè atque intempestivè Cardiacâ ingerunt; Etenim *Sanguinis mictus, maculæ purpureæ*, & reliqua symptomata lethalia, (de quibus supra) eo tantum nomine, præsertim ætate florentibus, superveniunt, quod nempe lectulo præproperè nimis affigantur. *Quarto* verò die lectulo ægrum adjudico, ac tum temporis, si eruptio parum pro votis succedat, rectè exhiberi potest Cardiacâ

diacum aliquod blandius, unica saltem vice, quo exigantur pustulæ. Inter ista quæ huc faciunt medicamenta, *Paregorica* dicta, qualia sunt *Laudanum liquidum*, *Diascordium*, &c. si in pauca quantitate Aquis cardiacis appropriatis admisceantur, cæteris prælucent: Hæc enim cum sanguini æstuanti frænum injiciant, Natura materiam morbificam opportunius atque liberius ejicit, atque amolitur. Neque etiam consulerem, Cardiacum ante hunc diem propinare vel urgente *Diarrhæâ*, atque illud, ut videtur, indicante. Licet enim, quod antea innuimus, nonnunquam Variolarum *Confluentium* eruptionem præcedat *Diarrhæa* (quæ oritur ab halitibus inflammatoriis, vel humoribus à massa sanguinis per primos dies exagitati atque æstuantis, in intestina exoneratis) non tamen hîc magis deerit natura dictis materiæ variolosæ halitibus in corporis habitum propellendis, (quo facto, sua jam sponte sistetur *Diarrhœa*) quam solet in halitibus istis extravertendis eliminandisque, qui in ventriculum inversi sub initio morbi vomitum provocant.

Animadvertendum verò est, quod si ad adolescentem vegetiorem accersor, & qui insuper liberaliore sive vini sive liquoris cujuscunque spirituosî compositione morbo ansam dedit, non satis habeo ad frænandam sanguinis ebullitionem, ut tam Lectulo, quàm Cardiacis abstineat, nisi ad hæc sanguis è brachio mittatur: Quod si non concedatur, obtinente vulgi præjudicio, missionem mihi saltem esse petendam existimo. Superinducta enim inflammatione ista, quam sanguini impressit liquorum spirituosorum fervor, intenso illi calori, quem hic morbus naturaliter comitem habet, ita furit sanguis, ut non rarò in vesicam vasorum ductu irruat; vel maculas pariat purpureas, aliaque ejusmodi symptomata, quæ per omnem morbi decursum crucem figunt Medico, atque ægrum è medio tollunt. Atque hæc de illis quæ ante pustularum eruptionem sunt peragenda.

Ubi primùm eruperint Pustulæ, jam proximò diligenter mecum perpendo, an *Discreti* fuerint generis, an verò *Confluentium*; cum longo hæc intervallo ab invicem distent, quantumlibet conveniant quoad symptomata quædam utrisque communia. Si itaque ex pustularum magnitudine, & paucitate, tardioreque eruptione, tum etiam Ægritudinis, aliorumque symptomatum gravissimorum, quæ in *Confluentibus* etiam post eruptionem fatigant, evanescencia, de genere *Discreto* mihi constet; ægrum Cerevisia tenuiori, jusculis avenaceis, hordeacis, &c. reficiendum curo, modo quem suprâ descripsimus. Atque si tempore æstivo eoque calidissimo Variolæ non ita multæ obtinant, quorsum attineat ægrum in lecto jugiter stratum obrutumque detinere, ego quidem non video. Quin potius singulis diebus, per aliquot horas de toro surgat, eâ lege, ut tam loco, quàm vestitu, frigoris pariter ac caloris nimii incommoda præcaveantur. Quid quod ægroto à cubili quandoque abstinente, morbus minori cum molestia, ac etiam breviori spatio tempora sua peragat, quàm si eidem continenter affigatur, quod non modò ægritudinis tædium adauget, verùm etiam febrilem æstuationem fovet, & prodeuntibus vesiculis dolorificam inflammationem conciliat. Quod si aut frigidior anni

tempeſtas, aut copioſior Exanthematum eruptio perpetuò decumbendi neceſſitatem ægrotanti imponat, proſpicio, ut non intenſiore caloris gradu, vel adjectis pluribus ſtragulis in lecto decumbat, quàm quibus in proſpera valetudine uti ſolebat, accenſo interim nonniſi hyeme incumbente, manè & ſerò foco mediocri. Neque etiam exigo, ut in eodem loco ſemper jaceat, nempe ne ſudores erumpant, quos ego tum rationibus ſuprà allatis, tum ipſa experientiâ fretus, ſidenter affirmo non abſque ingenti periculo promoveri poſſe.

Determinante morbo, cùm halituum à materia jam in pus converſa prodeuntium eruptio liberior à puſtulis tandem cruſtoſis ac duriuſculis impediatur, abs re non erit *Vini Canarini ſemi-cocti cochl. 5. vel 6. vel aliud medicamentum Cardiacum temperatum exhibere*, ne ſcilicet halitus illi putridi in ſanguinis maſſam poſtliminio revertantur. Et ſanè jam nunc, neque prius, Cardiacis locus eſt. Eodem pariter tempore Diæta paulò calidior & cardiaca magis poteſt concedi; juſcula v. gr. ex pane & cereviſia ſaccharata, è farina avenacea cum cereviſia & ſaccharo &c. Neque aliis omnino erit opus, in genere ſcil. *Diſcreto* ac leniori, ſi æger hâc Methodo ac diæta, utriſque moderatis, ſe tractari patiatur; niſi fortean inquietudo, vigiliæ, aut alia ſymptomata Phrenitidem minitantia, Paregorici uſum ſubinde ſuadeant.

Hæc ſanè, reclamante licèt immani iſto ac malè fundato hominum præjudicio, quod ex adverſo militat, vera eſt ac genuina Methodus huic Variolarum generi medendi, & obtinebit demum, me vitâ functo. Et licet non negem, multos regimine admodum oppoſito tractatos nihilominus convaleſcere, fatendum eſt tamen, (& ſanè dolendum etiam, ſi vobiſcum reputemus, quàm omni prorſus periculo vacat ex ſua natura hoc *Diſcretum* genus) plurimos etiam interire, quin & alii complures fatiſ pariter concederent, niſi vel à frigidiore tempeſtate, in quam incidit morbus, vel à Phlebotomia (aliter ſupervacanea atque inutili) nuper celebrata ſervarentur. Quo nomine, ſi vel obſtinatio amicorum, vel ægri diffidentia prædicto regimini interceſſerit, tutius mihi videbatur ſanguinem detrahare; quod quidem, licet in hac ſpecie per ſe officiat (quatenus ſc. & ſeparationem perturbat confunditque, & pabulum inſuper tum puſtulis, tum tumoribus elevandis deſtinatum ſubducit) aliquantiſper tamen ſecuturum regimen calidius penſat, ac proinde hanc, quam non niſi coacti uſurpamus, Methodum, non uſque adeò periculoſam atque ancipitem reddit.

Ex dictis (ut obiter attingam) facile erit vulgare illud Problema ſolvere; quâ fiat ſc. ut perpauci adeò è plebe hoc morbo pereant, ſi ad eos comparentur, qui inter divites eodem trucidantur; quod quidem vix ad aliam cauſam poteſt referri, quàm quòd ob rem domi anguſtior, & agreſte vivendi genus, vix illis fiat copia ſibi nocendi regimine magis accurato ac delicatiori. Quinimo & plures inter vulgus jugulavit hic morbus, ex quo *Mithridatii, Diaſcordii, Decocti C. C. &c.* uſum didicere, quàm in ſæculis *indoctioribus* quidem, at magis *ſapientibus*; cùm in ſingulis fermè ædibus reperiatuſ ſtolidi aliqua ac ſciola muliercula, quæ in hominum perniciem, quam non didicit,

Artem exerceat. Atque hæc de Variolarum, quas *Interstinctas* appellavimus, curatione.

At si *confluant* Variolæ, periculosa plena res alicui est; arbitror enim ego, genus hoc non minus ab altero illo discrepare, quam ab hoc ipsa pestis, licet apud hominum vulgus, quibus nomina & verba pro rebus sunt, utriuslibet curatio ex æquo prædicetur. In hac morbi specie, cum intensioris sanguinis inflammationis proles sit, major pariter adhibenda est cura, ne calefiat æger, ut in prioris curatione jam dictum est. Quamvis autem species hæc ex sua natura majorem sibi vendicet refrigerationem, quam altera ista, ad promovendam tamen faciei ac manuum intumescuntiam, (sine qua de ægro actum est) & pustularum elevationem atque augmentum, tum etiam, quia æger ob exulcerationes dolorificas lecto abstinere nequeat, expedit, ut in eodem contineat & se, & manus etiam suas, modò stragulis modicè contactus sit, & concessa fuerit venia ab hac in illam lecti partem corpus pro arbitrio suo transferendi, ut in genere *Discreto* innuimus. Præsertim verò morbo exeunte, cum jam appetat *Febris maturatio*, non tantum hac libertate privandus est æger, sed monendus etiam, ut eam utatur, quin & versandus persæpè nocte atque interdiu, ut ingens calor contemperetur, & evitentur sudores, quibus amandatur lenis iste humor, quo diluendæ sunt Variolæ, ut mitescant.

Quandoquidem verò, ut diximus, *Ptyalismus* hanc speciem jugiter comitatur, qui cum è præcipuis sit Naturæ evacuationibus, atque hinc in ejus locum, quæ per pustulas fieri debuit, substituatur, (quæ quidem per pustulas evacuatio in hac specie humili ac depresso non æquè atque in altera procedit) summopere annitendum est, ut dicta Salivatio in vigore persistet & conservetur, nec ante diem suum sistatur, vel remediorum calidorum usu, vel à cerevisia tenui aut simili alio liquore liberaliter hauriendo, ægrum arcendo. Jam cum Ptyalismi mos naturaliter se habentis, ut cum prima eruptione incipiat, & die *undecimo* minuatur, neque tamen nisi post diem adhuc unum aut alterum omnino desinat, si ante diem illum penitus cesset, in lubrico sunt ægri res. Nam cum faciei tumor (per quem nonnihil materiæ morbificæ evacuat) nunquam non eo ipso die dispareat, si Salivatio eodem pariter tempore se subducatur, æger materiâ variolosâ jam putrescente, ceu veneno, inficitur; cumque nulla amplius detur porta, per quam evacuari possit, in busti limine constituitur; nisi fortè (quod fit nonnunquam) manuum intumescuntia, quæ ut serius quam illa faciei se ostendit, ita tardius recedit, ejus sit molis ac momenti, ut ab Orci faucibus illum eripiat. *Salivatio*, quæ tanti hinc est tamque necessaria, admodum promovetur, si ægro affatim propinetur Cerevisia tenuis, vel liquor alius quilibet, qui nec illum calefaciat, nec ad sudores provocet.

Præter hæc, verò, ut consopiatur vehemens illa sanguinis ebullitio, quæ hæc Variolarum species alteram illam longè superat, & sustentetur *Ptyalismus*, (necessaria nempe hujusce morbi evacuatio) conveniunt medicamenta *Narcotica* præ aliis quibuscunque: quæ licet ob vim, quâ donantur, incrassant.

tem, educendæ Salivæ videantur officere, jamdiu tandem ego me isto liberavi præjudicio, atque eadem in hoc morbo adhibui, adstipulante ubique rerum eventu, modò æger pubertatem excefferit. Sanguis enim Infantium Puero-
rumque (qui per integrum morbi stadium plerumque satis benè dormiunt) cùm
mitiùs ferveat, minùs hujusmodi eget sufflamine; atque insuper horum usu
Diarrhæa, quam in hoc morbi genere infantibus evacuationem natura insti-
tuit, cum ægri damno sistitur. Adultis verò *Paregorica* Medicamenta, si fre-
quenter usurpentur, hæc adferunt commoda: Primò, somnum moderatè con-
ciliando, efferam minus sanguinis ebullitionem ac proinde Phrenesin cohibent
præcaventque. Dein, ab eorum usu Faciei & Manuum intumescencia, quam
insignem in hoc morbo natura habet evacuationem, rectiùs procedit. Quin-
etiam, quod non parum facit ad ægri securitatem, cum non rarò justo citius
detumescat facies cum malis ægri rebus, tumor Narcoticorum ope ad debi-
tum usque naturæ terminum suffulcitur & protrahitur; mitigato enim san-
guinis fervore, radii inflammati opportunè ad manus, faciem atque omnem
corporis superficiem pro morbi ingenio feruntur. *Ptyalismus* denique hisce
propagatur, qui licet vi medicamenti ita fortiter incrassantis ad horas ali-
quot sistitur in quibusdam, mox tamen aucto novis hisce suppetiis robore,
insurgit denuò natura, & coeptum opus feliciter peragit. Quin etiam ani-
madverti *Salivationem*, quæ circa diem *undecimum*, aliquando etiam citiùs,
cum ingenti ægri periculo minui solet, exhibitis plus semel *Paregoricis*, de
novo fuisse redintegratam, nec ante diem *decimum quartum*, alicubi etiam
& post illum, desuisse. Propino ego ut plurimum vel *Laudani liquidî* gut-
tas 14. aut circiter, vel *Syr. de Meconio* ʒj. in *Aq. flor. Paralys.* vel simi-
li stillatitia solutam: Quæ si adultis post plenam eruptionem ad morbi usque
finem singulis noctibus propinentur, non modò incommodi nihil, sed & ma-
gnum inde emolumentum capient, quod frequenti experienciâ didici. Expe-
dit verò, ut cenfeo, paulò temperiùs quàm aliter fieri solet, *Paregoricum* ex-
hibere; facile enim observatu est in Variolis pessimi moris, *caloris*, ut ita
dicam, *Paroxysmum* vesperi plerumque ægrum inquietudine, anxietate, aliisque
symptomatis laceffere, quæ si *Paregoricum* hora sextâ septimave vespertinâ su-
matur, aliquatenus præcaveri possint.

Proximo loco, cum in Variolis *Confluentibus* haud minus certò *Infantes*
Diarrhæa comitetur, quàm *Adultos Ptyalismus*, naturâ, ut suprâ ostendi-
mus, alterutram harum evacuationem materiæ morbificæ eliminandæ ubi-
que constituyente, ut nec hîc *Ptyalismo*, ita neque istic *Diarrhææ* frenum in-
jicio, cùm utrumque ex æquo sit absurdum: Malè locata interim impruden-
tium aliquot muliercularum opera in sistenda hujusmodi *Diarrhœa*, multa
infantium millia letho dedit, dum falsò secum reputant, *Diarrhœam* par in
hac Variolarum specie atque in *Distincta* discrimen apportare; nesciæ scili-
cet, *illic* tantum officere *Diarrhœam*, ubi per pustulas evacuatio, *hîc* ve-
rò naturæ opus illam esse, morbo effugium quærentis. Misâ itaque *Di-*
arrhœâ, καὶ τῇ φύσει ex præcepto Divini senis συμπερίτλων, quo coepi pede per-
go;

go ; in cunis ut nunc jaceant infantes , ut nunc istinc auferantur , consulo ; & si fuerint ablaetati , eandem , quam superius Adultis , Diætam istis concedo.

Ultimis morbi diebus , cum facies ob pustulas crustosas , duras aridasque ferme riget , eandem oleo *Amygdal. dulc.* inungo persæpè , tum ad mitigandum dolorem à regiditate ortum , tum ut effluvia calidiora liberiùs exhalent.

Facies ne cicatricibus deturpetur , nihil quicquam molior ; cum *Olea* , *Lini-menta* , &c. id tantum agant , quò tardius evanescant albi isti furfures , quibus se invicem pellentibus excipientibusque , postquam æger jam lecto surrexit ac mediocriter valet , paulatim succedunt foedæ illæ cicatrices. Sed ab his non valdè metuendum est ægro , ubi ob regimen moderatius pustulæ minus exacerbatae nullam qualitatem causticam contraxêre.

* Jam verò , licet Methodus hæc (si cautè scilicet ac prudenter circumstantiis particularibus accommodetur) prædicta illa à natura abhorrentia atque periculosa symptomata præoccupet , & securum atque perbenignum morbum reddat ; à quacunque tamen causa extorta sint hæc , me nondum accersito , necesse habeo in aliquibus , quæ hîc subnectam , aliâ viâ insistere , eadem ut submoveam atque debellem.

Imprimis igitur , si in *Discreto* genere ob regimen justo calidius , & continuos sudores , ægri facies die octavo non intumescat ,) pustulis interim satis densè se exerentibus) sed flaccida sit , & palleant pustularum interstitia , in casu posito , ultra quod ad temperatum magis regimen , & compescendum sanguinis *ὀρεασμὸν* velis remisque contendo , *Paregoricum* aliquod medicamentum è vestigio hauriendum præcipio ; quod quidem somnum blandè conciliando (nisi plus nimio cerebrum incaluerit) & mitigando proinde effrænem sanguinis ferociam , sanguinem unâ cum calore ad faciem , prout morbi ratio postulat , tempestivè determinat. Quod si eo usque processit malum hîc *προφάσει* ortum , ut sudor , qui huc usque copiosè manavit , sponte suâ defecerit , æger Phrenitide corripiatur , de vehementi queratur ægritudine , urinam paucam at frequenter reddat ; jam non aliis auxiliis (cum in propinquo mors sit) ægro subveniri posse autumo , quàm vel Narcotica affatim exhibendo , vel sanguinem liberaliter extrahendo , corpusque auræ exponendo. Et profectò haud ita temerarium atque *ἀτόπον* videbitur , quod jam proposui , si ad illos animum advertamus , qui ob copiosas narium Hæmorrhagias subito ingruentes , ferreas imminentis lethi manus salvi evasere. Illud insuper est perpendendum , quòd in extremo hoc agone non idcirco instat mors , quòd pustulæ intrò recedant , (extant enim hæ eminentque cum insigni rubore , etiam animam agente ægro) sed quòd facies non turgescat ; ad promovendam verò hanc faciei intumescentiam , quicquid id demum est , quod ad sanguinem contemperandum facit (Venæ-sectionem autem & modicam refrigerationem eam vim obtinere nemo , opinor , negaverit) necessariò æquè ac Paregoricorum usus , atque ob easdem planè rationes , debet conferre.

Non hæc ita velim intelligi , ac si in qualibet Phrenitide , Variolis superveniente , (cum nullum hîc symptoma frequentius occurrat (Venæ-sectionem

* *Curatio Symptomatum.*

nem

nem statim suaderem, sed in illam tantum, quæ ideo accidit, quia facies non turgescit, in *distincto* sc. genere, & pustulis copiâ satis magnâ comparentibus; vel ubi ob regimen admodum calidum, & Cardiacorum usum, sanguis adeo effectus est, atque ultra omnem modum evectus, ut inducias ferre nequeat, donec medicamentis *Paregoricis*, & reliquis eodem facientibus, ad debitam temperiem reduci possit. Cum enim ita se res habeat, Medicus ad conscientiam suam potius, quàm ad incertam famam se componens, vel sanguinem, ut ante dictum, detrahare debet, vel ut æger aëre liberiore refocilletur, præcipere: Quod ut satis efficeretur, sæpè mihi visum est in tali agone phrenetico, ut æger lecto aliquantisper exurgeret, quo facto plures à morte liberavi. Præter ista verò, quæ oculis ipsis usurpavi, innumera sunt illorum exempla, qui his modis quasi Orci faucibus erepti sunt. *Phreneticorum* enim nonnulli Nutricum curam fallentes (miris sc. artibus utuntur homines ita affecti) atque è lecto dilapsi aëris frigori semetipsos etiam noctu exposuerunt: Alii frigidam vel furtim, vel raptim nacti, vel etiam precibus à nutrice emendicatam hauserunt, adeoque felici errore salutem jam planè desperatam consequuti sunt.

Unicam hîc loci historiam adscribere non gravabor, quam ab eo ipso accipi, cujus res agebatur. Is nempe *Bristolium* profectus, juvenis adhuc, inque ipso ætatis flore, circa mediam æstatem Variolis correptus est, iisque paulo post Phrenitis accessit: Nutrix in urbem ingressa, interim ægrum suum aliorum curæ commisit, mox nempe reditura. Verùm dum paulo diutius moratur, ægrotus (ut astantibus visum est) interea moritur. Astantes & anni tempestatis, & habitûs ægri, craffi scil. atque corpulenti, rationem habentes, ne oleret cadaver, è lecto sublatum ac nudum mensæ imponunt, linteo superstrato; Nutrix tandem rediens, accepto nuncio, cameram intrat tristissimo spectaculo interfutura; mox amoto linteo, vultuque conspecto, subobscura quædam vitæ indicia conspici sibi visa est, ac proinde statim projectum corpus in lectum reposuit, adeoque sub manu consilium capiens, ac nescio quid fatagens, ægrum suum in vitam revocavit, atque diebus aliquot interpositis, sanum conspexit.

Sed ut ad propositum revertar; Proximo loco, si in Variolis *Confluentibus* Saliva eo usque excocta sit & viscida ob calorem præcedentem; ut tantum non suffocetur æger, (quod *undecimo*, ut supra diximus, die non insolens est) *Gargarisma* necessario in usum trahatur, & ut sæpè die nocteque siringâ in fauces sedulò injiciatur, seriò imperandum. Componatur verò illud è Cerevisia tenui, vel aquâ Hordei, cum melle Rosarum. Vel sequens usurpari poterit: *℞. Cort. Ulmi ʒvi. Rad. glycyrrhiz. ʒss. Passular. enucleat. n. xx. ros. rubr. p. ij. coq. s. q. aq. tibi. colaturâ dissolv. Oxymel. simp. & mel. ros. aa ʒij. M. s. f. Gargarisma.* Quòd si æger ritè fuerit tractatus, *Ptyalismus*, etiam cum jam coeperit imminui, ita pulchrè suo fungetur munere, ut hoc remedio opus non fuerit. Et profectò ubi eò res rediit, ut æger singulis momentis à suffocatione periclitetur, stupore obrutus, & spiritu ferè undiquaque præcluso, non

non satis tutò huic remedio fiditur : Ægro ita ad incitas redactò *Emeticum* peropportunè ac feliciter nonnunquam exhibui ex *Infusione Croci Metallo-
rum*, sed dosi paulò majori, sc. *ad ʒiſſ.* quando, ob eximiam, quâ laborat æger, stupiditatem, minor dosi haudquaquam operabitur, atque interim eos exagitando humores, quo nequeat educere, ægrum in magnum vitæ discrimen conjiciet. Sed neque huic remedio satis fidere possumus, atqui (quod verè dolendum) aliud adhuc certius desideratur ad truculentissimum hoc symptoma debellandum, quod solum ac suo Marte eos ferè omnes jugulat, quotquot in hac Variolarum specie *die undecimo* intereunt.

Cætera quæ in hoc morbo accidunt symptomata, ut *præcaventur* ope regiminis moderati, ita ab eodem pleraque etiam *tolluntur* : e. g. ut *Phrenesis* ante dicta, à nimia cerebri excalefactione prognata, sanguine quovis modo paululum ventilando curatur, eâdem Methodo & *Comati* (quod alteri contrarium prorsus videtur symptoma, & ab obstructione corticis cerebri fit, dum halitus calidiores à sanguine regiminis ac medicatorum calidorum usu attenuato, magnâ copiâ ac vi illic impelluntur) facile occurritur.

Eâdem hâc sanguinis contemperatione & *Maculas Purpureas* vidi sublatas : Sed neque hâc, neque aliâ Methodo quâcunque, vel *miſctum sanguinis*, vel violentam ejusdem è pulmonibus eruptionem adhuc sufflaminare potui ; utraque verò Hæmorrhagia hæc, quatenus mihi hætenus observare licuit, indubiè mortem prænuntiat.

In *Urinæ suppressione*, quæ juniores ac vegetos nonnunquam incesſit (à confusione sc. magna & spirituum *ἀταξία*, ejusdem excretioni subservientium, ob sanguinem & humores nimio fervore agitados) omnes *Diureticorum* tribus in auxilium accersivi, sed nihil æquè feliciter hîc mihi cessit atque è lecto eximere ægrum, qui postquam adstantium manibus suffultus cubiculum bis terve circumambulaverit, mox urinam satis copiosè reddet, haud parvo cum levamine. Testes hîc possum compellare Medicos quosdam è familiaribus meis, qui in hoc casu ex meo consilio idem fieri præceperunt, neque eos fefellit eventus.

At verò quæ à materiæ variolosæ percussione ob frigus extremum, vel evacuationes indebitè factas, proveniunt symptomata, usu Cardiacorum & conforini regimine sunt tollenda, qui tamen non ultra spatium, quo ista perſtant, continuandus. Horum præcipua sunt Pustularum depressio seu procidentia, & *Diarrhæa* in Variolis *Discretis*. Neque enim in *Confluentibus*, vel Pustularum depressio mali quidquam ominatur, cum ea sit morbi natura ; neque *Diarrhæa* infantium iisdem laborantium, cum salutem ista adferat, non periculum. In utroque hoc casu potio Cardiaca ex *Aquâ stillatitiâ* appropriatis, cum *Diascordio*, *Laudano liquido*. &c. jure optimo concedetur, idque non tantum ad dicta symptomata submovenda, sed quolibet morbi tempore, si æger de cordis dolore atque ægritudine conqueratur. Sed ut verum loquamur, symptomata hujus generis oppidò rara sunt, si cum illis conferantur, quæ extremorum alteri, exitiabili magis, licet minus culpato, debentur.

tur. Et quidem opinor, rumorem illum, qui de crebra pustularum retrocessione invaluit, ex eo natum esse, quòd qui earundem depressionem in genere *Confluentium* observaverint, illam pro materiæ variolosæ ob susceptum frigus recessu habuerint, cùm nihil sit hîc præter morbi morem: Atque in genere *Distinctio* idem suspicantur, quia sc. pustularum eruptionem atque augmentum ante diem expectant, cùm non satis attenderint ad tempus illud, quo natura fructum hunc ad maturitatem solet perducere.

Ægro jam convalescente pustulisque deciduis, ubi per dies aliquot carnes idem degustaverit, circa diem nempe *primum & vicesimum*, sanguinem è brachio extrahendum censeo, si morbus fuerit vehementior; cùm inflammatio, quam sanguini impresserunt Variolæ, sive adultus fuerit æger, sive infans, non minus Venæ-sectionem indicet, quàm colluvies, quæ eidem accrevit, Catharsin: quod satis liquet, *tum* à sanguinis colore, qui post atrociorum morbum educitur, Pleuriticorum sanguini omninò similis, *tum* etiam à magnis istis inflammationibus, quæ post morbum hunc in oculos decumbunt, aliisque diris sanguinis excalescenti & à morbo depravati effectibus, unde etiam, qui antea pancreaticè valebant, postea cum humoribus calidis acribusque in pulmones, aut aliam aliquam partem depluentibus, per reliquam vitam omnem confligunt. At si pauciores extiterint pustulæ, Phlebotomiâ non opus erit. Post venæ-sectionem Catharticum exhibeo ad tres vel quatuor vices.

Adhæc, ægro à *Confluentibus* Variolis jam diu liberato, & è lecto quotidie surgenti nonnunquam accidit *Cervicis tumor* ferus ac molestus; qui tamen vel sponte facessit post Venæ-sectionem & Catharsin, vel usu Herbarum emollientium ac discutientium, (quales sunt *Malvæ, fol. Verbasci, Sambuci, Lauri, cum flor. Chamomillæ & Meliloti*) in lacte coctarum, facilè fugatur. Atque hæc de Historia Variolarum quæ hosce annos grassatæ sunt, quas, ut ab aliis speciebus, quæ infecutæ sunt, dirimam, *Legitimas* appellare libuit.

C A P U T II.

Febris Continua Annorum 1667, 68, & partis 1669.

JAm de Febre illa dicam, quæ durante *Variolosâ* hâc *Constitutione* dominabatur, & cum Variolis ingressa, stetit cùm iisdem, ceciditque. Ita se hîc res habuit; Doluit æger in regione, quæ cordis scrobiculo subjicitur, nec sustinuit, ut manu illa premeretur; quod quidem symptoma non memini me observasse in alio morbo præter hanc Febrem, & hanc speciem Variolarum. Capitis dolor, & calor totius corporis, ut etiam Petechiæ, satis manifesto indicio se probabant. Sitis interim non urgebat. Lingua sanorum similis non rarò comparuit, nisi quod quandoque albida, sicca rarissimè, nunquam verò nigra. Æger in spontaneos eosque effusissimos sudores ab initio morbi solvebatur, sed cum nullo levamine; quinimo ubi calidioribus medicamentis & regimine provocabantur isti, periculum erat, ne mox Phrenitide corriperetur.

Petechia-

Petechiarum insuper numerus augebatur, atque alia symptomata adhuc efferebantur omnia. Urinæ separatio, quæ satis videbatur laudabilis *vel* ab initio, spem faciebat salutis; neque tamen æger magis exinde in melius proficiebat, quàm post *διαφύκνουν*, de qua prius diximus. Si minus rectè tractaretur hic morbus, diutissimè protrahebatur plerumque; neque Crisi aliquâ factâ, nec sponte more aliarum Februm desinens, sed vehementibus symptomatis miserum excrucians ad septimanas sex vel octo, nisi mors intercederet. *Ptyalismus* quandoque satis copiosus sub finem accedebat, si nempe nulla insignior præcesserat evacuatio, atque ægro Julapia refrigerantia imperata fuerant, quo quidem, si neque evacuationibus, neque usu Medicamentorum calidorum fuerit interceptus, morbus ultra spem omnem fugam sibi quærebat.

Ut verò Febris hæc ab ista aëris Constitutione Epidemica pendebat, quæ eodem tempore variolas producebat, ita profecto dicta Febris, si non eadem planè esset, ejusdem ferè cum illis naturæ atque indolis per omnia videbatur, demptis solummodo symptomatis istis, quæ eruptionis vel consequentiæ, vel effecta erant necessaria: Nam eodem modo uterque morbus aggrediebatur, dolor idem in partibus, quæ cordis scrobiculo subjacent; si manus admoveretur, linguæ item color, urinæ consistentia, & Sudores spontanei copiosi ab initio oborti ubique respondebant. Propensio itidem quam habebat hic morbus, quoties in flammam vehementiorem assurgeret, se per *Ptyalismum* exonerandi, eadem prorsus erat atque in variolis hisce, quoties scilicet *confluebant*. Cùm insuper hæc Febris eo præcipuè tempore sæviret, quo latius quàm unquam alias, quantum ego observavi, hîc locorum grassabantur variolæ, nemini dubium esse potest, quin ejusdem omnino sint prosapiæ. Id certò scio, Phænomena practica omnia, quæ Curationem respiciebant, eadem planè fuisse in utroque morbo, exceptis istis, quæ variolarum eruptio, ejusque effecta in isto morbo indicabant, quæ, cùm nulla essent in hac Febre, indicari proinde non potuère; quod quidem mihi abundè constabat ex accuratissimis illis observationibus, quas feci, dum utroque morbo laborantes tractarem. Quapropter danda mihi est venia, (non quòd nova rerum nomina affectem, quæ perinde mihi sunt invisâ atque illi cui maximè, sed ut hanc Febrim à cæteris distinguam) ut istam à similitudine quam cum hac variolarum specie habet, *Febrem Variolosam* insigniam.

Utut verò Febris dicta Variolas referebat, nemo tamen sanus eadem illam methodo debere curari faciliè sibi persuaserit, cùm in his mediantibus Abscessibus particulæ inflammatae in habitum corporis amendantur eliminanturque; in hac Febre autem non nisi per Salivationem ejiciantur: Qui enim in morbi principio manabant *sudores* profusi, *Symptomatici* erant, non *Critici*; cùm natura non aliam hîc evacuationem videretur designavisse quàm *Salivationem*, quam tamen ipsa eadem natura pervertit ut plurimum, vel *Diarrhœa*, quæ sæpissimè à radiis inflammatoriis per arterias mesentericas in intestina delatis, atque eadem ad excretionem sollicitantibus, exoritur, (quod etiam in *pleuritide* usu venit, aliisque Febribus Inflammatoriis, ob sanguinis par-

ticularumque fervidarum orgasmum, ut eventilentur satagentium, vel immensis etiam qui *sudoribus*, morbum hunc pariter cum Variolis ex naturæ præscripto ubique comitabantur: quibus, cum symptomatîci essent ipsi, *Salivatio* quæ Critica aliàs erat futura, aliò derivabatur, ita ut nisi evacuationem aliam suggereret Ars, ad septimanas aliquot perseveraret morbus, nec aliarum Febrîum more Concoctionem subiret.

Sed ut paulò ulteriùs progrediamur, quò & Febris hujus naturam rectiùs capiamus, & ea pariter substernamus, quibus *Indicationes Curativæ*, tanquam immobili fundamento, superstrui possint, omnino animadvertendum est, quòd in *Febre* illâ quæ in *Constitutione Intermittentibus Epidemicâ*, vigeat, materia quæ à sanguine erat sejungenda tantæ erat crassitudinis, ut separari nequiret sine præviâ Digestione, quâ ad debitam evacuationem disponderetur, (determinato scil. ad hoc tempore) idque vel *διαπνοή* paulò pleniori, vel Dejectionibus Criticis; ita ut id tantum negotii Medico daretur, sic se ad morbi genium accommodare, ne ex una parte in symptomata periculosa assurgeret neque ebulliret, neque ex altera ita parum effervesceret ut materiæ inimicæ exterminandæ impar prorsus esset, cum Febris Naturæ instrumentum fuerit, ad hujus secretionis opus debita opera fabricatum. Quin & in *Peste* materia aliqua reperiatur à sanguine segreganda; sed cum subtilissimarum fuerit partium & maximè inflammabilium, (ita ut quandoque ubi summè exacerentur, sanguinem, fulguris instar, pervaderent, nec ebullitionem quidem in eodem ciere valerent) ictu oculi per eum trajiciebat, nec nisi in glandula aut parte aliqua externa sistebatur; ubi irretita carnes circumjacentes primò in inflammationem, postea in *Apostema*, pertraxit. Est autem *Apostema* Naturæ machina, quâ ista, quæ carnibus infesta sunt, amolitur, sicut *Febris* ejusdem est machina, ad difflanda ea, quæ sanguinem malè habent. Quo in casu, Medicorum est, evacuationem materiæ Pestilentialis, quam per hos abscessus natura molitur, prout decet, regere; nisi fortè quis magis consultum esse putaverit, aliam aliquam evacuationem substituere, quæ magis penes illum fuerit, ejusque arbitrio certius obtemperaverit, quàm illa Naturæ. Eodem etiam modo procedit Natura in expellenda *Variolarum* materia, licet ea species sit inflammationis pinguioris ac magis crassæ, quæ per pustulas ubique sparsas ejicitur, *Carbunculorum* loco ac *Bubonum* &c. Atque in hoc etiam casu Judicationes Curativæ eò sunt dirigendæ, ut naturalis per pustulas evacuatio ritè administraretur. Jam verò cum in hoc *Febris inflammatoriæ* genere, de quo nunc agimus, non inveniatur crassior illa materia, non nisi præviâ Digestione egerenda, sicut in Febre superiùs descripta, incassum Ebullitioni obsecundamus ad obtinendam hujusmodi Digestionem; quin imo econtra, haud leve est periculum, ne huic viæ insistentes, stimulos addamus morbo, cujus *esse* in inflammatione plus satis violentâ consistit: atque porrò, cum natura nullam huic Febri evacuationem per modum eruptionis constituerit, quod in Febre Pestilentiali & Variolis fieri cernimus, (utut rebus aliis posteriori huic morbo respondeat) necessariò in hoc stabit rei summa, ut
sedetur

sedetur *inflammatio* evacuationibus & medicamentis contemperantibus. Hunc mihi proponens scopum, hujusce Febris Curationem aggressus sum, quæ methode hâc difficulter expugnata fuit.

* Ad ægrum accersitus, mox sanguinem è brachio educendum curavi, modò nimia debilitas, præsertim verò provectior ætas, non contra indicaret; & Venæsectionem insuper alternis diebus ad duas adhuc vices repetendam jussi, nisi redeuntis sanitatis signa aliter suaderent. Diebus interjectis *Enema* è lacte & saccharo, vel simile injiciendum præcepi; præscripsi & Julapium sequens vel aliud ejusmodi, frequenter per omnem morbi decursum assumendum; ℞. *Aq. Portul. Lactuc. fl. Paralyf. n.* ℥iiij. *Syr. de Limon.* ℥i℔. *Syr. Violacei* ℥j. *Cap.* ℥iiij. quater vel quinquies in die, & ad libitum; serum lactis, Aquam hordei, & similia ejus farinæ pro Potu ordinario concessi; pro victu juscula etiam Hordeacea, Avenacea, Panatellam, Poma cocta, &c. jusculis verò è carne pullorum, vel aliâ quacunque interdixi.

Præ reliquis omnibus edixi ne se in lecto assidue contineret, sed illo abstineret bonam diei partem, idque quotidie; quando observaverim in hâc Febre, (uti etiam in *Pleuritide, Rheumatismo*, aliisque omnibus morbis Inflammatoriis, in quibus abigendis Venæsectio & Refrigeratio primas obtinent) medicamenta summè Refrigerantia, & repetitam sæpius Phlebotomiam ne hilum prodesse, dum interim æger lecto indefinenter affixus, ejus calore torreatur, æstare præsertim. Quocirca nec sudores quibus subinde difflebat æger, ab hac methode refrigerandi, tum Medicamentis exhibitis, tum jugem lecti usum vetando, me deterrebant: Etsi enim, sumpta à plerumque juvantibus *Indicatione*, magnum sibi quis inde emolumentum haud injuria pollicitaretur, refragabatur tamen ubique experientia, qua magistra didici, ægrum non modò nihil exinde commodi capere, sed è contra vehementius incallescere; ita ut non rarò *Phrenesis, Petechiæ*, cæteraque pessimi ominis symptomata mox hujusmodi sudores exciperent, quæ non tam à morbi *malignitate*, quam *sinistro regimine* oriri videbantur.

Si è contra dicatur, jam laudatam Februm curandarum Methodum Authorum Theoriæ omnimodè adversari, qui omnes uno ore pronunciant, Febrim per *διαφύσιν* rectissime ac maxime naturaliter expediri; hæc habeo quæ pro me militat, præter certissimæ ac constantis Experientiæ testimonium mihi in hujus particularis Febris curatione nunquam non suffragantis: Suppono ante omnia viros doctos, qui sudorum provocationem ad tollendam Febrim efflagitant, eos velle sudores qui à prævia Digestione humoris aliqujus in sanguine stabulantis excernuntur, in quo humore elaborando præparandoque ut per *διαφύσιν* eliminantur, natura certo aliquo ac determinato tempore fuerit occupata. Verum enim verò longè aliter hîc se res habet; æger enim à primo statim morbi impetu in sudores uberrimos solvitur, qui soli morbi hujus pars magna sunt, & si Phænomenis omninò omnibus sit habenda fides, morbus hicce à nudo potius calore & sanguinis æstu, quàm ab humore aliquo delitescente, & post debitam Concoctionem à sanguine per sudores

dores expellendo, pendere videtur. Quod si demus, hujusmodi humorem Digestione maturandum in hac Febre, pariter atque in multis aliis reperiri, quorsum attinet, Naturæ (cujus enormiora molimina in ordinem redigere opis est nostræ) plus nimio satagenti morem gerere, hujusmodi sudores vel Cardiacis provehendo, vel regimine calidiore, cum non minus sudores respiciat quam Dejectiones tritum illud Axioma, *Cocta, non cruda, sunt medicanda.*

Stante hac Constitutione, accersabar ad virum doctissimum D. D. *Morrice* (qui tum temporis *Londini*, jam *Petworthiæ* Medicinam cum laude facit) hac Febre cum effusissimis sudoribus & frequentibus Petechiis laborantem; Consistentibus aliis aliquot Medicis, utrique nostrum familiaribus, Vena secta fuit, surrexit è lecto, absterfo primum sudore, Medicamentis & Diætâ Refrigerantibus usus est, præsentissimo cum levamine, multis malis atque periculosis symptomatis mox diffatis, &, cum eidem methodo insisteret, intra paucos dies sanitati restitutus est.

Sed ad rem. Neque etiam *Diarrhæa*, quæ Febrim hanc sæpissime comitabatur, me à dicta Methodo vel latum unguem dimovit; quinimò expertus sum (cum sc. ab halitibus inflammatoriis è sanguinis massa per Arterias Mesentericas in intestina excretis, atque eadem vellicantibus, illa nasceretur) nihil huic profluvio sistendo æquè conducere atque Venæ-sectionem, & sanguinis contemperationem, *aquâ Hordei, sero lactis* atque aliis suprà nominatis procurandam.

Hæc sanè Methodus optimè mihi cessit in hujus morbi curatione, ad quam quidem apta nata præ cæteris mihi videtur. Non quòd ego nunquam via longè contraria incedentibus spectator interfuerim, adhibitis sc. Cardiacis & calido regimine, ægro nihilominus à morbo sæpe liberato, ita tamen ut mihi semper videretur is non mediocri discrimen adiisse, nulla id suadente necessitate: Etenim *Petechiæ*, quæ aliter perpaucæ erant, his modis numerosissimæ scatebant; sitis, quæ ut plurimum vix molestabat, jam intensius urgebat; Lingua, quæ alias humida solebat esse, neque à sanorum linguâ, nisi quòd, ut diximus, subalberet aliquantisper, multum abhorrens, sicca in hoc regimine arefactaque, quin & nigra sæpe comparebat. Postremò illi ipsi sudores, quos Cardiacorum usu extorquere satagebant, tandem eorundem ope penitus intercidere: Exacta enim per corporis habitum nimis larga feri copia, sanguis humori istiusmodi ulterius suppeditando par non erat, cumque ista qua dilui debuerat humiditate in solidum jam spoliaretur, exarescebat protinus æger; atque in externis partibus constringebatur, omnino præter naturæ morem quem in hac Febre observare solet, donec tandem sanguis humiditate ab absumptis mutuata denuò repletus, partim Medicamentorum, partim etiam Febris vi, serum hoc recens ingestum, ac cum illo Febrem, à finibus suis pelleret. Quæ quidem Crisis erat coacta nimis, & nimis periculosa, & (quod adhuc pejus) rariùs etiam contingebat.

Jam verò, ut suprà monuimus, Febris hujus solutio, ut etiam Variolarum,
(quæ

(quæ foror ejus germana meritò audiunt) per *Salivationem* non raro fiebat; quæ quidem nunquam non salutaris fuit, ita ut eâdem liberaliùs procedente tam maculas revera purpureas, quàm Febrim ipsam evanescere oculis viderim meis. Oborta itaque *Salivatione*, nulla omnino Evacuatio convenit, nec quæ venâ pertusa, nec injectio quæ fit Enemate; cum ab utraque periculum sit, ne humor aliò divertatur. At serum lactis, atque alia refrigerandi vi pollentia necessariam in *Salivatione* elicienda operam navabant, ut è contra Cardiaca, & quæcunque alia calefaciebant, materiam inspissando ejusdem educationi officiebant.

Superstite adhuc Febre hâc, nec dum extincta penitus, anno maximè 1668. * *Diarrhæa*, sine manifesto aliquo Febris indicio, Epidemicè grassabatur: Jam enim *Constitutio* ad *Dysentericam* illam accedebat, quæ insequentì anno invaluit, ut jam proximè dicemus. Hanc nihilominus eandem ego censui Febrem esse cum *Variolosâ* adhuc regnante, forma tantùm diversa, atque alio se symptomate efferentem. Cùm enim mihi constaret, rigorem atque horrorem hanc etiam *Diarrhæam* præcedere solere, atque illam insuper ut plurimum ex eadem προφάσει invadere, ex qua solebat ista quæ tùm depopulabatur Febris, verisimile mihi est visum, Febrem hanc ortum suum debere radiis inflammatoriis in intestina inversis, atque eadem ad expulsionem hanc sollicitantibus; cùm interim sanguinis massa, ope hujus diverticuli à malis, quos aliter radii isti attulissent, effectibus integra maneat atque illæsa, nullo Febris visibili signo exterius se prodente. Adhæc æger partes cordis scrobiculo accum-bentes manu premi non tulit (quod quidem symptoma & *Variolis* & *Febri* hujus *Constitutionis* accidisse jam pridem ostendimus.) Idem etiam dolor, atque eadem carniū teneritudo sæpenumero externè in Epigastrium protendebatur; nonnunquam etiam inflammatio, quæ in Apostemate, atque ægri morte demum terminabatur. Quæ omnia luce clarius indicabant, *Diarrhæam* hanc ejusdem omnino naturæ fuisse atque essentiæ cum illâ, quæ tum domina-batur, Febri. Sententiam hanc meam magis adhuc ratam faciebat felix eventus, quem Venæ sectio & Medicamentorum, Diætæ, atque Regiminis refrigerantium usus, quæ in *Febris Variolosæ* curatione usurpassè nos sæpe diximus, in sananda etiam hac *Diarrhæa* perpetim habuere, utpote quæ huic Methodo promptè cessit. Cùm verò alia longè diversa tractaretur, sive exhibitis *Rhabarbaro* aliisque *Catharticis lenitivis* (ad deturbandos sc. mordaces istos succos, qui intestina ad hujusmodi Excretiones putabantur irritasse) sive etiam Astringentibus: ex levi, suâ naturâ, morbo, in exitialem sæpissime evasit; ut, qui eo anno concinnabantur *Diem obeuntium Indices*, plus satis testantur. Atque hæc dicta sunt de *Morbis Epidemicis*, qui ab hac *Constitutione* pendebant.

* *Diarrhæa.*

S E C T I O Q U A R T A.

C A P U T I.

Constitutio Epidemica partis Anni 1669. atque integrorum 1670, 1671, 1672. Londini.

INeunte *Augusto* An. 1669. *Cholera Morbus*, immania *Ventris tormina* sine *Dejectionibus*, uti etiam *Dysenteria*, quæ per decennium jam parcius comparuerat, grassari cœperunt; *Cholera Morbus*, quem nunquam antehac ita fuisse Epidemicum animadverteram, hoc non obstante, eo etiam anno, uti semper, intra *Augusti* cancellos stetit, vix in priores *Septembris* Hebdomadas evagatus. *Ventris* autem *Tormina absque dejectionibus* ad *Autumni* exitum usque perseverabant, & *Dysenterias* comitabantur, quibus etiam latius spargebantur illa: Superveniente verò hyeme tormina ista sine dejectionibus, penitus disperebant, nec deinceps infestabant per sequentes Annos, quibus vigeat hæc *Constitutio*, qua nihilominus *Dysenteria* ἐπιδημιασάτος sæviebat. Cujus rei hanc ego causam fuisse arbitror, quòd scilicet *Constitutio* ista nondum ita perfectè in *Dysentericam* transierat, ut symptomata illa omnia quæ *Dysentericos* affligunt, in singulis valeret producere. Etenim insequente *Autumno* cum jam redirent tormina, nullo non symptomate Pathognomonico stipatus incessit morbus. Inter *Tormina* hæc dejectionibus cassa, & *Dysenterias* jam memoratas quæ ubique populabantur, exoriebatur & novum *Febris* genus, utrique morbo comes, quæ non eos tantùm invadebat, qui priorum alterutro laborabant, sed etiam illos, qui ab utroque adhuc immunes perstabant; nisi quòd nonnunquam (at rariis id quidem) ventris tormina admodum levia accederent, nunc soluta alvo, nunc verò adstricta; quæ cum illam *Febrim* quadantenus referret, quæ morbis præfatis non infrequenter adhærebat, *Febris Dysentericæ* nomine ab aliis distinguenda est, maximè cum, ut mox docebimus, à *Dysenteria* genio atque indole in eo tantùm recederet, quòd *Dejectionibus* istis caruerit, quæ in *Dysenteria* indefinenter molestabant, cæterisque iis effectibus, quæ huic evacuationi necessariò debebantur. Appetente jam *Brumali* frigore *Dysenteria* ad tempus se subduxit; *Febris* autem *Dysenterica* magis grassabatur; *Variolæ* etiam, at mitiores, & fractis admodum viribus quibusdam in locis impetebant.

† Anno verò subsequente vix dum ingresso, ipso nempe *Januario*, successere *Morbilli*, qui indies auctiores facti, nullam ferè familiam, nullos saltem infantes intactos sinebant; atque ad *Vernum* usque *Æquinoctium* sensim invalescentes, ab illo tempore iisdem ferme quibus insurrexerant gradibus

dibus paulatim referebant pedem, & *Julio* mense evanescere, non amplius visi per eos annos omnes, quibus dominabatur *Constitutio* hæc, nisi quod proximo anno ea ipsa tempestate, qua in præcedente, eruperant, rari hac illac dissiparentur.

Morbilli isti *Variolarum* generi, mihi hætenus non cognito, viam sternebant, quas ut à cæteris distinguam, ob Phænomena irregularia inusitataque à me observata (quæ postea in earundem *Historia* tradentur) à præcedentis *Constitutionis* Variolis longè distantia, *Variolas Anomalas Constitutionis Dysentericæ* compellare lubet. *Variolæ* hæ, licet morbillis longè infrequentiores, non paucos tamen aggrediebantur, donec inchoante mense *Julio*, *Febres Dysentericæ* prævalerent, epidemicè incurstantes; approximante verò *Autumno*, *Augusto* scilicet, *Dysentericæ* postliminio revertebantur atque omnia pervastabant, etiam inclementius quam prægresso anno desævientes. *Hyberno* tamen frigori terga dederunt, ut priùs. Verum enim verò his fugatis *Dysentericæ Febris* & *Variolæ* hyemem omnem funestabant.

At circa initium *Februarii* * *Anni* insequentis, substitutis *Tertianis Intermittentibus*, uterque morbus rarior prodibat. Dictæ *Intermittentes*, licet non admodum *Epidemicæ*, frequentiores tamen erant, quàm quovis alio tempore observasse me memini, à quo sc. expiravit *Constitutio* ista, quam sibi adeò faventem illas habuisse suprà notavimus. Atque hæ, pro more *Intermittentium Vernarum* Solstitio æstivo vix præterlapso omnino evanescere. Incipiente mense *Julio*, *Dysentericæ Febres* quam præcedentibus annis obtinuerant stationem de novo repetebant; *Autumno* verò aliquantum provectiore, *Dysenteria* jam tertio regressa est, sed contractior quàm anno ultimo elapso, quo ad æpulum pervenisse videbatur, supervenienti autem *Hyemi* tertium etiam cessit, *Febre Dysentericâ*, & *Variolis* reliquam eam tempestatem iterum contristantibus.

† Cum verò, ut jam monuimus, sub ingressu utriusque anni præcedentis morbus aliquis valde *Epidemicus* invalesceret, morbilli scil. exoriente Anno 1670. *Intermittentes* autem *Tertianæ* Anno 1671. inchoato, quorum prædominio ita intercidebantur *Variolarum* copiarum, ut fines suos, prædictis annis ineuntibus, longè lateque propagare nequirent: Hæc inquam de causa remoto jam obice, (nempe initio *Anni* 1672.) cum solæ dominarentur *Variolæ*, *Epidemicè* admodum ex consequenti grassabantur, donec subintrante rursus *Julio*, *Febres Dysentericæ* denuò invaderent, quæ redeuntibus jam quarto *Augusto* *Dysentericiis* mox facessiebant; *Dysentericæ* verò non pauciores tantum quàm prioribus annis fuerant, sed mitiora insuper apportabant symptomata. Porro *Variolis* hinc indeque sparsis, haud facile erat dictu, quis morbus præpolleret. Existimo quidem ego, *Constitutionem* aëris ad *Dysenterias* pro-gignendas minùs facientem, *Variolis* eam subministrasse facultatem, quæ pari passu procedere valerent, secus atque iis annis quibus *Dysentericæ*, *Augusto* mense confertim magis trucidabant. *Hyems*, ut solebat, *Dysenterias* ablegavit, sed neque *Febrem*, nec *Variolas*: *Variolæ* hîc etiam pro more suo, exulantibus *Dysentericiis*, rerum denuò potiebantur, & per omnem reli-

quam brumam regnabant. Quinimò subsequente *Vere*, ut etiam *æstatis* initio, huc atque illuc deferebantur, longè tamen mitiores quàm pro hoc genere.

Verùm enim verò quando assero, *Epidemicorum* alterum ab altero, ut clavum à clavo, pelli, non statim dico, eum, qui pellitur ac cedit, morbum in solidum evanescere, at verò rariùs invadere. Durante enim hac *Constitutione* uterque morbus reperiébatur, etiam illa tempestate, qua cum minùs ei conveniebat; e. gr. *Dysenteria*, etsi morbus *Autumno* maximè proprius, unum fortasse aut alium, licèt rarò admodum, *Vere* incessébat.

Satis itaque evicimus, quod per integram hanc *Constitutionem*, subintrante *Julio* (qui mensis certissima est *Februm Autumnalium Epocha*, uti *Vernarum Februarii*) *Febres Dysentericæ* grassabantur; *Autumno* verò jam se propiùs admovente, *Dysentericæ* (morbus, si accuratiùs loqui velimus, verè *Autumnalis*) iisdem succedebant, quas ab hyeme diffatas excipiebant *Febris Dysenterica & Variolæ*; quæ quidem *Variolæ* non eam tantùm hyemem, sed & subsequens etiam *Ver*, nec non *æstatem* illi conjunctam peragrabant, donec reverso *Julio*, à *Febribus Dysentericis* *Epidemicè* prædantibus ejicerentur: Atque hæ rerum erant vices dum vigeret prædicta *Constitutio*.

Observare insuper est, quod sicut *Epidemicorum* quilibet in subiecto particulari suas habet periodos, *Augmenti* sc. *statûs*, & *Declinationis*; ita etiam *Constitutio Generalis* quæcunque, quæ huic alterive morbo *Epidemicè* producendo favet, pro ratione temporis quo dominatur suas etiam periodos habet, quatenus sc. indies magis ac magis *Epidemicè* grassatur, donec *apicem* attigerit suam, atque exinde iisdem ferè gradibus decrescat, donec tandem penitus exoluerit, alteri *Constitutioni* locum cedens. Symptomatum enim quod attinet vehementiam, atrociora sunt omnia ubi primum se ostendit; quæ quidem paulatim mitescunt, & in *Constitutionis* *Catastrophe* tam sunt benigna atque *εὐφρόνια*, quàm patitur morbi natura, in quo fundantur, quod satis demonstrant *Dysentericæ*, & *Variolæ* hujus *Constitutionis*, ut mox fusiùs declarabimus. Hujus *Constitutionis* morbos particulariter tractandos aggredior, eo quem ipsi servarunt ordine.

CAPUT II.

Cholera Morbus An. 1669.

Morbus hic, qui, ut antea diximus, Anno 1669. se latius diffuderat, quàm alio quovis anno, quantum ego observaveram, eam anni partem, quæ *Æstatem* fugientem atque *Autumnum* imminentem complectitur, unicè ac eadem prorsus fide, qua veris primordia *Hirundines*, aut insequentis tempestatis fervorem *Cuculus*, amare consuevit: Qui ab ingluvie aut crapula nullo temporis discrimine passim excitatur affectus, ratione symptomatum non absimilis, nec eandem curationis methodum respuens, tamen alterius est subsellii. Malum ipsum facile cognoscitur, adfunt enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio, Ventrìs ac intestinorum dolor

dolor vehemens, inflatio & distentio; Cardialgia, sitis, Pulsus celer, ac frequens, cum æstu & anxietate, non raro etiam parvus & inæqualis; insuper & nausea molestissima, sudor interdum diaphoreticus, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas; cum aliis consimilis notæ symptomatis, quæ astantes magnoperè perterrefaciant, atque etiam angusto viginti quatuor horarum spatio ægrum interimant. Est etiam & *Cholera sicca* à spiritu flatuoso, supra & infra erumpente, idque sine vomitu vel secessu; cuius unicum duntaxat exemplum me vidisse memini, ineunte hujus anni Autumno, quo tempore prior illa species mihi creberrimè & factò quasi agmine sese obtulit.

* Sedulâ mentis applicatione, & multiplici etiam experientiâ edoctus, quod si hinc acres istos humores, fomitem morbi, Catharticis expellere conarer, idem agerem; atque is, qui ignem oleo extinguere satagit, cum Cathartici vel lenissimi operatio omnia magis perturbaret, & novos insuper excitaret tumultus: Et si ex adverso medicamentis Narcoticis aliisque astringentibus in ipso statim limine primum humoris impetum compescerem, dum naturali evacuationi obisterem, & invitum humorem detinerem, æger, inimicò visceribus incluso, bello intestino indubiè conficeretur. Has, inquam, ob causas, mediâ mihi viâ insistendum esse duxi, ut partim scilicet humorem evacuarem, partim etiam diluerem; morbum itaque hac arte mihi à multis retro annis comperta ac comprobata, toties quoties in ordinem coëgi.

Pullus tenerior in tribus circiter aquæ fontanæ congiis elixatur, adeò, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat; hujus decocti (vel defectu ejus, liquoris possetici) capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhaurire jubetur, eodemque tempore bona ejusdem quantitas pluribus *Enematis* successivè injiciendis inservit, donec quâ per superiora, quâ per inferiora, tandem omne jusculum absumptum, ac denuò rejectum fuerit. Hisce haustibus, pariter ac Clysteribus, Sympliciorum *Lactucæ, Violarum, Portulacæ, Nymphææ*, eorumve aliqujus, Uncia subinde admisceri poterit; quanquam & citra ejusmodi additamenta, jusculum ipsum per se rem satis commodè exequatur. Ita Ventriculo insigni liquoris quantitate sæpius onerato, atque, ut sic dicam, subverso, ac reiterata Enematum injectione, humores acres vel foras eliminantur, vel retusâ acrimoniâ ad debitam temperiè revocantur. Exantlato hoc eluvionis penso, quod tres vel quatuor horas sibi vendicat, medicamentum aliquod *Paragoricum* curationi coronidem imponit: Mihi hoc crebro in usu est, R. *Aq. Paralyf. ʒj. Mirab. ʒij. Laudani liquidi gutt. xvj.* cujus loco Narcoticum quodvis officinale succenturiari poterit. Atque hæc quam proposui diluendi humores viâ multò tutius ac expeditius, quàm quæ vel per evacuantia, vel per astringentia vulgò instituitur, periculosissimo affectui occurrit, quippe cum ab *illis* tumultus concitator & ferocior evadat, ac omnia susque deque vertantur; hæc è contrâ hostem in mediis visceribus detineant, ac ex advenâ reddant planè inquilinum; ut taceam, protracto in longitudinem morbo præter

periculum ex ejusmodi mora, quâ in massam sanguinis tandem humores vitiosi irrepunt, atque mali moris Febrium facile accendunt; etiam ægris gravissimi mali tædium procreari.

At verò diligenter est animadvertendum, quòd si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu ac dejectionibus ad horas aliquàm multas continuatis, puta 10. vel 12. fuerit exhaustus, & jam frigescent extrema membrorum; hoc, inquam, casu, omiſſis aliis quibuscunque auxiliis recto cursu ad sacram hujus morbi anchoram, *Laudanum* intelligo, confugiendum est; quòd non tantum exhibendum est urgentibus Symptomatis, sed etiam cessantibus Vomitu ac Diarrhoeâ manè & serò quotidie repetendum, donec pristinas vires æger, ac sanitatem tandem receperit.

Hic morbus, quantumlibet Epidemicus, rarissime tamen (quod supra dictum est) *Augusti*, quo primum coepit mense, terminos excessit; ex quo mihi subest contemplari elegantissimum illud subtilissimumque artificium, quo utitur natura in Epidemicorum natalibus atque ortu; Licet enim eadem prorsus maneant causæ, unde plures sub finem *Septembris* æquè ac mense præcedente, hoc morbo possunt corripì, nimia sc. Fructuum Horariorum ingestio; eundem tamen non sequi videmus effectum: Quisquis autem *Choleræ morbi legitimi*, quòcum solo nobis impræsentiarum res est, Phænomena studiosè collegerit, fatebitur morbum istum, qui quovis alio anni tempore invadit, quamvis ex eadem occasione prognatum, atque eorundem symptomatum nonnullis stipatum, ab hoc nostro toto cœlo distare, haud aliter ac si in aëre peculiaris mensis hujus lateat reconditum, ac peculiare quiddam, quod specificam hujusmodi alterationem soli huic morbo adaptatam, vel cruori vel Ventrìculi fermento valeat imprimere.

CAPUT III.

Dysenteria partis Anni 1669. atque integrorum 1670, 71, 72.

Ventris tormina sine dejectionibus initio *Augusti* 1669. ut supra innuimus, invadere coeperunt; & excurrente eo Autumno, *Dysenterias*, quæ cum iisdem ingrediebantur, æquabant numero; ne dicam exuperabant. Febris nunc iis accessit; nunc aberat. *Dysenteriarum* per id tempus grassantium torminibus dicta Ventris tormina omnino respondebant; atrocissima nempe hæc erant, & per intervalla cruciabant, nullæ verò sequebantur Dejectiones vel *Stercorosæ*, vel *Mucosæ*. Pari passu cum *Dysenteriis* per *Autumnum* hunc omnem procedebant, sed, ut jam docuimus, non cum iisdem per Annos sequentes hujus *Constitutionis* Epidemicè amplius invadebant. Cum verò tormina hæc sine dejectionibus neque naturâ suâ, neque illâ, quâ promptissime sopiebantur methodo, à *Dysenteriis* multum diffideant, ad has me conféro.

Animadverti, morbum hunc uti nunc, ita ferè semper, *Autumni* initio invade-

vadere solere, & appropinquanti hyemi pro tempore cedere; cum verò annorum series eidem epidemicè producendo nimium faveat, unum alterumve, etiam quovis alio tempore potest ferire; quin & circa *Veris* ingressum, fortè etiam maturius, (si nempe aura calidior intemperantiori gelu derepente soluto mox supervenerit) plures aliquot incessere. Unde, perpauca licet fuerint, qui hoc corripiantur morbo, cum tamen id tempore ita alieno contingat, satis scio illam *Constitutionem* haud mediocriter huic morbo suffragari. Atque ita se res habuit per eos annos, quibus *Dysenteriae* ita latè depopulabantur; quandoque enim circa finem hyemis aut *Veris* initium, uti dictum, hic morbus hunc illumve vexabat.

Nunc cum rigore horroreque aggreditur hic morbus, quos sequitur totius corporis calor, (ut in Febris solenne est,) atque hunc brevi post ventris tormina; ista verò dejectiones; Sæpè verò nulla antecedit Febris præsensio, agmen autem ducunt tormina, dejectiones subsequuntur; Semper tamen adest ingens cruciatus, & intestinorum depressio cum dolore, quoties exoneratur alvus, cum crebris itidem dejectionibus, & molestissimo vilcerum omnium quasi descensu. Dejectiones *mucosæ* sunt omnes, non *stercorosæ*, nisi quod nonnunquam stercorosa interponitur, idque sine dolore insigni. Mucosis hisce dejectionibus intertexuntur sanguinis quædam lineamenta; quandoque tamen ne minimum quidem sanguinis per omnem morbi decursum iisdem admisceatur; quo non obstante, (modò frequentes sint Dejectiones, cum ventris torminibus & colluvie mucosâ,) morbus haud minus rectè *Dysenteria* vocabitur, quàm si unà manaret sanguis. Interea temporis æger, si vel ætate floreat, vel Cardiacorum ope incalescat, febricitat, linguâ subalbidâ quadam mucilagine densè obsita, &, si vehementius fuerit excalefactus, nigra etiam atque sicca: Prosternuntur admodum vires, dissipantur spiritus, nullum non adest Febris malè moratæ indicium. Non dolores tantum summos atque ægritudinem adfert hoc malum, sed, nisi peritè tractetur, ingens etiam in vitæ discrimen ægrum perducit; cum enim jam imminutæ caloris vitalis ac spirituum copię à crebris hisce dejectionibus ante exhauriantur, quàm peccans materia possit se sanguine exturbare, manuum ac pedum frigore superveniente, à morte periclitabitur, etiam intra morborum acutorum periodos oppetendâ; quod si intentatas *Parcarum* manus hac vice eluserit, plura tamen diverfi generis symptomata miserum expectant: v. gr. nonnunquam progressu morbo, loco filamentorum sanguineorum, quæ eodem incipiente dejectionibus permista conspici solebant, sanguis *sincerus*, ne mucos quidem intermixto, largiori quantitate singulis conatibus egeritur, quod, cum corrosionis majorum aliquot vasorum quæ intestina perreptant, argumentum sit, ægro interitum minatur. Nonnunquam etiam intestina à magno illo incendio, quod excitavit materiæ calidæ atque aëris ad partes læsas affluxus copiosior, *Gangræna* insana-bili afficiuntur. *Aphthæ* insuper exeunte morbo oris interna faucesque sæpenu-merò obsident, imprimis ubi corpus diu fuerit excalefactum, & materiæ peccantis evacuatio medicamentis astringentibus impedita, non exacto prius per-

Cathartica morbi fomite. Atque hæc quidem mortem imminentem ut plurimum denunciant. Quod si prædicta symptomata superaverit æger, & morbus in longum trahatur, tandem intestina ordine quæque suo deorsum versus affici videntur, donec in *rectum intestinum* malum omne detrudatur, & in *Tenesmum* definat; quo facto, longè secus atque in Dysenteriis Dejectiones *stercorosa* vehementissimum intestinis dolorem inferunt, alvi scil. facibus teneriora adhuc intestina inter descendendum radentibus; cum Dejectiones *Mucosa* eo tantum tempore inferiori intestino, *Recto* nempe, molestias creent, quo materia in eo solo conficitur atque inde excernitur. Hic autem morbus licet *Adultis*, maximè *grandævis*, haud rarò exitialis, *Infantibus* nihilominus perbenignus reperitur, qui ad menses aliquot ab eodem quandoque afficiuntur sine quovis incommodo, modò res naturæ permittatur.

Quantum cum hac, quam descripsimus, affinitatem habeat *Endemia* ista *Hybernorum Dysenteria*, non satis scio, cum nondum ea mihi innotuerit; quin & in his, quas incolimus, regionibus quomodo se habeat *Dysenteria*, quam jam depinximus, si ad illas referatur quæ aliis annis infestabant, mihi pariter incompertum est, cum fieri quidem possit, ut variæ enascantur *Dysenteriarum* species, ut sunt *Variolarum* & *Epidemicorum* aliorum, diversis *Constitutionibus* propriæ, & quæ proinde medendi methodum in aliquibus diversam sibi suo jure vendicent. Neque est, cur hos Naturæ lusus in re tantopere demiremur, cum in confesso apud omnes sit, quod quo profundius in quæcunque Naturæ opera penetremus, eo luculentius nobis affulgeat ingens illa varietas, & divinum pene artificium operationum ejus, quæ captum nostrum longissimè superant. Adeò ut quisquis ille fuerit, qui in se receperit hæc omnia mente assequi, & multifarias Naturæ operationes *κατὰ πόδας* indagare, partim magnis ausis excidit, neque voti per omnia compos reddetur: Convitia interim, (si quid judicando valet) pro repertorum vel utilissimorum quam fecit semente, certò certius sibi metenda proponet, idque eam tantum ob causam, quod primus invenit.

Porro observandum est, quod *Epidemici* omnes ubi primum è Naturæ sinu emergunt exiliuntque, quantum ex eorum Phænomenis licet conjicere, principio magis spirituosos ac subtili videntur inhærescere, quam ubi jam magis adoleverint, quoque magis ad occasum vergunt, eò magis indies crassi atque humorales fiunt: Etenim quales quales demum fuerint inimicæ istæ particulæ, quas aëri intimè permixtas *Constitutionem Epidemicam* formare opinabimur, omninò par est, ut easdem majori agendi potentiâ per ea tempora pollere existimemus, quibus primum eruperint, quam postquam earum vires fuerint refractæ. Ita primis mensibus, quibus grassabatur *Pestis*, nullo ferè non die ejus contagio afflati, dum in triviis versarentur, inopinanter extincti sunt, nihil prorsus mali præsentientes, cum, ubi morbus magis adoleverat, neminem, nisi Febre atque aliis symptomatis præcedentibus, unquam prostravit: Ex quo abundè conficitur, morbum hunc in ipsis incunabulis magis efferatum atque acutum fuisse, quam post principia, licet pauciores

primâ acie jugulaverit, aucto jam sc. habebat in humana corpora influxu. In *Dysenteriis* pariter, de quibus jam agimus, omnia universim symptomata atrociora sub primo morbi ingressu comparebant, & licet, si ad ægrorum numerum respexeris, latius indies malum serperet, donec tandem ad statum pervenisset, in quo ex consequenti plures interibant, quam ineunte morbo, symptomata tamen sub initio sæviebant magis quam in *statu* ac multo adhuc magis quam in *Declinatione*, & cæteris paribus plures pro ægrorum numero *Ἐλαβε πορφύρεον θάνατον καὶ μοῖραν κραταίην*. Adde quod quo diutius perseverabat morbus, eò magis Humoralis etiam videbatur; v. g. primo quo invasit Autumno, quamplurima nullis omnino Dejectionibus molestabantur; Torminum verò quod spectat atrocitatem, Febris intensiorem, subitam virium prostrationem, aliaque symptomata, insequentium annorum Dysenterias longo intervallo post se reliquit. Quinimò Dysenteriae cum Dejectionibus, quæ primæ incessabant, principio magis spirituofo ac subtili videbantur inhærere, quam quæ illas sequebantur. Etenim in primis Dysenteriis & conatus & ad desidendum irritatio majores erant tum etiam frequentiores; ipsæ verò Dejectiones, stercorosæ præsertim, & minores, & magis insolentes: Quibus autem gradibus morbus in genere se promovit, iisdem etiam imminuebantur Tormina. Dejectiones verò magis stercorosæ erant, donec tandem fatifcente *Epidemicâ* hâc *Constitutione* Tormina vix perciperentur, Dejectionesque stercorosæ magis essent quam mucosæ.

* Ut ad Curativas Indicationes tandem procedamus, cum varia quæ huic morbo accidunt symptomata, diligenter ac maturè mecum pensitasset, *Febrem* eum esse (sui sc. generis) in intestina introversam deprehendi, cujus ope humores calidi atque acres in massa sanguinea contenti atque eandem exagitantes, per Arterias Mesaraicas in dictas partes deponuntur: unde à vehementiori sanguinis atque humorum eò contendentium impetu patefactis vasorum orificiis, sanguis per sedem effunditur. Interea temporis importuno intestinorum nisu, quæ omnem adhibent operam ut humores continuo instantes expellant, mucus iste quo naturaliter obducuntur, singulis sedibus, nunc parcius, nunc copiosius, una egeritur. Proinde ultrò se *Indicationes* offerre videbantur, neque mihi aliud quippiam incumbere existimaui, quam ut primum acres istos humores secta vena immediate revellerem, quo facto insuper reliquam massam contemperarem, tum etiam dictos humores per Cathartica subducerem.

Hâc itaque Methodo sum usus; Quo primum accersabar die, venam cubiti tundendam suasi, eadem nocte & *Paregoricum* propinavi, & sequenti aurorâ Potionem hanc Catharticam Lenitivam, mihi familiarem. *R. Tamarind. ʒss. fol. Sennæ ʒij. Rheī ʒiſs. Coq. f. q. Aquæ Colaturæ ʒiiij. dissolve Mann. & Syr. Ros. solut. an. ʒj. m. f. Potio sumenda summo mane.* Hanc ego potionem Electuario cuilibet cum Rheī pauca quantitate parato, soleo præponere: licet enim *Rhabarbarum* Cholerae atque acrioribus quibusque humoribus evacuandis sit dicatum, attamen nisi *Mannæ* aliquid, aut *Syrupi Rosacei*,

* *Curatio.*

sacei,

sacai, vel aliud ejusmodi, ea quantitate admisceatur ut ad pleniorē Catharsin affurgat, in Dysenteriiis curandis non admodum conducit. Quandoquidem verò satis est obviū Medicamenta Cathartica etiam lenissima, & tantum *Εκκροτικά* ventris tormina intendere, spirituum etiam dejectionem, atque *Αἱματίαν* universalem ægro inferre, adventitio nampe illo tumultu quo sanguinem ac humores commovent inter operandum; ea propter solenne mihi est *Paregoricum* temporius aliquanto subicere quàm post Cathartica consuevimus, hora sc. pomeridiana quacunque, modò Catharticum suo defunctum munere videatur; quo sc. quem concitavi motum denuò sufflaminare valeam. Deinceps ad duas adhuc vices dictum Catharticum præscribo, alternis scil. diebus hauriendum; Paregoricum etiam post singulas Purgationes, quo supra monuimus tempore. Hoc insuper diebus à Purgatione vacuis tam mane quàm serò exhibendum curo, quo sc. symptomatum ferociam debellem, atque inducias impetrem, dum cum humore peccante exterminando mihi res est. *Anodyno* autem utebar maxime *Laudano liquido*, guttis nempe 16. vel 18. in Aqua qualibet Cardiacā, pro dosi una.

Post Venæ sectionem & Catharsin semel celebratam per totum morbi decursum Cardiacum quodvis è temperatioribus, ut *aq. epidem. aq. scord. comp.* & his similibus, subinde degustandum concessi. *Ex. gr. R. aq. cerasor. nigr. & fragor. an. ℥iij. aq. epide. scordii comp. & cinnamomi hordeat. an. ℥j. margarit. præparat. ℥i℥. Sacchari Crystallini q. s. adde aq. rosarum Damasc. 3℥.* (ad gustum sc. gratiorem) *mis. f. Julap. de quo cap. coch. iij. vel v. in languoribus, vel ad libitum.* Hæc autem imprimis in senioribus ac Phlegmaticis usurpavi, quo nempe spiritus magna Dejectionum vi, quo in hoc morbo usu venit, prostratos erigerem quadantenus, & refarcirem: Potus erat Lac coctum cum Aquæ triplo; aut *Decoctum album* (quod appellant) ex *C. C. & micæ panis albiss. an. ℥ij. coctis in aq. font. ℥iij. ad ℥iij. & postea s. q. sacchari albiss. edulcoratum*: aliquando etiam lac cerevisiatum; vel, ubi dejectio virium id postulaverit, *Aq. font. ℥iij. cum Vini Canarini ℥℥. simul coctæ* pro potu ordinario frigide assumebantur. Panatella item nonnunquam vescebatur, nonnunquam jusculo è carnibus ovinis macilentioribus. Grandæviores lectulo magis addixi; Aquam item Cardiacam illis familiarem liberalius indulsi, quàm infantibus aut junioribus par erat. Laudata Methodus omnibus, qui mihi hætenus innotuere, in hoc morbo vincendo facile palmam præripuit, qui perrarò ultra tertiam Purgationem duravit.

Quod si morbus præfractor his non cederet, dictum *Paregoricum* ægro exhibui singulis diebus mane, & hora somni, donec omnino convalesceret; imò quo certius adhuc hic affectus debellari potuerat, Laudanum prædictum octava quaque hora, i. e. ter spatio diei naturalis, propinare non dubitavi, idque in majore dosi quàm supra recensui, nempe ad gutt. xxv. si prior dosi fluxui cohibendo haud par fuerat. Insuper *Enema ex lactis vacci libra dimidiâ, & Theriac. Androm. sesquiuncia* sing. diebus injiciendum curavi, quod quidem in quibuscunque alvi dejectionibus mirè confert. Nec vel minimum quidem incom-

incommodi à tam frequenti Medicamenti Narcotici repetitione mihi adhuc videre contigit; (quantamlibet noxam inde sequuturam comminiscantur inex-
perti) licet plures noverim qui in morbo contumaciori idem ad septimanas
aliquot continuas quotidie usurpaverint. Hic autem admonendum, quòd cum
alvi fluxus ad *Diarrhæam* tantum assurgat, satis erit ut (Phlebotomiâ ac
Catharsi fortiori omiſſa) *Rhabarbarum* ſolum ſingulis matutinis exhibeatur,
nempe ejusdem *pulv.* ʒʒ. (plus minus pro ægri virium ratione) in *Bolum* ſ. q.
Diaſcordii concinnata addendo ol. Chym. cinnamomi gutt. ii. noctibus autem
inſequentibus *Paregoricum ex aq. Cinnamomi hordeatæ ʒj. & laudan. liquid.*
gutt. xiiij. Diætam interim obſervando qualem in curatione *Dysenteriæ* ſuprà
deſcripſi, atque etiam ſingulis diebus, ſi opus fuerit, clyſterem injiciendo
ibidem laudatum. Sed hoc obiter.

Ut unica inſtantia (neque enim pluribus Convaleſcentium exemplis, nulla
cogente neceſſitate, Lectori tædium creabo) Methodum jam à me propoſi-
tam commendatam faciam; Vir pietate atque Eruditione inſignis *Th. Belke*
S.T.P. & Comiti Sancti Albani à Sacris Domæſticis, durante hâc Conſtitutione
Dysenteriâ acutiſſima laborans, me in ſubſidium accito, ipſiſſima hac me-
thodo reſtitutus eſt.

Infantes hoc morbo correpti eodem planè modo erant tractandi; ſanguinis
tamen extrahendi quantitatè, tum etiam Medicamentorum, tam Cathartici,
quàm Anodynæ viribus pro annorum ratione imminutis; ita ut v. gr. Narco-
tici guttæ duæ infanti unius anni ſuffecerint.

Laudanum Liquidum, quod in quotidiano, ut dictum, uſu mihi erat, hanc
ad normam ſimpliciorẽ præparavi. *℞. Vini Spanici lbj. Opii ʒij. Croci ʒj.*
pulv. Cinnamomi, & Caryophyllorum an. ʒj. infundantur ſimul in B. M. per
duos vel tres dies, donec liquor debitam conſiſtentiam acquirat; Colatura ſer-
vetur pro uſu. Hanc noſtram præparationem *Laudano* Officinarum ſolido an-
teferendam virtutibus quidem non cenſeo, ſed ob formam ſaltem commo-
diorem, & majorem Doſis certitudinem, eidem antepono: cum ſc. Vino,
Aquæ diſtillatæ, aut liquori alii cuicunque inſtillari poſſit. Et proſectò non
hic mihi tempero, quin gratulabundus animadvertam, Deum Omnipoten-
tem πάντων σωτήρα εἶναι non aliud remedium, quod vel pluribus malis de-
bellandis par ſit, vel eadem efficacius extirpet, humano generi, in miſe-
riarum ſolamen, conceſſiſſe, quam ſunt *Opia*, Medicamenta ſc. ab aliquâ
Papaverum ſpecie deſumpta. Et quamlibet ſunt nonnulli, qui credulis perſua-
dere velint, omnem ferè Narcoticorum, *Opii* præſertim ipſius, virtutem ab
artificioſa ac debita, quam ſoli adhibent, præparatione pendere; qui tamen
experientiâ judice certaverit, & tam ſimplicem ſuccum à natura oblatum,
quàm ejus præparata cum diligenti obſervatione in uſum frequenter revocave-
rit, nullum ferè diſcrimen intercedere comperiet, & mirandos illos effectus,
quos edit, nativæ ipſius plantæ bonitati atque excellentiæ, non verò artificis
polydædali ſolertiæ deberi certò ſciet. Quinimo ita neceſſarium eſt in hominis
periti manu organum, jam laudatum Medicamentum, ut ſine illo manca ſit

ac claudicet Medicina, qui verò eodem instructus fuerit, majora præstabit, quam quis ab uno Remedio facile speraverit: Rudis enim sit oportet, & parum compertam habeat hujus medicamenti vim, qui idem sopori conciliando, demulcentis doloribus, & Diarrhoeæ sustendæ applicare tantum novit, cum ad alia plurima, gladii instar *Delphici*, accommodari possit, & præstantissimum sit Remedium Cardiacum, unicum penè dixerim, quod in rerum natura hactenus est repertum.

iv Hæc Methodo erant tractandæ *Dysenterie* in genere. Observandum est autem, quod cum primo quæ ingrediebantur anno, indolis magis subtilis, uti dictum, ac spiritus sæ essent, quam quæ sequentibus annis infestabant, idcirco non ita promptè Catharticis parebant Medicamentis atque illis, quæ tam sanguinem diluebant contemperabantque, quam acres istos humores, qui ex eodem in fistulam intestinale excernebantur. Quamobrem primo autumno, quo *Tormina sicca* & *Dysenteria* invadebant, Methodum sequentem constanter ad utrumque morbum abigendum adhibui, eventu ubique assipulante; donec appetente frigore eandem etiam anno eodem minus efficacem esse sentirem, atque annis sequentibus, cum jam magis a subtilitate recederet morbus, prorsus inutilem.

Ita verò processu, si æger ætate florens febricitaret, cubiti venam tundendam præcepi, atque elapsa hora una aut altera, eundem ingesto affatim liquore diluendum, ut in *Cholera morbo*, facitaram; non verò, ut illic, jusculo è carnibus pullorum, aut Lacte Cerevisiato, aut Lactis ipsius sero, quod eadem qua illic copia frigide propinandum, tepide verò inferius injiciendum curavi, nec Saccharo adjecto, nec alia re quacunque. Tormina, & Dejectiones sanguine permixtas, rejecto jam quarto Enemate semper evanescere animadvertēbam: Hoc labore exantlato, & transmissio sero lactis omni (quod duarum triumve horarum spatio fiet, si diligenter operam navaverit æger) lectulo protinus eum commisi, ubi brevi sponte sua in madorem solvebatur (à sero lactis sanguinis immixto) quem ad horas 24. continuari, minime provocari jubebam; nihil interim concedens præter Lac crudum paulo tepesfactum, quo etiam utebatur solo ad dies tres vel quatuor postquam è lecto surrexerat. Si vel ob lectuli, vel lactis usum nimis præmaturè intermissum, recidivam pateretur æger, eadem vestigia denuò repetenda erant. Hæc Methodus, si certa atque expedita fuerit, non ideo à viro quolibet prudente repudiabitur, quod fastuoso Remediorum apparatu non se venditet.

Hujusmodi *Febrem* symptomatis, qualia supra descripsimus, stipatam, iis in locis & temporibus reperiri quibus *Dysenteria* Epidemicè regnat, & Methodum hanc quam delineavimus, eidem omnino deberi, testimonio viri probi atque eruditi Doctoris *Butler* amplius confirmabitur, qui Nobilissimum *D. D. Henricum Hovvard*, à S. Maj. Regia Britannica ad *Maroccensem* in *Africa* Legatum comitabatur; quibus in regionibus, ut mihi ipse retulit, observavit *Dysenteriam* per ea tempora, uti semper, epidemicè grassari, & *Febrem*, quæ cum illa jungebatur, omnino illi similem quam depinximus; qui-

quibus ille medebatur tam in urbe *Tingitanâ*, quam aliis in locis, sive *Nostrates* essent ægri, sive *Mauri*, dicta Methodo, felici semper exitu. Quam quidem neuter alteri debemus, sed pari fortuna in eandem difficultatē incidimus. Profitebatur autem, optime istic sibi cessisse in illius morbi curatione Methodum illam, qua liquoris diluvio submerguntur *Dysenteria*. Atque existimo illego, omnino par esse ut in calidiori isto Climate longè rariùs successu careat hæc Methodus quam in nostra *Britannia*.

Primo illo Autumno quo vigeat hæc *Constitutio*, *Daniel Coxe* M. D. vir ingenio & eruditione ornatissimus, *Dysenteria* acutissima laborans, me quem consuluit suadente, ope Methodi jam laudatæ, citò, tutò, & jucundè sanatus est; post tertium sc. quartumve Enema, dum lecto affiderem, & Tormina & Dejectiones sanguineæ evanescere; nec qualibet re alia, præter lecti ad dictum spatium patientiam, & Lacteam Diætam, ad sanitatem redintegrandam opus habuit. Eodem planè modo & idem postea alios quam plurimos hoc malo affectos restituit exeunte eo Autumno. Anno autem proximo, illum etiam idem molientem spes fefellit.

Jam olim diximus, quod sæpenumero hic morbus, si diutius excurrat, intestina seriatim omnia deorsum versus afficiat, donec tandem omnis ejus vis in *Rectum* decumbat cum assidua desidendi cupiditate, qua nihil præter mucosum quiddam & subcruentum excernitur. Hoc si fiat, frustra erit, me iudice, qui medicari sataget vel quavis Methodo prædicta, vel Clysteribus Abstergentibus, Glutinantibus atque Astringentibus, quæ pro variis ulceris, quod supponitur, temporibus injici solent; vel etiam Fotu, & Inseſſu, Suffumigiis, ac Suppositoriis dictos scopos respicientibus. Liquet enim, hoc ab ulcere *Recti* non procedere, sed ex illo potius, quod *Intestina* quibus gradibus vires resumpserint, iisdem etiam materiæ morbificæ reliquias in *Rectum* deturbaverint; quod quidem indefinenter proripitatum singulis sedibus mucosam illam materiam, qua ex naturæ providentia intestina duplicantur, elidit. Corroboranda est itaque pars affecta, quò possit, aliorum intestinorum exempla, jam fatiscientes mali reliquias funditus eliminare. Hoc autem ea sola præstabunt, quæ corpori in genere vires adjicere apta nata sunt. *Topicum* enim, qualecunque id demum fuerit, parti dolenti applicatum, cum alienum quid sit, contactu moleſto debilitatem magis adferet, quam robur subministrabit. Tolerandum itaque est ægro, donec Diætâ Analeptica & liquore aliquo Cardiaco, qui palato arridet maxumè, pro libitu ingesto, revocari possint vires, quibus redeuntibus, pari passu suaque sponte proripiet se hoc *Tenesmi* symptoma.

Accidit etiam nonnunquam, licet rarò admodum, ut *Dysenteria* sub initio non rite curata, particulare subjectum ad annos aliquot discruciet, integra sanguinis massa Crasin quasi *Dysentericam* jam indepta, unde acres calidique humores intestinis continuo suppeditantur, ægro interim singula vitæ munia modiocriter bene obeunte. Hujus Specimen se mihi obtulit non ita pridem in muliere quadam meis ædibus vicina, quæ per tres annos hujus *Constitutio-*

his posuerunt hoc malo continenter exercebatur. Cum remedia quam plurima esset experta antequam ad me accederet; Venæ-sectionem tantum, missis cæteris præsidis quibusque celebrandam censeui, quam ut sæpius repeterem, longioribus tamen intervallis, tum sanguinis color, Pleuriticorum sanguinis æmulus, tum insigne illud quod post singulas vices magis ac magis auctum sentiebat levamen, mihi addebant animos; cuius opem tandem pristinam sanitatem consequuta est.

Antequam finiam, hoc est notandum, quod tamen in his annis quibus Dysenteria adeo epidemicè grassarentur, evacuationes prius memoratæ prorsus necessariae erant antequam ad usum Laudani deveniret, ut si tamen in Constitutione quavis huic morbo minus faventi, ista tuto omitti possint, & accuratio compendiosiori viâ, solo nempe usu Laudani, absolvi, eo quem descripsimus modo. Atque hæc de *Dysenteria* dicta sunt.

COAPUT IV

Febris Continua parvis Anni 1669, atque integrorum annorum 1670, 71, 72.

EO ipso tempore, quo sæviebat *Dysenteria*, & *Febris* quædam illi simillima, quæ *Dysentericis* accidere sæpè solebat, una exorta est, quæ quidem non eos tantum; quos jam sauciaverit *Dysenteria*, sed ab illa prorsus immunes, (nisi quod subinde, at raro, tormina haud quidem atrocia, nunc cum Dejectionibus, nunc sine illis, paterentur ægri) pariter incessit. Easdem enim ubique, seu causas manifestas & apparentes habuit, quas *Dysenteria*, eadem etiam per omnia symptomata, quæ *Dysentericorum* Febrem comitabantur. Ita ut, si evacuationes per alvum *Dysenteria* laborantium excipias, & quæ ab istis necessariò pendebant symptomata, dicta *Febris* ejusdem prorsus naturæ cum ipsis *Dysentericis* videretur; & deinceps per hujus Constitutionis decursum omnem, parem cum illis subit symptomatum quorumlibet alterationem, eisdem scilicet differentiis, quoad Augmentum, Statum & Declinationem, affecta, quibus afficiebantur in genere *Dysenteria*. Hæc itaque *Febris Dysenterica* mihi audiebat.

Memorata *Febris* nonnunquam, uti dictum, cum alvi Torminibus, sed minoribus, ingrediebatur (prioribus annis maxime, quibus invasio) vel ista ad eam post accedebant, sæpius verò nulla erant. Sudores, qui in Febre Constitutionis prægressæ copiosissimi erant, ut supra notavimus, in hac rari ac pauci, sed Capitis dolor in hac quam in illa specie immanior: Linguae agrorum, licet humidæ atque albæ, ut in altera specie, crassæ in super pelliculâ oblinebantur. Rarius hæc per *Ptyalismum* sibi fugam quærebat, quod in alia non erat infrequens. Ad *Aphthas*, cum jam discessum meditaretur, erat propensior, quam vel prior ista, vel alia quævis *Febris* species, quam mihi hactenus contingit videre, huic etenim perquam familiare fuit (uti & Febri etiam illi,

illi, quæ Dyſenteriis ſuperſeuit) cùm jam ferè deſineret, materiam foedam atque acrem è ſanguine in os atque gulam deponere, unde naſcebatur dictum ſymptoma, in iis præſertim, quos contumacior morbis diutius maceraverat, & regimen juſto calidius, amplius infirmaratur.

Eodem etiam modo generabatur *Aphthæ* iſtæ, quæ *Dyſenteriis* pervicacioribus cùm Febrè conjunctis nullo non die accidebant; præſertim ſi præter regimen calidius evacuationes etiam per alvum medicamentis aſtringentibus prius fuerint coërcitæ; quàm morbi fomes è venis Phlebotomiâ & Catharſi exigeretur.

Hæc erant certiffima huiusce Febris *ἡγεμόνα*, reliqua ſymptomata variabantur quotannis; & pro manifeſtis aëris qualitatibus certis quibuſdam temporibus, & pro Dyſenteriae in genere progreſſu, tum etiam vario ejusdem ſtatu. Sed ut hæc clariùs intelligantur, cùm hoc præſertim artificio in *Epidemicorum* productione triumphet natura, rem paulò altiùs repetam. Notandum eſt itaque, quod, licet aëris *qualitates manifeſtæ* non eam vim cuilibet *Conſtitutioni* imprimant, ut cauſæ ſint Epidemicorum, qui ad illam propriè referuntur *Productivæ*, (cùm à recondita atque inexplicabili ejusdem conditione fluant iſti,) pro tempore tamen in eos habent poteſtatem, & proinde intro mittuntur *Epidemici*, aut etiam excluduntur, prout illis favent qualitates manifeſtæ, vel adverſantur; *Univerſalis* autem *Conſtitutio* eadem prorsus manet, ſive eam promoverint iſtæ, ſive quadantenus retardarint. Unde etiam eſt, quod, cùm variis *Epidemici* in eandem incidant *Conſtitutionem*, hic aut ille morbus particularis eam potiffimùm tempeſtate ſe exerat, ad quam ſenſibiles aëris qualitates eundem deſtinaverint, atque alteri demum *Epidemico* locum cédât, quem ſc. diverſæ ſubſequentis temporis qualitates advocarint. Ex quo fit, ut Febris *Stationaria*, quæcunque demum illa ſit, quæ ad *Epidemicum* eo anno regnantem attinet, *Julio* menſe potiffimùm ſæviat, cuius initio plures hominum catervas ſimul aggreditur; *Autumno* verò appropinquante, magnò illi *Epidemico*, à quo annus inſignitur, rursus invaleſcenti decedit, & parcius infeſtat, ut quilibet ſemper annus ſatis docet. Excaleſcēt enim à prægreſſa æſtate hominum corpora Febres, *Conſtitutioni Generali* propriæ quæ ſunt, promptiffimè eodem tempore invadunt, appetente verò *Autumno*, quo qui prædominatur *Epidemicus*, faſces reſumit, iſtis omnino recedendum eſt.

Sicuti verò nominatæ Febres ſenſibili aëris Qualitati acceptum referre debent, quòd jam hoc menſe exoriantur; ita etiam ſymptomata varia, à ſua natura, quatenus ab ejusmodi *Conſtitutione* generali pendent, prorsus aliena, à manifeſtarum qualitatibus, quæ in illum incidunt *menſem*, peculio ſumunt mutuo. Hinc eſt, quòd quibus annis dictæ Febres hoc menſe turmatim ingrediuntur, variis ſymptomatis novis ſtipantur, præter illa, quæ eis ſunt propria, quatenus ab ejusmodi *Conſtitutione* generali procreantur, eadem tamen ipſæ maneant, licet apud vulgus ob *πανωμίαν* diverſitatem *Novæ* quot annis Febres audiant. Ad paucas verò tantùm ſeptimanas perſeverant

symptomata hæc magis peculiariora, quibus elapsis propria solummodo symptomata, quæ eis accidunt, quatenus Febres sunt *Stationaria* talis *Constitutionis*, reperiuntur per reliquum annum.

Hoc tum in aliis liquebat Febribus, tum magis peculiariter in *Dysentericis* mensis *Julii* 1671. & 72. in quarum *priore* vehemens ægritudo, & Bilis æruginosa, cum magna in Diarrhoeam propensitate sub morbi finem, continuo observabantur. In *posteriore*, doloris sensus in partibus corporis musculosis, Artubus maxime, ad Rheumaticorum fere dolores accedens: Faucium insuper inflammatio, mitior tamen quam in Angina laborantibus. Utraque tamen hæc in eadem *Febre specifica* coibant; & eadem planè medendi ratione utraque profigebantur, differebant autem respectu tantum qualitatum sensibilium, quibus donabantur tempora illa, in quæ incidebant. Improvisa verò subitaneaque harum Febrium circa dicti mensis initium erupcio, & nova ad tempus aliquod peculiarium symptomatum facies, (licet neque specie differant, neque methodo medendi, quam postulabant, à Febre illa, quæ integrum percurrerat annum.) Hæc, inquam, plus satis evincunt, quam sit difficile certam Febris speciem omni tempore e Phænomenis elicere, licet eam satis rectè possit dignoscere, qui ad alios morbos eodem anno ingruentes diligenter attenderit, & propria insuper Febris symptomata, quæ ad hunc vel illum *Evacuationis* modum spectant, ritè observaverit. Nec parum fecit ad investigandam Febris speciem consideratio, siue Methodi, siue Medicamenti, a quibus eadem minimo cum negotio expugnatur.

Quod ad reliquias symptomatum, Febres *Stationarias* comitantium; differentias spectat; *varia Constitutionis tempora* eæ tantum respiciunt, atque eo nomine vel sunt intensiora, vel remissiora, illa prout intenduntur, vel etiam remittuntur, symptomata aliorum Epidemicorum, ad quos ipsa pertinent.

Sed ut ad rem revertamur; *Febris* hæc, quæ cum *Dysenteria*, ut supra dictum, est ingressa, parem cum iis passum tenuit, nisi quòd se paulum subduceret, dum alii horum annorum Epidemici prævalerent; persistebat tamen illa, nunc plures, nunc pauciores petens, durante hac *Constitutione*.

* Pro huiusce *Febris Curatione*, cum observassem, uti prius dictum, Phænomena *Febris Dysentericorum* quamplurimum eadem planè esse cum illis, quæ huius anni *solitarias* comitabantur, consentaneum mihi videbatur sanatos iri ægros meos, si evacuationem illam quandatenus imitarer, quâ natura materiam illam corrosivam atque acrem, quæ & ipsius *Dysenteria*, & supervenientis Febris causa *Continens* est, solet ablegare. Ac proinde eadem ipsâ Methodo, tum quoad Venæ sectionem, tum repetitas Purgationes, Febrem hanc aggressus sum, quam in *Dysenteria* curatione supra fufius deduximus; Nisi quòd *Paregorica* Purgationibus interjecta non hic juvare, sed & obesse deprehenderim, (secus atque in *Dysenteria*) cum ab his detineretur materia illa, quæ Catharsi eliminari debuerat. Pulticulâ Avenaceâ, Hordeaceâ, Panatellâ, & similibus sub primis morbi diebus victitabat æger; potus erat Cere-

* *Curatio.*

vifia

visia tenuis tepefacta : Post celebratam vero semel iterumve Catharsin nulla suadebat necessitas pulorum carnibus, aut similibus. Eueptis ægro interdiceret, cum hæc per Purgationem Medicatio ea indulgeat, quæ non poterant concedi, si aliæ viæ insisteretur. Tertia ut plurimum Purgatio, interposito semper die, morbum absolvit; neque tamen perpetuum id fuit, sed aliæ insuper nonnunquam instituendæ erant. Si Febre jam pulsa, fractiones adhuc essent ac magis effoctæ ægri vires, atque is tardius convalesceret; [quod *Histericis* frequentissime accidebat] *Laudano* in parva dosi exhibito eandem restaurare, & spiritus transfugas ac dissipatos in desertas stationes revocare conabar; raro autem remedium illud repetebam, neque unquam præscripsi, nisi bi-duo triduove à postrema Catharsi. Nihil verò æque ad renovandas vires refocillandosque spiritus faciebat, atque auræ liberior usus mox ut Febris recesserit.

Ansam autem ad praxin hanc instituendam hinc primum arripui, quod nempe, nascente ferme *Constitutione* hac, dum irrequieto sollicitoque animo novæ hujus Febris naturam volutarem, ad juveniculam mihi vicinam advocabar; Febricitantem quidem illam atque acerbissimo incipitis dolore fere enectam, aliisque symptomatis, quibus *Febrem Dysentericam* onerari jam diximus: Hæc cum à me interrogaretur, & de modo, quo Febris primum invadebat, & de ejusdem duratione, falsa est se à *Dysenteria*, quæ tum ubique fere grassabatur, a quatuordecim retro diebus fuisse liberatam, cui sive fuit sponte discedenti, sive medicamenti ope depulsæ protinus successit dicta Febris cum dolore capitis; Quibus ego me rectissime occurrere posse conjectabam, si *Dysenteriae* loco aliam evacuationem substituerem, ejus simillimam, quia præclusa Febris oborta est; ac promde methodo supra laudatâ eandem restitui; Atque huic quidem se promptissime dedebant hujus *Constitutionis* Febres. Semper enim rebar non sufficere ad comprobendam in *Acutis* medendi rationem, ut feliciter ea cederet, (cum ab imperitissimarum muliercularum temeritate sanentur nonnulli) sed requiri adhuc, ut morbus nullo negotio victus quasi suo pte genio cedat, atque abitum affectet, quantum ejus fert natura. Sed hæc obiter.

Ineunte *Junio* 1672. Vir Nobilissimus, ac Prudentissimus Dominus Comes *Salisburyensis* hac Febre laborans cum torminibus, (alvo tamen non soluta) accersiri me jussit, & Methodo propositâ sanitati redditus est. Neque alia mihi ulla fuit opus, dum hæc staret Febris.

In adolescentibus, aliquando & in paulò provectoribus, Febris hæc caput nonnunquam petebat, unde delirabant, non quidem ut in aliis Febribus Phreneticorum more, sed quasi stupore, ad *Carum* proximè accidente, percussi. Hoc illis præ cæteris accidebat, qui sub morbi principio in sudoribus quoquo modo extorquendis operam inauspicato collocarant. Non id mihi contingebat Felicitatis, ut his sublevandis per tunc temporis essem, licet nullum non moverem lapidem, nullumque non e remediis hactenus notis in suppetias advocarem. Atque hæc de Febre hujus *Constitutionis* possint sufficere.

CAPUT V.

Morbilli Anni 1670.

Sub initio *Januarii* 1670. (ita ut solent præmaturè) *Morbilli* sunt ingressi, atque indies magis invalescebant, donec instante *Verno Æquinoctio* adepti, exinde iisdem gradibus imminuti tandem *Julio* sequenti penitus extinguerentur. Horum jam ego Historiam (cùm omnium, quos hactenus vidi, in suo genere perfectissimi illi mihi videantur,) certam atque exquisitam, quatenus mihi tum observare licuit, literis consignabo.

Ortum habet hic morbus, atque Occasum temporibus supra notatis. *Infantes* plerumque aggreditur, omnesque adeò ex illis, iisdem mœniis conclusos. A rigore atque horrore, calorisque & frigoris, quæ se mutuò *primo* die expellunt, inæqualitate tragœdiam orditur; tandem affulgente *secundo* die in Febrem consummatam desinit, vehementi ægritudine, siti, inappetentia, linguâ albâ, (non verò siccâ) tussiculâ, capitis atque oculorum gravedine, & somnolentiâ perpetuâ stipatam. Plerumque etiam è naribus atque oculis stillat humor; atque huiusmodi lacrymarum in oculos effusio certissimum est signum morbillorum ingruentium. Cui & hoc addendum haud minus certum, quod etsi in facie, exanthematum specie, hic affectus ut plurimum se prodit, in pectore tamen non tam exanthemata quàm maculæ latæ & rubræ superficiem cutis non superantes, conspiciuntur, sternutat æger tanquam à suscepto frigore, intumescunt palpebræ, (paulò sc. ante eruptionem) vomit, sæpius tamen laborat *Diarrhæa* cum Dejectionibus coloris subviridis. Dentientibus autem maximè id convenit. Infantes etiam per hunc morbum solito sunt morosiores. Ingravescent ut plurimum symptomata ad *quartum* usque diem, quo tempore plerumque (licet ad diem *quintum* aliquando differantur) circa frontem & reliquam faciem maculæ parvæ rubræ, pulicum morsibus persimiles, prodire incipiunt, quæ tam numero quàm magnitudine auctæ, racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis variæ figuræ, interfingunt. Quæ quidem maculæ rubræ è parvulis quibusdam papulis rubris haud longè ab invicem diffitis, supra cutis superficiem paululum elevatis, conflantur, quarum protuberantia, digito leviter admoto, tactu potest deprehendi, licet oculorum longius remotorum aciem ferè effugiat. A facie, quam primò solum occupant, sensim ad pectus ventremque, crura deindè ac tibias se diffundunt hæ maculæ, licet truncum atque artus rubore inficiant tantum, nulla eminentia sensibili cutis æquabilitatem transgressæ. Eruptione *Morbillo- rum* non perinde deliniuntur symptomata, atque *Variolarum*; Vomitus tamen post eruptionem nunquam observavi; Tussicula nihilominus, Febrisque intenduntur, cum spirandi difficultate, oculorum debilitate defluxioneque in eisdem decumbente, somnolentiâ perpetuâ, atque inappetentiâ, uti prius adhuc perseverantibus. Die *sexto*, aut circiter, frons & facies asperescunt,

emo-

emorientibus pustulis, ruptaque cuticulâ, & per id temporis maculæ per reliquum corpus & latissimæ sunt, & maximè rubescunt. *Octavo* circiter die maculæ in facie evanescunt, & vix in reliquo corpore cernuntur; *nono* verò nullæ sunt prorsus, facie atque artubus, quandoque & toto corpore, quasi farinâ conspersis, particulis scilicet disruptæ cuticulæ paulum elevatis & vix cohærentibus, quæ morbo jam abituriente in frusta distrahitur, & postea à toto corpore squamularum formâ decedit. Evanescunt itaque *Morbilli* die ferè *octavo*, quo tempore vulgus (à spatio quo perdurare solent *Variolæ*, deceptum) eisdem introverti affirmat, licet reverà illi cursum à natura destinatum absolverint, & symptomata quæ iisdem recedentibus superveniunt ex eo nata autumat, quod iusto citius se intro *Morbilli* receperint. Observare enim est, Febrem atque spirandi difficultatem tunc temporis augeri, importunitus urgere Tussiculam, ita ut nec interdiu, nec etiam noctu ferè somnus possit obrepere. Infantes præsertim sub regimine calidiori, aut, qui calidioribus usi sunt medicamentis ad promovendam Morbillorum eruptionem, huic malo sunt obnoxii, quod Morbillis jam facessentibus se ostendit, unde in *Peripneumoniam* conjiciuntur; quæ plures jugulat, quam aut *Variolæ* ipsæ, aut symptomata quodcunque ad eum spectans morbum; licet omni prorsus periculo vacent *Morbilli*, si modo perite tractentur. His etiam non raro accidit *Diarrhœa*, quæ vel morbum statim excipit, vel etiam ad plures septimanas excurrit, post morbi, omniumque ejus symptomatum fugam; haud sine magno ægri discrimine, in quo abhinc orta spirituum profusione continuâ, versatur. Aliquando etiam post regimen intensè calidum Exanthemata livescunt primò; mox nigrescunt; id verò *Adultis* tantum contingit, de quibus conclamatum est, ubi primùm nigredo ista conspicitur, nisi Phlebotomia & temperationis regiminis refrigerio iis acturum subveniatur.

* *Morbillis* ut naturâ, ita & medendi, quam sibi poscit hic morbus, ratione, cum *Variolis* satis convenit: Medicamenta, & regimen calidiora periculi plenissima sunt, utut frequenter in usum revocentur ab ignaris ægrorum Curatricibus, eo animo ut morbus à corde procul submoveatur. Feliciter præ aliis mihi cessit methodus illa, quâ æger ad dies binos solum, ternosve ab eruptione lecto adstringebatur, quo sanguis leniter pro morbi genio particulas inflammatas facillè separabiles, à quibus ostendebatur, per cutis spiracula diffaret, nec lodicibus, nec igne, præter modum, quem sanus tenebat, adjectis: A carnibus quibuscunque arcebam, juscula avenacea, hordeacea, & similia, nonnunquam & pomum coctum concedebam; Potus vel erat Cerevisia tenuis vel Lac cum Aquæ triplo coctum. Tussim, quæ huic morbo ferè assidua est, decocto aliquo Pectorali subinde hausto delinitam volui; uti etiam eclegmate aliquo eundem scopum attingente. At præ reliquis *Diacodium* omni nocte ab ipso morbi insultu per totum ejus decursum exhibendum curavi. Ex gr. ℞. Decoct. pectoral. ℥jss. syr. violac. & capill. Veneris an. ʒjss. mis. f. Apozema. Cap. ʒiij. vel iiij. ter vel quater in die. ʒ. ol. amygdal. dulc. ʒij. syr. violac. & capill. Ven. an. ʒj. sacchari cand. albi q. s. mis. f. eclegma, de quo sæpius

* Curatio.

Q

lam.

lambat, præcipuè quando tussis urget. R. aq. cerasor. nigr. ℥iij. syr. de meconio ℥j. mis. f. haustus, sumendus sing. noctibus. Si verò infans fuerat æger, minuenda erat tam Pectoralium quàm Narcotici dosis, pro ratione sc. ætatis.

Rarissimè perit qui hoc utitur regimine; nec præter necessaria atque inevitabilia morbi symptomata, novis insuper malis atteritur: Tussis præ reliquis fatigat; à qua tamen nihil est periculi, nisi morbo jam prætergresso, cumquè adhuc per septimanam unam aut alteram persistat, auræ liberioris usu, ac remediis Pectori dicatis, haud difficulter fugatur; quin imò sponte sua & paulatim decrescit & tandem fatiscit.

Si autem æger à Cardiacorum, vel Regiminis justo Calidiorum usu, post eorum discessum, (quod valdè est familiare) Febre vehementi atque *Dyspnæa* aliisque Accidentibus, qualia *Peripneumonicos* solent affligere, in vitæ discrimen adducatur; felicissimo semper eventu vel tenerrimorum infantum venas in brachio secui, eductâ ea sanguinis quantitate quam ætas viresque indicarent. Quandoque etiam, urgente morbo, Phlebotomiam iterare haud sum veritus. Profectò haud paucos Infantes hoc statim symptomate enecandos, benedicente summo Numine, misso sanguine eripui. Infantibus autem accidit illud post *Morbillorum* recessum, quibus ita est exitiale, ut inter præcipuos *Parcarum* ministros jure habeatur, plures jugulans quàm vel ipsæ Variolæ; nec dùm mihi visus est qui certa alia methodo, eidem potuit occurrere. Quin & *Diarrhæa*, quam *Morbillos* excipere diximus, Venæ-sectione pariter sanatur; cum enim halitibus inflammati sanguinis in intestina ruentibus ortum suum debeat, (quod etiam in *Pleuritide*, *Peripneumoniâ*, aliisque qui ab inflammatione creantur, morbis usu venit) à quibus illa ad excreationem stimulantur, sola Venæ-sectio levamen adferet, à qua tum revelluntur acres isti humores, tum etiam sanguis ad debitam redigitur temperiem.

Nec est cur quis miretur me in teneris infantibus Venæ-sectionem instituendam suadere, cum sanguis, quantum ego hætenus potuerim observare, haud minus tutò ex eorum venis quàm ex adultorum extrahatur. Et profecto ita est illa necessaria, ut nec symptomati memorato, nec aliis quibusdam quæ infantibus accidere solent, omissa phlebotomia certo mederi valeamus. Exempli gratia, quo pacto Puerorum *Dentitionum Convulsionibus*, quæ nono decimoque mense superveniunt, (cum Gingivarum intumescencia doloreque, à quibus comprimuntur nervi atque irritantur, unde etiam Paroxysmi isti nascuntur) sine Venæ-sectione opem feremus; Quæ sola in dicto affectu *specificis* quibuscunque vel decantatissimis, quæ hætenus innotuere, longè est anteferenda; quorum nonnulla adventitio calore nocent etiam, & dùm occulta aliqua proprietate morbo adversari creduntur, manifesto calore eidem militant, atque ægrum ad plures deducunt. Prætereò impræsentiarum ingens illud solatium quod adfert Venæ-sectio Infantum *Pertussi*, (quam Nosrates vocant *Hooping Cough*) in qua Remedia quælibet Pectori dicata longò post se linguunt intervallò.

Quod de horum symptomatum *Morbillis* decedentibus supervenientium, curatione jam diximus, nonnunquam etiam eisdem florentibus potest competere,

petere, si nimirum artificiali, si fas est dicere, atque adscititio calori ea debeantur. Hoc anno 1670. famulam Dominæ *Annæ Barington* hoc morbo laborantem, unâ cum *Febre*, *Dyspnœa*, *Maculisque purpureis* corpus omne deturpantibus, aliisque symptomatis quàm plurimis periculosis, Medicus invisebam; cum regimini, Medicamentis, quæ satis multa usurpaverat, calidioribus ista omnia tribuerem, sanguinem à brachio extrahendum curavi, & Ptiſanam Pectoralem atque Refrigerantem sæpe assumendam præscripsi, quorum ope, & regiminis simul temperationis, & maculæ, atque alia omnia symptomata pedetentim evanescabant.

Hicce Morbus mense *Januario*, ut dictum est, natus, ad *Æquinoctium* usque *Vernum* crescebat indies; à quo tempore imminuta paulatim vi, sequenti *Julio* planè defuit; nec est reversus per omnes annos quibus hæc *Constitutio* dominabatur, nisi quod insequenti Vere, nonnullibi, licèt rariùs, se ostenderet, de *morbillis* hæc dicta sunt.

C A P U T VI.

Variolæ Anomalæ Annorum 1670, 71, 72.

Morbilli prædicti (quod jam supra innuimus) *Variolarum* speciem ab illa quam propagaverat *Constitutio* præcedens, diversum introducebant, eodem ferè cum illis tempore ingredientem, initio scil. *Januarii* 1669. 1670. quæ licèt non usque adeo Epidemica atque ipsi Morbilli eosdem tamen comitabatur per omne illud tempus quo dominabantur, atque iis etiam fatiscantibus, per residuos hujus *Constitutionis* annos perseverabat, *Dysenteriis* nihilominus primas concedebat, sub auspiciis *Autumni* iisdem faventis atque amicissimi, grassantibus; *Hyeme* verò, *Dysenteriis* aliena tempestate pressis, denuo recrudebat hæc de qua agimus species. Atque hunc servabant ordinem per singulos hujus *Constitutionis* annos, nisi quòd postremo quo illa vigeat *Autumno*, Anno sc. 72. (languescente jam ista *Constitutione*, & *Dysenterias* jam exolescentes segnius promovente) *Variolæ* præter solitum hoc quoque tempore grassabantur, atque ita pares *Dysenteriis* concurrebant, ut haud facile esset dictu, quas morbus plures occuparet, licèt quantum ego conjectando valui, prævalere *Dysenteria* adhuc videretur. Quin & hæ etiam *Variolæ*, ad exemplum Epidemicorum aliorum quorumlibet, primo statim insultu atrociores erant, atque indies increbrescebant donec ad statum pervenissent, quem semel transgressæ, tum quoad symptomatum vehementiam, tum ægrorum numerum, senum imminuebantur.

Sed ut particularia earum Phænomena referamus; haud parum præter opinionem mihi primum comparebat hoc *Variolarum* genus, cum animadvertirem istud quàm plurimis Phænomenis insignioribus ab eò differre quod produxerat *Constitutio* præcedens, & in quibus observandis me operam satis

sedulam olim collocasse rebar. Hæc tantum earum Phænomena ab alterius generis Phænomenis diffidentia, impræsentiarum tractabo, prætermiſſis iis quæ cum Variolis ita prolixe ſuprà deſcriptis habebant communia.

Discretum Variolarum genus his tantum a genere *Discreto communi* alterius *Constitutionis*, diſterminabatur: Primo, quod cum in iis, quoties erant *interſinctæ*, Eruptio diem *quartum* prævertere non ſoleret, hic in *tertium* plerumque incidebat; quod *Confluentibus* ſolenne quidem eſt. Deinde non ad eam magnitudinem, procedente morbo, hic aſſurgebant puſtulæ atque in alio genere; magis autem exalperabantur in minori mole, & ſub diebus ultimis ubi jam maturuerant *nigræ* frequentius viſebantur. Illud etiam addam, quod nonnunquam, licet rarius, ægrum etiam pauciſſimis notatum puſtulis, *Ptyaliſmus*, haud ſecus atque in *Confluentibus*, exerceret. Ex quibus conſicitur, *Diſtinctas* hujus *Constitutionis* Variolas, ad *Confluentium* naturam propius accedere, atque *Inflammationis* magis intenſæ eſſe participes, quam quæ in *Diſtincto* Genere uſu venire ſolet.

Confluentes verò ab aliis, quas per alios annos ego obſervaveram, *Confluentibus*, in multis, quæ jam recenſebo, discrepabant. Nunc *ſecundo* nunc *tertio* die ſe primum monſtrabant, ſpecie tumoris ſubrubri, atque uniformis, vultum omnem contegentis, *Eryſipelate* quidem denſioris, nullo ferè viſibili puſtularum diſcrimine; reliquum corpus congeries quædam (ceu panni latiores) ex infinitis propemodum puſtulis rubris efferatis in unam conflatae variegabant, inter quas ſparſæ, in femoribus præcipue, veſiculæ quædam ſatis conſpicuæ, ambuſtorum ad inſtar, ſero limpidiore diſtentæ eminebant, quod quidem diſrupta ſubinde pellicula copioſè effluebat, ſubjecta carne nigredine & Sphacelo quaſi affecta. Rarius autem occurrebat hoc tam dirum ſymptoma, idque primo tantum menſe quo hæc ſpecies regnabat: Quo tempore inter alios ita male multatos, ineunte *Januario* 1669. 1670. accerſirme curavit vir probus, nomine *Collins*, Zythepſa in Parochia *S. Ægidii*, cujus filius adhuc infans veſiculas habuit in femoribus Juglandem nucem exæquant, ſero limpidiore repletas; quibus diſruptis ſubſtrata caro quaſi mortificata omnino comparebat, atque non ita diu poſt æger ſatis conceſſit; quæ & eorum omnium ſors fuit, quos hoc tam funeſto ſymptomate correptos vidi unquam. Die *undecimo* circiter, pellicula alba reſplendens tumori ſubrubro, variis faciei partibus, & paulatim vultui omni obducta eſt. Pellicula hæc alba brevi poſt materiam quandam cruſtoſam ſplendefcentem eructabat, colore quidem neque flavo, neque fuſco, (qui duo in aliis Variolarum ſpeciebus reperiuntur) ſed rubro ſaturato, concretum ſanguinem imitante, qui matureſcente puſtula ad nigræ indies magis accedebat, donec tandem facies integra nigredine fuliginis omnino æmula, tingeretur; Cumque in alia Variolarum *Confluentium* ſpecie dies *undecimus* in maximum vitæ diſcrimen ægros adduceret, & plerisque emorientium ſupremus eſſet; in hac ſpecie æger niſi regimine immoderate calido oppreſſus mortis refrigerium maturius præoccuparet *decimum quartum* ut plurimum diem, aliquando etiam *decimum ſeptimum* expecta-

expectabat, quo demum elapso salva res erat. Notandum est tamen, quod qui lethalibus istis vesiculis ac mortificatione, quæ nonnullis primo mense quo hæc species invadebat accidisse memoravimus, Libitinæ destinabantur, intra paucos dies ab eruptione interibant.

Et Febris, & symptomata alia omnia quæ vel præcedebant, vel comitabantur hoc Variolarum genus, graviora erant quam in præcedente, & Inflammationis adhuc majoris manifesta dabant indicia, Ægri ad Salvationem erant procliviores; Pustulæ & efferatiores, & mole longè minores; ita ut non facile, ubi primum apparebant, ab *Erysipelate* quis eas discreverit, vel etiam à *Morbillis*; nisi quod hi ex die Eruptionis, & aliis signis in historia morbillorum supra recensitis, certò innotescant. Pustulis decidentibus furfures diutius hærebant, foedioraque stigmata inurebant cuti.

Operæ pretium est & illud adjungere, quòd durante hac anni *Constitutione*, quàm tam epidemicè sæviebant *Dysenteria*, *Variolæ* regimine justo calidiore provocatæ per *Dysenteriam* nonnunquam viam sibi facerent, quod ne semel accidisse hætenus quidem animadverteram.

Observare autem convenit, *Variolas* hæc non ita diris symptomatis per omnia sua tempora fuisse stipatas; postquam enim binos exegerant annos, tertio, sc. 1672. mitescere cœperunt, & exuto nigro colore, paulatim ad flavum illum, & *favorum* similem, accedebant, qui *Variolis Legitimis* maturefcentibus est proprius, ita ut postremo hujus *Constitutionis* anno benignæ planè essent & boni moris, habita generis ratione. Quo non obstante, satis liquebat illas ad aliam prorsus Classem relegandas esse, ex pustularum nimirum exiguitate tam eximia, ad salivationem dispositione, atque aliis.

* Quamlibet ob causarum Differentiæ cujuslibet specificæ qua immergimur, ignorantiam, impossibile fuerit *rationem* harum Variolarum *formalem* comprehendere, quatenus ab illis, quas alia promit *Constitutio*, contra distinguuntur, mihi tamen liquidò constabat ex singulis Phænomenis *inflammationem* in his quam in illis longè immaniore fuisse, ac proinde omnem medendi rationem in eo stare, ut pluribus adhuc repagulis sisteretur effrænata sanguinis Ebullitio. Id autem maximè efficiebatur (post *Hypnotica* dicto modo exhibita) regimine temperato, indulgendo sc. ægro usum liberaliorem liquoris alicujus qui non eum excalesceret, sed potius fervidissimum illum æstum (quo hic morbus, pustulis maximè ad maturitatem jam pervenientibus, miseros præ cæteris quibusque morbis fatigat atque exurit) illico commitigaret. *Decoctum Album* dictum, ex pane sc. & C. C. exigua quantitate in multa aqua factum, & Saccharo dulcoratum hic juvabat; at Hydrogala è tribus Aquæ partibus & Lactis una simul coctis, & ægri palato & votis magis ut plurimum, refrigerando respondit; nec eo tantum profecit ingesti liquoris copia, quo insignem calorem, cum *Maturationis* Febre præcipuè vigentem, restingueret, sed quatenus Ptyalismum etiam promoveret, atque eundem diutius protraheret, quam poterat fieri si æger nimio æstuarer calore. Præter hæc omnia, sæpenumero ita bene cessisse liquores hosce affatim haustos

observavi, ut eorum usu *Variolæ*, quæ cum pessimis *Confluentiæ* signis exhibant, progrediente morbo *Distinctæ* sint factæ; pustulæ quæ maturescentes rubram primò, mox nigram materiam aliter evomuisent, flavissimæ comparerent; pro efferatis insuper atque minutulis, *benigni* atque optimi moris haberentur.

Nèque etiam *Fluxus Mensium*, qui foeminis hoc morbo laborantibus haud infrequens accidit, liberalem horum liquorum usum quicquam prohibet; imo verò & suadet, si nempe tempore non solito isti fluant. Etenim non jam alia de causa periclitantur foeminæ, nisi quod sanguis ab immodico morbi calore plus justo attenuatus, qua data porta ruat, naturæ ductus sequens; præsertim ubi noxia Curatricum temeritas, regimine calidiori, & *Decocto C. C. cum floribus Calendulæ, &c.* adhibitis, oleum igni affuderit. Quicquid autem sanguinem potenter diluit contemperatque, licet non immediate, in quantum tamen ejusdem fluxum cohibet, tum pustulis, tum faciei manuumque tumori in statu conservandis necessario conferet: cum ex adverso Remedia calidiora, licet ad hunc scopum rectius videantur collimare, cum tamen jugem hunc sanguinis fluxum promoveant, longissimè aberrant. Quinimo nec dubium mihi est quamplurimas mulieres hoc errore periisse, dum sc. Assistentes, ne pustulæ ob sanguinis fluxum considerent, veriti, malo huic Cardiacis medicamentis, & regimine adhuc calidiori adhibitis occurrere niterentur, quo facto misellas certius pessundederunt; quantumlibet *astringentia* varia Cardiacis admiscentes, Hæmorrhagiam sistere, atque pustularum unâ tumorisque debitam elevationem tueri sategerint.

Haud ita pridem *Dominam* tam virtutibus quàm stirpe prænobilem, *Variolis* nigris & mali moris laborantem, tractavi. Quamvis autem ab initio iis omnibus illi interdixeram, à quibus sanguis exagitari poterat, cum tamen temperamento esset admodum sanguineo, viridi juventâ vegetâque, fervida etiam anni tempestas accederet, yderepente, tertio scilicet die ab eruptione, ita largo *Mensium profluvio*, tempore illis non debito, correpta est, ut astantes mulieres eam jam abortivisse suspicarentur. Licet hoc symptoma ad dies multos importunè urgeret, non tamen idcirco existimaui Lactis & Aquæ usum à me præscriptorum, intermitteri deberi: quid quod magis jam necessarium illum esse, & liberalius adhuc indulgendum censuerim? quod etiam per omnem morbi decursum factitavimus, præsertim cum appeteret *Febris Maturatio*. Quo quidem tempore Medicus Doctissimus, Candidissimusque, Dominus Do. Millington, ejusdem mecum Collegii Socius, jam amicissimus, ad sociam operam invitabatur; qui cum omnia satis bene respondere, pro hujus morbi genio animadverteret, mihi lubens assensit, ut pergeret ægra dictos liquores affatim haurire, quos ipsa sibi gratissimos, & tam ad salivam facere, quam ad refrigerium & refectionem sæpè affirmabat. Cum verò jam indurari facies coeperit, & crustâ obduci, ab halitibus putridis à materia purulenta, quæ in hoc pessimo *Variolarum* genere malè olebat, intromittendis ægræ nostræ metuentes, vini Canarini semicocti cochlearia paucula, semel in die assu-

assumenda, vel quoties in ventriculo ægritudinem aliquam perferentisceret, concessimus. Pauculis hisce, nisi quod haustulum etiam *Paregoricum* horâ somni quotidie imperavimus, convaluit; neque delirio, neque alio quovis symptomate, præter dictam Hæmorrhagiam, grave aliquod periculum minitante. Facies manusque satis intumescébant, pustulæ, quantum tulit morbi species, satis magnæ erant; Salivatio copiosa & facilis ad metas usque; postremo quantumlibet pustulæ, quæ faciem obsidebant, cum maturefcerent, nigredinem affectare viderentur, in plerisque tamen ejus partibus flavescébant.

Quibuscunque verò caloris atque inflammationis gradibus *Variolarum* species, huic *Constitutioni* peculiaris, alias aliarum *Constitutionum* species superaverit, cum tamen *Discretæ* essent Pustulæ, vel saltem *paucæ*, docuit experientia, non opus esse tantâ prædictorum liquorum quantitate ingerendâ; satis autem fuit, ut æger pro sitis modo atque imperio cerevisiam tenuem potaret, jusculis Avenaceis, Panatellâ, & pomo cocto subinde vesceretur, & si ex Ephēbis excesserat, *Paregoricum ex Syrupō de meconio*, cum vel ægrotaret, vel ob nimias vigilias delirare inciperet, assumeret. Neque aliud quicquam tentabam (nisi quod ægros lecto addicerem) ubi pustulæ *raræ* comparebant. Atque hâc solâ Methodo Charissimus mihi filius, *William Sydenham* distincto hujuscemodi Variolarum genere laborans mense *Decembri 1670.* favente Numine, restitutus est.

De Variolis hujus *Constitutionis* nihil superaddam, cum jam aliam speciem fusiùs tractaverim, à quibus hæ in eo tantum discrepant, quod naturæ sc. calidioris fuerint, & magis *inflammatoriæ*; unde sequitur, diligentiorē adhuc operam fuisse navandam, ut restingeretur intensior iste calor, qui tam iis naturalis erat, & ægro ita certum minitabatur incendium.

C A P U T VII.

Colicæ Biliosæ An. 1670, 71, 72.

PER omnes hujus *Constitutionis* annos, cum sanguis ad humores cholericos fervidosque in viscera deponendos propensior esset, *Colica Biliosa* præter solitum plures invasit; qui morbus licet *Chronicis* annumerari debeat, ac proinde extra oleas mihi sit, cum tamen ab eadem sanguinis indispositione penderet hoc tempore, à qua & *Epidemici* plerique qui tum grassabantur, vel eo nomine hic mihi veniet tractandus, præcipue verò quia animadverti, morbum huncce eadem planè præcessisse symptomata Febrilia, quæ *Dysenteriam* per illa tempora regnantem præcedere solebant; atque eundem, etiam aliquando (quod suprâ notavi) *Dysenteriam*, quæ post diuturnos cruciatus ægro tandem valedixisse videretur, fuisse infecutum. Ubi verò *Dysenteriam* diuturnam non excipiebat, plerumque à Febre ordiebatur, quæ per horas aliquot tantum affligens, in hunc morbum solebat desinere. Juvenes, ut plurimum, temperamento calido ac bilioso præditos, æstate præsertim adoritur. Intestina

norum dolor atrocissimus est, & præ cæteris omnibus, quibuscum mortalium calamitosissimi committuntur, maximè intolerabilis. Intestina nonnunquam quasi injectâ fasciâ constringit, nunc in punctum contractus quasi terebello perforat: subinde remittitur dolor, mox recrudescit Paroxysmus, quem æger præsentens, vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret, & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certò ad unum aliquod punctum determinatur dolor atque in ejusdem progressu; neque tam crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter *Cathartorum* vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eò obstinatiùs in puncto figitur; vomituritio succedit, frequentior & major alvi Adstrictio; donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum vi *totalis Peristaltici intestinorum motûs inversio*, (nisi maturiùs quis tulerit suppetias) atque *Iliaca Passio* procurantur; in quo morbo *Cathartica* Medicamenta omnia in *Emetica* statim transeunt: Enemata etiam injecta, unà cum alvi facibus, per omnem intestinorum ductum sursum lata, vomitu ejiciuntur. Quæ hoc modo excernitur materia, sincera si fuerit atque ἀμυγής, viridis aliquando, aliquando etiam flava, aut insoliti cujusdam coloris spectatur.

Cum singula hujus Affectus Phænomena, eum ab acri aliquo sive humore sive halitu, è massa sanguinea in intestina excusso, nasci apertè doceant, Indicatio Curativa primaria mihi hæc est, ut sc. evacuetur dictus humor, tam *Antecedens* in venis, quàm *Continens* in visceribus conclusus; altera verò ab hac, ut Anodynorum usu & compescatur humorum eò tendentium impetus, & mitigetur immitissimus dolor.

* Sanguinem itaque è brachii venis paulò liberaliùs educi, (si nempe id fuerit hætenus intentatum) & post horas 3. vel 4. Anodynum exhiberi curo. Postero die Catharticum aliquod Lenitivum præscribo, interposito die uno repetendum, ad tertiam etiam nonnunquam vicem, prout humoris reliquæ plures mihi videntur, aut pauciores. Observandum est autem, quòd si malum hoc sive Fructibus Horariis nimis avidè ingestis, sive alii cibo cuicunque *σωπία* originem suam debeat, unde sc. succi pravi corruptique primùm in sanguinem trans mittebantur, atque ex eodem postliminio in viscera; rebus, inquam, sic stantibus, ventriculus ante omnia eluendus est, Lacte Cerevisiato affatim hausto, & per vomitum rejecto, quo exantlato, Anodynum propinandum est, sequenti autem die primùm vena secanda, & in cæteris eo, quem jam docuimus, ordine procedendum.

At verò cum & doloris vehementia, & vomituritio, ob quam intestina ad inversionem quasi feruntur, Cathartorum operationi obsistant, intendendæ sunt eorundem vires, neque Leo subere excipiendus, frustra enim mitius Catharticum exhibueris, nisi fortè æger alvo sit facilè solubili, quod diligenter inquirendum est: Cum enim hujusmodi medicamen viam sibi facere per intestinorum canales non valeat, æger ab eo læditur magis, dum scilicet ab ejusdem inefficaci agitatione & vomitus & dolor augentur. Potio Cathartica Lenitiva ex infusione *Tamarind. fol. Senn. & Rhei*, in qua dissolvi possunt.

* Curatio.

Man-

Mannæ, & *Syr. Rosaceus*, Catharticis aliis anteferenda, cum humores minus exagitet & commoveat. Cum tamen sive ob ægri adversationem medicamenti formæ liquidioris, sive vomiturationem, in ventriculo retineri vix queat, Pilulæ necessario in subsidium vocandæ; inter quas *Cochiæ* mihi præ cæteris semper placuere, utpote certissimo pede quam coeperunt viam insistentes, tum in hoc casu, tum in aliis plerisque. Ubi verò tanta est sive Ventriculi debilitas, sive etiam Vomituritio, ut nec Pilulæ possint detineri, ibi remedium primò *Anodynum* impero, & paucis horis elapsis *Catharticum*, eo temporis spatio interjecto, ut *Catharticum* à *Narcotico* tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas autem in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam eidem communicandam sufficiant, ut suam demum exerat operationem, cessante altero. Licet *Catharticum*, modò id possit fieri, diu post *Anodynum* rectissime propinetur, cum etiam ad horas duodecim ab hoc assumpto, alvus isti ægris respondeat, atque non nisi operosius solvatur.

Cum autem hic uti in aliis plerisque morbis in quibus indicantur *Narcotica*; *Catharticum* semper dolorem intendat, (saltem finitâ jam operatione, quâ quidem vigente mitius nonnunquam cum ægro agitur) idcirco solenne mihi est *Anodynum* ingerere, ubi primum expiravit *Cathartici* *ἐνέπρεια*. Quale quidem mane etiam & serò quotidie hauriendum impero, spatio sc. omni inter Purgationes medio, quo certius dolorem consopiam, donec Catharsis debite fuerit celebrata.

Peractâ *Cathartici* operatione humorum *δυσασµόν* compescere (quod jam solum restat agendum) *Anodyno* mane & vesperi jugiter exhibito, contendo; quod etiam sæpius aliquando est repetendum: nec unquam mihi contigit, dolores vehementiores sedare posse nisi Dosi largiori & reiteratâ; quæ enim alteri malo debellando par esset, ab hoc vincitur, violentiâ doloris remedii vires frangente. Tutissimò autem repetuntur *Narcotica* urgente hujusmodi dolore, non item ubi ille desierit. Quamobrem doloris indicium secutus, *Narcoticum* repeto, donec vel cessaverit ille, vel admodum fuerit mitigatus; eo nihilominus interjecto temporis spatio, ut compertum mihi sit, quid à dosi præcedente sperari debeat antequam alteram superaddam. Plerumque verò, nisi ubi summè viget dolor, *Paregoricum* mane & serò exhibitum sufficiet. *Anodynum* mihi familiare *Laudanum* istud *Liquidum* est supra descriptum, cujus guttæ xvj. in Aqua Cardiaca stillatitiâ solvantur, vel augetur dosi pro doloris magnitudine.

Simplicissima hæc Methodus, quâ primum Humor peccans Venæsectione & Purgatione evacuatur, deinde *Narcoticorum* ope conciliatur quies, semper mihi felicissimè cessit præ aliis quæ mihi hætenus innotuere omnibus. Cum *Enemata* Carminantia, eo fine injecta ut humores acres exterminent, crabrones irritent tantum, & concitato humorum tumultu diuturniorem reddant morbum. Hic autem imprimis animadverti volo, quòd licet tam Phlebotomiam quam Catharsin huic sedando morbo necessario esse præmittendam affirmavero, nonnunquam tamen, re ita postulante, eâ utrâque omisâ à *Paregoricis* ordienda tela est. Exempli gratiâ, ubi ob prægressam ægri-

tudinem aliquam Evacuationes copiosiores non ita diu ante *Colicæ* adventum institutæ fuerint; (non rarò enim ob viscerum debilitatem, maximè si accedat major caloris gradus à vino, vel spirituofo liquore alio immodicè hausto, qui nuper ab alio convaluere morbo in hunc præcipitantur) hoc, inquam, in casu non modò non necessarium, sed & noxium esse censeo, alia insuper adjiciendo Cathartica novos excitare tumultus, atque omnia denuò perturbare. Illud jam taceo, quod in hoc Affectu æger ut plurimum, priùs quàm consulatur Medicus, repetito *Enematum* usu intestina satis proluit; ita ut partim hac de causa, partim ob diuturniorem morbi moram *Narcotica* ferè sola in usum videantur revocanda.

Menfe *Augusto* 1671. Nobilissimus Dominus Baro *Annesly Colicâ Biliosâ* laborans cum cruciatu intolerabili, & frequenti vomituritione, jam ab aliquot diebus ad Castellum de *Belvoir* accersiri me jussit, nullum non enematum genus, atque alia insuper remedia à Medicis Doctissimis, Experientissimisque eo locorum degentibus præscripta jam tentaverat. Ego nullis usus ambagibus, repetitum Narcoticorum usum ad normam jam traditam suasi, quorum ope propediem convaluit, & mecum ab urbem sanus rediit.

Quandoquidem autem dolor hic præ cæteris quibusque ex sua natura reciduus sit, omnis ei revertendi ansa *Anodino* bis quotidie ad aliquot dies exhibito præscindenda est. Quòd si, quoties intermittitur Narcoticum, dolor subinde recrudescat, (ut nonnunquam fit) nihil à me hætenus excogitari potuit, quod ad persanandum ægrum ita certò faceret atque *Equitatio*, vel in curru vectio, quo longiora itinera confici debuère, *Anodino* interim mane & serò indefinenter propinato. Hujusmodi enim exercitiis materia morbum committens in corporis habitum deducitur, & sanguis perpetuâ agitatione comminutus de novo quasi depuratur; ipsaque demum intestina caloris nativi excitatione haud parum corroborantur ac refocillantur. Nec pudet fateri, me dicto exercitio in partes adscito morbum hunc, cui alio quovis modo devincendo par non fui, plus semel penitus expulisse. Neque verò illud tentandum est, nisi post evacuationes debitas sufficienter celebratas, neque ab eo nisi post diès aliquàm multos desistendum.

Pauper quidam mihi vicinus, qui & adhuc est superstes, *Colicâ Biliosâ* vehementissimâ per hos annos laboravit, quam *Catharticis, Clysteribus, Globulisque plumbeis* devoratis expugnare, diu, sed frustra erat conatus: Hic Ego ad frequentem Narcoticorum usum confugi, neque poenitendâ operâ, quamdiu enim ista repeterentur, satis rectè habuit, sed cùm his palliaretur tantum malum, non extirparetur: (revertebatur enim ut primùm erat exhausta Narcoticorum vis.) Ego hominis misertus, & gravi morbo, & re angustâ afflictissimi, Equum ex meis commodabam, quo iter dicto jam modo peragendum aggrediretur; eoque ad diès pauculos continuato, viscera eas vires recepère, ut morbi reliquiis excutiendis paria jam essent, & sine *Anodinorum* præsidio omnino convalesceret.

Et, ut quod res est loquar, non in hoc tantum casu, sed in morbis aliis

Chronicis quàm pluribus hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu usurpatum memini, modò quis in illo improbius perseveraret. Si enim nobiscum reputemus ventrem inferiorem, in quo disponuntur organa secretoria, hoc maxumè exercitio vibrari, eaque succussionibus aliquot mille uno in die exagitari solere, facile credemus, eadem succum quemlibet recrementitium ibi impactum ope dicti exercitii posse excutere, & (quod majoris adhuc momenti) validioris istius caloris nativi excitatione ita corroborari, ut munere, quod iis mandavit natura, in sanguine depurando rectè defungantur.

Dietam, si junior æger & calidioris temperamenti, refrigerantem atque incrassantem impero, puta Hordei cremorem, Panatellam, &c. & tertio quoque die, si latret adhuc stomachus, pullum teneriorem, merulamve piscem coctum; Potum non alium concedo, quàm cerevisiam tenuem mitemque, vel lac cum Aquâ coctum, neque ulterius quidquam indulgeo, nisi Equitatio ad redintegrandam sanitatem necessaria, plenioris victum & generosioris postulet liquorem, quibus rependantur spirituum exercitio exhaurientorum damna.

Quin imò observatione constat, quod ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, ita ut viscera elanguesceret, atque æger extremâ jam macie atque debilitate tantùm non esset confectus, in hoc, inquam, casu liberalior sive *Aquæ Epidemicæ*, sive *Mirabilis*, sive aliùs demum cujuscunque, quâ sanus maximè delectabatur, usus, hoc tempore eundem ultra spem omnem juverit; hujus enim ope paucissimæ istæ caloris nativi spirituumque reliquæ excitabantur, & fermentum præternaturale visceribus adhærens, & novis paroxysmis fomitem subinde ministrans, à liquoribus magis spirituosus extinguebatur.

Porrò ut in morbi curatione, ita etiam & eodem jam depulso, *Dietâ* illa tenuis, de qua diximus, adhuc aliquandiu est observanda. Cùm enim morbus hic recidivam præ aliis omnibus affectet, atque insuper sedem sibi delegerit præcipua Coctionis instrumenta (*viscera* intelligo, jam ab eodem infirmata) vel levissimus hujus generis error malum haud leve confestim apportabit. Quo circa tam in hoc, quàm in cæteris omnibus viscerum Affectibus cibi *δύσπεπτοι* cane pejus & angue sunt vitandi; & qui conceduntur, *ὑπερτοι* eâ tantum quantitate sumendi, quæ ad vitam sustinendam possit sufficere.

* Fœminarum nonnullas vexat *Affectus Hysterici* species quædam, *Colicam Biliosam* ita ad unguem referens, tam doloris acerbitate, quàm situ, tum etiam humoribus coloris flavi viridisque vomitu rejectis, ut mihi obiter tractanda veniat, ne à quopiam pro jam dicto morbo hæc habeatur.

Quæ habitu corporis laxo crudoque sunt mulieres cum hoc malo præ cæteris conflictantur, quæque alio aliquo Affectu Hysterico jam pridem laboravere, aut (quod sæpenumero fieri solet) quæ à partu difficili ac laborioso ob natum infantem grandiusculum, qui vires & naturam maternas nimis exhaustit,

vix evasere. Regionem ventriculi, nonnunquam & paulò inferiorem, dolor haud mitior quàm in Passione Colicâ Iliacâve primum obsidet, quem vomitiones sequuntur enormes, nunc viridis materiæ, nunc verò flavæ. His accedit (quod sæpe observavi) major animi dejectio desperatioque, quam in morbo alio quocunque. Post diem unum alterumve facessit dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilo leniùs sæviens quàm antequam solveretur Paroxysmus, *Icterus* quandoque satis spectabilem, comitem sibi adsciscit, intra dies pauculos sponte evanescentem. Cessantibus jam symptomatis omnibus, ubi ægra sibi satis valere videatur, levissima animi commotio, sive ab ira sive à dolore ea fuerit excitata (quibus hoc in casu promptissimè afficiuntur foeminae) dolorem ferè revocat; quod etiam & de Ambulatione, & de alio exercitio quolibet præmaturè nimis suscepto dicendum est; cùm ab hujusmodi causis eleventur vapores in habitu corporis laxo atque imbecilliori. *Vapores* cum vulgo dico, cùm sive istiusmodi sint, sive *Convulsiones* particularum partium, utrovis pariter modo solventur *Φαινόμενα*. Hi vapores, sive Convulsiones hæ, ubi hanc illamve corporis regionem invaserint, pariunt symptomata, ei, quam invasere, parti accommoda; ac proinde licet unum atque eundem ubique morbum faciant, plerosque tamen quibus miseri cruciantur affabre simulant; quod vel ex hoc liquet Affectu, qui cùm partes *Colo* adjacentes infederit, *Colicam Biliosam* ad amussim imitatur. Neque minùs id patet in multis aliis corporis partibus eodem morbo tactis; e. g. nonnunquam *Renum* alterum vehementissimo dolore afficit, unde vomitus immanis; atque etiam per ureteris ductum persæpe delatus, *calculum* simulat, & cùm ab Enematis aliisque medicamentis Lithontripticis & calculo exturbando dicatis exasperatur, uno eodemque tenore diutissimè affligit, subinde etiam (præter morem suum, cùm per se omni vacet periculo) ægrum ad plures deducit. Vidi insuper & symptomata ab eodem prognata, quæ *vesicæ calculum* omninò referebant: Non ita diu est, à quo noctu excitabar, ut Comitissæ mihi vicinæ, dolore in vesicæ regione admodum violento & urinæ suppressione derepente correptæ, confulerem: Cùm ego illam Affectibus Hystericis variis obnoxiam certò scirem, atque ex eo augurarer, non isto eam, quem putabat, laborare morbo, Enemata, quæ parabat ancilla, injici non patiebar, ne ab iis cresceret morbus, at horum loco, atque Emollientium, v. gr. *Syr. de Althæa*, &c. quæ adferebat Pharmacopola, *Narcoticum* exhibui, quod symptoma illud subito compescuit. Neque sanè *vel* una aliqua pars corporis ab hujus mali insultibus penitus eximitur, sive interna ea fuerit, sive externa, ut sunt Fauces, Coxæ, Crura, in quibus omnibus dolorem excitat intolerabilem, atque, ubi discesserit, teneritudinem quandam quæ tangi recuset, relinquit, perinde ac si carnes multo verberare fuerint emollitæ.

Quemadmodum autem quædam ad *Colicæ Hystericæ* historiam pertinentia obiter tradidi, ne sc. illa pro *Biliosa* falsò haberetur; ita & quædam etiam alia in *ὑπόθεσιν* attingam, ad *Symptomatis* doloris, qui eam comitatur, curationem faciendâ;

cientia; *Curatio* enim *radicalis*, quæ *morbum* sublatâ causa tollit, alterius omnino est & speculationis, & loci.

Venæ sectio & repetitæ purgationes, quæ in *Colica Biliosa* incipiente aper-
tissimè indicantur, hîc locum non habent nisi in casu infra dicendo. Docet
etiam experientia, & exasperari dolorem, & invalescere symptomata alia om-
nia, à tumultu, quem ista cient, adjuta; atque adeò plus semel animadver-
ti, *Enematum*, vel lenissimorum, repetitionem, continuam symptomatum
seriem invexisse. Experientiæ ratio etiam assipulabitur, quæ morbum hunc
à spirituum potius ἀταξία atque inordinato motu, quàm humorum vitio ali-
quo produci dictabit, si expendamus nempe circumstantias illas, quibus ut
plurimum originem suam debet: Hujusmodi sunt, magnæ atque indebitæ
sanguinis profusiones, motus animi uti etiam & corporis violentiores, & alia
id genus. Quæ omnia, remedia illa suadent proscribenda, à quibus major spi-
rituum perturbatio possit excitari, atque eorum loco *Anodyna* esse usurpanda,
licet *viridis* ac pravus materiæ vomitu rejectæ color contrarium indicare vi-
deatur. Subtilior enim est atque minutior colorum speculatio, quàm ut eva-
cuationibus, quas ipso facto nocentes deprehendimus, auctoritatem concilia-
re valeat. Nullusque dubito, morbum hunc (qui licet acerbissimum dolo-
rem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine com-
missos, lethalem sæpenuerò evadere. Adde, quod si quis *Emeticum* vel fortis-
simum hodie propinaverit, ut sc. eam, quam putat, morbi mineram exhau-
riat, ægra postero die materiam æquè viridem aut pravi alterius coloris, atque
erat prior illa, evomet.

Observandum est tamen, eam quandoque sanguinis atque humorum co-
piam reperiri, quæ *Narcotici* operationi eò usque obsistat, ut, quamlibet
sæpiissimè repetatur, orgasmum tamen cohibere nequeat, nisi secta prius ægræ
vena, aut alvo subducta; quod in foeminis temperamenti magis sanguinei
atque viraginibus mihi subiit notare. Si ita se res habeat, vel Phlebotomia,
vel Catharsi, fortè etiam utraque, *Anodyno* via aperienda est. Celebrata
enim harum utraque, *Narcoticum*, quod prius summâ licet dosi exhibitum nihil
quicquam profecit, jam etiam in mediocri dosi, effectum obtinebit, cui destina-
batur. Rarò autem hoc contingit, neque tum reiteranda sunt hæc remedia.
Quibus præmissis, ubi opus iis fuerit, in *Anodynis* eâ methodo, quam in *Colica*
Biliosa proposuimus exhibendis progrediendum est, quæ crebrius parciusve
sunt ingerenda pro doloris recedentis ratione. Quæ quidem Methodus præsens
atque instans vehementissimi doloris *symptoma* tantum respicit; cum non hîc
loci illam, quæ morbi *causæ* occurritur, tractandam in me receperim.

Cùm verò hic morbus tam in Hypochondriacis, quàm Hysteriis [nam ut-
troque, ut alio loco dicetur, par est ratio] sæpiissimè in *Icterus* desinere soleat,
atque iisdem passibus quibus hic ingreditur, iste se proripiat; observandum oc-
currit, quòd in hac Icteri specie curanda Cathartica omnia, vel omnino omit-
tenda, vel si adhibenda fuerint, *Rhabbarbaro* solùm, vel leni quovis Medica-
mento utendum. Etenim metuendum, ne à Catharsi novi tumultus cieantur, ac

proinde Symptomata omnia postliminio recurrant. In hoc itaque casu nihil omnino agendum, cùm Icterus huic occasione originem debens, sensim sponte sua facessat, ac tandem brevi temporis spatio penitus evanescat: Sin autem Icterus longas moras neſtat, atque non nisi ægrè discedere videatur, ad Remedia confugiendum. Hoc uti soleo, ℞. Rad. Rub. Tinctur. & Curcumæ an. ʒij. Chelidon. maj. cum toto, & summitat. Centaur. min. an. M.I. coq. in æqualibus partibus vini Rhenani & aquæ font. ad ℥ij. Colatura dissolve syrup. de quinque Radicibus ʒij. M. s. f. Apozema, capiat ℥ß. calidè manè & serò usque dum convaluerit. At ubi Icterus per se invadit, Colicâ neutiquam prægressâ, omnino oportet, ut præter alterantia jam dicta, etiam Chalogoga, i. e. quæ per alvum bilem subducunt, ægro exhibeantur, nempe semel vel bis antequam aggrediatur usum præscripti Apozematis, & postea semel singulis septimanis durante ejusdem usu. Ut ℞. Electuar. è succo rosar. ʒij. Rhabarb. subtiliss. pulv. ʒß. Cremor. tartari ʒj. cum s. q. syr. Cichor. cum Rheo f. Bolus. Sumat. summo mane, superbibendo vini Rhenani haustulum. At si vel his continuatis morbus adhuc obstiterit; ad Aquas ferreas quales sunt istæ Tunbrigenses, adeundum, quæ ex ipso fonte bibendæ sunt singulis matutinis dum convaluerit. Atque hæc de morbis hujus Constitutionis.

S E C T I O Q U I N T A.

C A P U T I.

Constitutio Epidemica partis Anni 1673. atque integrorum
1674, 1675.

Circa initium mensis Julii 1673. alia quædam Febris species est ingressa, Constitutione verò necdum ita ad eam unicè dispositâ, ut penitus excluderentur Constitutionis præcedentis morbi, non admodum fuit Epidemica. Nondum enim desierat ista Variolarum species, quæ Anno 1670. primum coepit invadere, licèt jam & rariùs occurreret, & mitiora symptomata; ita ut bini hi morbi pari ferè passu procederent, neuter verò multum grassaretur: Priori Constitutione nondum ita prorsus evanescente, ut nullos proferret morbos veteris profapiæ, (Dysenteriae enim perpaucae adhuc reperiiebantur) neque Nova ita adhuc confirmatâ, ut eos produceret, qui alios exterminarent omnes.

Et per Autumnum hunc & Hyemem omnem Variolæ pari cum hac Febre incedebant passu, neutro tamen morbo admodum grassante, atque interim tantùm non extinguebantur Dysenteriae. Novembri autem tum currente, post acerrimum Gelu ad dies aliquot perdurans, succedente insperatò tempe-
state

state calidiori, quàm ego me per istud anni tempus unquam observasse meminì, pauculæ *Dysenteriae* & paulò ante, & circiter *Festum Nativitatis Domini* hîc illic spargebantur: Hæ autem extremum morientis *Lucernæ* conatum referebant, mox enim morbus hicce (ista saltem ejus species) omnino intercidit.

* Præmaturè admodum sequente Anno, mense sc. *Januario*, invadebant *Morbilli*, haud minùs *Epidemici* atque erant isti, qui eodem fermè tempore *Anni 1670.* fuerant ingressi. Etenim in nullam non ferè familiam se insinuant, infantes præ cæteris omnes adorti. Non autem perinde *Regulares* erant, neque *Typum* ita ad amussim servabant, atque isti, qui prædicto anno infestabant. De hac autem illorum ab invicem discrepantiâ plura dicam, ubi de illis agam particulariùs. Hi magis indies magisque grassabantur ad *Æquinoctium* usque *Vernale*, à quo tempore iisdem gradibus decrescebant, donec paulò post elapsum *Solstitium Æstivum* tandem evanescerent.

Sicut autem *Morbilli Epidemici*, qui invadebant initio anni 1670. *Variolas nigras* ibidem descriptas, introducebant, hi pariter haud minùs *Epidemici*, qui initio hujus anni comparebant, *Variolarum* speciem introduxère isti persimilem. Cùm enim (quod priùs est notatum) *Variolæ* præcedentis *Constitutionis* post priores annos duos pustulas emitterent minùs nigricantes, majores insuper sensim & majores donec sub finem anni 1673. pro speciei ratione, mites essent & benignæ, jam receptâ pristinâ feritate, & pessimis symptomatis stipatæ revertebantur. Invaluit hæc *Variolarum* species Autumno proximo, longiùs etiam in Hyemem excurrent, quæ, cum solitis calidior multò esset, morbo favebat; appetente verò tempestate frigidiorè imminuta est, Febri jam grassanti mox locum cedens.

† *Febris* hæc, quæ per annum perseverarat omnem, initio *Julii 1675.* longè latèque depopulata est; sed Autumno jam appropinquante in viscera cœpit converti, nunc *Dysenteriae* symptomatis, nunc *Diarrhœa* se prodens, licet quandoque neque hanc haberet comitem, neque illam, sed caput magis tentabat, stupidiore reddens ægros. *Variolæ* interea, quæ jam pauculos hinc inde afecerant, sub *Æquinoctium Autumnale* penitus disparebant, vix unum alterumve jugulantes. Jam enim *Febris* alios vincens *Epidemicos*, anni prædominio potiebatur. Observandum est nihilominus, quòd cùm proclivior esset *Febris* hæc materiam morbificam in viscera deponere, quæ *Dysenteriam* quandoque, sæpius autem *Diarrhœam* excitabat, ex hac occasione *Ventris* *Tormina* eam edidisse stragem vulgò putabantur, quæ Febri huic revera fuerat imputanda; licet nemo, qui ægrotos hoc Autumno tractaverit, nescius sit, quantum invaluerit hæc *Febris*; ut nec etiam, *Dysenteriam* dictam & *Diarrhœam* pro symptomatis magis quàm morbis *Essentialibus* ac *Primariis* haberi debuisse.

Hunc *Febris* ista cursum tenuit per omnem Autumnum, nunc caput petens, nunc viscera, ubique sæviens sub persona symptomatum iis partibus accidentium, ad finem usque *Octobris*: Quo tempore quæ eo usque tepida atque

ad instar æstatis placida fuerat tempestas, derepente in frigidam humidamque est mutata; unde etiam *Catarrhi* & *Tussis* increbuerè magis quàm alio ullo, quod memini, tempore. Quod autem maximi erat momenti, *Tussibus* hisce supervenire solebat *Febris* hujus *Constitutionis Stationaria*, quæ ansa hinc arreptâ & magis grassabatur, & quædam etiam symptomata variabat. Cùm enim paulò ante, insultus, ut jam dictum, in præfatas partes plerumque fieret, nunc in pulmones & Pleuram præ cæteris detorquebatur, unde symptomata nascebantur *Peripneumonica*, & *Pleuritica*, licet eadem omnino *Febris* esset, quæ *Julio 1673.* ingressa sine quavis symptomatum alteratione progrediebatur, donec *Catarrhi* isti accederent.

Hi *Catarrhi* & *Tusses* usque ad exitum *Novembris* perseverabant, quo elapso derepente minuebantur. *Febris* autem eadem planè mansit atque erat antequam *Catarrhi* se ostenderent, licet nec ita prorsus *Epidemica*, neque iisdem symptomatis stipata, cùm horum utrumque per *Accidens* à *Catarrhis* penderet. Quin etiam recedentibus *Catarrhis Variolæ* hinc inde spargi coeperunt, ejusdem planè generis cum *Variolis* anni præcedentis; sed cùm jam secundum fermè annum explevissent, non ita atrocia erant symptomata, ac ubi primùm invaderent. Quamdiu adhuc stabit hæc *Constitutio*, dicere non habeo; id certè scio illam perquam *Anomalam* atque irregularem hætenus fuisse, atque morbos omnes per eam natos ejusdem omninò indolis.

De hujus *Constitutionis* *Epidemicis*, eo quo se invicem ordine excipiebant, jam agam.

C A P U T II.

Febris Continua An. 1673, 74, 75.

HÆc, perinde atque alii *Epidemici*, mox ab ingressu socia habebat symptomata, quæ indicia haud obscura dabant majorem & spirituosam magis tunc esse inflammationem, quàm ubi morbus magis adoleverat. Etenim primo quo invadebat anno, uti & *Vere* insequente, symptomata *Pleuritica* *Febrili* superveniebant, & sanguis è venis extractus (saltem pro primâ & secundâ vice) *Pleuriticorum* referebat sanguinem, at morbo jam provectiori cessabant ea signa Inflammationis intensioris.

Præter symptomata *Febribus universis* communia, hanc *Febrem* ista sequebantur: Ut plurimum afficiebatur æger dolore Capitis & Dorsi satis atroci, stupore item, & dolore Articulorum, Artuumque tensivo, imò & totius corporis, at mitiori aliquanto quàm *Rheumatismo* laborantes. Primis diebus calor & frigus sibi invicem succedebant, quandoque etiam ineunte morbo æger in sudatiunculas erat propensior. Lingua, ubi *Febris* suo genio erat permessa, nec sicca, nec à calore naturali multum recedens, nisi quod magis alberet, neque sitis multum urgebat: Quòd si excalefieret æger ultra ordinariam *Febris* sortem, lingua aridissima erat cum flavedine subfusca, sitis etiam

etiam intendebatur; Urinaque aliter colorem ferè naturalem servare solebat, intensè rubebat.

Febris his tantùm gravata symptomatis, si peritè tractaretur, die *decimo quarto* ægro valedicebat; pertinacissima, *primo post vicesimum*.

Inter hujusce Febris symptomata eminebat affectus quidam *Comati* haud dissimilis, quo correptus æger obstupebat delirabatque, imò ad septimanas aliquot dormitabat nonnunquam, nec nisi valido clamore expergiscebatur, à quo ægrè excitatus oculos aperiebat tantùm, & post ingestum sive medicamentum, sive potum, cui assueverat, mox in stuporem dilabebatur ita quandoque profundum ut in *Aphonia* desineret absolutissimâ.

Qui sic fuerat affectus æger ubi ad se rediit, die *vicesimo octavo*, vel *trigesimo* coepit convalescere; cujus primum signum erat, quòd cibi aut potus genus aliquod insuetum aut absurdum deperiret. Convalescentis caput ad dies aliquot debile atque infirmum, nunc versùs hanc partem, nunc illum nutabat; aliaque aderant signa, quæ caput plurima fuisse passum ostenderent. At quo passu vires restituebantur, eo ipso discessit dictum symptoma.

Quandoque non tam dormitabat æger, quàm tranquillè delirabat, incongrua tamen subindè effutians ceu iratus, ac mente motus; at non eò excaescentiæ & furoris ascendebat, quo solent ii, qui à Variolis atque aliis Febris Phrenetici fiunt; à quibus hic in eo etiam discriminabatur, quòd per intervalla abrupta dormiebat, stertebat etiam profundius. Adhæc non ita erat acutum hoc symptoma atque illud, sed erat diuturnius. *Pueris* etiam hoc plerumque accidebat, aut iis, qui nondum adoleverunt, illud *Adultis* maximè. In utrisque verò si ingererentur calidiora remedia, & sollicitarentur sudores, malum in caput facile transferebatur, & dictis symptomatis ansam præbebat.

Ubi verò symptoma hoc nec sponte suâ accessit, nec medicamentorum vi coactum, morbus intra diem *decimum quartum* terminabatur ut plurimum, nonnunquam etiam intra tertium quartumve, quod factum vidi.

Autumno 1675. ut suprà innuimus, Febris hæc per *Dysenteriam* sibi fugam quærere, nonnunquam & per *Diarrhœam* affectabat: Harum posterior præcipuè sæpè excurrerat, stupore adhuc manente. Utraque verò quantum diligenti observatione assequi poteram, nihil erat aliud, quàm Febris symptoma.

* Curationem hujus Febris quod attinet, sub primum introitum, nempe *Julio 1673.* tum ex variis phænomenis ab istis longè diversis, quæ præcedentem comitabantur, tum ex eo quòd Cathartici minus pareret, quibus felicissimè Febres omnes Constitutionis prægressæ deviceram, statim didici, Febrem hanc esse alterius planè familiæ, & diutius, quàm solebam aliàs, in ejus specie investigandâ hærebam, & ex consequenti anxius dubitabam, quem mihi Curationis scopum proponerem. Quo enim tempore primum erupit hæc Febris, nullum habuit alium Epidemicum sibi σύγχρονον, cujus perspecto genio de hujus naturâ verisimile aliquid conjectare possem, cùm Variolæ, uti dixi, quæ illam comitabantur, nigrarum istarum, quæ anno 1670. invase-

S

rant,

* *Curatio.*

rant, reliquias omninò referrent, jamque & mitissimæ essent & tantum non exolerent. Nihil mihi itaque aliud jam restabat, nisi ut in hunc morbum nudum & ab aliis sepositum accuratissimo examine inquirerem, atque oculo ad *Juventia & Lædencia* quàm diligenter maximè potui semper intento, viam pro virili, Exploratoris instar, prætentarem. Atrox capitis dolor, propensioque quam habebat hic morbus ad dolores lateribus infigendos, tum etiam sanguis Pleuriticorum similis, me statim edocebant, Inflammationem haud mediocrem huic Febrī subesse, nec tamen eam posse ferre largiorem istam evacuationem, quæ Pleuritidi convenit: Sanguis enim post primam aut secundam saltem vicem detractus Glutinis colorem, quo tegebatur superficies, protinus amisit, nec repetita adhuc venæ-sectione levabatur æger, nisi fortè morbus in Pleuritidem veram transfiret; quod nonnunquam accidebat post regimen iusto calidius, præsertim primo *Vere* quo invadebat, sc. *Anno 1674.* quo tempore à Solis accessu occasionem nactus (cum etiam nondum adolesceret morbus & principio magis spirituosio inniteretur quàm postea) ad genus Peripneumonicum videbatur accedere. Cum verò & experienciâ & exemplo à repetita Phlebotomia deterreret, licet luce clarius esset Febrē hanc, præcipuè sub primum ingressum, haud parum inflammatoriam fuisse, nihil jam restabat, quo ejus calor restingui posset præter *Enemata* sæpius repetenda, & medicamenta Refrigerantia. At præter hos Affectus Inflammationem apertè prodentes, illud *Stuporis* Phænomenon, Febrī huic quàm alii cuilibet familiaris, omnino indicabat, continuò repetenda esse Enemata, quibus materia Febrilis, quæ ita promptè caput petebat, ab eo diverteretur; quin & Venæ-sectioni repetitæ, quam ægrè tulit propria hujus morbi natura, substituebantur illa, atque ejus pensabant defectum, sanguinis fervorem placidè ac sensim temperantia, & causam eliminantia morbificam. Porro judicabam Emplastra *Epispastica* satis ampla cervici posteriori applicata in hac Febre potius ex usu fore quàm in aliis, quibus materia Febrilis haud ex æquo caput tentabat; Etenim à cruciatu & fervore vehementibus, quos dicta Epispastica parti, cui imponuntur, solent imprimere, materia, quæ secus in caput ascenderet, in locum affectum corrivatur. His, & regimini ad eundem refrigerandi sanguinis scopum facienti, tandem morbus quasi naturaliter sponteque suâ cedebat, quantumlibet sæviret, si methodo ab hac diversâ eum quis aggrediretur; quod mihi ab experimentis plus satis frequentibus abundè liquebat.

Hunc itaque cursum institui: Sanguinem è brachii venis mittendum; et quantitate, quæ ægri viribus, ætati, aliisque circumstantiis convenire mihi visâ est, ante omnia curabam, atque eodem ferè tempore Emplastrum Epispasticum benè largum nuchæ applicandum. Die proximo Clysterem lenitivum ita tempori injiciendum præcepi, ut antè noctem sedari posset tumultus, qui ab eo inter operandum excitaretur, hórâ scilicet secunda tertiave post meridiem. Repetebatur Enema illud singulis diebus donec imminueretur morbi vis. Quo quidem tempore ab eo cessandum esse duxi, imò & maturius, si nempe Febris diem quartum & decimum excessisset, jamque inveterasceret, quo in casu licet

licet ab Enematis præcedentibus debellata non fuerit, eadem tamen post elapsos hos dies supervacanea esse comperi: Morbi enim acie per Ebullitionem prægressam jam retusâ, atque ægro ἐξω βίλως constituto, & à symptomatis violentioribus, quæ ab eo pendebant, securo, nihil prius erat, quàm ut morbum suo uti Genio, & quasi sensim deflagrare, ac suis viribus ruere sineremus. Quod mihi semper cessit melius quàm evacuationem qualemcunque violentiorem hoc tempore moliri. Ægro interim carnibus interdixi, cerevisiam verò tenuem ad arbitrium concessi.

Restat & aliud, quod, quia multiplici experientiâ astipulante ægris optimè solebat vertere, in describendo hujusce morbi regimine mihi minimè prætereundum fuit, nempe ut æger quotidie lecto abstineret, saltem ad horas aliquot; vel si id vetaret major ejus debilitas, vestes saltem indueret, & supra lectum cubaret, capite paulò elatiori. Etenim cum magnum illum impetum, quo Febris in caput ferebatur, & inflammatoriam simul sanguinis Diathesin contemplerer, subiit mihi in mentem, ægrum à corporis positura nonnihil emolumenti capere posse, si nempe ea talis fuerit, ut à circumambiente nullatenus augesceret calor, (quod omninò fieri necesse est, si in lecto se jugiter contineat) neque sanguis in capitis arcem tendentis impetus promoveretur, cum illinc cerebri fervor intendatur, proindeque spiritus animales calefiant atque exagitentur, à quibus & vehementior cordis vibratio & Febris augmentum.

Quantumlibet autem ægris conducatur in Febribus omnibus, quæ inflammationis intensioris sunt participes, ut non semper lecto incarcerentur, animadvertendum est tamen, eosdem, si diutius, quàm par erat, pro una vice à lecto abfuerint, declinante præsertim morbo, in dolores vagos, qui in *Rheumatismo* desinere possint, nonnunquam de facili incidere, nonnunquam etiam superficiem corporis *Îctero* deturpari; quæ si cui contingant, lecto addicendus est, quo apertis cutis spiraculis commodè diffilari possint istiusmodi particulæ, quæ malorum alterutri fomitem præbent; hoc verò ad diem unum aut alterum tantum, sudore non provocato: Hujusmodi autem Accidentia oppidò rara sunt, nec nisi in Febris declinatione comparent unquam; quo tempore cum jam morbus mitior est, longè tutius ægro permittes, ut in lecto assidue decumbat, quàm vel initio, vel in statu; quin imò per hoc tempus id magis confert ad materiam Febrilem digerendam, quæ, si æger maturius lecto affigatur, efferatur magis atque incenditur.

Hic si quis objecerit, dictam Methodum, licet ad sanguinis impetum à capite amoliendum reficiendumque ægrum, satis commodam, minus tamen expedire, eò quòd evacuationi per sudores, quâ materia Febrilis jam concocta eliminanda omninò erat, officiet: Respondeo, nihil agere contra-sentientem, nisi prius argumentis confecerit hujusmodi evacuationem omni Febrili deberi, quod haud ita in proclivi atque facile est. Docet enim Experientia, non autem Ratio, quænam Februm species per Diaphoresin, & quæ per Catharsin sit exterminanda, &c. Quin imo est cur arbitremur, dari quas-

dam Februm species, quas Natura methodo sibi peculiari, sine visibili aliqua Evacuatione, ablegat, reducendo scil. in sanguinis massam eique assimilando materiam illam morbificam, quæ cum eodem minus quadrabat. Quæ ego nixus ratione, sæpenumero tam in hac Februm specie, quam aliis, modò intermittentes non essent, mox à primo insultu, totoque sanguine nondum inquinato, easdem in ordinem redegi, imperato tantum Cerevisiæ tenuissimæ, quoties ac quantum desiderarent, potu, esuque tam juscule, quam aliorum, cujuscunque generis sint, ægris interdicto; Permissis interim & exercitii consueti usu, & aurâ liberiore, nullâque prorsus evacuatione vel semel institutâ. Sanè omnimoda solum hujusmodi per biduum triduumve, abstinentiâ liberos meos, ac amicitia mihi conjunctissimos, curavi; Verum hoc remedio non nisi in junioribus, ac temperamento sanguineo præditi est utendum.

Quòd si demus, Naturam non alia methodo quam per Diaphoresin morbum vincere posse, an non eos volumus sudores, qui morbo jam fatiscente prorumpunt, & à præviâ Digestione fluunt, non verò istos, qui primis morbi diebus protrusi, ab interrupta furentis naturæ œconomiâ nascuntur; Hujusmodi, opinor, sudores non erunt promovendi, at compescendus potius tumultus ille, cui ortum suum debent. Istiusmodi autem sudores multas Februm species, licet non omnes, solent comitari. Neque enim sum nescius, quasdam Februm species ejus esse indolis, ut in παραμῆ sudorem hunc Criticum sibi postulent: Tales sunt particulares Intermittentium Paroxyfmi; magna item & frequentissima Naturæ Febris ab illa pendens Constitutio, quæ ad Intermittentes epidemicè producendas unicè facit. In his enim, si cui methodo insistatur, quæ non eò tendit, ut materia morbifica digeratur primum, dein per sudores eliminetur, augebitur morbus: Quocirca nullæ hîc evacuationes locum habere debent; nisi quatenus morbi impetum primis diebus, quibus aggreditur, sufflaminare valent, ne inter medentium operas æger fato succumbat. Quin & Febris Pestilentialis causa, cum tenuissima sit & perquam subtilis, vel primis morbi diebus, sudoribus diffusi potest, suffragante ubiq; experienciâ.

Istis autem in Febribus, in quibus ordinario symptomatum ductu, & si suo genio uti permittantur, nusquam videmus naturam materiam morbificam jam præparatam tempore præfinito evacuare solere; nescio an non plus satis temerarius is fuerit, qui sudore provocando vim morbo inferre cogitet, atque ægrum eâ sola methodo restituere, cum ut docet divinus senex, τῆς φύσεως ἀντιπατάσεις κενὰ πάντα: Atque illud quidem usu venire autumo in Febre hac particulari, de qua hîc agimus, quam, multiplici experienciâ edoctus, satis scio sine sudoribus fugari posse; ægrum etiam, dum eosdem importunius sollicitamus, sæpenumero nullâ cogente necessitate in manifestum vitæ discrimen conjici, à materiâ morbificâ in caput sursum latâ: Attamen neque in hac Febre, neque in alia qualibet, vel ex eis, quæ sudore critico solvi non solent; si fortè hujuscemodi sudor morbo jam imminuto spontè supervenerit, quæ symptomatum omnium remissione debitæ concoctionis sobolem esse arbitramur, medicorum prudentissimus quisque eum contemnet; ubi verò non
ita

ita spontè exit, quî certò scire possumus, an non hominem è medio tollamus, dum humores regimine & cardiacis calidioribus ad ejusmodi sudores disponere nitimur? Si quis fortè in Thesaurum inciderit, nisi desipiat, humo tollet; stultus autem sit oportet, qui hâc fretus fortunâ omnem adhibet operam, ut alium ejusmodi cum vitæ periculo adipiscatur. Quo verò cunque modo hæc se res habeat, mihi abundè constat, solam Febrem calorem eum secum adferre, qui materiæ Febrili ad Coctionem præparandæ possit sufficere, neque eo intensiorem à regimine fervido forinsecùs accersendum.

Præfatam Methodum per Venæ-sectionem atque Enemata in hujusce febris curatione quàm felicissimè succedere comperiebam; eam verò, quoties à Diaphoreticis lacefferetur, non solum mali moris symptomata, sed etiam dubium semper exitum habuisse; Inter symptomata eminebat tacitum illud delirium, quod non tam infana loquacitate se prodebat, quàm *stupore* Coma æmulante, quod, uti diximus, huic Febri frequens solebat accidere. Hoc symptoma, (licet nonnunquam sponte suâ ortum illud viderim) à nimia tamen Curatricum diligentia in provocandis sudoribus malè posita, ut plurimum invitabatur: Hoc enim pacto materia morbifica, quæ in hac Febris specie sudoribus morem gerere recusabat, vehementer exagitata in caput tandem elevabatur cum ingenti ægrorum discrimine.

Jampridem animadverti in Curatione Febris Constitutionis alterius, quod per ultimos annos hujusmodi *Stupor* Pueros maximè, atque eos, qui ex ephebis vix excefferant, subindè invadebat, sed nec ita profundus, nec perindè Epidemicus atque erat is, qui hanc Febrem comitabatur. Neque tamen illum, licet huic inferiorem, multò minùs hunc, ubi primùm ingrederetur morbus, edomare potui; licet nullum non lapidem moverim, repetitis Venæ-sectionibus, non in brachiis tantùm, sed cervice etiam & pedibus, Emplastris, Vesicatoriis, Cucurbitulis, Enematis, Diaphoreticis omnis generis, &c. in partes adscitis. Tandem statui, post sanguinem è brachio eductum, Epispasticum Cervici applicatum, atque Enemata duo vel tria è Lacte & Saccharo injecta primis morbi diebus, nihil quicquam amplius moliri nisi quod ægrum & à carnibus, & à liquoribus spirituosus quibuscunque arcerem: Ad naturæ methodum interim attendebam, cujus ego vestigiis inhærens symptoma hoc superare tandem discerem. Morbus interim cui invigilabam, tutò licet tardè recedens, tandem evanuit. Huic itaque methodo insistendum mihi esse duxi in Febribus, quas deinceps tractavi universis; quod quidem, si & symptomatis magnitudinem & eventum ubique votis respondentem spectamus, haud parvi momenti mihi videtur.

Et sanè mihi nonnunquam subiit cogitare, nos in morbis depellendis haud satis lentè festinare, tardius verò nobis esse procedendum, & plus Naturæ sæpenumero committendum, quam mos hodie obtinuit. Errat enim, sed neque errore erudito, qui Naturam Artis adminiculo ubique indigere existimat. Namque id si fieret, parcius humano Generi ea prospexisset, quam postulat speciei Conservatio: cum ne minima sit proportio inter morborum ingruent-

tium frequentiam, & facultates quibus pollent homines ad eosdem fugandos, *vel* iis sæculis, quibus Medendi Ars maximè caput extulit, & à quampluribus exulta est. Aliis in morbis quid hoc profecerit nescio. Illud fatis scio ex diligenti observatione mihi astipulante, quòd in Febre, de quâ jam agimus, dictum symptoma post usurpatas evacuationes generales, Venæ-sectionem dico, & Enemata, solo tempore feliciter solebat vinci.

Antea diximus, Convalescentiæ prænuncia Signa ut plurimum ad diem usque *Tricesimum* differri solere, (in *stupore* scilicet paulò confirmatori) ægro nonnunquam etiam *Aphonia* correpto: quibus elapsis, incongruum aliquod atque absurdum sive cibi, sive potus genus importunè flagitabat, Ventriculi fermento à morbo diuturniore impensè vitiato. Hoc in casu, quandoquidem jam exhaustæ corporis vires refectione omnino indigerent, lubens ea etiam concessi, quæ minùs ægro convenire viderentur, modò palato magis arriderent.

Mensè Septembri 1674. filium novennem Librarii cujusdam ædibus meis vicini, nomine *Not*, hâc Febre unâ cum Symptomate jam sæpe memorato laborantem tractabam: Extracto è brachio sanguine, & Clysteribus per primos aliquot morbi dies continuos injectis, importunissimæ Matri obstabam, quæ rem ocyùs expedire acriter urgebat quàm ego cum salute filii stare posse arbitrabar. Datis itaque induciis, nulloque medicamento alio propinato præter Julapium aliquod è vulgaribus, quod pacandæ quidem matri potiùs destinabatur, quàm filio restituendo, trigesimum circiter diem melius habere coepit; edulia varia etiam absurda miserè discupiens, quorum pars aliqua concedebatur, licèt nullo alio nomine concedi debuisset; atque ita tandem prorsus convaluit.

Quamvis autem *Stupor* hic ad *Comatis* accedens naturam, huic Febri aliis symptomatis frequentius superveniebat, quandoque tamen, ut rariùs, *Phrenesis* absque stupore nonnullos invadebat, in quâ æger insomnes dies noctesque agebat, nullâ ratione poterat regi, aliaque patiebatur symptomata iis similia, quæ vel ab aliis Febribus, vel à Variolis in Phrenesin actos infestabant. Inducias non tulit symptoma hoc, ut solebat Affectus Comatosus jam memoratus donec fieret digestio; ægrum verò intra paucos tollebat, nisi inflammatio cohiberetur. Atque hîc mihi suppetias præ cæteris tulit *Vitrioli spiritus*, quem post Venæ-sectionem atque Enematis unius alteriusve injectionem cerevisiæ tenui instillatum pro potu ordinario concessi: Qui intra dies paucos & somnum conciliabat, & sanitatem, superatis symptomatis, ægro reddebat: quod quidem nullâ alia methòdo efficere valebam. Atque hoc reiterata sæpe Experientia mihi abundè constabat.

Febri huic, Autumno 1675. & *Dejectiones Dysentericæ* superveniebant, quandoque & *Diarrhæa*. Istas ego statim perspexi *Symptomaticas* fuisse huic Febri, non verò, ut in Constitutione præcedenti, *originales* & primò ortas. Quo non obstante, cum morbi causa in sanguinis massa clauderetur, Venæ-sectionem ea indicabat; quæ quidem, propinato etiam post Narcotico ad duas vices, symptomati huic debellando par erat.

Septembri 1675. Domina Conysby juxta Equilia Regia habitans me accersivit, laboraverat ea hac Febre, ventris torminibus derepentè jam correpta, quæ deinceps excipiebant Dejectiones sanguineæ ac mucosæ: Licèt protritæ jam ab aliquot diebus, ob morbum diutinum, vires essent, maximè verò à Dejectionum frequentia, quæ nocte prægressâ multùm fatigaverant, sanguinem tamen è brachio statim educendum curavi, & paulò post Narcoticum exhibendum, quibus peractis ea ipsâ nocte Dejectiones stercorosæ conspiciebantur. Manè & vesperi sequentibus Narcoticum repetebam prædictum, imperato etiam medicamento Cardiaco moderatori quo spiritus refocillarentur: atque ab his statim convaluit.

Diarrhæam quod attinet, quæ eodem ferè anni tempore huic Febri haud rarò accidebat, minùs adhuc ista faceſſebat negotii, cùmque ea neque ægro pròdeſſet, neque etiam officeret, quantum mihi observare licuit, (sive adesset stupor, sive etiam abesset) nullam ab illa indicationem Curativam elicere valebam, modò intra eos staret limites, ut æger ab eâ de vitâ non periclitaretur: quo in casu Narcoticum sine dubio indicabatur, atque in eo solo probandus Anodynorum usus per omnem morbi hujus decursum, ingens enim illa propensio quâ hac Febre laborantes in stuporem ferebantur, ab his intendebatur, ac proindè nisi urgente necessitate in usum nunquam erant revocanda.

Notandum est haud rarò accidere tam ab hac Febre quàm Febribus aliis, convalescentibus iis maximè quos illæ diutiùs maceraverant, nec nisi post longas magnasque evacuationes tandem dimiserant, (præsertim si invalidiori essent corporis habitu) ut noctu in lecto cubantes incallescere primùm, mox sudore diffunderent, à quibus vehementer infirmabantur, & vires tardiùs recipiebant, nonnulli etiam præcipitabantur in tabem. Cùm symptoma hoc non aliundè nasci existimarem quàm à sanguine ob morbum contumaciorem eo usque depauperato debilitatoque, ut succos, quos recenter advectos nequiret assimilare, per sudores ejicere moliretur; ita affectis author semper fui, ut singulis auroris noctibusque cochlearia quinque vel sex Vini Malacensis annosioris haurirent, cujus usu ægris vires crescebant jugiter, & evanescebant sudores. Atque hæc de Febre hujus Constitutionis continuâ, quam ob insignem stuporem eam ferè semper comitantem, lubet *Comatosam* appellare.

C A P U T III.

Morbilli Anni 1674.

O Riente anno, mense sc. *Januario 1673, 1674.* ingressa est *Morbillorum* species quædam ab eâ diversa quæ eodem mense Anno 1669, 1670. invaserat; neque tamen minùs epidemicè sæviebant hi atque isti, sed non perinde erant regulares, neque ita constanter Typum observabant: Nunc enim citiùs, nunc seriùs erumpebant; cùm in alia specie, eruptio in diem ab invasione *quartum* semper incideret. Adhæc humeros, & cæteras trunci partes,

primum occupabant, cum isti alteri faciem primum peterent, & in reliquum corpus paulatim spargerentur. Ne hâc in specie observare licuit, nisi rarissime, eas cuticulæ desquamations ad instar farinæ inspersæ, quoties recederent morbilli, quæ in aliâ specie haud minus certò conspiciebantur, quàm post Febris Scarlatinæ decessum conspici solent. Plures insuper è medio tollebant, quoties imperitè tractarentur, quàm priores illi. *Febris* enim & *Dyspnœa*, quæ Morbillis abiturientibus solebant accidere, vehementiores erant, & *Peripneumoniam* hîc propius referebant, quàm in altero genere. Quantumlibet autem fuerint *Anomali* atque irregulares hi *Morbilli* quoad jam memorata symptomata, in præcipuis tamen satis iis competeat Historia quam de morbillis tradidi, cum morbos An. 1670. Epidemicos describerem, quæ idcirco impræsentiarum repetenda non erit. Hi, uti etiam Priores isti, ad Vernalis usque Æquinoctium invalescebant, à quo tempore decrecentes, appetente Solstitio æstivo, aut non diu post, evanescere.

* Curatio, cum nullâ ferme in re ab illa differat quàm in Morbillorum historiâ jam fusè tradidi, exinde petenda est. Unicam tantum hîc, pro meo more, instantiam adferam Methodi quâ illas aggrediebar.

Februario 1674. Domina virtutibus ornatissima, atque in exemplum nata, Comitissa *Sarisburiensis* me accersivit: Infantium unus tantum tum temporis ægrotabat, mox reliqui (5 autem vel 6 erant) quos omnes eadem methodo tractavi. Lectulo eos addixi ad dies binos ternosve ante eruptionem, ut sanguis, pro suo genio, particulas faciliè separabiles morbum committentes, per cutis poros eliminaret. Neque autem vel stragulis, vel igni quibus sani assueverant, quidquam adjici patiebar; ab esu carnum arcebam, juscula Avenacea, Hordeacea, ac subinde pomum coctum concedens, cerevisiam tenuem insuper, vel lac cum aquæ triplo coctum pro potu. Urgentèque pro more Tussi, Ptisanam Pectoralem sæpe assumendam præscripsi. His peractis omnino convalere, brevi illo spatio quod hic morbus solet percurrere; neque vel per ejus decursum, vel eodem fatigante, symptomate quovis morbo huic non familiari, tentabantur.

Duobus primis mensibus quibus hæc morbillorum species se prodebat, intercurrebat & *Febris* quædam *Morbillosa* hic illic sparsa, in quâ ἐκθύματα nonnulla per truncum corporis, colli præsertim posteriora, atque humeros erumpebant, Ecthymata Morbillorum imitantia; à quibus in illo saltem determinabantur, quod non universum corpus pariter occuparent, quas diximus partibus contenta; Febris etiam (licet ejusdem planè generis) immanior erat, & ad dies 14. nonnunquam etiam plures, protrahebatur. Nec venæ-sectionem tulit hæc Febris, nec Enemata, ab utrisque irritata; at Methodo quæ Morbillis superius dicata est, lubens concessit. Atque hæc de Morbillis fuerunt dicenda.

CAPUT IV.

Variolæ Anomalæ An. 1674, 75.

Quemadmodum Morbilli Epidemici initio anni 1670. incurfantes, *Variolas nigras* ibidem delineatas introduxere, ita etiam hi, qui haud minus epidemicè grassabantur initio Anni 1674. Variolarum speciem introducebant tam earum similem, ut eadem istæ revixisse omnino viderentur, non aliæ subnasci: cum enim (uti jam diximus) in priore illa variolarum specie post elapsos priores annos duos, pustulæ minùs in dies nigræ comparerent, & grandiores etiam pedetentim conspicerentur, donec exeunte anno 1673. morbus jam mitis, habita generis ratione, ac benignus esset, jam pristina ferociâ, & infausto malorum symptomatum agmine stipatus denuò revertebatur. Etenim pustulæ fuliginem nigredine æquabant, ubi nempe confluerint; & æger non priùs extingueretur quàm ad maturitatem istæ pervenerint; immaturæ enim fusco tantùm erant colore. Pustulæ quin etiam perpustillæ erant, si numerosæ (Paucæ enim ubi fuerant tantùm, haud erant minores, quàm in aliis Variolarum generibus, nigræ verò rarissimè.) Verbo dicam, istas quas anno 1670. descripsimus satis referebant; licet non in omnibus cum iis quadrarent, distarent autem pauculis quibusdam, quæ quidem majorem sub his quàm illis putredinem latere, naturæque eas esse magis crassæ & incoctilis ostendebant: Maturæ enim pejus olebant, ita ut iisdem graviter laborantibus præ foetore vix quidem accedere. Tardiùs enim periodum absolvebant, hærebantque diutiùs, quàm ulla species alia adhuc videre contigit.

Notatu interim est perdignum, quòd quantò mitior est morbi species, tantò citiùs pustulæ ad maturitatem, atque morbus ad finem perducitur. Ita in specie istâ regulari Variolarum Confluentium quæ anno 1667. ingressa est, Dies *Undecimus* maximum adferebat vitæ discrimen, quo semel elapso, non ampliùs ut plurimum ægro metuendum erat. In proximè sequenti specie anomalâ Confluentium, quæ initio anni 1670. coeperunt invadere, æger die *Decimo quarto*, vel ad extremum *Decimo septimo* maximè periclitabatur, quos si æger superaverit, salvus omninò erat, nec quenquam post hunc diem ab hoc morbo interemptum hæcenus observavi. At verò in hac specie Confluentium, æger etiam post diem *Vicesimum* contrucidabatur; nonnunquam & si convalesceret, quæ paucorum fors erat, non tantùm tibiæ intumescabant, (quod quidem in Variolis Confluentibus quibusque familiare est) sed brachia insuper, humeri, crura, partesque aliæ; qui quidem tumores ab intolerabili dolore *Rheumaticorum* per omnia æmulo, tragoediam ordiebantur; postea haud rarò suppurabantur, & in sinus ingentes & partium musculosarum apostemata desinebant, ægro in vitæ periculo etiam ad multos dies a discessu Variolarum adhuc versante. Adeò ut mihi luculenter constaret de gradibus, quibus hic se Epidemicus promoveret per tres hæc Constitutiones, quarum

T poste-

posterior priorem semper exuperavit, tum quoad majorem putredinem, tum quoad morbi materiam minùs coctilem.

Videntur autem mihi hæ quas jam tracto *Variolæ*, nova quædam Variolarum species, è priore jam inveterascente suborta. Quamvis pro aëris diathesim eum producente Epidemicum, Variolæ nigræ, quæ initio anni 1670 primùm se ostendebant, ad ~~exemplum~~ suam usque progredierentur, tamen ad instar recidivæ alicujus morbi à materia pristina denuò fermentescente, aër rursus ad Variolarum productionem faciens, ex veteri penu easdem deprompsit; qui quidem morbus redintegratus sumptisque de novo viribus, reviviscere planè & quasi rejuvenescere videbatur. Tantò autem magis anomalæ hæ erant, tantòque magis intensam redolebant putrefactionem, quantò materia, è qua generabantur, istà crassior erat atque sæculentior, ad quam præcedentes primum ortum referebant. Quod ut magis elucescat, existimandum omnino est, nullam ejusmodi diathesim in ipso aëre supponi debere, quæ hunc hoc in loco Epidemicum propaget, alium verò longè diversum in alio non ita multum distante; hoc enim si fieret, (fit autem subinde) quilibet ventorum motus Constitutionem diffilare valeret; vero autem similis mihi videtur hunc vel illum particularem aëris tractum effluviis repleri à minerali aliquâ fermentatione, quæ aërem, per quem feruntur, particulis nunc huic animalium generi, nunc alteri exitialibus, contaminantia, morbos variis terræ Affectibus appropriatos eò usque propagant, donec expiraverit subterranea illa halituum minera; quæ pariter in novam denuò fermentationem agi possit, ex reliquiis nempe materiæ exolescentis, uti in casu jam memorato. Mihi verò, qui non ultra quàm res ipsa loquitur sapere audeo, perinde est, an hæc, an alia aliqua Hypothesis Phænomena rectius solvat. Id saltem pro comperto habeo, quas jam tractavi Variolas, præcedentis Constitutionis Variolis fuisse simillimas, nisi quòd & crassiorē naturam, & putredinem longè intensiorem redolere viderentur. Quibus etiam de causis duabus, ubi admodum *confluerent*, plures orco dabant, quàm species alia quælibet, quam mihi hætenus videre contigit; &, si quid meo judicio tribuendum sit, Pestem ipsam, pro numero sc. ægrorum, pernicie æquabant, licet, ubi *Discretæ* invaderent, haud certius intentarent periculum, quàm alia quævis species, & tam pustularum magnitudine, quàm colore, aliisque circumstantiis boni se moris esse faterentur.

* Curationem quod attinet; Jam à multis annis miratus sum Indicationes planè contrarias, quas hic mihi morbus subinnuere videbatur. *Hinc* enim lucet clarius fuit, à calidiori regimine symptomata, quæ à nimia inflammatione pendent, statim produci, Febrim scil. Phrenesim, maculas purpureas, & similia, quibus hic morbus præ cæteris quibusque est obnoxius, *inde* verò regimen iusto frigidius faciei manuumque intumescentiæ, quæ hic apprimè est necessaria, officere, & pustulas flaccidiores reddere. Postquam hæc diu multumque apud me satis anxie revolveram, intellexi tandem, utrique huic incommodo eodem simul tempore posse occurrì. Usus enim Aquæ cum Lacte co-

* *Curatio.*

ctæ,

Etæ, Cerevisiæ tenuis, aut liquoris alterius similis liberaliorem concedendo, penes me erat internum sanguinis ὀργασμὸν frænare; Atque ex adverso ægrum in lectulo jugiter detinendo, ne brachio quidem exerto, blando ejus calore pustularum elevationem & faciei manuumque intumescuntiam valebam promovere. Neque hæc secum methodus pugnare videtur, sanguis enim, eruptione jam finitâ, particulas inflammatas in corporis habitum eructasse putandus est, neque jam stimulis ad ulteriorem materiæ secretionem indigere: Ita ut, cum jam in habitu corporis, maturandisque Abscessulis rei cardo versetur, id tantum sit agendum *sanguinis* nomine, ut sc. sanguis ab halitibus calidis, à carne pustulis obsessa retro agendis, fartus tectus conservetur; *Pustularum* verò, ut blando partium externarum calore ad maturitatem illæ perducantur. Jam verò, ut ut feliciter mihi cesserit hæc Methodus, uti prius docui, in Variolis aliis *Confluentibus*, in istis tamen hujusce Constitutionis illa me fefellit; ita ut eorum plerique qui vehementiùs laborabant interirent, sive methodo jam à me laudata, sive regimine & Cardiacis calidioribus uterentur. Omnino itaque intellexi, desiderari adhuc aliquid præter ista, quæ vel ad compescendam sanguinis ebullitionem, vel ad pustularum elevationem, manuumque atque faciei intumescuntiam facerent; desiderari scil. aliquid, quod Putrefactioni magis intensæ, quàm in his Variolis præ cæteris quibusque observâram, vincendæ par esset. In mentem mihi tandem venit *Vitrioli Spiritus*, quem existimabam utrique intentioni, tum Putredinis oppugnandæ, tum perdomandæ caloris ferociæ, satisfacere posse. Quamobrem Ægro sibi relicto, donec & dolor & vomituritio, quæ eruptionem præcedere solent, jam desinerent, & Variolæ conferto agmine prodirent omnes, tandem die *quinto sextove* dictum *spiritum*, cerevisiæ tenui ad levem aciditatem instillatum, pro potu ordinario concessi ad libitum sumendum, liberaliùs verò, cum appareret Febris maturatio, quem Potum, donec perfectè convalesceret, imperavi usurpandum quotidie.

Hic spiritus, ceu morbo reverâ specificus, symptomata omnia ad miraculum ferè compescebat. Facies & maturiùs, & longè altiùs intumescibat. Variolarum interstitia, ad colorem magis rubrum, & Rosæ Damascenæ æmulum magis accedebant: Pustulæ quoque minutissimæ grandescabant, saltem quantum ea species pateretur: Pustulæ etiam quæ aliter nigræ comparuissent, hîc materiam quandam flavam & colore Favum referentem eructabant. Facies deinceps, pro nigra, colore flavo saturato ubique tincta conspiciebatur; Celerius maturascebant, atque tempore alia omnia diei unius aut alterius spatium, citius percurrerant. Hæc autem accidebant omnia, si liquorem nempe laudatum liberaliùs haurirent: Quapropter, quoties ægrum copiam subjugandis symptomatis debitam respuere animadverterem, spiritum istum, vel Syrupo aliquo in cochleari permixtum, vel Aquæ Destillatæ cum Syrupo junctæ additum, subindè ingessi quo pensaretur sc. liquoris parcior usus.

Varia hujus Medicamenti commoda recensui, incommodi ne minimum quidem ex eo natum hætenus potui deprehendere: Licet enim Salivatio die undecimo decimove ferè ab eo sistatur, cujus vicem per id temporis Dejectio-

nes aliquot subire solent; tamen ab his minus ægro erit periculi, quàm ab ista fuit; Quandoquidem, quod plus semel diximus, qui Variolis *Confluentibus* laborant, eò præcipuè urgentur discrimine, quòd saliva his diebus viscidior reddita fauces præcludat, cui quidem symptomati hoc in casu Diarrhoea succurrit, quæ vel sponte sua desinet, vel saltem, ubi nullum amplius à Variolis periculum est, Lacte & Aqua mistis, & Narcotico assumptis facillè compescetur.

Ægro interim in lecto jacenti, inclusis quoque bronchiis, stragula præter solita adjici non patiebar; concessi etiam, ut ab hac in illam lecti partem se pro arbitrio transferret, ad sudores arcendos, in quos proclivissimus erat, hoc non obstante remedio. Jusculis interim avenaceis atque hordeaceis victitabat, nonnunquam & pomo cocto. Ultimis diebus, si vel langueret æger vel ægro-
taret stomacho, Vini Canarini cochlearia tria quatuorve indulsi. Haustum verò Paregoricum jam à quinto sextove die singulis vespers temporius propinandum Adulto (Infantibus enim eo non erat opus) præcipi; *Laudani liquidi* sc. guttas 14. in Aq. fl. Paralyf.

Die decimo quarto ægrum è lecto surgere permisi; vicesimo primo sanguinem è brachio educendum curavi; Catharticum deinde ad duas vel tres vi-
ces exhibui; quibus peractis ægri facies coloratior ac magis vivida conspiebatur, quàm solebat eorum, quos hic morbus ita malè multaverat: Adde, quòd Methodus laudata vix patitur faciem cicatricibus deturpari, quæ ab humoribus calidis efferatisque proveniunt cuticulam rodentibus.

Die Julii 26. 1675. Vir Nobilis mihiq. Amicus, Dominus Elliot Regi à cubiculo, Domesticum è suis meæ curæ commisit, ferâ hæc Variolarum *Confluentium Nigrarum* specie propediem laboraturum: Habebat is annos octo-
decim circiter, temperamento erat admodum sanguineo, & in hunc morbum à nimia Computatione recens inciderat: Confluebant pustulæ densiore agmine quàm alias vidi unquam, ita ut nulla ferè inter eas intercapedo linqueretur, quâ distingui possent. Remedii hujus *spasmodici* confusus viribus, venam nullus secui, licet tempus quo accersebatur id liberum faceret; atque etiam se-
care debuissim, cum à nimia Vini ingurgitatione invitaretur morbus. Post Eruptionem finitam, die viz. quinto vel sexto, *Spiritum Vitrioli* in lagenas aliquot cerevisiâ tenui repletas jussi instillari, atque hunc Potum ordinarium concessi pro arbitrio sumendum. Die octavo ea sanguinis quantitas è naribus fluxit, ut Nosocoma hoc symptomate territa, me ocys accersendum puta-
ret: Adveniens ego, cum ab immodico sanguinis calore & impetu inusitato illud oriri animadverterem, Cerevisiam tenuem dicto spiritu imprægnatam uberius adhuc hauriendam imperavi, quo facto Hæmorrhagia dicto citius est coërcita. Salivatione satis copiosa, faciei & manuum intumescentiâ, pustularumque augmento ritè procedentibus, morbus se satis feliciter expedit; nisi quod ultimis diebus Dejectiones aliquot mucosæ sanguineæque interpella-
rent, quæ fortè nullum faceffissent negotium, si venam, eo quo diximus no-
mine, mox accersitus aperuissim. Nihilominus nullo alio præsidio Dyfen-
teri-

teriam adoriebar, quàm Narcotico illo, quod aliàs etiam, si hoc symptoma non urfisset, singulis noctibus fuisset assumendum, quo vis ejus retusa erat donec evanescerent pustulæ; posteaque extracta è brachio sanguinis quantitate satis largâ. Lactèque atque Aquâ affatim haustis, subito convaluit.

Eodem ferè tempore quidam è meis vicinis Dominus *Clench* duos mihi Liberos sanandos tradidit, quatuor annos habebat alter, alter adhuc lactebat, nec dum sextum mensem attigerat. Pustulæ utrisque perpusillæ erant, *Confluxiles* admodum, & ad Erysipelatis modum prodibant, generisque nigri dicti. *Vitrioli spiritum* utrique in potu omni instillandum curavi, quem non obstante ætate, Junioris præsertim tenellulâ, ne hilum averfabantur; quin & nullo symptomate graviore affecti convaluere illico. Amicissimus mihi vir, Dominus Doctor *Mapletoft*, utrosque mecum invisens, ætate majorem jam convalescentem reperiit, minorem verò in cunis adhuc laborantem.

Animadvertendum est autem, quòd, sicuti Variolæ hujus Constitutionis quæ non confluebant, satis erant benignæ, ita neque remedio jam præscripto opus habebant; satis verò erat istâ eas Methodò tractare quam generi *Distincto* jam suprà deberi docuimus.

Habes jam, Lector, quæ de *Variolis* mihi erant dicenda omnia; quæ licet non nemo fortasse parvi penderit pro sæculi genio, scio tamen ego haud parvo mihi labore, curâ atque industria, per multos annos continuos ea stetitisse; neque jam à me fuisse evulganda, nisi vicisset charitas in proximum, & studium aliis benefaciendi; vel pretio existimationis propriæ, quam satis intelligo à subjeeti novitate gravandam fore. Neque tamen video, cur aliquem male habeat nova Methodus ei morbo medendi, (cujus nec apud *Hippocratem* vestigium ullum, nec apud *Galenum* invenitur, nisi quis fortè locus difficillimâ ratiocinatione torqueatur) cum quæ à Modernis adaptantur Curationes, à magnis illis rei Medicæ luminibus non institutæ, æquo jure ab his negliguntur, atque ab illis magnifunt.

Quin & pariratione nemini mirum debet videri, si quid immutavero in ea Methodo, quæ expugnandæ sunt istæ Febres, quæ ab iis pendent Constitutionibus, quæ Variolis Epidemicæ sunt; Etenim si in prioribus illis mundi sæculis Variolæ nusquam gentium comparuerint, sequitur neque istiusmodi Febres uspiam locorum extitisse unquam! Verò autem simillimum est, ne quid dicam au daciùs, Variolas nondum tunc temporis in rerum naturâ fuisse reperi-tas: si enim per antiquiora tempora perinde atque nunc dierum hic morbus invaluisse, sagacissimum *Hippocratem*, opinor, is nunquam latuisset; qui cum morborum Historias & oculariùs intellexerit, & descripserit accuratiùs, quàm post-natorum quispiam, & hujus etiam descriptionem genuinam, atque simplicem pro suo more nobis reliquisset. Quocirca opinari mihi fas sit, morbos certas habere periodos pro occultis illis atque adhuc incompertis Alterationibus, quæ ipsius terræ accidunt visceribus, pro variâ sc. ejusdem ætate ac duratione: quodque, sicuti alii morbi jam olim extitere, qui vel jam ceciderunt penitus, vel ætate saltem penè confecti exolevere: & rarissimè com-

parent; (cujusmodi sunt *Lepra* atque alii fortasse nonnulli) ita qui nunc regnant morbi aliquando demum intercident, novis cedentes speciebus, de quibus nos ne minimum quidem hariolari valemus. Hæc se ita res habere potest, quicquid de eâ videatur nobis *βραχυβόις*, qui heri tantum nati sumus, cras fortè interituri, neque quas de morbis Authores, vel antiquissimi, congegesserunt rationes, ævi multò productioris, si cum Antiquissima mundi Epochâ conferantur.

C A P U T V.

Tusses Epidemicæ Anni 1675. cum Pleuritide & Peripneumoniâ supervenientibus.

Cum tempestas placida ac tepens, imò verò æstatis simillima, præter solitum ad postremos usque *Octobris* dies perseveraret, Anno 1675. eam verò mox exciperet alia multum diversa, frigida scilicet atque humida subito ingruens, *Tusses* ubique numerosiores grassabantur quàm alio quovis, quod memini, tempore, nemini ferè parcentes, cujuscunque is fuerit sive ætatis, sive temperamenti, integras verò simul familias pervadentes. Neque numero tantum erant spectabiles (cùm quælibet hyems haud paucas nobis generet) sed etiam ob anceps illud periculum, in quod eos, quos affecerant, per accidens conjiciebant. Cùm enim *Constitutio*, & jam, & per Autumnum omnem modò elapsus, in producenda Febre Epidemica suprâ descripta omnes nervos intenderet, cùmque jam nullus existeret morbus alius Epidemicus, cujus contranisu hujus vires aliquantisper possint refringi, *Tusses* istæ Febri sternebant viam, atque in eam quàm libentissimè commigrabant. Interea, quemadmodum Tussis Constitutioni opitulabatur in Febre producenda, ita etiam Febris occasionem ex Tussi natam arripiens, jam Pleuram ac Pulmones haud aliter invadebat, ac caput invaserat vel septimanâ illâ, quæ harum Tussium exortum fuerat prægressa; Quæ tam improvisa symptomatum mutatio nonnullis, qui minus diligenter adverterant animum, ansam præbuit, Febrem hanc pro *Pleuritide Essentiali*, aut *Essentiali Peripneumoniâ* habendi, licet eadem omninò illa maneret atque fuerat per integram hanc Constitutionem. Nunc enim, uti prius semper, cum dolore Capitis, Dorsi, atque Artuum quoslibet aggrediebatur; quæ symptomata omni ubique hujusce Constitutionis Febri conveniebant. Materia tantum Febrilis, cum stimulante Tussi in Pleuram ac Pulmones uberius deponeretur, symptomata dictas partes attinentia excitabat, attamen Febris quantum mihi licuit observare, eadem prorsus cum illâ fuit, quæ ad eum usque diem fuerat depopulata, quo hæc Tusses primum comparebant; quin & remedia quibus promptissimè parebat, idem planè demonstrabant. Et quantumlibet lateris dolor punctorius, spirandi difficultas, color detracti sanguinis, & reliqua signa Pleuritidi familiaria, *Essentialem Pleuresin* subesse innuerent, non aliam ta-

men medendi methodum postulavit hic morbus, quàm quæ Febri hujus *Constitutionis* quadrabat, ab illa verò quæ *Veræ* Pleuritidi conveniebat, abhorrebat admodum, ut ex infra dicendis liquebit. Addo, quòd cùm Pleuritis, quoties est morbus primarius, eo plerumque anni tempore soleat invadere, quod inter Ver atque Æstatem ambigens, utriusque quasi fibula est; hic morbus alieno prorsus sydere natus, pro symptomate tantùm Febris, quæ isti anno propria fuit, ducendus est, atque accidentalis Tussis sobole.

* Ut ad eam methodum ritè procedam, quam hujus Anni Tussibus, tum etiam istis quæ aliis contingunt, (modò ab iisdem causis nascantur) deberi monuit experientia, animadvertendum est, effluvia ista, quæ à sanguinis massâ per insensibilem transpirationem ablegari solent, à frigore cutis spiracula subito contrahente intrò verti, & in Pulmones deponi, quos irritando, Tussim mox excitant. Cùmque hoc pacto detineantur calidæ istæ & recrementitiæ sanguinis exhalationes, quo minùs per cutis poros exeant, Febris in sanguinis massa facilè accenditur; ubi scilicet vel tanta est halituum copia, ut pulmones iis eliminandis haud sufficiant, vel calore adventitio sive Remediorum, sive Regiminis justo calidiorum quasi adjecto oleo ignis augetur, & qui in Febrim jam plus satis erat proclivis in eandem præceps agitur. Verùm enim verò, qualiscunque fuerit Febris *Stationaria*, quæ illum annum funestat, atque per id temporis dominatur, nova hæc Febris statim in ejus nomen ac familiam adoptatur, ejusdem ubique genio obsequens, licèt symptomata quædam adhuc retineat, à Tussi, quam habuit parentem, pendentia; Ac proinde satis constat in Tussi qualibet ex hac *προσάσει* natâ, non tantùm ipsi morbo, sed & Febri, quæ Tussi huic paratissima accedit, occurrendum esse.

Hâc innixus basi, iis qui meam implorant opem hoc modo succurrere conabar. Si Tussis nondum Febrim, atque alia symptomata, quæ ut plurimum se adjungere solere diximus, accersiverat, satis esse arbitrabar, ægrum à carnibus & liquoribus spirituosus quibuscunque arcere, hortabar item ut exercitiis uteretur moderatis, & frueretur aurâ liberiore, Ptisanam pectoralem refrigerantem subinde hauriens. Sufficiebant nimirum paucula hæc & ad Tussim perdomandam, & Febrim, aliaque symptomata quæ illam comitari solebant, prævenienda. Sicut enim abstinentiâ à carnibus, & liquoribus spirituosus, tum etiam refrigerantium usu ita contemperabatur sanguis, ut impressioni Febrili ineptior esset; ita etiam exercitii ope fervida illa sanguinis effluvia, quæ, quoties corporis Pori à repentino frigore occluderentur, intro acta Tussim excitabant, viâ sibi naturali ac genuina exhalabant opportuniùs, & cum bonis ægri rebus diffabantur.

Tussim quod spectabat sedandam, haud vacabat periculo Narcoticis atque Anodynis illam aggredi; nec minus periclitabatur, si quis liquoribus spirituosus calidisque medicamentis idem moliretur, cùm utroque modo inviscatâ, atque induratâ Tussis materiâ. halitus isti, qui à sanguine placidè ac sensim discedentes tussiendo in auras invanescerent, jam exitu negato, in cruoris massa

præ-

* *Curatio.*

præclusi Febrim ibidem ciebant. Atque hoc sæpenumero non paucis è vulgo inconsultioribus pessimè cessit, qui cum spiritu vini ustulato aliisque calidis liquoribus Tussi obicem ponere niterentur, Affectus Pleuriticos & Peripneumonicos invitabant, atque insanâ hac sapientiâ morbum suâ naturâ levissimum & faciliè sanabilem, in periculosum ac sæpè lethalem transformabant: Nec minus hallucinabantur (licet magis cum ratione insanire viderentur) qui provocatis sudoribus morbi causam exterminare volebant: Quamvis enim non diffiteamur, sudores spontè prorumpentes haud rarò præ cæteris quibuscunque præsidis causam morbificam expellere, liquet tamen, nos, dum in iis extorquendis sumus, sanguinem incendere, & quem servare volumus ægrum letho dare posse.

Quandoque verò, non tantum ubi minùs ritè tractaretur morbus, quo scil. supra descripsimus modo, sed etiam nonnunquam sua sponte (maximè in delicatioribus ac tenellulis) nunc statim ab initio, nunc post diem unum aut alterum, Tussi superveniebat caloris ac frigoris vicissitudo quædam, capitis, dorsi, atque artuum dolor, ad sudores nonnunquam propensio, noctu maximè, (quæ omnia pariter Symptomata Febrim hujus *Constitutionis* plerumque sequebantur) quibus sæpè adjungebatur lateris dolor, nonnunquam etiam Pulmonum quasi constrictio coarctatioque, unde difficulter spirabat æger, inhibebatur Tussis, excitabatur Febris vehementior.

Febri, & pessimis ejus symptomatis rectissimè, (quantum accuratè facta observatione mihi constitit) occurrebatur venæ-sectione in brachio, & Epispasticô Nuchæ applicatô; Clystere item quotidie injiciendo. Ægrum interrim monebam, ut singulis diebus ad horas aliquot lecto absisteret, abstineret à carnibus, nunc Cerevisiam tenuem, nunc Lac Aquæ permissum, nunc Ptisanam aliquam Refrigerantem ac Lenientem forberet. Elapsô jam biduô tri-duove, si nondum minueretur dolor lateris, sed adhuc vehementer urgeret, sanguinem secundo detraxi, & ut in usu Enematum persisteret adhuc, suasi. Enemata autem quod attinet, diligenter advertendum est (tam in hac, quàm in aliis Febris) ea, jam fractis morbi viribus, & retusa acie, non diu & continuo repetenda esse, maximè in Fœminis Passioni Hystricæ obnoxiiis, aut Viris Hypochondriacis; cum talium sanguis atque humores *εὐμεταβλητοί* sint, ac nullo ferè negotio exagitentur atque æstuent, unde perturbatur corporis œconomia, & symptomata Febrilia etiam ultra solidam periodum ægros discruciant.

Sed ut ad rem revertamur, dum hoc pacto spatium morbo concederemus, quo sanguis calidas illas particulas, quæ in Pleuram ac Pulmones impegerant, sensim excuteret, symptomata universa placidè solebant evanescere; cum qui morbum ferociùs atque hostili manu aggrediebantur, ingenti remedium molimine bellum inferentes, vel suos Ægros amitterent, vel saltem Phlebotomiâ sæpius repetitâ, quàm vel postulabat morbi genius, vel etiam tutò ferebat, eorundem vitam redimere cogerentur. Cum enim in vera Pleuritide Venæ-sectio repetita omnem numerum absolvat, solaque ad Curationem sufficiat, (modò non obstiterint medicamenta & regimen calidiora, quæ contrà mi-

litant

litant) ex adverso in hoc symptomate satis erat semel, vel ut plurimum bis venam secasse, modò ægro concederetur ut è lecto exurgeret, & potu refrigeranti uteretur. Nulla autem cogebat necessitas, si benè observaverim, sanguinem sæpiùs educere, nisi ubi à calore foris accedente admodum intenderetur dictum symptoma; neque etiam in hoc casu periculo id omninò vacabat.

Hanc jam nactus ansam, paucula de eo dicam quod omnium ore tritissimum est, *Pleuresin* scilicet quandoque ita *Malignam* reperiri, ut per eos annos Phlebotomiam ferre nesciat, saltem toties repetitam, quoties hic morbus communiter deposcit. Censeo quidem *Pleuresin Veram* atque *Essentialem*, quæ, ut posthac dicetur, omnibus annorum omnium Constitutionibus indifferenter infestat, omnibus indifferenter annis Venæ-sectionem pariter repetitam indicare; aliquando tamen accidere ut Febris ejus anni propriè Epidemica, à repentinâ aliquâ manifestarum aëris qualitatum alteratione, materiam morbificam in Pleuram aut Pulmones libenter deponat, ipsaque Febris nihilominus eadem prorsus maneat. In hoc casu, etsi Venæ-sectio possit concedi ut huic symptomati, si multum sæviat, occurratur; generaliter tamen si loquamur, non multò plus sanguinis symptomatis ratione educendus est, quàm Febris nomine debuerat educi, à quâ pendet istud symptoma: Namque si hæc ejus sit indolis, ut à repetita Venæ-sectione non abhorreat, potest ea repeti in Pleuritide quæ ejusdem symptoma est; at verò si Febris repetitam Venæ-sectionem respuat, neque juvabit ista, imò & nocebit in Pleuritide, quæ cum Febre stabit cadetve. Hoc autem modo se res habuit, me saltem judice, in *Pleuritide symptomaticâ* quæ Febrem comitabatur hoc in loco grassantem, quo tempore subingrediebantur *Tusses*, hâc nimirum hyeme 1675. Atque hoc quidem mihi ideo reticendum non erat, quòd existimem dubio illum tramite errare, atque incerto duci filo, qui in Febrium Curatione non continenter ob oculos habet anni *Constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo Epidemicè producendo favet, cæterisque morbis omnibus unâ concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis.

Novembri anni præfati, Dominum *Thomam Windham*, Domini *Francisci Windham* Equitis filium natu maximum, hâc Febre laborantem tractabam. Querebatur is de lateris dolore, aliisque symptomatis, de quibus cæteri hoc morbo affecti. Venam haud plus semel tundendam curavi, Epispasticum Nuchæ apponi, Enemata quotidie injici; nunc Ptisanas atque Emulsionem refrigerantes, nunc Lac Aquæ immistum, nunc Cerevisiam tenuem propinavi, suasi ut lecto absisteret quotidie ad horas pauculas, quâ methodò intra paucos dies restitutus est, & celebratâ Catharsi omnino convaluit.

Notandum autem est, quòd tametsi symptomata hæc, quæ tussi supervenire solerent, ea propè essent, quæ hanc hyemem funestabant, attamen tussis ipsa sine illis sola invadens, eâ tempestate magis dominabatur. Hujus autem medela neque venæ-sectionem, neque Clysteres sibi vendicabat, modò febris à regimine vel medicamentis calidioribus non excitaretur. Cùm satis erat ad eam compescendam ægro liberioris aëris foras usum concedere, & carnis

esum, ut & vinum ac id genus liquores spirituosos, qui Febri ansam præbeant, omninò interdicere. Porro *Tabellas* sequentes sæpiusculè devorandas imperavi; quæ quidem ad tusses à frigore susceptas coërcendas omnibus aliis, quæ mihi adhuc innotescunt, longè præcellunt. ℞. *Sacchar. Cand. ℥iiss. Coq. f. q. aq. communis usque dum adhærescat extremis digitorum, tum adde pulv. Liquirit. Enul. Campan. sem. anisi & sem. Angelic. an. 3℔. pulv. Irid. & flor. Sulphur. an. ʒij. ol. chym. sem. anisi ʒj. f. s. a. tabellæ, quas secum continuò portet, ac earum unam frequenter assumat.*

At priusquam his, quæ de morbis Epidemicis differui, ultimam imponam manum, Objectioni, quàm contra eorum nonnulla adferendam prævideo, occurrendum mihi est, quòd nempe non satis cum *malignitate* istâ pugnare videantur, quæ pluribus horum morborum adhæret. Non is sum, qui receptam à Viris doctissimis, sive hujus seculi, sive antiquioribus, de malignitate opinionem convellere aut possim, aut etiam velim, cum ista indiciis plus satis se prodatur manifestis, in Epidemicis plerisque. Liceat mihi tantùm quæ de ejus natura sentio in medium proferre, quò hæc nostra Praxis minùs à ratione abhorrere videatur. Ipse enim cum eruditissimo *Scaligero*

*Non mihi, sed Rationi, aut quæ Ratio esse videtur,
Milito; securus quod mordicus hic tenet, aut hic.*

Censeo itaque ego *malignitatem* eam omnem quæ Epidemicis competit, (qualiscunque tandem fuerit specifica ejus natura) particulis calidissimis ac spirituosissimis, humorum in humano corpore contentorum naturæ plus minusve adversantibus, consistere ac terminari, quia solæ istiusmodi particulæ humores ita subito alterare valent, atque in morbis malignis fieri videmus. Censeo item calidas illas & spirituosas particulas assimilando maximè agere: Cum ex naturæ lege quodlibet Principium Activum sui simile procreare satagat, & quæ ei cunque obsistunt ad propriam indolem inflectere atque accommodare. Ita ignis ignem generat, & maligno infectus morbo focium inficit, spirituum sc. emissionem, qui humores mox inficiendos sibi assimilant, & in naturam suam perducunt trahuntve.

His præmissis, omninò sequitur nihil esse prius quàm ut dictæ particulæ sudore eliminentur; hoc enim modo morbus confestim funditus extirparetur: At hîc reclamationem experientia, docetque hoc in omni *malignitatis* specie fieri non posse. Quamvis enim in ipsâ *Peste* particulæ pestilenciales, tum quòd admodum fuerint subtiles; tum etiam quòd sanguinis partibus maximè spirituosissimis infideant, dissipabiles sint, atque excitato sudore non interrompendo ejici queant, in aliis tamen Febribus, ubi particulæ assimilantes non in eam subtilitatem sunt evectæ, atque etiam humoribus magis crassis incorporantur, minora illa maligna non tantùm sudoribus diffilari non potest, sed sæpenumero etiam augetur, quibus isti sollicitantur, Diaphoreticis. Quantò enim magis usu calefacientium actuantur particulæ hæ calidæ ac spirituosæ, tantò magis in-

tenditur ea quam habent assimilandi facultas, quandoque etiam magis excalefiunt humores isti in quos agunt, tantò libentiùs in assimilantium castra migrant, earundem impressiõibus cedentes. Cùm ex adverso ratio dictare videatur, medicamenta illa quæ contrariæ sunt naturæ non tantùm particularum calidarum atque acrium vim inhibere, sed etiam humores condensare obfirmareque, quo spirituum morbificorum fortiùs sustineant impetum, vel etiam frangant. Atque appellanda hìc mihi venit Experientia, quã magistrã edoctus sum & Purpureas Febrium maculas, & Variolarum pustulas nigras, eò promptius sumpsisse incrementum, quò magis calefieret æger, easdem verò pro ratione moderatioris regiminis, quod iis omnino debetur, decrescere solere ac minui.

Jam si quis me roget, quì fiat ut, cùm *malignitas* in ejusmodi particulis calidis ac spirituosis consistat, haud rarò ita parca Febris signa conspiciantur, etiam in morbis summè malignis; responderem percontanti, Primò in præcipuã illã, & maximè insigni malignitatis instantiã, ipsã *Peste*, abundè constat Particulas *ποσπας* ita supra modum subtiles esse atque aculeatas, (præsertim ubi primùm incipit grassari) ut auræ ad instar sanguinem pervadant, ac syderatis quasi ejus spiritibus, ne in Ebullitionem quidem illum attollant, unde æger sine Febre perit.

At verò in minori isto malignitatis gradu qui in aliis Epidemicis reperitur, symptomata Febrilia ita parum conspicua redduntur, nonnunquam à confusione in sanguine atque humoribus excitatã à particulis inimicis eorum in gremio conclusis; unde natura quasi oppressa non potis est, symptomata illa magis regularia exercere quæ morbo competunt, at anomala sunt *φανόμενα*, ferè omnia ob *διανομήαν* penitus everfam dirutamque; quo in casu deprimitur sæpè Febris, quæ obtinente genuino naturæ ductu, omnino vigeret. Quandoque etiam pauciora se ostendunt Febris indicia quàm pro morbi genio, ob metastasin mineræ malignæ vel in Genus Nervosum factam, vel in alias partes corporis, vel etiam humores extra sanguinis pomœria, dum turgeret adhuc materia morbum committens.

Quicquid verò id fuerit, ne hariolari quidem possum quænam alia Medendi Methodus *malignitati* qualicunque adhibenda sit, præter eam quæ Epidemico, cui inhæret, debetur. Ita ut sive Epidemicus de eorum numero sit, qui primò Concoctionem materiæ Febrilis, mox ejusdem ritè dispositæ eliminationem per sudores sibi vendicant: vel eorum, qui per eruptionem aliquam fugam sibi quærunt; vel etiam eorum, qui ab artis præsidio viam sibi aperiendam præstolantur, in singulis his, inquam, generibus, *Malignitas* morbi comes, cum ipso morbo stabit cadetque, pari usã fortunã, & pari etiam passu recedens; atque ex consequenti, quæcunque evacuatio Febris in genere competit, eadem & malignitati debetur: quantumlibet evacuationes istæ sibi invicem fuerint contrariæ. *Malignitati* itaque isti quæ *Febres Autumnales Intermittentes* comitatur, uti & *Febrem Continuam*, quæ ejusdem est indolis, medebitur Diaphoresis, quæ concoctionem subsequitur ceu

ejus effectum. *Variolarum malignitati* subveniet tempestiva Abscessulorum maturatio, atque ita de reliquis; in quibus omnibus, peculiaris *malignitatis* species istis præsertim modis ac methodo illâ optimè superatur, quibus libentissimè cedunt peculiare istis morbi, ad quos illa spectat, sive hac methodo procedendum fuerit, sive alterâ. Hoc mihi dicat ratio, nisi pro Junone nubes, atque huic etiam Experientia jugiter suffragatur.

C A P U T VI.

Anacephalæosis.

ATque ita demum animadvertimus, spatium illud annorum, quo finiuntur prægressæ observationes genera *Constitutionum* omnino *Quinque* peperisse; Quinque nimirum peculiare aëris Diatheses, totidem *Epidemicorum* species peculiare, Februm nominatim, producentes: Februm autem harum prima, quæ iis annis infestabat quibus *Intermittentes Autumnales* maximè grassabantur, unica mihi videtur, (quantum observatione diligenti fidâque hætenus assequi potuero) in quâ Natura ita omnia symptomata moderabatur, ut materiam Febrilem debitâ Coctione præparatam certo suo tempore ad exitum disponderet, vel per justam διαφύγην vel διαπύον paulò liberaliorem; (quæ idcirco *Febris Depuratoria* mihi audit.) Et profectò facilè adducor ut credam, præcipuam hanc esse atque *Primariam Naturæ Febrem*, tum ob regularem illam methodum, quâ utitur in promovendâ materiâ morbificâ eâdemque præfinito tempore digerendâ; tum etiam quia hæc Febris aliis quibuslibet frequentior occurrit, cum credibile sit *Febres Intermittentes* Epidemicè sæpius grassari, quàm alios morbos quoscunque, si illis nempe habenda sit fides, qui de earum frequentia in seculis jam elapsis tot & tanta scripserunt; quicquid demum in causâ fuerit quod ita raræ comparuerint, à quo *Pestis* hanc urbem est depopulata: Enim verò *Febris hæc Pestilentialis Inflammatoriis* iis omnibus, quæ post invasere, se ducem præbebat, ac ἀπόσπομον. *Febris* autem isti *Primariæ*, de quâ supra, adaptantur, ni fallor, illustria illa, atque necessaria Axiomata, quæ tradiderunt *Hippocrates*, alique Medici antiqui; quorum ope ita illa est regenda, ut præparetur materia Febrilis ad Crisin per sudores ritè faciendam: Neque enim satis video, qui possint accommodari dicti Aphorismi subsequenter istis Februm speciebus, quæ diversam longè habent indolem; & rarò ejusmodi Methodo aliquâ solvi solent, quâ nos adjuti, si ad eam accedamus scilicet, eamque perficiamus, morbos hosce subjugare possimus. Ut ut verò hæc se res habeat, notatū dignum esse autumo, quod cum *Febris hæc*, quæ ab illâ *Constitutione* pendebat, qua *Intermittentes* cæteris prædominabantur, (si vel diutius persisteret, vel æger nimis evacuationibus fuerit exhaustus) subindè in *Intermittentium* castra de facili transfret; istæ *Febres* quæ sequentes funestabant annos, etiam si diutissime cruciarent, rarissime tamen *Intermittentes* fierent, indicio satis manifesto eam

eam *Febrē Continuam* atque *Intermittentes* istas, vel, natura quadantenus convenire, vel non multum ab invicem abhorrere.

Jam si quis à me percontetur, quo demum pacto *Febris Continua* speciem ex notis in Febrium descriptionibus à me traditis queat expiscari, cum plerumque singulæ iis implicentur symptomatis, quæ omnibus in genere competunt Febribus, (cujusmodi sunt calor, sitis, inquietudo, &c.) Huic ego responderem, difficile id quidem esse, at non planè impossibile, modò quis seriò atque ad amussim exegerit circumstantias eas omnes quas in Historia præcedenti indigitavimus; maximè si in urbe aliqua, aut loco alio hominibus referto, examen instituat. Ponamus enim Medicum ad *Febrē Continua* laborantem accersiri, id primò habet adminiculi ad judicium ritè formandum, quod vel ex observatione propria, vel aliis indicantibus facilè resciscat, quinam alii morbi præter hanc *Febrē*, & cujus demum generis, eo locorum Epidemicè grassantur; quo cognito non ampliùs dubitabit cujus generis esse debeat *Febris* ista, quæ huic alteri Epidemico regnanti famulatur. Quamvis enim fieri possit ut *Febris* iis tantum se prodatur symptomatis, quæ omnibus omninò Febribus sunt communia, (præsertim si in ἀραξία & confusionem agatur à Methodò quæ ab ejus curatione prorsus aliena est) alii tamen Epidemici characteres naturæ atque indoli suæ proprios ac peculiare apertissime agnoscent. Verbi gratia, qui *Variolas* inspexerit, facilè conjectabit: (modò ejus morbi Historiam probè calleat) vel à die quo primùm erumpunt Pustulæ, vel ab earum magnitudine, atque colore, &c. ad quodnam Variolarum genus species illa particularis fuerit referenda: atque ubi semel cognoverit quænam sit illa Variolarum species, quæ eo anno atque per loca ista increbrescit, satis illi constabit de specie *Febris* cujusvis per id temporis, atque eo locorum grassantis. Et sane si morborum Historias ad unguem perdidicissem, (quam ego mihi laudem minimè sumò) sicuti Epidemico quovis conspecto, non dubitarem de *Febris* tum regnantis genere pronunciare, licèt ne unam viderim quidem; ita *Febris* quælibet conspecta, quisnam ei jungeretur Morbus Epidemicus, me satis doceret, an *Variolæ* scilicet, vel *Morbilli*, vel *Dysenteria*, &c. Cum tam peculiare aliquod horum genus, quam *Febris* peculiaris, particularem quamlibet Constitutionem jugiter comitetur.

Secundò autem, præter indicia illa quæ Epidemicorum unà invadentium consideratio nobis suggeret, & ipsa cujuslibet *Febris* symptomata ad ejusdem speciem dignoscendam, haud obscuram lucem foenerantur. Quamlibet enim, ut supra innuimus, Febres in universum omnes quædam habent symptomata omnibus communia, sunt tamen & certæ aliquæ Distinctionis notæ quas singulis speciebus sigillatim impressit Natura; quæ cum subtiliores sint ac magis reconditæ, non nisi à cautissimis, & minutissima quæque perscrutatim trutinantibus erui solent, aut investigari. Inter hæc signa distinguenda semper existimavi ego, ægri sive sudationem sive siccitatem in hoc vel illo morbi tempore, *Febris* speciem præcipuè & præ cæteris demonstrare, modò illa à statu naturali ac sua, Methodo minùs congruè non fuerit dejecta. Atque hoc ip-

sum liquidò mihi constabat in Febribus omnibus Epidemicis, quotquot observationes hæ nostræ hætenus complectuntur. Exempli gratiâ, iis in Febribus quæ vigeant exolescente *Intermittentium Autumnalium* prædominio, ægri externa arefcebant, nec vel minima sudoris præsignatio ante materiæ Febrilis concoctionem, quæ die decimo quarto plerumque perficiebatur, in conspectum se dabat. Neque etiam cieri hîc poterat sudor sine ingenti ægrorum discrimine, qui in Phrenesin, aliaque symptomata periculosissima mox à coacto sudore præcipitabantur. In *Febri Pestilentiali*, quæ hanc quidem subsecuta est, (*Inflammatoriarum* autem omnium quæ ab illo tempore invasere, chorum duxit) nulli sudores sponte suâ prorumpébant, at à sudorificis excitari poterant vel primis morbi diebus, atque iis semel obortis. æger nullo non symptomate levabatur. Febre proximè succedente quæ *Variolas* iis annis comitabatur quibus illæ *Regulares* erant, æger suâ sponte effusissimis sudoribus totus dimanavit, vel à morbi initio; at qui istis indulgebat æger, intendebat illicò symptomata omnia, haud mitigabat. In binis Febribus quæ duabus *Variolarum Anomalarum* speciebus, atque *Dysenteriis* se comites adjungebant, & sudores Anomali etiam fuere; at plerumque solis primis diebus exeuntes, licet qui primam Febrem comitabatur sudor, quàm qui posteriorem, aliquantisper esset copiosior, sed in neutrà emolumento fuit ægro, cum non à præviâ Concoctione, sed à confuso particularum noxiarum motu is eliceretur.

Arduum verò id mihi imprimis videtur, Novæ Febris speciem, vertente primùm anni *Constitutione* indagare, cum nec dum specimen ejus aliquod quis oculis usurpaverit, nec dum resciverit, qualesnam demum sint futuri morbi Epidemici, quos ut plurimùm Febris prævertit. Molestum esset singula enumerare quæ iis annis, de quibus egi, occurrebant, quò liqueret ansas haud obscuras à natura nobis suggeri, quibus adjuti hoc præstare valeamus, ac proinde Cognitio hæc à perdiligenti atque accuratissimâ Circumstantiarum omnium observatione necessario pendeat. Quantumlibet autem difficile id fuerit, imò si & impossibile planè supponamus, Novæ Febris, ubi primum ingreditur, speciem certò distinguere, tamen ad Curationem quod attinet, Indicatio à *Juvantibus* & *Lædentibus* sumenda, nobis saltem relinquitur; cujus operam paulatim prætentantes ægrum in tuto possimus collocare, modò ne plus satis properemus; quâ quidem *festinatione* nihil ego quicquam exitius esse autumo, nec re ulla alia Febricitantium plures vita spoliari. Neque pudet fateri, me non semel in curandis Febribus, ubi nondum constaret quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & ægro consuluisse optimè, dum enim morbo invigilarem, quò eum opportunius confodere valerem, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se Typum redegit, ut jam mihi innotesceret quibus armis esset debellanda. Sed, quod dolendum omnino est, ægrorum quamplurimi, haud satis gnari quòd perinde sit Medici periti quandoque nihil agere, atque aliò tempore efficacissima adhibere remedia, probitatis atque fidei fructum hunc capere nolunt, sed vel negligentia vel ignorantia id impunitant;

tant ; cùm Empiricorum infulsissimus quilibet medicamenta medicamentis ad-
jicere æquè novit , ac solet magis , quàm Medicorum prudentissimus.

Hæc sunt ferè quæ hætenus observavi , saltem quæ ad normam aliquam re-
duci potuerint , de *Morborum Epidemicorum* speciebus , atque ordine illo quo
invasêre ab anno 1661. ad finem usque anni 1675. Quo quidem tempore
Variolæ , & *Febres Continuæ* earum comites , qui fermè à biennio dominatæ
sunt mitiores jam factæ videntur exolescere. Qui post sequentur morbi , solus
novit , qui novit omnia.

SECTION SEXTA.

CAPUT I.

Febres Intercurrentes.

Observationes annorum , quos jam descripsi , satis arguunt Februm alias
Stationarias meritò audire , ejusmodi Febres intelligo , quæ , cùm à
particulari quadam , at nondum satis cognita hujus aut alterius anni *Constitu-
tione* pendeant , singulæ suo ordine invalescunt , grassantur admodum , &
quasi cæteris dominantur per continuam illam annorum seriem. An dentur
etiam aliæ species præter jam dictas : An etiam exacto quodam annorum cur-
riculo , aliæ alias certo ac constanti ordine excipiant , an secus se res habeat
nondum mihi licuit deprehendere. Sunt verò & aliæ *Febres Continuæ* , quæ
licet jam parcius , jam inclementius sæviant & depopulentur , tamen cum
Stationariarum quibuslibet , ut etiam & secum invicem eodem anno indifferen-
ter commiscentur , quas idcirco *Intercurrentes* appellandas censeo. Quid tam
de illarum ingenio , quàm de Methodo Medendi eisdem adhibendâ , hætenus
observando didici ; in sequentibus tradam. Sunt verò , *Febris Scarlatina* , *Pleu-
ritis* , *Peripneumonia Notha* , *Rheumatismus* , *Febris Erysipelatosa* , *Angina* , &
fortè aliæ quædam.

Jam verò cùm universos hosce morbos , vel adhuc comitetur Febris , vel
saltem fuerit comitata , donec exonerata in partes sive has , sive illas , pro morbi
ratione , materiâ Febrili , sive exitum invenerit ; nullus dubito Febrem ipsam
pro morbo primario habendam , reliquosque affectus à quibus ut plurimum mor-
bi isti nomen mutuantur , symptomata esse , quæ vel peculiarem *æστωρ* mo-
dum , vel partem , in quam ruit morbi vis , præcipuè spectant. Verùm modò
de re conveniat , nullam de nominibus movebo litem ; mihi integrum fuerit
morbum hoc vel illo nomine designare , pro arbitrio meo.

Animadvertendum est , quòd sicuti *Febres Stationariæ* , de quibus suprâ egi-
mus , magis minùsve Epidemicè infestant , quod jam diximus , prout anno-
rum Constitutio in secretâ atque inexplicabili aëris temperie fundata , eis-
dem

dem favet, ita etiam *Intercurrentes* hæ nonnunquam, licet non ita frequenter atque istæ, Epidemicè grassantur. Quamvis enim plerumque oriantur ab hac vel illa particulari corporum particularum ἀνομαλία, quâ sanguis atque humores quoquo modo vitiantur, aliquando tamen originem debent suam mediatè quidem causæ alicui generali in aëre manifestis qualitatibus hominum corpora ita disponente, ut exinde tales talesve sanguinis atque humorum dyscrasiæ generentur, quæ *Intercurrentium* ejusmodi *Epidemicorum* causæ fuerint immediatæ. Uti cum Gelu acrius diu perseveraverit, se in Veris usque pomœria longius extendens, derepentè autem calidior tempestas succedat, *Pleuritides*, *Anginæ*, similesque morbi alii solent invadere, qualiscunque demum fuerit *Constitutio* annorum *Generalis*. Et quoniam hi nonnunquam Epidemicè grassantur perindè atque alii isti, idcirco ut hos ab illis Febribus dispeſcam, quæ ad certam annorum seriem determinantur, omnibus indifferenter annis communes *Intercurrentes* appellare libet.

Quanto autem à se invicem intervallo diffideant duo hæc Febrium Genera, quantum ad causas aëre subministratas, quoad alias tamen causas externas, ac Procatarticas spectat, sæpenumerò conveniunt. Ut enim jam mittamus Contagium, quod quidem nonnunquam Febrium Stationariarum aliquibus ansam exporrigit, & crapulam taceamus, quâ matre profeminantur tum istæ Febres, tum hæ etiam de quibus jam ago; causa evidens externa Febrium quamplurimarum inde petenda est, quòd quis scilicet vel præmaturiùs vestes abjecerit; vel ab exercitio incalescens se frigori incautiùs exposuerit; unde poris subito occlusis, retentisque iis halitibus, quibus aliàs per cutis spiracula patebat exitus, hæc vel illa Febris species in sanguine succenditur, prout vel *Generalis Constitutio*, quæ tum temporis obtinet, vel particulares humorum dyscrasiæ in hanc vel illam Febris speciem potentiùs determinaverint. Et sanè existimo plures modo jam designato, quàm *Peste*, *Gladio*, atque *Fame* simul omnibus perire: Etenim si quis ægrum Medicus de primâ morbi occasione paulò minutiùs interrogaverit, (modò ex Acutorum istorum numero sit quos supra tractavimus) audiet quasi semper, vel eum vestem aliquam temerè deposuisse cui pridem assueverat, vel corpus motu excalefactum subito frigori permisisse, atque ex alterutrâ harum ἀποπάσει incidisse in morbum. Quam ob causam familiares meos semper moneo, ut nullo alio anni tempore quicquam vestium, quibus assuevere, sibi detrahant, nisi mense uno ante *Solstitium Æstivum*: Nec minori cum studio eosdem hortor, ut ab exercitio calescentes frigus sedulò evitent.

At verò diligenter hîc loci notandum est, quòd licet morbi isti, qui sub *Intercurrentium* titulo jam mihi tractandi veniunt, plerique, si non omnes, *Essentiales* fuerint morbi, sæpenumero tamen *Affectus* quidam, tum eos quoad Phænomena referentes, tum eodem etiam insigniti nomine, istis Febribus superveniunt quas *Stationarias* appello, & sunt nuda earum *symptomata*: Quo in casu non jam illa Methodus adhibenda est, quæ iis debetur quoties morbi sunt *Essentiales*, at ista potiùs quam sibi postulat Febris cujus nunc sunt

sunt symptomata, ad quorum quidem curationem ea leviter tantum inflectenda est: In genere autem ad Anni Febrim seriò attendendum est, investigandumque quo illa pacto facillimè expugnari possit, Venæ-sectione, an sudoribus, vel aliâ methodo quâlibet. Hoc si fusque deque habeatur, cum ingenti ægrorum discrimine persæpe errabimus. Si quis objecerit hos ipsos Affectus, quos ego Essentiales voco, & de quibus jam ago, reverà symptomata tantum esse, respondeo, symptomata ea fortè esse respectu febris ad quam propriè spectant, at symptomata sunt saltem Februm, quæ illa semper ac necessariò produciunt. V. gr. in *Pleuritide* Essentiali, Febris ejus est indolis, ut semper materiam morbificam in Pleuram deponat; in *Angina* Essentiali, ejus indolis est, ut eadem ad fauces semper amandet; atque ita se res habet in cæteris: Cum ubi affectuum memoratorum utervis Febri superveniat, quæ ad hanc illamve annorum Constitutionem spectat, atque ab ea pendet, idem per accidens tantum neutiquam verò necessariò produciitur. Quo nomine haud parum à se invicem determinantur.

Jam autem, ut Affectus *Essentiales* mihi dictos ab iis qui *Symptomatici* tantum sunt, ritè distinguamus, multum confert nobiscum perpendisse, quod qualia sint symptomata quæ invasionem Febris hujus alteriusve *Stationariæ* comitantur, talia omnino erunt symptomata quæ insultum sive *Pleuritidis*, sive *Anginæ* sequuntur, quoties ejusmodi Febris Accidentia sunt tantum. Quod quidem cernere erat in *Pleuritide* *symptomatica* prædictâ, quæ Febri per hyemem grassanti, anno 1675. superveniebat. Quotquot enim hac laborabant *Pleuritide*, ubi primùm corripiebantur, Capitis, Dorsi, & Artuum patientibus dolorem; quæ certissima erant & maximè vulgaria Februm earum omnium symptomata, quæ & antequam ingrederentur *Pleuritides*, invadebant, atque illis expirantibus adhuc durabant. Cum quoties uterlibet horum *Intercurrentium* morbus *Essentialis* est, omnibus indifferenter annis pari modo aggredditur, nihil prorsus habens commune cum Febre *Stationaria* per id tempus regnante. Ad hæc symptomata omnia quæ post emergunt magis perspicua sunt, cum non obscurentur ac confundantur ab aliorum *Phænomenon*, quæ naturæ sunt diversæ, & ad aliam spectant Febrem, admixtione. Præter hæc, Anni tempus, quo essentiales *Intercurrentes* plerique, non tamen omnes, solent infestare, haud rarò subinnuit ad quam classem hujusmodi Affectus referendi sint. At verò ad Morborum, tum horum, tum aliorum etiam omnium Diagnosin, iis demum instructissimus accedet, qui observatione ac diligenti ita intimè eorum Phænomena rimando perscrutatus fuerit, ut ubi eos inspexerit, genus statim nôrit distinguere; licèt Differentiarum characteristicarum aliæ ita sint fortasse subtiles ac delicatæ, ut easdem alteri verbis nequeat exprimere.

Quandoquidem autem variæ hæ Februm species, (quantum quidem assequi possum ex Phænomenis, quæ tum morbos ipsos, tum medendi rationes attinent, sedulò pensitatis) peculiari, ac cuilibet morbo propriæ sanguinis inflammationi ortum debent suum, in eodem refrigerando contemperandoque omnis mihi ferè Curationis vertitur cardo; Methodo interim pro morbi genio

variata, & cui, experiētiā jugiter suffragante, ea species libentissimè concedit materiæ morbificæ eliminandæ ubique satago. Et profectò in Febrium quarumlibet curatione omne punctum tulerit, quā portā excludenda veniat materia Febrilis, qui certò nōrit; Venæ-sectione v. gr. Sudoribus, Catharsi, aut si qua est alia magis apposita.

C A P U T II.

Febris Scarlatina.

Scarlatina Febris, licet nullo non tempore possit incidere, ut plurimum tamen exeunte æstivo se prodit, quo quidem integras Familias, Infantes verò præ cæteris infestat. Rigent, horrentque sub initio; ut in aliis Febribus, qui hâc afficiuntur, neque vehementer admodum ægrotant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstinguitur, crebrioribus certè & multo latioribus, magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt illæ quæ *Morbillos* constituunt. Ad duos tresve dies persistunt hæ maculæ, quibus demum evanescentibus, decedenteque subjectâ cuticulâ, restant furfuracæ quædam squamulæ ad instar farinæ corpori inspersæ, quæ ad secundam aut tertiam vicem se produnt, conduntque vicissim.

* Cum hic morbus nihil aliud mihi videatur, quàm mediocris sanguinis effervescentia, à prægressæ Æstatis calore, aut alio aliquo modo excitata, nihil quicquam molior, quo minus sanguis sibi despumando vacet, & materiæ peccanti, quæ satis promptè adjungitur, per cutis poros ablegandæ. Quamobrem tum hinc & à Venæ-sectione, & ab Enematum usu mihi temperans (quibus remediorum formis facta revulsione particulas sanguini infestas cum eodem intimius permisceri, & motum Naturæ magis congruum sufflaminari autumo) tum ex altera parte ab exhibendis Cardiacis, quorum æstu impetuosius fortè exagitabitur sanguis, quàm propagatâ & leni illâ separatione in qua jam totus est; (Quid quod & vehementior Febris hoc fomite possit accendi) satis habeo ut æger à carnibus in solidum abstineat, & à liquoribus spirituosus quibuscunque, tum ut neque usquam foras prodeat, neque se perpetim lecto affigat. Cui jam penitus desquamatâ, & cessantibus symptomatis, è re fore existimo, ut purgetur æger leni aliquo medicamento, ætati atque viribus accommodo. Simplici hâc & naturali planè methodo; hoc morbi *nomen*, (vix enim altius assurgit,) sine molestia, aut periculò quovis facillimè abigitur. Cum è contra si plus negotii ægris facessamus, vel lectulis continenter incarcerando, vel Cardiacis aliisque remediis supervacaneis nimis doctè, & (ut vulgo videtur) secundum artem supra modum ingestis, morbus statim intenditur, & æger non rarò, nullâ aliâ de causâ, quàm nimiâ Medici diligentia, ad plures migrat.

Veruntamen hoc animadvertendum volo. Si *Convulsiones Epilepticae* vel etiam *Coma*, huic morbo sub initium eruptionis supervenerint, (quod quandoque accidit in pueris ac junioribus hoc morbo laborantibus) omnino oportet, ut *Epispasticum* amplum, ac forte, posteriori cervici applicetur; atque porro ut *Paregoricum* è Syrupò de Meconio statim exhibeatur, repetendum singulis noctibus usque dum convalescat; imperando interim ut æger bibat pro potu ordinario lac cum triplo aquæ coctum, & à carnis esu absteat.

C A P U T III.

Pleuritis.

Hic morbus, quo nec alius frequentior, nullo non tempore infestat potissimum verò anno inter Ver & Æstatem ambigente. Nam per id temporis sanguis à nova solis vicinia excalefactus in effervescentias & inordinatos motus effrænatiùs ruit. Temperamento sanguineo præditos præ reliquis aggredditur, sæpè etiam rusticos, & *duro jam fractos membra labore*. A rigore pleurumque atque horrore orditur, quos excipiunt calor, sitis, inquietudo, & cætera Februm symptomata plus satis nota. Elapsis pauculis horis, (licet aliquando multò serius ingruat symptoma hoc) æger vehementi dolore, eoque Punctorio, in laterum alterutro circa costas corripitur, qui nunc versus Omoplatas, nunc Spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectoris se propagat. Tussi etiam crebrâ affligitur, quæ magnum adfert cruciatum, à partium inflammatarum contentione ortum, unde spiritum subinde reprimat, ut prima tussendi molimina coërceat. Quæ singulis vicibus *Anacatharsi* rejicitur materia, sub initio morbi pauca & tenuis conspicitur, & sæpè sanguinis particulis intermixta; sed procedente morbo copiosior est & magis concocta sanguine etiamnum permixto. Febris interea pari passu incedit, quin & vires sumit à symptomatis illis, quæ ab ipsa nascuntur. Atque dicta Febris cum funesto comitatu omni, [*Tussi* scilicet, *sputo sanguinis*, *dolore*, &c.] pro ratione liberioris materiæ morbificæ expectorationis, sensim minuitur. At verò materia hunc morbum committens, non semper, eodem procedente, concoctionem expectorationi debitam attingit: fit enim non rarò, ut materia paucula adhuc & tenuis, sicut in principio morbi, tussiendo educatur, & consequenter Febris cum reliquis symptomatis, ne hilum remittat, donec ægrum jugulaverit. Æger interea nunc alvo est nimis adstrictâ, nunc solutâ nimis, dejectionibus crebris & liquidissimis. Est ubi morbo admodum invalescente, & Venæ-sectione non celebratâ, æger ne tussire quidem valeat, sed immani dyspnœâ laborans, tantum non suffocetur inflammationis vi; quæ tanta aliquando reperitur, ut pectus ne ad spatium quidem respiratori debitu sine exquisitissimo dolore queat expandi. Est etiam ubi post ingentem inflammationem, & omissam Phlebotomiam, quæ nascente morbo fuerat imperanda,

randæ, mox ad Apostema res redit, *pure* in thoracis cavitatem subinde depleto; quo in casu, quamvis Primaria Febris vel omnino cesset, vel minùs saltem urgeat, attamen, in vado non est æger, sed *Empyemate*, atque *Febre Hæcticâ* succedentibus, miser *Tabæ* extinguitur.

Jam verò licet *Pleuritis* propriæ illi atque specificæ sanguinis inflammationi, quæ eam, quando affectus primarius existit, producere solet, originem suam debeat, per accidens tamen aliis Febribus quandoque supervenit, cujuscunque demum generis eæ sint, ex præcipitatione scilicet materiæ Febrilis in pleuram, vel musculos intercostales. Atque illud quidem in ipso ferè Febris initio accidit, crudâ adhuc existente materiâ Febrili, nondumque per idoneam ebullitionem subactâ, adeoque nec ad separationem debitam per loca magis conferentia præparata. Hoc autem incommodi sæpissimè ex intempestivo ac præpostero calidorum medicamentorum usu infertur, qualia à nobilibus quibusdam fœminis exhiberi solent; quarum interim benevolentia charitasque multo melius in pascendis pauperibus, quàm in iisdem medicandis, collocaretur. Atque illæ quidem eo consilio (si tamen ullo utantur) id faciunt, ut in primo statim Febris insultu provocetur sudor; parum cogitantes, quàm inconsultò atque infelicitè idem tentent. Natura enim hoc pacto turbata, humores adhuc crudos existentes expellere, qua data porta cogitur; atque adeò nunc in cerebri Meninges impetu fertur materia Febrilis, indeque *Phrenitis* nascitur; nunc ad membranam costas succingentem idem malum appellit, ex quo *Pleuritis* oboriri solet; præsertim ubi ægrorum ætas ac temperamentum, annique tempestas inter Ver atque Æstatem ambigens, sua etiam symbola ad rem contulerint: Certè enim tempestate illâ Febres Pleuritidem transire proclives sunt.

Pleuritis autem, ejusmodi quam diximus præcipitationi ortum suum debere, evacuati per Venæsectionem cruoris calor subindicare videtur. Nimirum sanguis (saltem ille qui post primam vicem extrahitur) ubi refrixerit, seviliquati præ se fert speciem ad crassitiem satis conspicuam; ac superficiem habet veri *puris* æmulam, & tamen ab eo longè diversam utpote quæ fibris instar reliqui sanguinis, arctè contexitur, nec ad modum puris defluit, quin à reliquo divulsa discolor illa pars, formam cuticulæ tenacis & fibris repletæ exhibet; & fortasse nihil aliud est quàm Fibræ sanguineæ, quæ rubicundo ac naturali suò integumentò per præcipitationem exutæ, ambientis aëris frigore in membranam hujusmodi subalbidam concrevère. At verò (ut id obiter attingam) animadvertendum est, quòd si sanguis è secta vena non recto flumine versùs Horizontem profiliat, sed per cutim repens perpendiculariter dimanet, utut celeri se proripiat gradu, sæpe tamen ad dictum colorem non accedit, cujus ego me causam nescire fateor. Neque æger ab istiusmodi sanguinis missione perinde levatur, ac si modò primùm descriptò fluat. Quinimo cum hoc ipso modo extrahitur sive orificium angustius, sive quid aliud obstitit, quo minùs pleniori exeat gurgite, neque hic sanguis Pleuriticorum sanguinem colore æmulatur, neque æger par exinde commodum capit. Ob-

servavi etiam, quod si sanguis recens extractus, quocunque demum modo fluxerit, immisso digito agitur, superficie rubenti ac florida, ut in aliis morbis quibuslibet, spectabitur.

Utut verò sanguis se habet, Morbus hic tametsi infamis, & plerisque aliis suapte natura periculosior, tamen si peritè tractetur, facile vincitur; & quidem non minùs certò constanter, quàm alii Medicorum conatus ad homines ab orci faucibus liberandos, morbosque averruncandos, perducere ad exitum foelicem solent.

Variis hujusce morbi Phænomenis diligenter perpenſis, nihil aliud illum esse arbitror, quàm Febrem à propria & peculiari sanguinis inflammatione ortam, quâ natura materiam peccantem in Pleuram deponit, nonnunquam & in Pulmones, unde *Peripneumonia* suboritur, quam à priore, gradu tantùm, & pro majore ejusdem causæ intensiōe, extentuque latiori differre autumo.

* Hunc itaque in dicto morbo pellendo mihi scopum propono, ut scilicet sanguis inflammationem reprimam, & particulas ejusdem accensas, quæ in membranam costas succingentem vim fecerunt, & incendio collabefactarunt omnia, per evacuationes debitas revellam.

Quamobrem in Venæ-sectione spem ponens maximam, ut primùm accersor, sanguinem è brachio lateris affecti ad *uncias decem* aut circiter mittendum curo. Potionem deinde sequentem statim à Venæ-sectione primùm celebrata sumendam præscribo.

℞. *Aq. Papav. Rhæad.* ℥iiij. *Sal. Prunell.* ʒj. *Syr. Violar.* ʒj. *M. F.* Haustus. Eodem tempore sequentem Emulsionem præscribo.

℞. *Amygd. dulc. N.* vij. *Sem. Melon. & Pepon. an.* ʒß. *Sem. Papav. alb.* ʒij. contundantur simul in mortario marmoreo sensim affundendo *Aq. Hord.* ℥iij. *Aq. Rosar.* ʒij. *Sacchar. cand.* ʒß. *M. F.* Emulsio; *Cap.* ℥iiij. quartâ quâque hora. Pectoralia etiam impero frequenter usurpanda, e. gr.

℞. *Decoct. Pectoral.* ℥ij. *Syr. Violar. & Capillor. Ven. an.* ʒiß. *M. F.* Apoze-
ma; *Cap.* ℥ß. ter in die.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.* ʒii. *Syr. Violar. & Capill. Ven. an.* ʒj. *Sacch. cand.* ʒß. *M. F.* s. a. Eclegma, de quo lambat sæpius in die. Oleum etiam *Amygd. dulc.* per se, vel *Oleum Sem. Lini* recenter extractum, magnò sæpe cum fructu assumuntur.

Dietam quod spectat, carnibus omnino interdico, atque insuper earundem decocto quamlibet limpidissimo. Consulo ut jusculis vescatur Hordeaceis, Avenaceis, & Panatellâ, & pro Potu utatur Ptisanâ ex decocto Hordei cum rad. Acetosæ, Liquirit. &c. ac nonnunquam Cerevisiâ lupulatâ tenui.

Porro, sequens Unguentum præscribo. ℞. *Ol. Amygd. dulc.* ʒij. *Ung. Pomati, & Dialthææ an.* ʒj. *M. F.* Linimentum, quo inungatur latus affectum manè & serò, superimponendo folium brassicæ. Jubeo item, ut in dictorum remediorum usu persistat per omnem morbi decursum.

Eodem ipso die, quo primùm accersor, si dolor vehementer urgeat, san-

* *Curatio.*

guinis eandem quantitatem rursus detrahi præcipio, vel nihilominus die sequenti, ut etiam tertio die, atque hoc modo ad quartam usque vicem, continuis quatuor diebus, (nisi prius æger convaluerit) Venæ-sectionem repeto, ubi scilicet dolor, atque alia symptomata admodum sæviunt. At verò, si vel morbus remissior & minoris periculi, patiatur ut lentiori pede progrediar, vel etiam dejectæ ægri vires non faciliè ferant Venæ-sectionem post tam brevialia intervalla repetitam; Phlebotomiam jam bis celebratam non deinceps repeto, nisi interjecto die uno aut altero inter singulas vices. Quâ quidem in re normam mihi statuo Contraindicantiâ; hinc nempe morbi violentiam, inde verò immunitas fractasque ægri vires ad invicem trutinatas. Et quanquam in curandis morbis integrum mihi esse volo, ut plus minusve sanguinis pro rei ratione demendum præcipiam, rarò tamen observavi *Pleuresin* confirmatam in Adultis minori quàm 40. circiter *unciarum* sanguinis impensâ sanatam: licet in Pueris semel tantum aut bis secuisse venam ut plurimum suffecerit. Neque, quæ nonnunquam supervenit, *Diarrhœa*, repetendis jam dictis Venæ-sectionibus obicem ponit, quæ quidem ipsa hac methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medicamentis restringentibus.

Enemata vel in solidum omitto, vel maximâ, quâ fieri potest, inter repetitas Venæ-sectiones intercapedine curo injicienda, eaque non nisi simplicissima illa è Saccharo in lacte soluto.

Durante morbo id ago, ne æger nimis exæstuet, ac proinde liberum illi facio, ut lecto quotidie eximatur; idque ad horas aliquot, prout vires suaferint; quod quidem tanti est in hoc morbi genere, ut si æger lecto jugiter affigatur, neque hæc tam larga sanguinis evacuatio, neque remedia alia utcunque refrigerantia, ad dicta symptomata perdomanda vel minimum aliquando proficiant.

Mox ab ultima Venæ-sectione, nisi forte prius id contingat, symptomata omnia mitescent, & æger (qui per aliquot adhuc dies & à liquoribus spirituosius quibuscunque, & à crassioribus cibis arcendus est) pristinas vires non ita diu post resumet: quo quidem tempore non abs re erit, ut alvus tenuiori aliquo Cathartico sollicitetur.

Jam verò si quem moveat, quod huic viæ insistentes, *Expectorationem* vix quidem attingamus, nedum quibus illa rationibus per varia morbi tempora sit promovenda, operosius differamus; sciat ille hæc non per incuriam nobis excidisse, sed deditâ operâ diuque satis cogitata, neglecta tandem fuisse & præterita: Cum semper existimaverim in summo discrimine versari illos, qui morbum hunc expectorationi eliminandum committerent. Nam ut tædium hujus methodi, quâ natura materiæ morbificæ ejiciendæ satagit, omittamus, nimium periculosæ insuper res est aleæ; cum non rarò eveniat, parte aliquâ materiæ jam concoctâ, fortè etiam per *ἀνανάθαρσιν* rejectâ reliquam adhuc crudam manere, idque successivè, præstantissimis quibusque remediis maturantibus expectorantibusque incassum usurpatis, cum expectoratio nunc quidem satis auspiciatò procedat, nunc penitus supprimatur; ægro

ægro interim usquequaque periclitante, atque pro meo in expectorationem imperio (quod sanè nullum prorsus est) sive vivis, sive etiam mortuis adjudicando. Cùm è diverso, mediante Venæ-sectione, morbifica materia penes meum sit arbitrium, & orificium à Phlebotomo incisum tracheæ vices subire cogatur. Quin imò constanter assero, huncce morbum, qui, si juxta præcepta à nobis damnata tractetur, inter patentissimas orci januas meritò reconfetur, æquè certò ac tutò Methodo jam à me præscriptâ (ut de brevissimo quo jam profligatus tempore nihil jam dicam) ac alium quemlibet morbum debellari. Nec dum mihi innotuit vel minimum damni à tam larga sanguinis (ut imperitis videri potest) detractiōe cuiquam fuisse illatum.

Sæpè quidem aggressus sum in tractando hoc affectu *Σεπάρειας* rationem aliquam stabilire, quæ citra ingentem hanc sanguinis jacturam subsisteret, nempe vel humorem resolvendo, vel expectorationis promotione illum evacuando: Sed nondum ea fors mihi contigit, ut huic ipsi, suprâ memoratæ praxi, parem aliquam reperire potuerim, cujus beneficio (non obstante tristi illa apud Hippocratem de *Pleuritide sicca*, prognosi) ægrum etiam non moratus expectorationem ab insultu morbi vindico; per ipsum sectæ venæ orificium & Pleuritidi fugam parans, & sanitati reditum.

Quandoquidem verò hujus morbi curatio in repetita venæ-sectione ferè tota stat, quæ tamen ab imperitis Chirurgis, & nescio quibus Medicastris in locis ab oppidis populosioribus longè diffitis celebrata, miseros à *punctura Tendinum* in artibus amittendi, atque adeo in vitæ magnum discrimen sæpissimè conjicit; non è re fore duxi, rationem huic malo succurrendi, si fortè fortunâ impingatur, hîc subnectere. Qui verò puncturâ hujusmodi plectuntur, dolorem non statim sentiunt, sed duodecim horis post Phlebotomiam se eodem affici conquēruntur, non tam in orificio nuper factō, quàm in partibus ad axillam tendentibus, ubi tandem dolor se figit, & tunc maximè percipitur, cùm brachium extenditur; attamen læsa pars tumore admodum insigni non afficitur, eodem avellanæ magnitudinem vix superanti, sed ex orificio humor aqueus vel ichor quidam jugiter destillat, quod quidem præcipuum puncturæ tendinis diagnosticum est habendum. Ita curatur, ut & propriis oculis ipsius observavi.

℞. Rad. lilior. albor. ℥iiij. Coq. ad teneritudinem in lactis vaccini ℔ij. Deinde ℞. farin. lini & avenac. an. ℥iij. Coquantur farinæ ad Cataplasmatidis consistentiam in s. q. lactis à radicibus prædictis colati, & radicibus contusis misceantur. f. Cataplasma, parti affectæ calidè applicandum mane & vespere.

C A P U T IV.

Peripneumonia Notha.

HYemè ingruente, at sæpius sub ejusdem exitum, Vereque adhuc nascente, quotannis emergit Febris *Symptomatis Peripneumonici* haud paucis conspicua.

conspicua. Paulò habitiores ac crassos ea præ cæteris aggreditur; virilem ætatē vel assequutos, vel etiam (quod sæpius accidit) prætergressos, liquoribus spirituosus (vini maximè spiritui) plus æquo addictos. Cùm enim in hujusmodi hominibus sanguis humoribus pituitosis brumæ tempore congestis, fuerit oneratus, atque idem ab ineunte Vere in novum motum cieatur. Tussis hanc nacta occasionem, mox subingreditur, quâ ministrâ dicti humores pituitosi in pulmones irruunt: quo tempore si fortè æger nullo vivens consilio, liquores ejusmodi spirituosos adhuc liberaliùs hauriat, crassescente jam ferè quæ tussim excitabat materiâ, & ab eâ præcluduntur Pulmonum aditus, & Febris omnem sanguinis massam depascitur. Primo Febris insultu nunc incalescit æger, nunc friget: Vertiginosus est, de capitis dolore queritur lancinante, quoties Tussis importuniùs fatigat. Potulenta omnia vomitu rejicit, nunc sine Tussi, nunc illa vexatur. Urina turbida cernitur, & rubens intensè. Sanguis detractus Pleuriticorum sanguinem refert; Anhelus sæpenumerò spiritum crebro ac celeriter ducit. Si moneatur ut Tussim provocet, haud aliter dolet caput, ac si in partes mox dissiliret, (quâ loquendi formula ægri ut plurimum utuntur.) Dolet & Thorax omnis, vel saltem pulmonum coarctatio adstantium auribus percipitur quoties tussit æger, pulmone non se satis dilatante, præclusis adeò ab intumescentiâ, ut videtur, meatibus Vitalibus; unde intercepta circulatione, sanguineque quasi præfocato, nulla ferè, præsertim in habitioribus, Febris indicia sunt; licèt hoc accidere etiam possit ob materiæ Pituitosæ copiam, quâ horum sanguis gravatus in plenam ebullitionem nequit assurgere.

* In curanda hac Febre id mihi negotiū dari sentio, ut sanguinem istum, qui ad Pulmonum & suffocationem & incendium facit, Phlebotomia revelam; ipsos pulmones remediis Pectoralibus deobstruam atque eventilem; & diætæ refrigerantis ope, totius corporis calorem compescam. Cùm verò *hinc* materiæ Pituitosæ saburra in venis contenta, Pulmonum inflammationi fomitem quotidie subministrans, Venæ-sectionem sæpe repetitam videretur indicare; *illinc* verò observatio, quam facere potui diligentissima, me doceret Phlebotomiam sæpe repetitam Febricitantium iis qui crassiore essent corporis habitu (præsertim ætatis florem prætergressis) pessimè cessisse, atque adeò ab ejusmodi repetitione haud minùs absterret; *Catharsin* ego crebriorem Venæ-sectioni succenturiabam, quæ ei satis rectè substituitur, in illis qui à largiori & iterata sæpius Phlebotomia abhorrent.

Ad hunc itaque modum processu; sanguinem è brachio in lecto jacentis extrahendum præcepi, nec passus sum ut ex eo surgeret ad duas tresve horas; cùm omnis sanguinis eductio, quæ universam corporis compagem labefactat quadantenus concutitque, hoc pacto faciliùs toleretur; ita ut mitius cum ægro agatur cum in lecto cubanti uncia decem fuerint detractæ, quàm si sex septemve tantum amiserit, postquam è cubili surrexerit. Die sequenti Potionem sequentem manè sumendam propino.

R. Cassiæ

* Curatio.

℞. Cassiæ extract. ʒj. Glycyrrhiz. ʒij. Ficus pingues N. iiij. fol. Senn. ʒiiij. Agarici trochiscat. ʒj. Coq. f. q. aq. Colat. ʒiiij. dissolve Mannæ ʒj. Syr. Ros. sol. ʒb. Mis. f. potio.

Postridie sanguinem secundâ vice mittere soleo, atque interjecto die uno Potionem Catharticam modò præscriptam iterum exhibeo, diebus alternis jugiter repetendam, donec omnino convaluerit æger. Diebus à purgatione vacuis, *Decocto Pectorali*, *Oleo Amygdal. dulc.* ac id genus aliis, ut utatur consulo.

A Carnibus & earum jusculo, maximè verò à liquoribus spirituosiss quibuscunque, ægrum interim inhibeo; quorum loco Pisanam ex hordeo & liquiritia, (Cerevisiam item tenuem, si eam efflagitet) pro potu ordinario concedo.

Atque ista quidem methodo vincenda est *Peripneumonia* hæc *Notha*, orta ab exundanti colluvie Pituitosa in sanguine aggesta ob Hyemis analogiam, & in pulmones explosa; in qua non tantum iterata Venæ-sectio, sed & Catharsis etiam indicabatur, secus atque in *Vera Peripneumonia*: quam ego ejusdem planè indolis cum *Pleuritide* esse arbitror, atque ab illa in eò tantum differre, quod *Peripneumonia* Pulmones universalius afficiat. Quin & utrique morbo pari omnino methodo medemur, Venæ-sectione sc. præ cæteris, & medicamentis Refrigerantibus.

Notha hæc *Peripneumonia*, licet ad *Asthma siccum* aliquantulum accedat, tum quoad spirandi difficultatem, tum etiam alia quædam symptomata, ab illo tamen satis dignoscitur, cum in ista manifesta Febris atque inflammationis signa se prodant, quæ in hoc nusquam comparent; quamlibet in hac specie minora sint longè ac obscuriora illis quibus insignitur *Vera Peripneumonia*.

Diligenter autem animadvertendum, quòd ubi spiritui aut aliis id genus liquoribus, cum hoc morbo confluentes se olim addixerint, minimè tutum erit eos statim ac derepente ab iis depellere; sed sensim id agendum, quò minus *Hydropi* tam repentina mutatio, ac abrupta viam sternat. Quod etiam in morbis quibuscunque ab hac *προφάσει* oriundis, observari debet. Cum verò de *Spiritu Vini* mentio fuerit facta, hic obiter dicam. Optandum sanè esset, quod aut idem omnino exulet, aut saltem spiritibus reficiendis, non verò iisdem extinguendis usurpetur: nisi quis internum ejus usum prorsus abdicandum maluerit, proindeque à Chirurgis solum ad *Ulcerà digerenda* fotubus immiscendum, aut *Ambustis* extus admovendum: quo postremo casu omnibus remediis, quotquot adhuc inventa fuere, hic liquor facile palmam præripit, cum cutem subjacentem ab omni putrefactione tueatur ac vendicet, atque eo nomine curationem quam citò absolvat, *digestionem*, quæ non nisi admodum tardè sua tempora percurrit, etiam non moratus: nempe si lintea spiritu vini imbuta partibus ab aqua ferventi, pulvere pyriò, vel simili læsis, quam primum hoc infligitur malum, applicentur, eademque spiritu dicto madefacta subinde repetantur donec dolor ab igne penitus evanuerit, & postea solum bis in die.

CAPUT V.

Rheumatismus.

Nullo non tempore incessit hic morbus, maximè *Autumno*, & præ cæteris annis florescentes & οἱ γόνυ χλωρόν. Hac ut plurimum occasione nascitur; æger sc. sive exercitio aliquo vehementiori, sive alio modo excalesfactus, mox repentinum frigus admisit. A rigore atque horrore orditur tragœdiam, quos statim excipiunt calor, inquietudo, sitis, & reliqua illa infœlix symptomatum caterva, quibus stipantur Febres. Elapso die uno alterove, (est & ubi citius) æger atroci dolore, nunc in hoc, nunc in illo artu infestatur, in carpis, humeris, genibus præsertim, qui locum subinde mutans, vicissim illos occupat, rubore quodam & tumore in parte quam postremùm affecit adhuc residuis. Primis aliquot diebus, Febris & symptomata jam memorata quandoque coincidunt; Febris autem sensim evanescit, manente dolore, quin & nunquam immanius sæviente, materia sc. febrili in artus translata; quod satis arguit Febris ipsa sæpius recrudescens ob materiam morbificam ab intempestivo Externorum usu percussam. Morbus hic quoties à Febre sejungitur, *Arthritis* sæpe audit, quamvis essentialiter ab illa distinguatur, prout cuivis facile constabit, cui uterque morbus intimiùs fuerit perspectus: unde forsitan petenda est ratio, cur tam sicco illum pede transiverint scriptores Medici: Nisi forte arbitremur, hanc morbi speciem ad reliquam malorum *Iliada* de novo accessisse. Utut se res habeat, jam plus satis grassatur hic morbus; & licet rarissimè hominem è medio tollat, Febre semel depulsa, tamen & vehementia doloris & diurnitas eum prorsus contemni non sinunt. Etenim si minus peritè tractetur, non ad menses tantùm, sed ad annos etiàm aliquot, imò per omnem adeò vitam miserum haud infrequenter discruciat; quamvis in hoc casu, non eodem semper vigore, sed Paroxyfinis quibusdam periodicè repetitis, ad instar Arthritidis, subinde laceffit: imò verò pòtest fieri ut ubi diu multumque vexaverint dicti dolores, tandem sponte desistant, atque interim æger omni membrorum motu ad mortem usque privetur, digitorum articulis quasi inversis, & protuberantiis, ut in Arthritide, nodosis in interna magis quàm externa digitorum parte se prodeuntibus: stomacho nihilominus valeat, & cætera sanus vitam toleret.

Est & alia hujus morbi species, licet non hujus esse profapiæ vulgò credatur, quæ *Lumbago Rheumatica* aptissimè dicetur: immanis dolor, sc. idemque fixus circa lumborum regionem, ipsumque aliquando ad os sacrum se demittens; *Paroxysmum Nephreticum* mentitur: nisi quòd æger non vomituriat: nam præter dolorem atrocissimum & vix ferendum circa ipsos renes, aliquando & ureteres per omnem eorum ductum ad vesicam usque; eodem licet mitiori, tentatur. Qui & mihi olim imposuit, tanquam à materia aliqua fabulosa in iis partibus hærente penderet; cùm revera materiæ *Rheumatismi* peccanti

canti & inflammatae ortum suum debeat, quæ quidem partes illas jam solas urit, intacto reliquo corpore. Immanis hic dolor, nisi abigatur eodem modo, quo prior species pariter etiam perdurat, pari sævitâ excrucians; adeo ut miser nequeat procumbere, sed vel lecto exiliat, vel super eodem erectus sedeat, corpore interim perpetuâ agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato, reductoque.

* Cum utraque hæc morbi species ab inflammatione videatur oriri, quod tum jam dicta arguunt Phænomena, tum præsertim sanguinis Venæ-sectione educti color, utpote qui Pleuriticorum sanguini tam est similis, quam ovum ovo, neque quisquam reperiatur, qui hos inflammatione laborare vel quidem dubitaverit; his, inquam, ita se habentibus, censeo ego, Curationem non aliunde quam à Phlebotomia debere sumi, sanguine interim contemperato, ejusque nimio fervore represso, tum medicamentis refrigerantibus atque incrassantibus, tum etiam conveniente regimine.

Ac proinde ut primùm accersor, statim sanguinis ℥x. è brachio lateris affecti mitti jubeo, & Julapium refrigerans incrassansque ad hanc ferè normam præscribo. *R. Aq. Nymph. Portulac. & Lactuc. an. ℥iiij. Syr. è limonibus ℥j. Syr. Viol. ℥j. M. f. Julap. de quo libat. ad libitum*: vel etiam Emulsionem in curatione morbi lateralis jam descriptam. Ad dolorem sedandum, *Cataplasma è mica Panis siliginei, & lacte croco tincto*, vel *fol. brassicæ* parti affectæ applicandum, & sæpè renovandum curo. *Dietam* quod spectat, carnibus prorsus interdico, quin & eorum jusculo, quantumlibet tenui limpidoque; quibus substituo juscula Hordeacea, Avenacea, Panatellam, & ejusmodi. Cerevisiam tenuem mitemque pro potu tantùm concedo, vel etiam (quæ magis ad rem facit) Ptisanam ex hordeo, rad. Liquirit. Acetosæ, &c. in aqua fontanâ incoctis. Volo interim, ut per aliquot horas singulis diebus lecto se abstineat, cum calor, qui à jugi decubitu, morbum promoveat intendatque.

Die sequenti sanguinis tantundem detrahi præcipio; atque intercalato die uno alterove, pro ægri viribus, tertio; dein interjecto trium quatuorve dierum intervallo (prout ægri vires, ætas, constitutio, aliæque circumstantiæ suadent monentque) quartò, atque ultimò, ut plurimum, Venæ-sectionem repeto; rarò enim usu venit, ut ultra quartam vicem venam incidamus, nisi vel regimen justo calidius præcesserit, vel medicamina calidiora ægro præter necessitatem fuerint ingesta. Quin & Anodyna sive Paregorica dicta Remedia effusiores sanguinis missionem postulant: Quamobrem utut sæviat dolor, per omnem hujus morbi decursum, religiosè mihi ab his temperandum existimo, modò mihi animo sit, curationem à sanguinis missione solùm petere, cum illorum usu figatur morbus, neque tam facilè Venæ-sectioni cedat, quæ ideò ob hæc ipsa medicamenta officiosè nimis exhibita, sæpiùs quam erat opus, celebranda est. Quid quod & in morbi statu, neque eam, quam titulo pollicentur, ἀναλγησιαν valeant præstare.

Interim dum prædicta remedia, diætæque sedulò usurpantur, *Enema è Lacte*

Y 2

fac-

* *Curatio.*

faccharato subinde injici curo, diebus scilicet à Phlebotomia vacuis. Porro ut hæc omnia ad dies minimum octo ab ultima Venæ-sectione diligenter observentur, seriò hortor moneoque; quibus elapsis, *Potionem Catharticam* è *Lenitivis* præscribo manè hauriendam, & insequenti vesperi dosin paulò liberaliorem *Syr. de Meconio in Aqua fl. Paralyf.* quo sc. sanguinis orgasmus, unde & recidivæ periculum aliter intentari poterit, penitus reprimatur. Quibus ritè peractis, ut in pristinum vitæ genus, quoad victum, exercitia, atque aërem, pedetentim se recipiat, lubens patior, ita tamen ut neque vinum, neque liquorem spirituosum quemlibet, neque etiam cibos, sive sale, sive aromatis conditos, sive etiam *δυσπηπτα* quæcunque, nisi diu postea degustare liceat.

Post venam, quoties supra innuimus, pertusam, ægri dolores admodum imminuentur, neque tamen adhuc prorsus evanescent; at verò refarcitâ, quam fecerat sanguinis detractio, virium jacturâ, (superveniente maxime proximo illo anni tempore, quod magis faciet ad redintegrandum corporis robur, quàm id, quo primum decubuit æger) symptomata ad unum omnia cessabunt, atque æger pancreaticè impofterum valebit.

Jam verò, tametsi prædictâ Methodo, aut aliâ huic simili, tempestivè atque sub ipsò morbi ingressu adhibitâ, eum, quem jam dixi, finem ut plurimum fortiatur; non rarò tamen accidit, ut ubi æger per errorem contrario planè modo fuerit tractatus, doloribus vagis, nunc quidem mitioribus, nunc verò atrocioribus, per omnem vitam miserè discrucietur: qui quidem minus cautis nullo negotio imponunt, & pro *Scorbuti* symptomatis vulgò habentur. Hic enim obiter, sed & liberè tamen dicam, quod licet nullus dubitem, quin *Scorbutus* in his Plagis Borealibus reverà inveniatur, tamen eum morbum non tam frequentem, quàm fert vulgi opinio, occurrere persuasum mihi habeo; multos autem ex iis Affectibus (ne pluribus dicam) quorum nomine *Scorbutum* incusamus, vel morborum *Fientium*, nondum verò *Factorum*, quique nullum adhuc certum induerunt Typum, effecta esse; vel etiam infelices *reliquias* morbi alicujus nondum penitus deviæti, à quibus sanguis cæterique humores contaminantur: Verbi gratiâ, quibus in corporibus materia aliqua *Arthritidi* producendæ apta recens generatur, nondum tamen in artus depluit, varia se ostendent symptomata, quæ *Scorbuti* suspicionem facient, donec *Arthritis* jam formata, atque actu se exercens, nullum amplius dubitandi locum relinquat. Neque ignoramus, non pauciora symptomata *Scorbutum* mentientia, *Podagricos* jam à Paroxysmo liberatos infestare; dum scilicet vel intempestivus evacuantium usus, vel ægri effoeta ætas, vel alia aliqua causa naturam interpellaverit, quò minus materiam omnem Arthriticam in artus exonerare valuerit; quæ adhuc retentam, cum *τὴ ἀνεπιρρόδου* existat, totam sanguinis massam inquinat, & confertissimo pessimorum symptomatum agmine hominem laceffit. Quod quidem non de *Arthritide* tantum, sed & de *Hydrope* adhuc incipiente dictum volo; de quo morbo licet vulgò jactetur, *Ubi desinit Scorbutus, ibi incipit Hydrops*, hæc tamen regula sæpe

sæpe sæpius non aliter est accipienda, quàm quòd, ubi primùm se *Hydrops* manifestis prodit indiciis, præconcepta de *Scorbuto* opinio statim collabascit. Potest & idem hoc affirmari de quamplurimis aliis morbis Chronicis, vel adhuc in corpore humano nascentibus, quique proinde nondum certum aliquem sibi cuderunt Typum; vel etiam de illis, qui, licèt partim fugati sint, nondum tamen penitus debellati exterminatique videntur. Et sanè nisi hoc concedamus, *Scorbuti* nomen, uti hodiè fit, in immensum crescet, & omnem ferè morborum numerum absolvet. Cùm, si id sedulò agamus, ut abdita cujusque morbi penetralia perscrutemur, eumque post irregularium symptomatum vela latentem eruamus, suâ se mox specie sit proditurus, & ad illam ad quam attinet familiam haud difficulter relegandus. Quin & Methodus, quâ hujusmodi morbi sunt abigendi, non adulterinis illis symptomatis, sed ipsi morbo, qualisnam is demum fuerit, ceu perfectè formato, jamque actu existenti accommodanda.

Sed hic notandum, non adeò consultum esse, quando *Rheumatismus* aliquot annorum diuturnitate altas radices egit, sanguinem tam brevibus ac sub ejusdem primordiis fiebat, intervallis mittere; quin præstare, septimanarum aliquot intercapedine repetitas illas Venæ-sectiones disternare; quæ tandem vel penitus materiam morbificam averruncabunt, vel saltem eò conducent, ut Fontanellâ in crurum alterutro excitatâ, & Spiritu quovis Volatili in vino Canarino manè & serò exhibito, reliquiæ ejus extirpentur.

Jam verò quantumcunque discriminis inter verum *Rheumatismum*, ut supra innui, & *Scorbutum* intercedat, aliam tamen speciem esse *Rheumatismi* quæ ad *Scorbutum* quàm proximè accedit, omnino confitendum est, utpote quæ insigniora hujus morbi symptomata æmulatur, & pariter eadem fermè remedia sibi vendicat, ideoque mihi *Rheumatismus Scorbuticus* audit. Dolor nunc hanc, nunc illam partem obsidet, sed eadem in tumorem ac in alia specie rarò attollit, neque febrim sibi comitem adjungit. Insuper non adeò fixus manet, sed indolem magis vagam ac incertam refert, cum anomalis inconditisque symptomatis stipatus. Nunc hunc vel illum artum discruciat, mox internas solum partes afficit, proindeque ægritudinem parit, quæ redeunte externarum partium dolore iterum se proripit; ita ægrum alternatim divexans, ac in diuturnitatem longam se protrahens, ad instar morborum, qui vel maximè Chronici habentur. Fœminas præ reliquis adoritur, ut & viros, qui imbecilliori naturâ sunt; adeoque ad affectuum hystericorum classem referri debere planè suspicarer, nisi quòd iteratâ experientiâ comprobassem eum remediis hystericis minimè cessisse. Illi etiam, qui longum & repetitum *Corticis Peruviani* usum experti sunt, huic malo sunt obnoxii; quod quidem (ut obiter attingam) unicum est incommodum, quod ex hoc remedio illatum novè unquam. Sed utut id sit, hic affectus sive ex hac occasione, sive ex alia quacunque causa originem ducit, quàm facillimè debellatur vinciturque usu sequentium, quæ nisi privato commodo publicum prætulissem prorsus mihi reticenda essent. Etenim his solis quàm multos, eo quo descripsimus modo

laborantes, sanavi, quibus Venæ-sectiones, quantumlibet repetitæ, Cathartica, Diæta lactea, Pulveres testacei, &c. ne hilum profecerunt. Atque hæc sunt.

℞. Conserv. Cochlear. hortens. rec. ℥ij. lujul. ℥j. pulv. Ari Comp. 3vj. cum s. q. syr. Aurant. f. Electuar. Capiat. ℥ij. ter in die per mensem integrum, superbibendo aquæ sequentis ℥iiij.

℞. Cochlear. hortens. M. viij. Beccabung. Nasturt. aquat. salviæ, menthæ, an. M. iiij. Cort. Aurant. n. vj. nuc. Moschat. contus. ℥℔. Infundantur in Cerevisiæ Brunsvicensis ℥xij. ac destillentur organis communibus, & eliciantur tantummodo Aquæ ℥vj. pro usu. Atqui præcisa dosis pulv. Ari comp. observetur, aut saltem eadem non minuatur.

CAPUT VI.

Febris Erysipelatosa.

NUllam non corporis partem, idque nullo non tempore incescit hic morbus, at præ reliquis faciem, exeunte præsertim æstate, quo tempore sæpe dum sub dio versatur, corripitur æger. Facies siquidem ex improvviso in tumorem attollitur, qui subito exorsus cum dolore ruboreque summis, denso minimarum pustularum ordine distinguitur, quæ auctâ magis inflammatione in vesiculas subinde facessunt; hinc per frontem ipsumque caput latius serpit, oculis interim tumoris magnitudine planè obrutis, (rusticis Syderatio audit) neque multum profectò abludit, nisi quod adsunt pustulæ, ab iis symptomatis, quæ inflicta ab apum vesparumque aculeis comitantur vulnera. Hoc se habet modo *Erysipelatis* notissima species ac vulgaris.

At verò quamcunque corporis partem hoc vitium obsederit, ut etiam quocunque anni tempore rigor atque horror, nisi præcesserint, (quod nonnunquam pridie, aut nudius-tertius solet contingere) huic se inflammationi ut plurimum adjungunt, satis insuper, inquietudo, ac reliqua Februm indicia, procedente morbo, uti primùm Febris dolorem, tumorem, atque alia peperit symptomata, (quæ indies ingravescencia nonnunquam in *Gangrænâ* terminantur) ita hæc invicem haud mediocrem ad Febris augmentum conferunt operam, donec remediis idoneis utraque restringantur.

Est & alia hujusce morbi species, licet rariùs occurrens. Hæc quolibet anni tempore invadit, idque hæc ut plurimum *προφάσει*, quod scilicet æger vinorum subtilium magis magisque attenuantium potationi paulò liberalius indulserit, aut liquoris similis spirituosi. Febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit, pustularum per universum ferè corpus eruptio, quæ urticarum puncturas referunt, & nonnunquam in vesiculas attolluntur, mox recedentes tuberculorum more sub cute se condunt, cum pruritu mordacissimo & vix tolerando, at quoties levissimam scalpturam subeunt, rursus apparent.

* Hic ego materiam peccantem sanguini permixtam ritè evacuandam, ejusdemque

* *Curatio,*

demque sanguinis ebullitionem remediis illam contemperantibus sufflaminandam censeo ; eam denique , quæ jam partibus impacta est , materiam evocandam , discutiendamque.

Hæc ut fiant , ubi primum accedo , satis largam sanguinis quantitatem è brachio extrahi præcipio , qui quidem Pleuriticorum sanguinem ferè semper æmulatur. Die sequente blandam illam Potionem Cathartica mihi in Praxi familiarem exhibeo , & horâ somni (si paulò frequentius dejecerit æger) haustum aliquem Paregoricum , e. gr. *Syr. de Meconio in Aq. fl. Paralyf. vel alium ejusmodi. Peractâ Catharsi , partem affectam sequenti decocto foveri jubeo. ℞. Rad. Alth. & Lil. an. ℥ij. fol. Malv. Sambuc. Verbas. an. M. ij. flor. Melilot. summit. Hyper. & Centaur. min. an. M. j. Sem. Lini & Fœnugr. an. ℥ss. Coq. in s. q. aq. ad ℥iiij. Coletur liquor. & tempore usus adde singulis libris Decocti , Spir. Vin. ℥iiij. Stupæ è panno laneo levis texturæ hoc decocto immersæ ac expressæ calidè , admoveantur parti bis in die , quæ post fotum quotidie illinatur seq. mixturâ. ℞. Spir. Vin. ℥ss. Theriac. Androm. ℥ij. pulv. Piperis longi , Caryophyl. an. 3j. M. Charta emporetica hæc mixturâ madefacta parti circumvolvatur.*

Æger insuper ut jusculis tantum hordeaceis atque avenaceis , cum pomis asfatis vescatur , volo , tum etiam cerevisiâ utatur tenuissimâ , & per horas aliquot singulis diebus à lecto sibi temperet. Hæc methodo tum Febris , tum alia symptomata citissimè ut plurimum fugantur. Sin aliter , rursus venam seco ; quod & tertium nonnunquam fieri debet , interposito semper die uno , si prava nempe adsit sanguinis diathesis , & Febris intensior. Diebus à Venæ-sectione liberis *Enema è Lacte cum Syr. Violaceo , & Julap. refrigerantia ex Aq. Nymph. &c. in Rheumatismi curatione jam dicta , qualibet horâ diei usurpanda præscribo. Ut plurimum verò unica Venæ sectio & subsequens Catharsis , si tempore adhibeantur , rem expediunt.*

Quæ urticarum puncturas , cum pruritu , refert species , pari modò est amolienda , nisi quòd hæc remediis ab extra applicandis minus egeat.

Hic obiter dicam , quod licet non solum hic affectus , de quo jam loquimur , sed & plerique eorum , qui cutim impetunt , & eruptionem aliqualem comitem sibi adjungunt , (modò Chronici ii non sint) facilè huic methodo cedant , ac proinde sanguinis missione & Catharsi iteratis brevi se proripiant , eorum tamen aliqui viâ planè diversâ tractandi sint , nec evacuationes modò dictæ quantumlibet repetitæ , nec *pulveres testacei* sanguini edulcorando destinati quicquam proficiunt , cum recrementa quædam pravam diathesin adepta intimius cuti impingantur , non nisi remediis , quæ sanguini robur ac vim conciliant , proindeque cutis spiraculis de obstruendis apta nata sunt , ullatenus amovendâ debellandaque : Cum successu itaque non vulgari sequentem methodum aggressus sum in *Pruritu serino* , atque inveteratis id genus cutis eruptionibus. Ut

℞. Theriac. Andromach. 3℔. electuar. de ovo ʒj. rad. serpentar. Virgin. subtiliss. pulverat. gr. xv. lapid. Bezoard. Oriental. gr. v. cum s. q. syr. e Con-

è Conditura Citri f. Bolus, sumendus mane & horâ somni per dies 21. superbibendo Cochl. vj. seq. Julapii.

℞. Aq. Card. Benedict. ℥vi. aq. epidem. & theriacal. stillat. an. ℥ij. syr. Caryophyl. ℥j. mis. f. Julapium.

Singulis matutinis post assumptum medicamentum sudet horæ unius vel alterius spatio, vel potius pluribus stragulis quam solet coopertus in lectulô levi madori indulgeat per dictum tempus. His finitis si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti linimento partes affectæ inungantur. ℞. Unguent. ex oxylapatho ℥j. unguent. pomati ℥j. flor. sulphuris ℥iij. ol. Rhodii ℞. f. liniment. Verumtamen medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæ-sectione atque catharsi ritè præmissis; quæ tametsi solùm adhibitæ curationem non absolvunt, ægrum tamen contra febrim præmuniunt, ob usum medicaminum calidorum alias occurruram.

Est & alia Eruptionis species, etsi minùs frequens, ad cujus medelam nullæ prorsus evacuationes conferunt. Hæc tametsi in aliis quandoque partibus, ut plurimum tamen in pectore apparet, ac loco aliquo determinato se figit, vix cutim supereminens, atque latiore maculam præ se ferens, nisi quod aliquantulum porriginosa, ac quasi furfuracea, cum squamulis colore ad flavum vergente tinctis, cernitur. Hac siye macula, siye impetigine vigente, æger bene se habet, eadem verò evanescente, ut sæpe fit, leviculam ægritudinem patitur, atque urina ejus turbidior, & rubicundior, sed ad flavedinem accedens, redditur. In hujus etiam affectus curatione eadem via atque iisdem post evacuationes universales, planè remediis insistendum, ac in Pruritu ferino modo dicto; ac proinde, quod non omittendum, vini, ut & carniū ὀψέων usus omnino concedendus, cum refrigerantia omnia magis officiant quam profint. Atque ita hæc postrema Eruptionis species curatur, quæ tamen aliquando non nisi Aquis Ferreis diu epotis cedit.

C A P U T VII.

Angina.

QUolibet anni tempore aggreditur, maximè tamen illo, quod Ver atque Æstatem interjacet, juvenes præ cæteris, & temperamento sanguineo præditos; Rufos etiam, quod non semel observavi, præ reliquis omnibus. Rigent horrentque mox à primò morbi insultu, sequitur Febris, & paulò post dolor, & Faucium inflammatio; cui nisi maturè succurratur, æger statim nec deglutire valet amplius, nec spiritum per nares ducere, sed cum sensu quodam strangulationis procluduntur Fauces ab inflammatione & tumore Uvulæ, tonsillarum, laryngis, ita ut tantum non suffocetur. Ingens ab hoc morbo periculum, utpote qui paucis nonnunquam horis hominem jugulat; quoties scilicet magna vis materiæ Febrilis in prædictas partes conjicitur, neque satis tempestivè convenientium remediorum usu, ingruenti occurritur procellæ.

* Opem laturus, sanguinem cum primis è brachio copiosè detraho, mox ex ranulâ utrâque; dein ut partes inflammatae melle Rosaceo spiritu sulphuris ad summum acorem permixto tangantur, author sum: mox Gargarisma sequens præscribo, non vulgari modo usurpandum, sed ita ut in ore sine ulla agitatione contineatur, donec incalescat, dein exspuatur, & repetatur subinde. R. Aq. Plantag. Ros. rubr. & Sperm. Ranar. an. ℥iij. Album. ovorum in aquam agitando redact. N. iij. Sacch. cand. Alb. ℥iij. F. Gargarisma. Jubeo etiam ut de Emulsione in cura Morbi lateralis præscriptâ vel simili, in dies sumat.

Sequenti mane, nisi Febris & dolor inter deglutendum perceptus aliquantulum remiserint, venam in brachio rursus ferio, Catharsi in diem posterum rejectâ. At si utraque hæc minuatur, Catharticum Lenitivum statim exhibeo; quod quidem post sanguinis missionem præ omnibus aliis perutile, ac apprise necessarium esse multiplici experientiâ comperii. Si fortean, quod quidem oppidò rarum est, Febris, aliaque symptomata, etiam post Catharsin, bellum minentur, iteratâ, ut prius, Venæ-sectione perdomanda sunt, ut & Epispastico amplo ac forti, posteriori cervici applicando. Per integrum hujusce morbi decursum, Enema Refrigerans Emolliensque omni mane, dempto illo quo Catharsi vacat, injiciendum, atque ægrum hoc pacto reficiendum quotidie præcipio. Carnes, cujuscunque demum generis, ut & juscula ex iis parata, sacra sunt; jusculis verò hordeaceis, avenaceis, pomis coctis ac id genus aliis vescitor; ptisanâ ex hordeo, vel cerevisiâ tenuissimâ utitor. Lectulo interim per horas aliquot quotidie absistat: cum hujus tepor tum Febrî, tum reliquis symptomatis, quæ hâc methodo expugnare satago, vires addat. Animadvertendum est autem, quòd istiusmodi Angina, quæ Febris, mihi Stationaria dictæ, symptoma tantum est, illa ipsa methodo curari amat, quam Febris ea sibi vendicat, ac proinde vel per διαφύεσις & cutis spiracula exterminanda est, vel per aliam qualemcunque medendi methodum, quæ Febrî Primariæ, cui inhæret, debetur, quod sedulâ observatione dignum.

Sunt & aliæ Febres Intercurrentibus jure merito annumerandæ, quæ, quoniam alio aliquo modo immediate ab initio sibi parant, & in hoc vel illo symptomate desinunt, vulgò Febres non habentur; licet tales ab origine verè fuerint, atque Affectus ille à quo morbus nomen mutuatur, Febris tantum sit Symptoma, quæ in illo demum terminatur.

Impræsentiarum duas tantum Hæmorrhagiarum species, Hæmorrhagiam scilicet Narium, ac Hæmoptoen, leviter perstringam.

† Hæmorrhagia Narium quavis anni tempestate infestat, præcipuè sanguine præfervido, temperamento verò debiliore præditos; idque magis ætate ingravescente, quam adolescente. Primò ut plurimum appulsu Febris præ se fert indicia, quâ derèpente sibi per nares, quâ data porta, faciente viam, dolor & calor incipit adhuc torquent. Sanguis ad horas aliquot profluit, dein aliquandiu sistitur, mox denuò erumpit, atque hæc vicissim: donec tandem vel remediorum usu, vel sponte suâ ob imminutam copiam, deperditamque co-

* Curatio. † Hæmorrhagia Narium.

Z

hibitus,

hibitus, omnino cessat; ita tamen, ut ægro singulis annis à recidiva metuendum sit, si vel à liquoribus spirituosus, vel alia occasione quâlibet æstuarè contingat.

Eum hîc mihi scopum propono, ut sanguinis fervor nimius atque Ebullitio, unde oritur dicta præter naturæ modum extravasatio, frænâ omnibus compescatur, ejusque impetus aliò vertatur. Ea propter frequenter brachii venas tundo, & sanguinem liberaliter extraho, *Pleuriticorum* sanguini colore semper respondentem. Victûs rationem refrigerantem atque incrassantem injungo. Ut aq. fontan. partes tres, Lactis unam simul coctas, & frigide hauriendas; poma cocta, juscûla hordeacea, & similia à carnibus abhorrentia. Julapia insuper refrigerantia atque incrassantia, unâ cum Emulsionibus, in morbis Inflammatoriis suprâ descriptis. Lectulo item ut absistat per aliquod spatium quotidie, nec vel semel quidem omittatur: Haustu quin etiam horâ somni Paregorico è Diacodio, ceu catenâ constrictus sanguinis furor coercetur. At verò cum hujusmodi Hæmorrhagias non rarò comitetur lymphâ acrior, quæ sanguini permixta ejus motum adjuvat, venarum orificia referando, præter revulsionem & refrigerationem, solenne mihi est Catharticum blandius, vel in ipsius morbi *auxilium* propinare, cujus operatione finitâ, Anodynum exhibeo præter solitum viribus auctum; & ubi symptoma penitus evanuerit, aliud demum Catharticum.

Quoad externas applicationes, Lintea quadruplicata immersa aquæ frigidæ, in qua *Sal prunellæ* dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur Nuchæ ac utrinque Cervici sæpius in die. Item post universas evacuationes peractas liquor sequens applicetur. *R. Vitriol. Hungar. & Alumin. an. ʒj. Phlegmatis Vitriol. ʒss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta. Liquorem frigescentem filtra, & à Crystallis subinde natis separa. Liquori residuo adde Ol. Vitriol. duodecimam partem. Turunda ex linteo raso liquore hoc probè humectata, nari ex quâ sanguis stillat indatur, per dies duos isthîc relinquenda.* Quo etiam liquore linteamina imbuta & applicata sanguinem sistunt ex quâcunque demum parte externa idem defluat.

* *Hæmoptoe* etiam, quæ in æstatis ac veris confinio homines calidioris temperamenti, at minus robusti adoritur, & quorum pulmones minus rectè valent, præ senibus item juniores, ejusdem ferè indolis cum Hæmorrhagiâ jam tractatâ mihi est, cum & hæc quoque Febris sit, quæ tam nomen, quàm essentiam exuit suam, illi quâ soluta est Crisi; hîc ferè tantum discrimine, quòd in morbo *priori* sanguis nimium agitato in narium venulas, in *hîc* verò in pulmones impetum facit; utque in illo, durante fluxu dolor & calor sinciput jugiter lancinant, ita in hoc pectus uterque obsidet cum debilitate quadam. Quin & hoc vitium eandem ferè quàm Hæmorrhagia narium methodum medendi sibi vendicat, nisi quod Catharsin minus ferat, à quâ, præsertim repetitâ, æger facile in tabem conjicitur. Ad Phlebotomia crebrò celebrata, Enema quotidie injectum,

* *Hæmoptoe.*

atum, Diacodium horâ somni propinatum, Diæta insuper, & medicamenta, tam incrassantia, quàm refrigerantia, opus pro vòto absolvent.

Atque hæc sunt, quæ hætenus observavi de numerosa ista Morborum Tribu in varias familias dispertitâ, qui *Febrium* sub nomine censentur, atque de iis symptomatis, quæ ab illa pendent, in quibus id seriò egi, ut nullas Putationes meas, nulla imaginaria Cerebri commenta orbi venderem; animo verò sincero candidoque, nullique adeò Hypothesi adstricto, eorum Historiam & naturalia Phænomena aliis traderem; Curationes enim pari fide, & cautelâ pari subnecterem. Quod si vehemens desiderium Methodum certioreminusque lubricam, in utilissimo tuendæ mortalium vitæ negotio, expiscandi constabiliendique, me in semitas nullo antea pede calcatas pertraxerit; nemo eruditorum, uti spero, mihi imputabit, quòd vel spretis aliorum judiciis, meo nimium fidam, vel rebus studeam novis; cum & non spernendus rerum eventus mihi hæc investiganti ingentes hucusque animos dederit, & posterorum experimenta sine dubio meam fidem sint liberatura. Et profectò haud oscitanter impugnandum est hoc morborum tam pestiferum agmen, quod nullo non die cum genere humano bellum gerit internecinum, atque ἀσπρόδον; & cujus telis duo ad minimum hominum trientes, si eos demas, qui violentâ morte perimuntur, confossi quotannis occumbunt. Indefinentes horum morborum impetus, & quotidianæ, quas etiam de viris robustissimis & ætate maximè florentibus reportabant, Victoriæ, (non obstantibus suppetiis iis omnibus, quæ nobis hætenus attulere speciosæ istæ Methodi in speculativorum libris satis fidenter descriptæ) animo meo hæc primum agitati minus satisfaciebant; cum reapse cernerem, ludicra ista Cerebroforum commenta ita parum ad redintegrandam ægrorum sanitatem conferre, ut qui ad Asyla hæc confugerant, quicquid pollicitarentur Thrasones Dogmatici, haud meliori in locò essent, quàm qui neglectâ Arte se totos naturæ permiserant. Si quid ego hîc egero, quo vel periculi, vel etiam difficultatis, quæ in his morbis persanandis plerumque occurrunt, pars aliqua levetur, (quod salvâ verecundiâ, me mihi polliceri posse saltem spero) scopum quadantenus assequutus sum, & dulcissimum improbi laboris in bono Proximi quærendo rectè collocati, fructum fero. Hæc præcipua fere sunt quæ jam habeo comperta, (vel saltem ad methodum aliquam novi reducere) circa *Febres & symptomata*, quæ ab eisdem pendent ad hunc usque 30. Decembris diem, An. 1675. quò hæc conscribo.



EPISTOLÆ RESPONSORIÆ DUÆ

A THOMA SYDENHAM M. D.

Prima

DE MORBIS EPIDEMICIS

ab Anno 1675. ad Annum 1680.

Ad ROBERTUM BRADY M. D.

Secunda

DE LUIS VENEREÆ HISTORIA

ET CURATIONE

Ad HENRICUM PAMAN M. D.

CLARISSIMO VIRO

THOMÆ SYDENHAM, M. D.

NEMO uspiam Medicorum, Vir eruditissime, adhuc vim aëris & influentiam in humana corpora attentè perpendit, nec in vita nostra perennanda quas agit partes eorum quispiam consideravit satis, viresque quas exerit in fermentando, & circumducendo sanguinē, aut in motibus animalibus quibuscunq; peragendis cujus sit energiae, & efficaciae horum non aliquis notavit; neque ejusmodi temperiem naturalem, alterationes multiplices & mutationes, quas Constitutiones haud perperā indigitas, ne leviter quidem, vel Medici, vel Historiæ Naturalis Scriptores attigerunt, multò minùs perscrutari sategerunt. Fieri sanè nequit,

quit, cum in omnes corporis partes, etiam reconditissimas, aër sese insinuet, quin quas subit alterationes & mutationes a rebus quibus imprægnatur easdem sanguini & succis communicet, & imprimat; unde ut plurimum ab hac vel illa prava aëris constitutione oritur hujus vel illius indolis prava sanguinis Diathesis. Optimo itaque consilio Observationes Medicas circa morborum acutorum historiam & curationem juxta varias annorum & eorundem partium constitutiones instituisti, cum in iisdem, aëris actiones in sanguinem, succos, & spiritus præsertim (si ipse non sit spirituum materia) conspiciantur. Et nullus dubito quin Febrium indoles ab annorum temperie in quibus grassabantur observata, utilissimam, si non unicam, methodum constituit ad praxim stabiliendam. Perge itaque, & si quæ adhuc restant Observationes Febrium annorum nuperrimè elapsorum, fac ut palam fiant, quâ in re quàm maximè humani generis salutis prospicies.

In Sectione prima, Cap. quinto, libri tui, paucis egisti de usu Corticis Indici, & ejusdem exhibendi methodo. Equidem scio quosdam haud infimi subsellii Medicos, qui in magnâ quantitate & dosi sæpius repetitâ eum exhibent; alios item qui ex eodem extracta, infusiones, & ex infusionibus julapia, & emulsiones conficiunt, quibus modis se non tantum Intermittentes, sed & continuas quasdam certò curare affirmant: Magnum procul omni dubio in curandis Intermittentibus est remedium. Ego quidem per 20. plus minus annos dictum Corticem variâ forma & multiplici præparatione maximo cum successu exhibendum curavi. Si verò peculiare quippiam de usu hujus Corticis nosti, vel quid melius progrediente experientiâ fueris edoctus, id ne graveris precor in lucem proferre.

In curatione Rheumatismi frequentem Phlebotomiam, & largâ manu celebratam tanquam necessariam proposuisti. Quærerem Ego an non rejectâ tam severa & crudeli methodo, alia non humani sanguinis adeò prodiga, nec minùs certa inveniri possit. Dum hæc agis, Dignissime Vir, malevolorum jurgia, & invidorum stigmata atque calumnias sat superque persenties; neque nunc minùs quàm olim nomini tuo aut famæ parcent, licèt ingenuis ferè omnibus displiceant, & candidioribus, apud quos solenne est istiusmodi detractores despicere. Isti verò, si Febrium historiam longo usu comprobatam, vel earundem essentias, causas, & differentias, vel veram tandem

Medendi Methodum expiscari volunt, Te Ducem & viam præmonstrantem sequi necesse habent; cum vix, aut ne vix quidem, alia, vel earum naturam investigandi, vel curandi ratio possit assignari. Maeste itaque esto, & sperne sciolorum dicteria; sincerorum hominum ingenia excita; tu methodum monstrasti, & si tua non placet, qui carpunt dent politiolem & magis firmam. Vale, Vir Integerime, qui hisce peragendis totam Medicorum turbam meritò devincies, inter reliquos verò

Tibi jure meritoque amicissimum,

Cantabrigiæ,

Decemb. 30. 1679.

R. BRADY.



Amplissimo Doctissimoque Viro

ROBERTO BRADY, M. D.

Collegii Cajo-Gonevillensis Custodi, nec non Regio in Medicinâ apud Cantabrigienses Professori longè celeberrimo.



E certè, Vir Humanissime, si quid in morborum curatione profecero, ad omne id cuius efflagitanti impertiendum præ cæteris qui nunc sunt homines facillimum esse omnino par est: si enim ea tantum mihi innotescant quæ & reliquis mortalibus, (quod mihi plus satis constat) nullo pacto mihi obfuerit levidensia ista & è triviis desumpta evulgare, sin autem assecutus sim aliquid quod è re Medica sit, & ad certiolem morborum Therapeian faciat, non tam mihi laudi dabitur, quàm aliis daretur quibuslibet, ea in lucem expromere; Qui & à Podagra jam ab annis plus minus triginta, & calculo diu malè multatus, facile mecum reputo, quàm seriò gauderem, si quod meis malis levamen aliorum indicio possit afferri. Cum autem paucissimis ingens illud privilegium à Deo Opt. Max. concedatur, ut publico comodo hæc in re inservire queant, iisque tantum, quibus è *meliore luto* quàm mihi *finxit præcordia Titan*, votis agendum est, quod reapse effectum dare non

non fatis est virium : Semper enim existimavi, neque id sine ratione, majoris esse felicitatis certam vel levissimi alicujus morbi debellandi methodum ægris mortalibus prodidisse, quam vel *Tantali*, quod aiunt, vel *Cræsi* thesauros accumulasse. Feliciorem hoc illum dixi; dicam & meliorem, sapientio-remque : quod enim uberius & sapientiæ & bonitatis suæ specimen quis potest edere, quam, cum se è communi generis humani natura decimum animadvertat, ea quæ molitur omnia ad publicam magis omnium utilitatem, quam ad suam ipsius, qui tam exilis totius particula & contempta res est, jugiter referre? *Ut enim* (loquor cum maximo illo dicendi sentiendique magistro *Cicero* meo, sui sæculi, ne dicam universæ hominum naturæ Genio) *leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic Vir bonus & sapiens & legibus parens, & civilis officii non ignarus, utilitati hominum, plusquam unius alicujus, aut suæ consulit.* *Cicero de fin. bon. & mal.* Quinimò fatis liquet, quòd cum facinorosi sit hominem jugulare, boni viri erit eundem vel conservare, vel alios iis instruere præsiidiis, quibus adjuti eum ab interitu vindicent, etiam auctore vitæ jam functo. Et vox illa planè inhumana & scelerata audit eorum, qui negant se recusare, quò minus ipsis mortuis terrarum omnium deflagratio consequatur.

His autem impræsentiarum missis factis, fatendum est, debere me ea, quæ de his morbis, de quibus percontari libuit, animo volutavi, utut exilia, tibi planè aperire, Tibi, inquam, Eximio Viro, & *Spartæ* quam ornas dignissimo; cujus ego & eruditioni & probitati, animique candori ea tribuo encomia, quæ reliqua Togatorum Gens, inter quos nites. Prætereò etiam, quantum tibi debeo gratiarum, quòd te tam malè habeant immerita illa, quibus à nonnullis proscindor convitia; de quibus hoc habeo dicendum, quòd si vita innocua hominis, qui neminem neque facto neque dicto læserat, me ab illis sartum tectum reddere valuisset, nunquam in me detonuerant. Cum autem nullo id meo crimine evenerit, neque, ut spero, eveniet unquam, stat sententia non me ideò plectere, quod alii deliquerint, id tantum ratus ad me attinere, ut viri probi scilicet officio defungar, & boni Medici, quantum patitur tenuitas nostra.

Morem itaque geram in tradendis observationibus, quæ mihi in morbis, de quibus sciscitabar, occurrebant. Primum autem agam de *Febribus intermittentibus* nunc apud nostros Epidemicis. Quo nomine non abs re fore arbitror annos istos ordine, sed breviter percurrere, qui illum excipiebant, quo claudebatur *Historia Acutorum Morborum* (qualis qualis illa demum fuerit) qui per præterlapsos annos 15. grassabantur, & quædam obiter perstringere in eorundem curatione à me pridem notata. Quo facto melius innotescet, quo tempore & quibus gradibus, quæ jam obtinet *Februm constitutio*, nobis obreperit.

* Annus 1676. eosdem peperit morbos quos genuerat *Constitutio* postremo loco commemorata in dictis Observationibus, viz. Annor. 1673. (in cujus

jus Autumno ea se primùm exeruit) 1674, & 1675. At verò exolescente fermè hâc crasi, mitiores erant, quàm pro suo genio, qui subpullulabant morbi, & minus insuper Epidemici; non obstante peculiari ejus anni indole, quantum ad manifestas aëris qualitates, quibus ab annis præcedentibus perquam abludebat, cum & æstatis fervor, & frigus hyemis omnes fermè annos, quorum memoriam habemus, longo intervallo superaverint. Et cum tam ingens tempestatum discrepantia similes tamen morbos produceret, satis hinc liquet, non tam manifestam quàm occultam aëris temperiem Epidemicis morbis favere. At verò fatendum est, morbos eosdem quoad symptomata quædam aliquando à manifesta aëris diathesi pendere, quod & *Morbilli* & *Cholera Morbus* hoc anno invadentes testatum faciunt, de quibus breviter agamus.

Morbilli enim nascenti anno coorti, licet non admodum Epidemici, id tamen eximii habebant, quòd solitò longiùs procurrent; nam cum pro more suo mense primùm Januario comparentes, ad Æquinoctium usque vernum ingravescerent, dein paulatim imminuti cum Solstitio fere expirarent, hoc anno ad Æquinoctium fermè Autumnale pertingebant, ab æstatis calore, nisi fallor, aucti viribus, quò diutius obsisterent. Neque tamen Methodum Medendi ab usitata illa diversam postulabant.

Exeunte æstate *Cholera Morbus* epidemicè jam sæviebat, & insueto tempestatis calore evectus, atrociora Convulsionum symptomata, eaque diuturniora secum trahebat, quàm mihi prius unquam videre contigerat. Neque enim solum abdomen, uti alias in hoc malo, sed universi jam corporis musculi, brachiorum crurumque præ reliquis, spasmis tentabantur dirissimis, ita ut æger è lecto subinde exiliret, si fortè extensò quaquaversum corpore eorum vim posset eludere.

Quamlibet autem hic morbus non aliam à recepta medendi rationem sibi vendicabat, *Anodyna* tamen fortiora, eaque sæpius ingerenda quàm alias solebam, omninò indicabantur. Ex. gr. Ad quendam vocatus per id temporis truculentissimo illò, quod modò descripsi, symptomate tantum non eneatum, (me autem comitabatur *Carolus Goodall* M. D. cujus animi Candor, Probitas illibata, summus in me amor, labor improbus in morbis dignoscendis curandisque unà cum nomine mihi semper occurrunt) & enormi vomitione, spasmodumque violentiâ animam agentem, cum sudore frigido, & pulsu vix micante, guttas 25. *Laudani liquidi*, à me jam olim publicati, in cochl. i. *Aq. Cinnamomi fortis* exhibendas curavi, veritus sc. ne vehiculum paulò copiosius medicamento rejiciendo (quod in movendi tam impenso conamine persæpe fit) ansam daret: dein lecto assidens quasi ad semihoram, & expertus Remedii vires nec Vomitioni compescendæ, nec sedandis Convulsionibus adhuc pares esse, toties illud ipsum repetere, & dosin in tantum augere cogebar, (interposito tamen spatio, ut quid à jam ingesto mihi foret sperandum prius ediscerem, quàm novas adferrem suppetias) donec tandem pervicacissima illa symptomata sub jugum victoris mitterentur, quod tamen vel mi-

nimo corporis motu excitata denuò excutere satagebant. Serio itaque imperavi, ut & corporis quieti modis omnibus indulgeret ad paucos dies; & Medicamentum jam dictum, sed in minori dosi, subinde assumeret, etiam postquam convaluerit, ad *εὐεξία* sc. confirmandam; quod nobis ex animo cessit.

Neque est cur me quispiam iusto audaciorem pronunciet, eò sc. nomine, quòd tantam Laudani Liquidi vim ægro infundere non dubitaverim; cum iudice experientià certò constabit, quòd in quibus affectibus ex *Opio* parata indicantur, (sunt autem tres, *vehemens dolor, vomitus, vel dejectio enormior, & insigniores spirituum animalium ἀταξία*) in iis & Remedii Dosis, & repetendi vices cum symptomatis magnitudine omnino sunt conferendæ. Quæ enim dosi remissiori symptomati coërcendo par est, ea ab aliò fortiore superabitur, & quæ alias ægrum in manifestum vitæ discrimen conjiciet, eundem impræsentiarum ab orci faucibus liberabit.

* Atque hi sunt morbi isti, qui hoc anno populabantur, iidem sc. ut jam innui, cum morbis trium annorum præcedentium. Quales autem fuerint, qui annum sequentem viz. 1677. funestaverint, non habeo dicere. Cum enim molestissimo sanguinis mictû, à motû vel levissimò, sub anni initiò male multarer, neque ita diu postea Podagrâ etiam, quæ non jam tam artus, quàm viscera sævissimo dolore excruciat, accedentibus insuper virium & appetitûs prostratione, crurum tumore, aliisque symptomatis non minùs periculosis, (quem, si tùm fuërim extinctus, mors certè non tam à bonis quàm à malis abstraxisset, haud equidem repugnantem) me domi meæ ad menses tres continere, deinde redintegrandæ sanitatis causa per idem ferè spatium rusticari coëgebar: *Autumno* reversus ad meos, Febres Intermittentes hinc inde sparsas esse (quarum tamen pars maxima ægros non in urbe primùm invaserat) ab amicis didici; cum autem mihi per valetudinem non liceret ægros invisere, de hoc anno nihil melius silentiò possum adferre.

† Proximi anni (viz. 1678.) *Constitutio* prorsùs immutata *Febribus Intermittentibus* (quæ jam ab anno 1664. ad trèdecim sc. annos urbe ferè exulaverant, nisi quòd nonnullos sporadicè occuparent, vel ex agris fortè comitarentur) usque adeò favebat, ut Epidemicæ rursùs audirent; neque eum tamen gradum hodie tuentur, quin & fines latius proferent, donec hæc, à qua pendet, aëris *διάθεσις* suam *ἀρχήν* attigerit. Quantumlibet autem dictæ intermittentes pauciores aliquot etiam tempore Verno fuerint adortæ, eo usque tamen exeunte Æstate & Autumno subeunte præ cæteris sæviebant, ut nulli ampliùs morbo Epidemici nomen relinquerent. Hyeme verò paululùm fatiscentes *Variolis* locum cedebant, atque aliis insuper Epidemicis, qui per omnia dominabantur, donec Intermittentibus apta tempestas in orbem rediret.

Sed ut jam edisseram, quæ de harum Febrium & naturâ & causis sedulâ observatione allecutus sum: imprimis notandum est, quòd licet olim *Quartanæ* frequentius occurrerent, nunc dierum aut *Tertianæ* erant, aut *Quotidianæ*, (nisi quis postremas has *Duplices Tertianas* malit appellare) & pariter quod

licet Tertianæ Quotidianæque aliquando cum rigore atque horrore invadentes, subsequente primùm calore, mox etiam sudore, tandem in omnimoda ἀσυμμετρία definerent, atque post statim periodum ægros de novo lacefferent; ne hunc quidem jam morem servabant ultra tertium quartumve Paroxysmum, maximè si æger lecto addiceretur, & assumptis Cardiacis calidioribus oleum camino, quod ajunt, addiderit. Postea verò Febris hæc eo usque etiam præter indolem suam incrudescebat, ut *Intermissionis* loco *Remissionem* tantum ægro concederet; & magis indies ad *Continuarum* speciem accedens, tacto Cerebro tandem haud paucos extingueret.

Curationem quod spectat, jam à multis annis mihi innotuit, quam sit periculosum eam in Tertianis & Quotidianis (quæ cum recentes sint nullumque typum indutæ in continuitatis vicinia adhuc hærent) per sudorifica moliri: quamvis enim notissimum sit simul cum sudore prorumpente inquietudinem atque alia symptomata statim evanescere, & ἀσυμμετρία succedere, & ex consequenti huic paululum esse indulgendum, saltem non esse obsistendum Paroxysmo fatiscente, tamen est compertissimum, quod si justo copiosius eliciatur sudor, quæ intermittebat, Febris jam fit Continua, ægerque tanquam incerto aleæ casu in vitæ discrimine versatur, hic servatur, perit ille. Ratio est hæc, nisi mea me fallit conjectura, quod sc. istiusmodi profusus sudor, cum materiæ febrilis, paroxysmi calore eo usque evectæ, ut jam per despumationem ejici possit, modum exuperet, exterminatæ eâ parte, quæ unico paroxysmo respondet, de reliquo sanguini incendendo impenditur. Hujus itaque methodi inefficiam, & aliarum evacuationum, Venæ-sectionis v. gr. & Catharsecos incommoda (quarum utraque relaxando tonum sanguinis morbum protrahunt) dum mecum perpenderem, *Peruvianus Cortex* certissimam mihi spem fecit, de quo verè affirmare possim, non obstante tam vulgi, quam perpaucorum è doctis præjudicio, me nihil mali ægris accidisse ab ejus usu vidisse unquam, vel cum ratione suspicari potuisse, nisi quod illi, qui longum & repetitum corticis Peruviani usum experti sunt [ut in *Capite de Rheumatismo* præmonstraverim] in speciem quandam *Rheumatismi Scorbutici* nonnunquam incidunt. Hoc autem malum perquam rarò ex hac occasione nascitur, & quando accidit facillimè Remediis ibidem descriptis cedit.

Et profectò si tam effectorum durationem, quam Corticis hujus innocentiam exploratam haberem, principem illi locum inter omnia quotquot sunt remedia deferre nullus dubitarem; cum non tantum in hoc morbo insignium esse virium deprehendatur; sed & in Uteri & Ventriculi etiam affectibus: Tantum abest, ut de ejus insalubritate meritò quis conqueratur.

His autem potissimum de causis, nisi fallor, dictus Cortex male audit. Primò quia plurima illa horrendaque symptomata, quæ Febres Intermitteutes jam diutius ægrum cruciantes comitantur, etiam ubi ne minimum quidem Corticis degustaverit, Cortici, vel semel assumpto, imputantur. Secundò quia cum occultâ vi & non per sensibilem aliquam evacuationem morbum averruncet, statuunt plerique materiam morbum committentem quæ propelli debue-

debuerat, tanquam hostem intra moenia vi Corticis astringente inclusam latere, novos daturam tumultus, atque ægrum non penitus evasisse cum adhuc catenam trahat. Ast hi non satis attendunt Sudores paroxysmum finientes id omne quod in lucido sanitatis intervallo accumulabatur prorsus eliminasse, manere tantum morbi seminium tempore maturandum; quodque Cortex fugientem paroxysmum à tergo urgens, & intercepto qui debuerat subministrari morbi commeatu sive fomite, non potest in sanguine retinere quod jam in illo non nisi tanquam in embryone reperitur; ac proinde neque strangulationum, neque obstructionum, quæ vulgò obijciuntur, reus est peragendus.

Quo autem pacto deprehendemus Corticem vi sua astrictoria Febres fugare? Qui id probare velit, necesse erit prius alia astringentia pari virtute prædita in medium afferat; mihi certè vel eorum fortissima adhibenti in experimentum nondum è voto cessit. Quid quod illos etiam sanat, qui ab ejus usu tanquam à Cathartico assumpto (quod nonnullis accidit) frequenter alvum deponunt? Id verò demum est rectè sapere suo se quemque pede ac modulo metiri. At si quis fucum sibi faciens, aliis se præditum esse facultatibus existimaverit, quàm quæ inserviunt percipiendæ vel *Naturali Theologiæ*, (ut Deo sc. rerum omnium Architecto & Moderatori debita veneratio cum profundissima animi prostratione jure merito exhibeatur) vel *Philosophia Morali*, (ut virtutem exerceat, & mores tam ad privatum quàm publicum Societatis Humanæ bonum accommodet) vel denique *Arti Medicæ*, *Mathematicæ*, & *Mechanicæ* (quibus vita communis adjuvatur.) Hic primùm Hypothesin aliquam è schola *Naturalis Philosophiæ* depromat, quâ vel unicam differentiam specificam rerum in natura possit enodare; ex. gr. rationem reddat quare *Gramen* omne viridi ubicumque colore, nusquam aliò cernitur infectum, &c. Hoc si effecerit in ejus castra haud invitus transeam; sin aliter, non verebor dicere quò Medici cura omnis atque industria in expiscanda Morborum Historia, iisque remediis adhibendis, quæ *Experientiæ Indice* ac *Magistrâ* eosdem valent depellere, debent collocari; observata tamen istâ medendi Methodò quam recta ratio (non speculationum commentis, sed tritò & naturali Cogitandi modò innixa) ei dictaverit. Dicam itaque paucis quod usu didici de Methodò qua Cortex nobis usurpandus venit.

Cortex Peruvianus, cujus *Pulvis Patrum* vulgò nomine insignitur, annis abhinc quinque & viginti [si benè memini] apud Londinenses nostros in exterminandis Febribus Intermittentibus, maximè Quartanis, primùm coepit inclarescere. Idque optimo sanè jure, cum hujuscemodi morbi rarissimè ab ullo alio, sive Remedio, sive Methodo Medendi, antea expugnarentur, unde etiam opprobria Medicorum & erant & audiebant. At verò non ita multo tempore elapso, duabus de causis, non quidam levibus, damnatus in desuetudinem prorsus abiit. Primò quia paucis horis antè adventum Paroxysmi, pro recepto id temporis more, exhibitus ægrum nonnunquam è medio tolleret; quod & civi cuidam Londinensi eidemque Senatori Urbano, *Underwood* nomine, & Capitaneo nomine *Potter* in vico vulgò dicto *Black Fryars* Pharmacopolæ me-

mini accidisse. Funestior hic pulveris exitus, quamvis oppido rarus, medicos tamen paulo cordatiores ab ejus usu merito retraxit. Secundò quia æger ope pulveris à Paroxysmo alias invasuro liberatus, quod plerumque eveniebat, tamen intra dies 14. recidivam ut plurimum pateretur, in morbo scilicet recenti, necdum temporis cursu suoque Marte committigato. Maxima pars hominum his permota rationibus spem de hoc pulvere jam pridem conceptam protinus abjiciebat: Neque enim tanti æstimabant Paroxysmum ad paucos dies protelare, ut se eo nomine in vitæ discrimen à pulvere intentatum induci paterentur. Ego verò jam ab aliquot retrò annis haud vulgarem hujus Corticis vim seriò perpendens, animoque revolvens, non aliò magis quam hoc Herculeo medicamentò Febres intermittentes debellatas iri confitebam, si quâ par erat cura accederet, & diligentia. Diu itaque multumque apud me agebam, ut & *Periculo* à pulveris usu impendenti, & *Recidivæ* intra paucos dies subsecuturæ [quæ duo erant amolienda incommoda] possem occurrere, atque ægrum hujus ope ad perfectæ sanitatis gradum promovere.

Primò *Periculum* quod minitabatur, non tam ex ipsò Cortice natum arbitrabar, quam ex eò quòd minus opportunè ægro ingereretur: cum enim vis ingens materiæ febrilis diebus à Paroxysmo vacuis in corpore fuerit aggesta, pulvis prædictus, si immediate ante Paroxysmum deglutiat, facit quò minus materia morbifica ipsâ naturæ methodò, Paroxysmi scilicet impetu, possit eliminari, quæ proinde præter fas inclusa ægrum in vitæ discrimen solet conjicere. Hoc ego me malum propulsare posse existimabam, materiæque pariter febrili de novo generandæ obicem ponere, si ubi primum Paroxysmorum unus affligere desierit, confestim pulverem exhiberem quo infecuturus sufflaminaretur, & diebus Intermissionis statis subinde vicibus eundem repeterem usque dum novus invaderet Paroxysmus, atque ita paulatim, tutòque proinde, sanguinis massam salutiferâ Corticis virtute penitus inficerem.

Secundò cum *Recidiva*, [quæ intra dies 14. plerumque accidebat] ex eo mihi videbatur nasci quòd sanguis non satis exsaturaretur virtute febrifugi, quòd utut efficax, una tamen vice morbo penitus exterminando par non fuit, idcirco autumabam nihil ad eam præcavendam æquè posse conducere atque methodum repetendi pulveris, etiam devicto ad præsens morbo, justis semper intervallis, antequam scilicet vires præcedentis dosi prorsus elanguescerent.

His itaque rationum mementis innixa mens, eam, quâ jam utor, mihi methodum dictabat. Ad ægrum *Quartanâ* Febre laborantem accersitus (die *Dunæ* v. gr.) si Paroxysmus eòdem die sit invasurus, nihil prorsus moveo, sed id tantum ago ut spem faciam eum à proximè venturo liberatum iri. Ac proinde binis diebus Intermissionis, (Martis sc. & Mercurii) Corticem exhibeo hunc in modum. R. Cortic. Peruv. subtiliss. pulverat. ʒj. cum s. q. syr. Caryophyl. vel de Rosis siccis, f. Electuar. dividendum in 12. partes, quarum unam capiat quartâ quâque horâ, incipiendo immediate post paroxysmum, superbibendoque haustum vini cujuslibet. Vel, si Pilulæ magis arrideant, ℞. Cortic. Peruv. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. syr. Caryophyl. f. Pil. mediocris magnitudinis, quarum ca-

piat

piat vj. quartâ quâque horâ. Sed minori cum molestia, eodem tamen fructu, hujus Pulveris uncia una admisceri poterit libris duabus Vini Clareti, atque ejus cochl. viij. vel ix. exhiberi iisdem quæ dicta sunt temporis intervallis. Die Jovis, quò metuitur Paroxysmus, nihil impero, cùm ut plurimum nullus accedat, reliquiis materiæ febrilis per solitos sudores, qui præcedentem paroxysmum absolvunt, despumatis ejectionisque è sanguine, atque intercisa novæ mineræ vel fomitis accumulatione repetito pulveris usu, diebus Paroxysmos determinantibus adhibiti.

Verum enim verò ne morbus denuò recrudescat (quod è prædictis incommodis erat alterum) die octavo præcisè à quo postremam dosin æger assumpsit eandem præfati pulveris quantitatem, (Unciam scilicet in partes 12. divisam) eadem quâ prius methodo, certo certius exhibeo. Quamvis autem repetita hòc modò semel Medicatio persæpè morbum conficiat, non tamen prorsus in tutò collocatur æger, nisi Medico tertio, quartove eandem methodum eòdem temporis intervallò iteranti parere non gravetur; maximè ubi sanguis à prægressâ aliquâ evacuatione fuerit debilitatus, aut se æger incautiùs auræ frigidiori ferendum exposuerit.

Verum etsi hoc remedium nullâ purgandi vi polleat, tamen ob peculiarem quorundam corporum temperiem atque idiosyncrasiam persæpè accidit, ut ab ejus usu tanquam à Cathartico fortiori assumpto æger violenter expurgetur. In hòc casu omnino oportet ut Laudanum cum eo exhibeatur, quò minus hanc operationem, tam suæ naturæ quàm morbo planè contrariam, ciere valeat, neque pulvis justo citiùs per alvum expulsus disperdatur, antequam suo fungeretur munere. In hoc itaque casu Laudani ejusdem gut. x. Vino instillari jubeo, & post alternam pulveris dosin assumi, modò Diarrhœa persistiterit.

Dicta Methodus usu mihi venit in cæteris Intermittentibus sive Tertianis, sive Quotidianis; utrasque enim statim à finito Paroxysmo aggredior, & repetito per jam commemorata Paroxysmorum interstitia medicamine (quantum scilicet earum fert indoles (urgeo atque à tergo premo; hoc tamen discrimine, quòd cùm Quartana rarissimè nisi Uncia una in doses dispertitâ, reliquæ sex Drachmis possint ita expugnari, ut inducias saltem concedant.

At verò Tertianæ, Quotidianæque, etsi post unum alterumve Paroxysmum omnino videantur intermittere, tamen non ita rarò (quod & à me ante est notatum) postea ad Continuum fere speciem vergunt, & ad Remissionem tantùm, etiam diebus quæ Intermissionem pollicebantur, accedunt; præsertim ubi æger lecto defixus regiminè justo calidiore, aut medicamentis Febri persudores ejiciendæ dicatis fuerit mutatus. Hoc in casu à remissione quantumlibet exiguâ (id enim mihi unum superest) ansam arripiens, pulverem quam proximè à Paroxysmo [quantum conjecturâ valeo] ingerendum propino, nempe quartâ quâque horâ ut modò dixi, ne quidem ipsum morans Paroxysmum, cùm aliter in spatio interjecto plus satis brevi alexeteria Corticis vis sanguini impertiri nequeat.

Cum autem Febres quæ jam apud nos grassantur, etsi post secundum tertiumve paroxysmum reponere se in classem Continuarum nitantur, tamen ad Intermittentes debeant referri; nulla mihi est religio *Corticem* vel in maxime *Continuis* hujus speciei sumendum proponere, qui dicto more iteratus ad apyrexiam certò ægrum perducet, modò assiduus *Lectuli* calor, & intempestivus *Cardiacorum* usus continuitatem Febri non conciliaverint; quò in casu *Peruvianum corticem* nihil quicquam profecisse plus semel observavi. Neque mihi unquam contigit ut viderem *Vinum* in quo propinatur *Cortex* [quod jure quis possit suspicari] febricitanti obfuisse; è contrà verò, calor, sitis, cæteraque *Febris* Symptomata ut plurimum post assumptam hujus remedii quantitatem sufficientem, mox evanescent, vino haud obstanti. Hic autem observandum, quòd quò magis *Febris* sive sponte suâ, sive regimine calidiori ad Continuitatem accedat, eò major *Corticis* quantitas exhibenda; ita ut nonnunquam viderim morbum hunc non nisi sesquiunciae, vel unciiis ejusdem duabus cessisse.

Cum verò sint aliqui qui *Corticem* hunc nec in *Pulveris* forma, nec *Electuarii*, nec tandem *Pilularum* ferre queant, his ejusdem infusum in frigido factum propino; *℥ij. sc. Corticis grossè pulverati in Vini Rhenani ℔ij.* aliquandiu macero. Liquor hic per manicam Hippocratis sæpiusculè trajectus, colore limpidus adeò non officit, ut vel delicatulorum palato arrideat; ac dictæ Infusionis *Unciæ* quatuor ad dies aliquot factæ, virtutem *Drachmæ* unius *Corticis* in pulvere exhibiti videntur continere. Quæ cum nec ingrata sit, nec ventriculum premat, duplo frequentius usurpari poterit, quàm reliquæ ejusdem remedii formulæ, nempe donec *Paroxysmi* terga dederint.

Quandoque accidit ut in hoc morbo malè formato, nec dum in typum regularem evecto, æger ob vomituritionem ferè continuam *Corticem* deglutitum, quacunque demum forma exhibeatur, retinere nequeat: In hoc casu vomitio prius est compescenda quàm *Cortex* propinetur. Ad quem scopum collimans jubeo, ut sexies vel octies spatio duarum horarum *succi limonum recens expressi Coch. j. cum salis Absint. ʒj. assumat.* Deinde *Laudan. liquid. gutt. xvj. cum aq. Cinnamom. fort. Coch. j.* Ac brevi post, si vomitus cessaverit, usum *Pulv. Peruv.* aggrediatur.

Pro Infantibus, quorum ætas tenella vix feret: ut aliâ formâ hoc remedium assumatur, (saltem ea quantitate quâ devincatur morbus,) sequens *Julapium* præscribere soleo. *℥. aq. Cerasor. nigr. & Vini Rhenani an. ʒij. Cort. Peruv. subtilissimè pul. ʒiij. syr. Caryophil. ʒj. m. s. f. Julap. Cap. Cochleare unum alterumve pro ratione ætatis, quartâ quâque horâ, donec paroxysmi non amplius discrucient; instillando alternis dosibus, si Diarrhœa adfuerit, Laudani liquidi gutt. j. vel ij.*

Observandum est insuper, quod cum breviora *Paroxysmorum* interstitia in *Tertianis* & *Quotidianis* *Intermittentibus* non satis temporis concedant ad sanguinem febrifugâ *Corticis* virtute plenè exsaturandum, fieri non potest ut æger proximum à prima medicatione *Paroxysmum*, uti in *Quartana* solet evenire, certò

certò effugere valeat, sed in his medicamentum sæpe non nisi post biduum promissam curationem absolvet.

Animadvertendum autem quod si æger, non obstante abundanti cautela superius tradita, nihilominus recidivam patiatur, (quæ in Quartanâ ipsâ rarius accidit, quam in Tertianis, vel Quotidianis) tamen prudentis Medici erit non nimium pertinaciter insistere methodo Corticis per dicta intervalla exhibendi, sed pro suo judicio aliis modis curationem aggredi, cui præ cæteris *Decoctum amarum*, quod appellant, magnopere conducere vulgò creditur.

Dietam quod spectat cæterumque regimen, nec à cibò nec à potù arcendus est æger, qualis qualis is demum fuerit qui ad stomachum facit; Fructibus tamen horariis & liquoribus frigidis (utpote & infirmandæ sanguinis massæ & Febri postliminiò reducendæ admodum conferentibus) semper exceptis. Vescatur itaque carnibus eupeptis & euchimis, & vino modicè utatur pro potu ordinario; quâ re solâ ægros nonnunquam restitui, etiam eos quorum corpora ob frequentem febris recursum contra Corticem quasi communita, saluiferam ejus vim perpetim eludebant.

Neque verò se temerè auræ frigidiori committere debet æger, donec sanguis pristinum vigorem de novo obtinuerit.

Hic autem advertendum, quod cum de Febribus Intermittentibus olim agens, ægrum sublatò morbo sedulo purgatum iri admonuerim, hoc intelligi velim de iis solum febribus quæ vel sponte suâ, vel aliò sive medicamento sive methodo præter Corticem Peruvianum erant debellatæ. Etenim Curatio, cum huic Remedio, de quo jam loquor, innitatur, purgatione nec eget, nec eandem planè fert. Ità potenter dictus Cortex sine ope Catharticorum non solum *Paroxysmis*, sed & *Dyscrasiæ* quam corpori iidem inflixerunt, subvenit. Vitandæ itaque ante omnia Evacuationes qualescunque, cum vel blandissima Catharsis, quin imò Enema à lacte Saccharato in morbi discrimen certissimè, fortè in morbum ipsum denuò ægrum conjiciet.

Hic autem commemorare libet, quod sub primos hujus Constitutionis annos, symptoma quoddam insigne Febribus Intermittentibus quandoque supervenerit. Nempe earum Paroxysmi non cum rigore & horrore, quas postea Febris excipit, invadebant, sed æger iisdem planè symptomatis tentabatur, ac si *Apoplexiâ* verâ laborasset, quæ tamen nihil aliud esset, utcunque hunc affectum æmularetur, quam ipsa Febris caput impetens: ut ex aliis signis, ita ex colore urinæ satis liquebat: quæ in intermittentibus ut plurimum rubore saturato extat, qualis cernitur in urinâ eorum qui Ictero laborant, etsi non adeò intensè rubet, & pariter sedimentum deponit pulverem laterum ferè referens. Hoc autem in casu quantumlibet evacuationes omnes, cujuscunque demum generis sint, indicari videntur, ad revellendos scilicet ex cerebro humores, ut in *Apoplexiâ* primariâ fieri solet: eadem tamen omnino omittendæ sunt, utpote quæ originariæ hujus symptomatis causæ, Febri nempe intermittenti prorsus adversentur, ac proinde mortem accersant; quod & ipse novi. At è contrâ expectandum donec paroxysmus sponte suâ evanuerit, quo

quo tempore Cortex, modò citius idem ingeri non poterit, quamprimum est exhibendus, & intervallis ab ejusmodi accessionibus liberis idem sedulò repetendus, usque dum perfectè convaluerit æger.

Nonnunquam accidit, etsi perquam rarò, ut Senes qui diu hoc morbo antea laborarunt, ac interea Venæ-sectionibus & Catharticis imperitè fuerint mulctati, in *Diabetem* incidant, etiam Febre jam perfectè fugatâ. Etenim cum sanguis eorum abhinc debilitatus assimilandis succis ei illatis prorsus impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & inconcocti exitum sibi quærunt, proindeque præ ingenti urinæ copiâ, quoties eam reddunt, excreta sensim vires labefactantur, & quasi substantia Corporis per hanc Cloacam exinanitur. In hoc affectu, uti & in omni *Diabete* ex quâcunque *ὑποφάσει* originem ducat, Curativæ Indicationes ad sanguinem invigorandum corroborandumque, ac pariter ad fluxum urinæ præternaturalem restringendum, omnino dirigendæ sunt. Ut *℞. Theriac. Androm. ʒiʒ. conserv. flaved. Aurant. ʒj. Diascordii ʒʒ. Zingib. condit. & nuc. moschat. condit. an. ʒiij. pulv. è chelis Cancr. compos. ʒiʒ. Cort. exterioris Granator. rad. Angelic. Hispan. Coral. rubr. præp. & trochisc. de terra Lemniâ an. ʒj. boli Arm. ʒij. Gum. Ar. ʒʒ. cum s. q. syr. de ros. siccis. f. Electuar. de quo sumat ad magnitudinem nuc. mosch. maj. manè, hora quinta pomerid. & nocte per mensem integrum, superbibendo seq. infusionis Cochl. vj. *℞. rad. Enul. Campan. Imperator. Angelic. & Gentian. an. ʒʒ. fol. absinth. Rom. marrub. alb. Centaur. min. & calaminth. an. M. j. Baccar. Juniper. ʒj. Incidantur minutim, & infundantur Vini Canarini lb. v. stent simul in infusione frigida. Coletur tantummodo tempore usus. Vescatur cibus *ἐμπέτοις*, viz. Carne vitulinâ, vervecinâ, &c. Abstineat ab esu olerum & fructuum qualicunque, & singulis pastibus bibat vinum Hispanicum.**

Eadem fere methòdo atque iisdem remediis contumax iste & diuturnus affectus, *Fluor sc. muliebris*, sanatur ac *Diabetes* modo dictus, nam utrobique Indicationes curativæ eadem sunt, quantumcunque inter se hi duo morbi dissidere videantur. At in *fluoris muliebris* curatione Venæ-sectio semel celebrata, ac postea Catharsis ex *Pil. Coch. maj. ʒij.* tribus vicibus repetita *Corroborantium* usui præmitti debent, deinde verò per totum processum omnino omitteudæ; cum quælibet evacuatio evertit quicquid corroborans substruxerit. Sed hæc obiter.

Hæc habui de Peruviani Corticis usu summam dicenda: Neque enim Remediorum pompæ libuit indulgere: Cum fanè qui aliquid Cortici adjiciunt præter vehiculum eidem in ventriculum transmittendo necessarium, aut ex ignorantia peccent, ut mihi videtur, aut dolo malo, à quo Vir Probus ex animo abhorrebit; qui cum pars sit ejusdem communis naturæ, ut *ὁμοφύλου* fraudem faciat nullo unquam privato suo cominodo poterit adduci. Quod superest, si ætati placuisset ad ea animum advertere, quæ annis abhinc quatuor in Historia Acutorum Morborum tradideram (quæ & ante illud tempus mihi innotuisse omnino est credibile) quo pacto sc. Cortex in interjectis Paroxys-

morum

morum spatiis debuerit ministrari, tum postea repeti ægro jam convalescente: viverent fortassis haud pauci eorum, quos jam terra tegit, ut ut homines vilipendant tenues sanè illos conatus nostros communi omnium bono dicatos, & monita spreverint ibidem dictata verbis insequentibus, quibus ea breviter continentur, quæ hîc fusiùs explicare visum est, viz.

Curandum est ante omnia, ne præmaturè nimis hic Cortex ingeratur, ante sc. quam morbus suo se Marte aliquantisper protriverit (nisi collabescentes & jam fractæ ægri vires eundem temporiùs sumendum esse dictaverint) neque enim illud solum est metuendum, ne à proprio ejus usu inefficax iste reddatur & spem ægri fallat, sed etiam ne de ægri vitâ agatur, si sanguinem omni fermentationis nisu se despumanti derepente injiciamus remoram. Proximo loco, neque Catharsi, multò minus Venæ-sectione, subducenda est materiæ Febrilis pars aliqua, quò liberiùs cortex suo fungatur munere: cum enim ab utraque labe factetur quadantenus æconomia corporis, eo promptiùs certiusque recrudescant Paroxysmi evanescente semel pulveris vi. Mihi etiam magis è re fore videtur, ut sanguinem dicto medicamine sensim longioreque à Paroxysmis intervallo leviter inficiamus, quàm ut uno omnino iclu Paroxysmum jam instantem tentemus confodere; hoc enim pacto & plus temporis remedio conceditur, quo suum opus plenius absolvat, & evitatur quicquid ibi est periculi, quod ægro poterit oriri ex subito isto atque intempestivo nimis sufflamine, quo Paroxysmum jam invalescentem atque omni se ope exerentem conamur opprimere. Postremò brevibus istis temporis intervallis repetendus est Pulvis, ut non protinus evanescat prioris dosis virtus antequam altera exhibeatur: crebrâ enim repetitione ista inopia tandem recuperabitur, profligato in solidum morbo. His adductus rationibus hanc ego methodum cæteris antepono. Peruviani corticis ℥j. cum syrup. Rosar. rub. ℥ij. misceatur; æger verò quantitatem Nucis moschatæ majoris mane & serò quotidie devoret diebus à genuino Paroxysmo vacuis, donec confectionem omnem absumpserit. Repetantur porrò ad tres alias vices interjectis semper diebus quatuordecim. Morb. Acut. Sect. I. Cap. V.

Quantumlibet autem Cortex supra laudatus in Febribus hisce medendis, omnibus aliis, quotquot adhuc inventa fuerunt, palmam faciliè præripiat, at tamen in *Tertianis Vernalibus*, si modò æger sanguineo temperamento præditus esset, atque etiam ætate floreret, Remedia sequentia curationem absolvisse observavi. Ex. gr. Mittatur sanguis è brachio die à paroxysmo libero, & post aliquot horas eodem die exhibeatur *Emeticum ex Infusione Croci Metallorum*; ita tempus præfigendo, ut Vomitorium opus suum absolvat ante Invasionem paroxysmi insequentis, quo elapso immediate aggrediatur usum sequentium. R. Extracti gentian. Absint. & Centaur. min. an. ℥ij. Misceantur ac dividantur in ix. doses, quarum unam capiat quartâ quaque horâ, superbibendo decocti amari sine purgantibus & vini albi an. ℥iij. est & altera methodus curandi has Tertianas, in pauperibus scil. quorum facultas prolixo apparatu Me-

dico ferendo non fit. Ut *R. Serpentar. Virginian. subtiliss. pulv. ʒj. vin. alb. ʒiij. M. s. sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene coopertus sudet per tres vel quatuor horas.* Idem faciendo per duas alias vices paroxysmo ingruente.

* Sequenti anno (nempe 1679.) sub initio Julii eadem Febres de novo vires redintegrabant, & quotidie increbrescentes mense Augusto quàm immanissime debacchabantur, ac magnam stragem edebant. Cum autem de his jam fusiùs egerim, nil ampliùs adjiciam, nisi quòd *Novo Epidemico* à manifestà aëris crasi pendenti sub mense Novembris prorsùs locum cedebant.

Etenim unà cum *Novembri* subingrediebantur *Tusses* cæteris quas mihi contigit observare annis *ἐπισημικώτεροι* cum in singulis ferè familiis universi laborarent. Harum aliæ opem medicam non magnopere desiderabant; aliæ verò pulmones ita vehementer agitabant, ut æger ventriculi contenta per os ejicere subinde cogeretur, vertigine insuper correptus, à nihi violentiori & laborioso. Primis ferè diebus *Tussis*, siccam æmulans, nullam materiam spectabilem exantlavit; mox ætate auctior nonnihil; atque ut verbo expediam, tum in eo quòd parcius expectorarent ægri, tum etiam conatu vehementiori, & paroxysmorum duratione, ad *Tussim puerorum Convulsivam* mihi propius accedere videbatur, nisi quòd mitius aliquantum sæviret. In hoc saltem *Convulsivam* superabat, quòd & Febre, & solitis ejus symptomatis stipata ægrum invaderet, quæ in *Tussi puerorum* nondum me vidisse memini.

Solenne sit licet *Tusses* sub Hyemis adventum affligere, mirabantur tamen omnes eas hoc anno ita præter solitum increfcere: quòd quidem hac præcipue de causâ arbitror contigisse. Quum mensis *Octobris* crebrioribus quàm solebat, & ferme continuis permaduisset imbribus, & sanguis hominum tempestati consentiens particulas crudas atque aquosas affatim imbibisset, transpiratione per cutis spiracula à primò frigoris insultu prohibita, Natura colluviem hanc ferofam vel per ramos *Venæ Arteriosæ*, vel quòd alii volunt, *Asperæ Arteriæ* glandulas eliminare satagit, & tussis ope explodere.

† Curatio rite ut institueretur, quoties sc. Medico fuit opus, tam per *Venæ-sectionem*, quàm *Catharsin* evacuandum esse nullus dubitavi: Neque enim alià aliquà methodò æquè commodè ejiciuntur redundantes feri particule, ac per *Phlebotomiam* & *Cathartica* quæ tam insigniter vasa emulgent. Remedia *Pectoralia* quòd attinet, (præter quam quòd eorum usu gratificamur ægris) non intelligo quò pacto amoliendæ *Tussis* causæ queant conferre, cum omnis eorum actio vel in incrassanda materia, quoties justo tenuior vim expultricis facultatis eludit, vel in eadem attenuanda, quoties ob visciditatem ægrius expulsi, poni videatur. Id certò scio inutiliter in his tantum temporis impendi; nonnunquam etiam sanguinis massam eò usque debilitari à re-tentis particulis feri naturæ inimicis, pulmonesve insuper *Tussi* irritatos ita con-quassari motu violento ac ferè continuo, ut non rarò via sternatur ad *Tabem*; à cuius insidiis celeritate Curationis æger vindicari debuerat. Neque multò tutius adhi-

adhibentur Sudorifica, à quorum usu æger nonnunquam in Febrem incidit, nonnunquam etiam particulæ sanguinis facile inflammabiles ita Pleuræ impinguntur, ut accendatur *Pleuresis*, quod per decursum dictæ Tussis Epidemicæ ingenti vi hominum cum suo magno periculo contigit.

Sanguinis itaque è brachio eduxi quantitatem moderatam, *Epispasticum* satis amplum ac forte posteriori cervici applicandum curavi, quo materiæ peccantis pars aliqua alio derivari possit. Posthæc *Catharticum* è Lenioribus, Infusionem sc. *Sennæ*, *Rhei*, cum *Manna*, & *Syrup. Ros. Sol.* quotidie exhibui, donec vel prorsus convalesceret æger, vel admodum imminuerentur Symptomata. Vel, si Potio minis ægro arrideret, *Pil. Coch. Major.* ðij. quotidie devorandos imperavi; horâ scilicet quintâ matutinâ superdormiendo.

Hâc etiam Methodo, Phlebotomiâ scilicet & repetitâ Catharsi, eâque solâ expugnatur *Tussis Puerorum Convulsiva*; malum alias pertinacissimum & penè insuperabile. Alii quid valeant hîc præstare planè nescio, me in variis atque omnis fere generis remediis operam non semel perdidisse satis scio. Sed leniora tantum Cathartica hîc conveniunt, eaque cochleatim sunt ingerenda pro ratione ætatis. Quæ quidem κατ' ἐπιπαύσιν evacuatio eo nomine, ut arbitror, dictæ Tussi medetur, quod scilicet, licet non multum humoris serosi in Pulmonibus inveniatur, fervidiores tamen & spirituosus Halitus è massa sanguinis in pulmones statim temporibus transmissi atrociores illos ruffiendi Paroxysmos in tenellis excitent; horum autem in pulmones impetus haud aliâ methodo æque sisti posse videtur & præcaveri, atque hac quâ motus prior contrarius (per viscera scilicet) morbi causâ conciliatur.

Verum in Morbis *Epidemicis* cujuscunque demum generis sint, (si modò recens adhuc ægrum corripuerint) summo operè cavendum, ne alvus ei ducatur, nisi misso prius sanguine. Qui enim Morbi à Constitutione aeris Epidemica pendent, aut jam Febres sunt, aut in earum classem levissimâ de causâ transeunt; cum ex tumultu in sanguine & humoribus à Catharsi vel lenissimâ excitato, & subsequente calore facile accendatur Febris, quam alias Natura propulsasset consuetis materiæ morbificæ evacuationibus; *gravedine* ex. gr. aut *Tussi* in hoc, de quo jam agimus, Epidemico, aut *Diarrhæâ*, quoties Febris cum illa faciens epidemice grassabatur. Idem potest dici de quacunque aliâ aeris Constitutione, quâ corpus ad certum aliquod Febris genus determinatur: quæ quidem non semper actu invadit, sed benignioris naturæ ductu morbi fomes è sanguine, mediante evacuatione aliquâ ejus Genio accommodatâ, exturbatur. Hoc constanter assero, quantumlibet mos jam obtineat exhibendi Cathartica ante celebratam Venæ-sectionem, vel quod adhuc est periculosius, eâ penitus omisâ. Licet enim objiciatur fæculentias in primis viis stabulantes toties in vacuas venas propelli, quoties detrahitur sanguis, alvo non prius subducta, certissimum tamen est evacuationem, quam isti præmitti volunt, nullo modo relarcire posse injuriam sanguini illatam à tumultuante Cathartico Phlebotomiæ præmissio. Atque negari non potest Catharticum mox à dempto sanguine assumptum longè mitius vim suam exercere, ne-

quæ perinde sanguinem vel calefacere vel exagitare, atque idem solet si Phlebotomiam præcedat. Neque paucos, ex Infantibus maximè, vel ob ignoratam hanc rem, vel neglectam periisse existimo.

Atque hoc mihi suffragante experientiâ multiplici compertissimum est. *Experientiâ*, inquam, optimâ duce & magistrâ, ad cujus leges & normam nisi exerceatur Medicina, eam prorsus exulare satius esset. Luditur enim, quod aiunt, de corio humano plus satis, cum hinc Empirici, neque morborum historiam, nec Methodum medendi callentes, & Receptis tantum freti, isthinc Sciolorum vanissimi spem omnem in affectato Artis ambitu & speculationibus utrinque pari ferè momento disceptatis ponentes, quasi junctis viribus majorem edunt stragem, quàm ederent morbi eorum destituti auxilio. Ea demum Praxis, eaque sola ægris mortalibus opem feret, quæ Indicationes curativas ex ipsis morborum Phænomenis elicit, dein firmat experientia: Quibus gradibus magnus *Hippocrates* ad cælum ascendit. Et si dictâ Methodo Ars Medica à quoquam traderetur, licet morbi unius aut alterius Curatio cuilibet è vulgo possit innotescere, integra tamen Ars, quaqua patet, homines prudentes & peritos etiam magis exquireret, quàm in statu hodierno, neque vel minimum Artis honori exinde decederet. Cum enim subtilitas longè accuratior in Naturæ operationibus (in quarum observatione vera Praxis Medica fundatur) quàm in Arte aliquâ, Hypothesibus etiam luculentissimis suffultâ, invenitur, medendi Ars, quam præcipit Natura, rude vulgi ingenium longiori intervallo superabit, quàm ista, quæ à Philosophia docetur. Fidem hîc mihi facient *Febres*, quæ duas è tribus in Medicina facienda partes occupant, & quemvis mihi arbitrum constituo, vel mediocriter cogitationibus indulgere solitum, vera dicam necne. Quis enim vel ex insulsissimis Empiricis est, qui se huic morbo curando imparem fatebitur, si id tantum agendum est, ut duabus istis Indicationibus Curativis, quæ vulgò obtinent, fiat satis? Nempe ut Sudoriferorum ope exterminetur materia morbum committens, & symptomatis eatur obviam, quæ ejusmodi evacuationibus superveniunt. Certissimum enim est, *Theriaca Andromachi, Pulv. è chelis Cancr. comp. Aq. Epidem. &c.* intrò assumptis, unâ cum regimine calidiori sudores posse propelli; quem sibi scopum unicè proposuit in hujus morbi curatione, maximè si fortè *Malignitatis* nomen auribus usurpaverit. Et ad mitiganda quod attinet symptomata, *Diacodium* in promptu est, quo somnus invitetur, quoties urgent vigiliæ, *Enema* quoties alvus non respondeat, & sic de cæteris. At nec ipsius valet comprehendere suo Marte, nec è Medicorum præscriptis ediscere, quæ demum illa sit Febris species quam debellare satagit; si modò credimus (credent saltem fortè Posterî) varias dari Febrium species, quarum singulæ suam sibi methodum medendi à reliquis diversam ferè postulant; Unam insuper eandemque Febrem, cujuscunque sit generis, uno modo ubi primum aggreditur, atque alio paululùm diverso per singulos gradus, quo usque grassabitur, tractandam esse. Quo pacto Indicationes Curativas ab hoc vel illo Phænomeno minus insigni mutuabitur naturalem morbi Historiam ignorans, (quæ

(quæ sola veram medendi rationem indigitare poterit) cum nequeat dijudicare, an hoc vel aliud Phænomenon à Curandi quam adhibet Methodo, an ab ipso nascatur morbo? Dies deficeret enumerantem varia & subtiliora illa minutioraque, quæ in hoc atque in aliis morbis curandis observanda occurrunt: quæ cum tot sint & tanti momenti ad liberandos à morte homines, semper licebit Posteris & seris Nepotibus aliquid adjicere iis Observationibus, quibus traditur varietas penè infinita operationum naturæ in Morborum productione, & Curativæ indicationes ex eo fonte depromendæ enumerantur. Non itaque vilescet Ars, si quid hujusmodi lucem aspiciat, quin potius illustrabitur, & difficilior reddita nonnisi sapientes & subacti judicii viros in feriorum numerum cooptari sinet. Sed hæc obiter.

Tusses modò dictæ, si imperitè tractarentur, *Febrem* accendere solebant ei haud absimilem, quæ Hyeme Anni 1675. adeo epidemicè grassabatur, & cujus historiam tradidi *Sect. quintâ Cap. quinto* libri de *Morbis Acutis*. Sed cum Febris hæc soboles tantum esset ac effectus *Tussis* Epidemicæ, eadem ipsâ methodo *Febrem*, felici semper cum successu, aggressus sum, quam in *Tussis* curatione suprâ descripsi; nempe *Venæ-sectione*, *Epispastico* cervici appposito, & *Cathartico* deinde tribus lauroris exhibito. Quamlibet enim in *Tussi* sine Febre nullum præfiniebatur tempus, quamdiu æger purgandus esset, (utpote quæ continuari deberet, ut suprâ notavi, donec vel prorsus convalesceret, vel admodum imminuerentur symptomata) in Febre tamen quæ à *Tussi* pendebat, purgatio per tres dies instituta ei prorsus debellandæ parerat; quod in Constitutione, de qua jam agimus, sæpiusculè observavi.

Hic autem notandum occurrit, licet hanc *Febrem*, quando se primum exerebat, comitarentur defluxiones in Pulmones molestissimæ, post mensem tamen unum vel alterum, cum colluvies ista feri sensim è sanguine eliminaretur, Febris ejusdem planè indolis hinc inde sine *Tussi* aliquâ infestabat (non penitus deleta, sed manente adhuc in sanguine malæ Crasis impressione) ac proinde haud diversam Curationem ab ea, quam *Tussis* comitabatur, sibi vendicabat.

Verum eodem, quem dixi, modo hæc Febris se extendebat usque ad initium Anni 1680. quo hæc conscripserim: quo tempore etiam cum anno surgente *Febres Intermittentes* modò dictæ apparere incipiebant. * Exinde verò ad initium usque Anni 1685. quo secundam hanc nostram Editionem jam conficio, eadem adhuc perdurarunt. Etenim tametsi in hac urbe non adeo Epidemicè nunc temporis invadunt ac in quatuor primis Annis, & mitiores etiam sunt; in aliis tamen locis, hunc his, nunc illis, non minus grassantur ac sæviunt. Atque etiamnum generalis Constitutio Intermittentibus producendis adeò favet, ut ad hunc usque diem affirmare possim, me ne unicam quidem Febrim per hos dies verè Continuum vidisse unquam, nisi fortè re malè gestâ in earum classem fuerit evecta, vel una esset *Intercurrentium* mihi dictarum, quod scilicet omni ferè anno invaderent. Ita pertinaciter hæc Constitu-

* Anni 1680, 81, 82, 83, 84.

tio hujusmodi Intermittentibus conducit; cujus certè acies prius est retunden-
da quàm *Continuæ depuratoriæ* mihi dictæ, epidemicè grassari fuerit integrum.
Etenim in Intermittentium specie natura plus satis festinare videtur, & agendi
vehementiâ justo citius tempora materiæ morbificæ subigendæ, mox etiam de-
spumandæ, debitâ percurrere: Quod in *Depuratoriâ* fecus accidit: in qua
non nisi post dies 13. vel 14. apparent signa materiæ febrilis tandem conco-
ctæ, per sudores subinde, vel potius per *διάρρην* paulò pleniorē, eliminan-
dæ. (His ritè perpensis nullus dubito quin Febres istæ *Depuratoriæ*, quæ annis
61, 62, 63, 64. regnabant, quasi feces fuerint *Intermittentium* quarundam quæ
ante id tempus per seriem Annorum certam sæviissent;) quanto autem tempo-
re hæc invaluisse haud equidem scio) Cum enim Constitutio quæ ad In-
termittentes faciebat sævitiem suam deponens jam fermè exolevisset, Febres quas
postea parturiebat magis humorales erant ac terreæ, unde non nisi lentè ac pe-
detentim sanguinem depurare sategerit, quæ in primis Constitutionis Annis sub-
tilioribus principiis innixæ, atque adeò Intermittentium typo indutæ, celeri
passu suis temporibus defungi solerent. Quòd si res ita se habeat, verisimile
mihi videtur hanc Febrim (*Depuratoriam* volo) postliminiò reversuram
quàm primum præsens Constitutio aliquantulum remiserit, eandemque serie
quadam annorum permanfuram antequam *Pestis* eam exceperit. Per annos au-
tem omnes, quotquot demum ii fuerint quibus Febris hæc grassabitur, *Inter-*
mittentes etiam subinde se exerent, ac fortean nonnunquam pro brevi tem-
pore Epidemicæ evadent; quando scilicet manifesta aliqua aëris temperies ad
id symbolum suum conferet. An huic Febri *Cortex Peruvianus* æquè mede-
bitur ac nunc dierum Febribus intermittentibus solet, non habeo certò dice-
re. At in *Peste* atque *Epidemicis Continuis*, quæ eandem ordine excipient, de-
bellandis, non alios effectus ex ejus usu expectare licet, quàm eos, quos ho-
die in *Pleuritide*, *Peripneumoniâ*, *Angina* ac id genus *Febribus inflammatoriis*
videmus, quibus non tantum non prodest, sed & planè obest. Sed utut id
fuerit, eo quem diximus modo in posterum Epidemicorum alii alios exci-
pient, siquidem natura eundem ordinem, ac per 24. annos ultimò præterlapsos,
observaverit.

Atque hæc ferè sunt omnia; Vir plurimùm Honorande, quæ de morbis
Epidemicis Annorum nuperrimè elapsum observavi. In *Rheumatismo* verò
curatione (nam & de illo etiam morbo quærebas) sæpenumero mihi sub-
iit tecum dolere, quòd non nisi ingenti sanguinis vi repetitis venæ sectionibus
eductâ, ea possit perfici; unde non tantum ægri vires pro tempore franguntur,
sed si paulò fuerit naturâ debilior, aliis etiam morbis ad annos aliquot ob-
noxior ferè redditur; cum post illos elapsos materia *Rheumatismum* prius
committens jam in pulmones depluat, ægro scilicet frigore perculso, vel aliâ
aliquâ *προφάσει* leviori diathesis latens in sanguine jam foras in actum protruda-
tur. His de causis experiri statui, an nulla alia methodus daretur à reite-
ratâ toties Phlebotomiâ diversa, quâ hic morbus possit debellari. Seriò itaque
perpendens, quòd affectus iste (uti jampridem in *Acutorum Historia* subinnui)

ab inflammatione videatur oriri, quod tum cætera arguunt Phænomena; tum præfertim sanguinis è pertusa vena color, utpote qui *Pleuriticorum* sanguini per omnia similis est; tandem vero simile esse judicabam morbum hunc Diætâ simplici, admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, ægro imperatâ, æquè feliciter atque repetitis Venæsectionibus profligari posse; etiam evitatis quæ alteri methodo adjungebantur incommodis: neque me fefellit *Diætâ è sero lactis Phlebotomiæ loco substituta.*

Prægressâ æstatē Pharmacopola mihi in vicinia nomine *Malthus* (Vir probus, & ingenio non vulgari) me accersebat. Rheumatismo autem miserè cruciabatur his symptomatis stipato. Coxendice primò ad biduum claudicabat, exinde Pulmones dolore tentabantur gravativo cum dispnoeâ, quæ post aliud fermè biduum evanescebat; dein caput vehementer cœpit dolere, mox etiam coxendix dextri lateris, quæ omnium primò laborabat; posteaque, pro morbi indole, omnes ferè tam brachiorum quàm crurum articuli per vices molestabantur. Cum debiliori esset & sicco corporis habitu, veritus ne minus firmas jamdiu vires & labescentes, demptò copiosius sanguine prorsus exsolverem (maximè cum æstas eo usque adoleverit, ut jam metus esset, ne superveniens hyems redintegrandis viribus frequenti venæsectione attritis intercederet) imperavi, ut solo *lactis sero* ad dies quatuor vesceretur æger, quibus elapsis præter serum lactis pro victu ordinario panem similagineum concessi loco prandii, semel nempe in die, donec penitus convalesceret.

Tenui hac diætâ contentus, ad dies octodecim perseverabat, nisi quod potestremis eorum alium insuper panem pro cœna indulgerem. *Serum* autem è *Lactis Libris octo* domi paratum quotidie infumebat, quo satis benè nutriebatur. Post hos dies cum non amplius urgerent symptomata, & jam sub diò versaretur, carnes etiam permisi, Pullorum scilicet elixorum, cæteraquæ *ἰνὴν τῆς*. Tertio autem quoque die solo lactis sero victitabat, donec tandem pancreaticè valeret; incommodis quæ suprâ memoravi hac methodo elusis, quibus decimo abhinc anno pessimè excipiebatur, Venæsectione ex meò præscriptò in curationis subsidium tunc adhibitâ ac sæpè repetitâ.

Si quis hanc methodum tanquam rudiorē & Artis laude carentem contempserit, sciat is velim, primò leviora tantum ingenia res quaslibet vilipendere, quod simplices fuerint & apertæ, dein me, vel imminutæ existimationis pretio, publico hominum bono inservire paratissimum. Quibus edico quod nisi obstarent præjudiciâ vulgi nullus dubitarem methodum jam dictam aliis etiam morbis, quorum impræsentiarum nomen reticere libet, accommodare. Quod sanè magis prodesset, quàm solennior illa remedium pompa, quæ in jam moribundis, tanquam bestiis, ut mox immolentur, coronatis, malè collocatur.

Quòd verò etiam ista, quæ pro vilissimis habentur, & nullius sunt pretii, accedente eâ, quæ in Medico quæritur solertiâ & *ἀρχνοία* hominibus ab orci faucibus liberandis queant inservire, exemplo docebo: quod licet ad morbum, de quo jam agimus, nihil pertineat, non tamen prorsus est *ἀποσύνταξις*

δ' ἰϋσον, nec ab eo quem mihi proposui scopo alienum. Duobus abhinc mensibus quidam in vicinia me rogabat, ut servum inviserem, qui haud modicam *Mercurii Sublimati Corrosivi* quantitatem deglutiverat, sive, ut postea audivi, ex amore *μελαγχολῶν*. Hora ferè elapsa erat, à qua venenum hauserat; cùm ad eum accederem, jamque os & labia valde intumescebant, vehementer ægrotabat, ardente ventriculi dolore, caloreque tantùm non confectus: Ego tres *Aquæ tepidæ Congios* repetitis haustibus summâ qua potui celeritate & diligentia ebibendos imperavi; atque ut toties nova ingereretur copia, quoties ventriculus jam ingestam per vomitum ejecerat: volui etiam ut eluerentur intestina aquâ tepidâ sine ullo additamento copiosè per sedem injectâ, ubi primùm ventris tormina admonerent venenum jam per inferiora exitum quærere. Paruit miser, jam vitæ avidus, & plures etiam aquæ libras quàm præscripserim, absorpsit. Amici, qui ægro, utpote in casu insolito, assiderent, ab eo didicerunt, quas primùm evomuit aquas gustu perquam acres fuisse, sale scilicet venenato plenius exsaturatas; singulis autem vicibus rejectas aliquam semper acredinis partem amittere, donec tandem nihil prorsus saperent. Quæ mox urgebant tormina, solâ aquâ injectâ ad modum Enematis leniebantur. Hoc tam nullo rerum apparatu, benedicente Numine, intra paucas horas convaleuit æger, nisi quòd labia non statim detumescerent, ore etiam à veneni particulis, quæ aquam, quam evomuerat penitus infecerant, adhuc exulcerato. Quæ symptomata *Diæta è lacte* solo ad quatrimum adhibitâ mox evanuerunt. Aquam *Oleo* (quod hîc unâ cum opere ignari solent perdere) atque aliis omnibus liquoribus ideo prætulî, quòd cùm ea magis esuriret, exinde magis idonea mihi videretur devorandis salinis hujus veneni particulis, quàm alius quilibet liquor, qui vel crassior esset, vel particulis alieni corporis jamdiu prægnantior.

Sed ut ad *Rheumatismum* revertar. Utut è fero lactis *Diæta* conveniat juvenibus, atque iis, qui temperatè & cum consilio vixerunt, tamen inconsultum fuerit virilem ætatem prætergressos, vel vino ac aliis liquoribus spirituosus jam à longo tempore plus æquo addictos hâc methodò tractare; utpote quæ in hujusmodi hominibus ventriculum labefactet, & pariter præ inusitato frigore sanguini inducto viam sternat ad Hydropem. In hoc igitur casu omnino par est, ut eo ferè modo, quem Libri nostri *de Morb. Acut. Sect. VI. Cap. V.* tradidi, curetur æger: Tametsi ex quo eum scripsi, experienciâ didicerim satius esse post secundam vel ad plurimum post tertiam Venæsectionem *Cathartica* sæpè sæpius exhibere atque repetere, donec symptomata omnia penitus cessaverint, quàm Phlebotomiæ rem totam committere. Etenim ob Catharsin suppetias ad averruncandum morbum Phlebotomiæ ferentem, citra ingentem istam sanguinis jacturam subsistere fas erit: atque porrò locus relinquatur *Paregoricis*, à quibus aliàs, utut sæviret dolor, ægro temperandum esset, cùm illorum usu fingatur morbus, neque tam facilè Venæsectioni cedat, Purgativa verò ista è *Lenitivis* solùm consent, ut *Tamarindis*, *Sennâ*, *Rheo*, *Mannâ* & *Syr. Ros. Sol.* cùm alia, quæ ex *Scammonio*, *Zalapio* &c. parantur, tumul-

tumultum cieant & dolorem exasperent. At singulis vespertinis post peractam Catharsin syr. de meconio ℥j. aliquantulum temporius, quàm id fieri solet propinetur.

Hic autem commemorare libet, me per constitutionem instantem observasse affectum quemdam modò Rheumatismum æmulantem, modò etiam à Nephritico dolore, quoad sævissimum lumborum cruciatum non multum abundentem, qui cum Febres intermittentes excipere soleret, translationi materiæ febrilis in musculosas corporis partes originem suam debebat.

Hoc symptoma haud diversam medendi methodum postulabat ab illa, quam morbus ipse, cui adhæreret, Febris nempè Intermittens, sibi vindicabat, cum à frequenti Phlebotomia & quibuscunque aliis evacuationibus exasperetur illud, atque æger in vitæ discrimen conjiceretur. Quod ut nemini imponat, id attingere voluit.

Atque hæc sunt, Spectatissime Vir, quæ in his affectibus, de quibus sciscitari libuit, sedulâ observatione habeo comperta; quæ si aut tibi placuerint, aut profuerint aliis, mihi cedent ex animi sententia; me saltem pro tenuitate mea debitum tuæ Claritati observantiæ specimen exhibere conatum, mihi seriò gratulabor.

Tibi semper addictissimus

THO. SYDENHAM.



Doctissimo Amplissimoque Viro

THOMÆ SYDENHAM, M. D.

M Agnum rei Medicæ exortum est lumen, & commodum, Vir Clarissime, ex consummatâ tuâ de Morbis Acutis Historiâ, eâque sedulâ observatione, & fidâ experienciâ stabilitâ, non lucri aut famæ aucupiò scriptâ, sed sincerâ fide, & mente honestâ: Cum tibi amplum satis theatrum sit officium fecisse, & præsentî seculo quôvis modò profuisse. Ipse hactenus celavi quod volui; at fortasse quid jam parem tibi è longinquò subolet. Qui laudat quod facis, urget ut facias quod adhuc laudetur. De Mor-

bis Acutis scribere summa difficultas est, ut pote quos tam rapida volvit rota, ut nisi opportunò sistatur sufflamine, in præceps ruat vita, nullis in posterum auxiliis, nullis suppetiis redimenda. Tu singula eorum momenta notas, & quid quòvis temporis articulò fieri necesse sit. Opus quidem perfectum, & absolutum, cui nihil addi poterat, nisi majus promiseris, de Morbis scilicet Chronicis. Hi inducias ferent, & tutiores examinandi, & judicandi moras.

Sæpe nobis incidit sermo de propudiò illò Morbi Venerei, cujus ignominiosam originem Gentes Europæ à se invicem sedulò satagunt propellere, & ut ejus magis adhuc occultentur vestigia ad ipsos Indos remotissimos amandant. Scortatorum audit flagellum, furiosæ, & indomitæ libidini aptissimè respondens pœna, eo fortasse fine tardius remota, ut tanti constet pœnitere. Et humanitatis, & peccati simul sensu tactus videbatur, qui palam optavit impurissimam hanc luem semel tantum curari posse. Cùm jam autem ad Agyrtas, Tonsores, & infimos quosque sciolos ejus sæpè devoluta sit curatio, illi aut fraude, aut imperitiâ magnò eam sumptu, majori etiam molestiâ, tamdiu differunt, & protollunt, ut vitæ planè tædeat inter carnificum tormenta, & longissimas Medicinæ moras protractæ, & ferè levius sit ægrotasse, quàm sanari. Jus igitur promissi, amicè tamen, exigo; præmittas oro, in arrhabonem reliquorum, si quid habes hâc in re confectum. Humaniter, & sincerè explices quâ methodò, quibus auxiliis hòc morbò captus se redimat quàm queat minimo. Satis est ut æger sub Deo, non etiam pejus sub Medicò vapulet. Hoc gratum pluribus fiet, & ad me aliqualis saltem pars gloriæ redibit, utpote cujus precibus desideratissimum hòc opus in lucem dederis.

Ex Ædib. Lambeth.

Febr. 12. 1679. 80.

Tibi omnino officio addictissimus,

H. PAMAN.



Ornatissimo, Eruditissimoque Viro

HENRICO PAMAN M. D.

Divi Johannis Cantabrigiensis Socio, Academiae Oratori Publico, & in Collegiô Greshamensi apud Londinenses in Medicinâ Professori.

Quanquam eum, quem de *Acutis Morbis*, Vir spectatissime, nuper edidi Tractatum, quæ est tua tam humanitas, quàm animi in me propensio, ceu opus undique consummatum deprædicare digneris; usque adeò tamen tenuitatis tum istius opellæ mihi sum conscius, ut me nihil aliud egisse existimem, quàm viam præmonstrasse, quâ qui ingenio magis valent, dictorum Morborum & Historiam & Curationem queant investigare.

— *Fungor vice Cotis, Acutum*

Reddere quæ ferrum valet, exors ipsa secandi.

Et profectò ita multiplex, incerta, & delicata, ut ita dicam, est natura, atque ita ludit in his morbis producendis, ut unius non sit hominis, utut vivacis, varia eorum *παρόμυνα*, & curationes iisdem accommodatas graphice depingere. Unum hominem dixi? quid quod vel decem quidem homines per tot sæcula sibi invicem succenturiati, atque iidem tum maximâ ingenii vi, tum indefessâ industria præditi, tum etiam in Praxi quæ numerosas observationes suppeditaret versatissimi; perpulchrè hîc operam suam collocare possint? Tantum abest ut ad Artem Medicam vel pervenerim ipse, vel me putem pervenisse.

Mecum habito, & novi quàm sit mihi curta supellex.

Morbos istos *Chronicos* quod attinet, quorum Historiæ perscribendæ spem tibi feceram, ita penitus animo meo insedit ejus rei studium, ut non tam aliâ de causâ, si bene me novi, vitam mihi prorogari exoptem, quàm ut istiusmodi aliquô conamine communi hominum utilitati inserviam: At verò singuli me dies docent quàm sit arduum cœptum id, & quàm periculosæ plenum aleæ, (mihi præ cæteris qui isto ingenii acumine atque solertiâ, quibus hîc est opus, non satis valeo) cum apud Scriptores rei Medicæ (Divinum *Hippocratem* si demas, atque alios paucissimos numero) vix ulla deprehendi queant vestigia, quibus adjutus per rerum avia spinis & sentibus impedita iter faciam; cum quæ promittunt subsidia Authores & Lumina ostentant, magis Ignes Fatui sint, quàm veræ faces, & in salebras potius ac præcipitia sequentem agant, quàm mentem fideliter & rectâ dirigant in genuina naturæ

Methodo indaganda atque invenienda : utpote quorum scripta ferè omnia *Hypothesibus* innituntur , quas peperit lascivientis ingenii & Phantasiæ luxuria ; ipsaque adeò Morborum Phænomena , (in quibus eorundem Historia vertitur) prout ab iis describuntur , ex eadem Hypothesew officina prodeunt ; quin & ipsa Praxis qua Morbos aggrediuntur (quod humani generis Pestis est certissima & pernicies) ad hujusmodi Postulata componitur , non ad rei veritatem. Usque adeò grassantur , & regnant ferè in singulis paginis Cerebroforum hominum commenta , jacent interim naturæ judicia. Quibus non obstantibus , si vitam Deus atque otium concesserit , experiar fortassis aliquando quid valeant humeri. Impræsentiarum , ut animum agnoscas in tui obsequia paratissimum , en tibi offero , ceu ejus quod molior operis specimen , dissertationem hanc , brevem illam quidem de *Lue Venereâ* , & quam solam adhuc prælo adornavi.

Primum autem id attingere volo , me haud paucos convenisse , qui sive præ studiò , honestò quidem eò , incontinentiores à peccato coërcendi metu infecuturæ poenæ , sive ut Castimonix laudem sibi arrogarent , non dubitabant asserere *Luis Venereæ* Curationem docendam non esse. His ego non assentior , utpote qui existimem nullum ferè locum Charitati atque operæ mutux relictum iri , nisi ea quæ sibi suâ ipforum culpâ improvidi accersunt mala , humaniorum officiis sarciantur. Omnipotentis Dei est fontes castigare , nostrum verò miseris pro virili succurrere , atque ægris opem ferre ; non autem curiosâ causarum indagatione illos acrius urgere , aut censorio vexare fastu. Tradam itaque quæ in morbo observavi atque expertus sum : non quò hominum animos deteriores efficiam , sed ut corpora (quod mihi negotii datum est) reddam saniora.

* *Lues Venerea* ex *Indiâ* primùm *Occidentali* An. Dom. 1493. *Europam* appulit ; cùm ante id tempus ne quidem nomine tenus , quantum scire licet , nostro orbi innotuerit : Undè etiam Morbus vulgò censetur iis tractibus *Americæ Endemius* , in quos nos primi Colonias deduximus. Mihi verò potius è regione aliquâ *Nigritarum Guineæ* conterminorum originem traxisse videtur ; cùm à plurimis nostratium , iisque fide dignis , qui *Insulas Caribes* dictas incolunt , didicerim , mancipia recens à *Guineâ* allata , etiam antequam in terram descenderint , tum alia ibidem degentia hoc morbo tentari , nullâ copulâ impurâ prægressâ ; ita ut non rarò universam aliquam eorum familiam , viros scilicet , mulieres , liberosque malè mulctet. Neque ista *Lues* quæ afflictissimos hosce sæpe sæpius invadit , vel hilum à *Venereâ* nobis dictâ , quantum ego quidem intelligo , quoad symptomata , *Dolores* scilicet , *Ulceræ* , &c. habitâ nempè diversorum Climatorum ratione , videtur discrepare , licèt nomine prorsus abludat , cùm *The Yaws* ab illis dicatur. At nec mendendi methodus quâ utuntur illi , à nostrâ abhorret , utrobique enim *Salivatio* ex *Hydrargyrò* utramque facit paginam ; non obstante eò quod hîc apud nos dicitur de eximiâ *Guaiaci* & *Salsaparillæ* vi , quam in natali solo exerant ,

* *Luis venereæ Historia.*

exerant, quæ ex longo ad nos itinere tantum non exhausta putatur. Probabile itaque mihi videtur *Hispanos* qui in Europam primi hunc morbum traduxere, eodem infectos fuisse ex contagio *Nigrorum* emptorum in *Africa*, quorum genti alicui (multi enim sunt populi *Guineæ* confines, apud quos invaluit mos ille barbarus homines Europæis mercibus permutandi) *Endemius* esse potest. Ut ut sit, contagiosa ista Lues paulatim serpens, has orbis terrarum partes eò usque inquinavit, ut si eâ celeritate grassaretur adhuc qua primum invasit, intra sæcula aliquot actum esset de genere humano, vel saltem Nosocomiis de cætero addictum, prorsus impar esset iis rebus gerendis quibus continetur hominum societas: nisi quod, Vegetabilium instar, in alienum à patrio solum quasi transplantata, Europæo nostro non perinde lætatur, sed languet indies, & mitioribus Phænomenis fatiscit. Novus apud nos hospes cum esset, si quem arripuerat, mox omnem sanguinis massam contaminabat, & diris capitis atque artuum doloribus, tum etiam ulceribus variis in partibus se prodebat. At verò centum retrò annis *Gonorrhææ Virulentæ* specie se primum ostendebat, ostenditque adhuc, hâc sibi portâ exitum quærens; nullo alio manifesto symptomate, nisi quod in perpauca ulcusculum in pudendo (vulgò a *Shanker*) primum morbi est indicium; cuius virus cum per *Gonorrhœam* non ejiciatur, sanguinis massam dictò citius pervadit inficitque.

Propagatur autem Venerea hæc Lues vel per *generationem*, undè misellus Infans ab inquinatō parentum alterō mala ducit stamina vitæ; vel per *contactum mollioris alicujus partis*, quo virulentia atque inflammatio corpori insinuantur ex occasionibus hoc in loco dicendis. Primò in lactatione v. gr. vel Infans Nutricem per rariores mammillarum poros, vel *Nutrix* Infantem per os tenerum inficere potest. Secundò Infantes si nudi cum inquinatis in eodem lecto dormiant. Licet enim Adulti quorum caro jam firmior ætate obduruit, vix nisi intercedente impuro coitu, quamvis simul dormiant, possint infici, Infantum tamen laxior caro & texturæ rarioris venenum facile excipit, quod non semel observavi Infantibus à genitoribus, quibuscum dormiebant, infectis contigisse. Tertiò autem, partis mollioris contactus maximè in Coitu impuro fit, ac proinde eò præ cæteris modò serpit Lues; cum scilicet penis Spiritibus Generationi dicatis turgidus, à Venereo sive ulcere, sive etiam pustulâ in uteri vaginâ stabulante noxam de facili haurit, quorum alterutrò intus latente Mulier nihilominus sana videri potest; venenò nempe, vel istarum partium illuvie ita detento, ut segnius invadat sanguinem, vel per menstruas purgationes diluto sæpius, & quadantenus exterminato. Contagio hæc carnosam virgæ substantiam, quantum ego judico, primum adurit, quam quidem corrumpens, eidemque primò inflammationem, mox ulcerosam *Szadzu* sensim inducens, efficit ut fanies, qualem in *Gonorrhæâ* cernimus, in urethram lente extillet: quod ut credam hâc ratione promoveor, ipse scilicet vidi virulentam hujusmodi

materiam per substantiam glandis porosam exudare, non per urethram ejectam, nulloque ulcere vel glandem occupante, vel præputium. Tandem verò altius penetrans, glandulas *Prostatas* efferatò ulcere solet depascere; quod haud rarò cernitur in eorum cadaveribus quos hic morbus è medio sustulit.

Gradibus mox dicendis procedit hic morbus, *Æger*, (ocyùs aut seriùs, prout mulier quacum consuevit magis minusve fuerit inquinata, pro ratione etiam temperaturæ *μιάσματι* excipiendo magis minusve idoneæ) primùm dolore genitalium insolito cruciatur cum quâdam rotatione quasi testiculorum, postea, si recutitus non sit, macula primò Morbillum jam erumpentem magnitudine & colore æmulans glandis partem aliquam invadit. Statim ab hujus maculæ exortu, liquor quidam lentè extillat, seminis instar, qui quotidie à seminis tam colore, quàm consistentiâ recedens, flavescit tandem aliquanto dilutius ovi vitello; & in Lue virulentiore intensioreque non modò virescit, sed & aqueo humori permiscetur sanguine affatim tincto. Pustula jam dicta *ulcus* tandem fit, primò haud absimile, *Aphthis* Infantium ora obsidentibus, quod indies latius & profundius depascatur, supervenientibus orificii callo & duritie. Animadvertendum est autem quòd memorata pustula rarò Gonorrhœam comitem habet in iis qui, aut jam pridem Gonorrhœâ laborarunt, aut recutiti sunt; utpote quorum Glans tum ab aëre cui exposita est, tum à frequenti linteorum attritu indurefcens, noxam non ita facilè suscipit. Hujusmodi Verpi igitur glandis ulcere ferè non tentantur, sola *Gonorrhœa* dicto modo nascitur. Hanc alia mox symptomata excipiunt, ut primò magnus doloris sensus in pene quoties erigitur, perinde ac si validâ manu transversus fortiter constringeretur, qui noctu præcipuè urget, quoties in lecto æger cœpit incallescere: quam quidem constrictionem penis dolorificam morbi hujus in hoc statu existentis signum *παθογνωμονικώτατον* existimo. Incurvatur etiam veretrum à fræno jam contractiore, quod cum in erectione extenditur pro natura sua, acutissimum dolorem adfert. Accedit etiam *ardor urinæ*, qui plerumque inter mingendum vix percipitur, at verò æger jam à mictu cessans per omnem urethræ ductum acriter admodum uritur, maximè quâ in glandem desinit. Nonnunquam etiam erosâ atque excoriatâ urethrâ jugi puris acrioris fluxu, natura in carne nova vice jam deperditâ justo occupatior, laxam quandam & spongiosam substituit, quæ mole quotidie aucta & sensim indurata *Caruncularum* excrescentiis ita meatum urinarium infercit, ut tandem lotio non detur exitus; quæ quidem carunculæ nihilominus ex ulceribus sibi adnatis ichorem quendam evomunt, & tum Medico crucem figunt inter curandum, tum ægro magis ipsâ morte timendum malum. Quinimò sæpe accidit ut sanies quæ per Gonorrhœam deplenda erat, vel à motu violentiori, vel Adstringentium usu in Scrotum deposita, atrocissimum dolorem, & Scroti inflammationem accersat, nunc alterutrò, nunc utròque ejus latere in molem ingentem

ingentem elatô ; Gonorrhœa interim progreditur tardiùs , at verò urinæ ardor non mitiùs urget. Atque hæc sunt communiora morbi hujus symptomata, manente hóc ejus statu.

At verò quoties sive Morbi diuturnitate , & in dictis partibus morâ contagium sursum fertur , & sensim sanguini labem imprimit , aut materiâ virulentâ indebito Adstringentium usu in corpore retentâ humores putrescunt , vera *Lues* exoritur , in quâ Tumores sive *Bubones* , sæpe in inguine compa-
rentes , primum ejus gradum constituunt. *Dolores* tum caput , tum artus in articulorum interstitiis , humeros scilicet , brachia , & talos crudeliter laniant , nullô ordine invadentes , & per intervalla , licet noctu ægrum lectuli calore perfusum rarissimè destituant , nec nisi sub auroram libenter evanescant , *Crustulæ* etiam & *porrigines* varias corporis partes deturpant. Flavescunt hæc fermè ad instar favi , quô signô à cæteris omnibus queant internosci. Quandoque superficie latiore varia occupant corporis spatia , ad eum modum , quo *Lepra* in Medicorum scriptis depingitur. Quanto autem magis scabies hæc diffunditur : tanto minùs æger discruciat. Univerfa symptomata pedetentim incrudescunt , dolor præ reliquis , qui tandem eò usque exacerbatur , ut se nequeat miser diutiùs in lectô continere , sed protinùs exiliens , huc illuc in cubiculô cursetet irrequietus fermè , donec illucescat. Adde quòd præ doloris vehementia , Cranium atque ossa tiliarum brachiorumque hinc inde attolluntur in perdura tubera , *Exostoses* dicta , excrescentiæ ossæ in equorum tibiis (vulgò à *Spavin*) haud absimilia : quæ quidem ossa tuberculis obfessa jugi dolore ac inflammatione tandem , cariola redduntur & putrescunt. *Ulceræ* etiam *Phagedænica* varias corporis partes depopulantur , quæ fauces ut plurimum primò aggredientia , sensim per palatum in nasi cartilaginem propagantur , quam mox absumunt , ita ut is jam fulcro destitutus planè concidat. Crescentibus indies ulceribus , & dolore aucto , æger partim indefinente carnificinâ enectus , partim ulceribus confectus & putredine vitam trahit cruciatu , foetore , carie , opprobrio molestissimam , & quavis morte longo intervallò miseriores , donec tandem , pereuntibus per vices membris , lacerum cadaver , & jam superis grave , humo condatur.

Intrinsicam hujus morbi naturam , Essentialem quam vocant , nisi quatenus ea ex istis , quæ jam depinximus , symptomatis elucescat , non mihi magis perspectam esse arbitror , quàm est Essentia sive Plantæ cujuslibet , sive Animalis : Quicquid verò de ea sit , certò mihi constat humorem hunc committentem inflammationis haud mediocris participem esse , unde hæc tot malorum Ilias : constat etiam dictum humorem evacuandum esse , idque iis mediis , quorum efficaciam Experientia , medicorum Magistra , suffragatur. Cum nondum inveniatur immediatum aliquod *Specificum* , cujus ope sine evacuatione prægressa *Lues* debellari queat. Neque enim vel *Mercurius* , vel *Ligna Exsiccantia* dicta , Specificorum titulo sunt donanda , nisi exemplis in medium allatis probare quis possit , vel Mercurium absque Salivatione , vel Lignorum

Lignorum Decoctum nullo subsequente sudore Luis Venereæ curationem quandoque absolvisse. Utque experientiâ didici sudorifica vulgaria haud minùs profecisse in hōc morbo quàm lignorum decoctum, ita nullus dubito, quin si reperiri possit aliud quid, sive in Regno Vegetabili, sive Animalī, quod in excitandâ salivatione pares cum Mercurio vires haberet, pariter etiam ad sanandam Luem valeret. Quandoquidem autem hic morbus adhuc intra Gonorrhœæ limites subsistens, longè ab eadem distat cum jam omnem sanguinis massam contaminaverit, & Venereæ Luis nomen præcisè mereatur, ita etiam Evacuatio quâ Gonorrhœæ materia ejicitur, alia prorsus est atque illa, quâ Lues jam formata eliminanda est.

* *Gonorrhœam* itaque quod attinet de quâ primò agemus, in remediis *Catharticis*, quantum huc usque usu comperimus, Curationis omnis cardo vertitur, quorum auxilio vel educitur humor peccans, vel procuratur diversio succorum corporis naturalium, qui aliter hosti in pabulum cederent. Quamvis autem, tum ratio, tum experientia mihi dictant hunc morbum & quolibet demùm Catharticò sæpe diuque exhibitò sanatum iri, ea tamen cæteris *σπασμώτεπα* mihi videntur, quæ bilem, maximè verò quæ ichorem ferofum fortiter è sanguine expurgant & subducunt. Ac proinde solâ *Jalapii radice* pauperibus aliquoties subveni, quorum tenuitati & rebus domi angustis consulendum erat. Cum verò & morbus conspicuam secum trahat inflammationem, & medicamenta purgantia quibus expugnandus is est, calida etiam sint, *Diata refrigerans* omnino est imperanda, à carceribus, quod dicitur, ad metas.

Sic itaque soleo præscribere. *℞. mass. Pilul. cochiar. maj. 3iij. Extract. Rudii 3j. resin. Jalap. & diagryd. an. 3℔. cum s. q. Opobalsami f. Pil. è singulis Drachm. vi.* Quatuor ex his singulis auroris deglutiendæ sunt horâ quarta vel quinta (ita ut æger superdormiat) ad dies 12. vel 14. vel etiam plures, donec sc. urinæ ardor & materiæ seminiformis color flavus admodum imminuantur; quæ cum pro voto successerint, satis esse autumo, si æger interjectò semper die unò, easdem repetat ad septimanas adhuc duas; quò tempore elapsò, sufficit ut bis in septimana sumantur Pilulæ, donec humor ex urethrâ stillare solitus prorsus evanescat, quod ut plurimum non nisi post multos dies contingit. Quamvis enim vulgò affirmetur, quòd ejusmodi ichor qui ardore urinæ & flavo materiæ extillantis colore disparentibus, manè præsertim, in summitate colis digitis compressi ad guttulam unam alteramve cernitur, à debilitate tantùm, & à laxitate partium ob diutinam virosi fomitis in eis moram oriatur; miseri tamen experiuntur magnò suò malò reliquias has esse contagii non penitus deleti; quod licèt quadantenus subactum, ex levissimâ quâque occasione (à potu scilicet nimio, aut exercitiò quolibet vehementiori, aut simili aliâ) novas excitat tragoedias, Gonorrhœa postliminiò recrudescente, si nempe æger catharsis molestiam

* *Gonorrhœæ virulentæ Curatio.*

molestiam defugerit; nondum extirpatô radicitus morbo.

Si post hujusmodi purgationem Gonorrhœa nondum cedat, ex usu erit loco pilularum, maximè in iis, qui difficiliùs purgantur, potentius aliquod medicamentum subinde intercalare, cujusmodi est Potio sequens, quæ semel tantum hausta magis aliquando fecit ad sistendam Gonorrhœam, quam leniora Cathartica sæpenumero ingesta. ℞. *Tamarind. ʒß. fol. sen. ʒij. Rhei ʒiß. Coq. s. q. aq. Colaturæ ʒiiij. dissolv. Mannæ, & syr. Rosar. solut. an. ʒj. syr. de spinâ Cervin. & Electuar. è succo Rosar. an. ʒij. M. f. f. potio.* Vel curatione tardiùs procedente detur *Turbith. minerale ad gr. viij. tantum bis vel ter, idque interposito debito temporis spatio, ne fortè oboriatur Ptyalismus; quod quidem remedium in eradicanda Gonorrhœa pervicaciori facile primas fert. Vel bis in septimana pil. sequentes exhiberi poterunt. ℞. pil. ex duobus ʒß. Mercur. dulc. ʒj. cum s. q. Opobalsami f. pil. iiij. sumendæ summo mane.*

Est autem ubi æger à Catharsi dictô modô repetitâ usque adeo abhorret, ut ne conspectum quidem, vel odorem solum remediorum ferre queat. Est etiam ubi corpus ex *ἰδιοσυγκρασίᾳ* quâdam ita pertinaciter purgantibus refragatur, ut debita peccantis humoris quantitas nequeat educi; atque ita dum impensius in hoc laboratur nullo cum fructu Lues tandem obrepit, quæ eos sæpissimè ægros adoritur, quorum corpora catharticis fortius obfistunt; cum ita se res habeat, *Enematis* agendum est, quibus injectis utrique indicationi, humoris scilicet tum expurgandi, tum ab affecta parte derivandi satis fieri potest. Quin etiam hæc Methodus expeditior est nonnunquam præmemorata ista, at non æquè tuta, me judice, cum prior illa licet diuturnitate molestior, minus tamen habeat periculi, ne qua contagiosi fomitis particula in visceribus hæreat, novos datura tumultus; Hoc verò incommodum facillimè evitatur, si Cathartica per os assumpta diebus ab usu Clysterum liberis, mutuam iis operam commodent.

Hæc itaque viâ incedo, *Pilulas* jam prædictas, aut alias ejusmodi, duabus tribusve auroris continuis exhibendas curo; postea *Enema* sequens manè, & horâ quintâ pomeridianâ quotidie injiciendum, donec penitus cessaverint symptomata; nisi quod semel aut bis in hebdomade Catharticum impero, misso die isto Clystere. ℞. *Electuar. è succo Rosar. ʒvj. Terebinth. Venet. vitello ovi solut. ʒß. dissolvantur in aq. Hordei ʒj. Colaturæ adde El. Diacathol. ʒij. m. f. Enema:* Singulis etiam noctibus *Opobalsami* vel *Balsami è Mecha gut. xxv. sacchari frustulo exceptas* concedo, sub lecti ingressu; quod quidem medicamentum, cum *Terebinthinæ* quoddam genus sit liquidum ac purum, iisdem quibus illa facultatibus pollet, & ulcerosæ genitalium diathesi apprimè succurrit; hujus itaque defectu *Terebinthina Cypria* ad quantitatem avellanæ dictis temporibus devoranda substitui possit.

Procedente Curatione, quâcunque ea demum methodô tentetur, ægro cibis omnibus sale conditis, vel aliâs dyspeptis (quales sunt carnes Bovinæ,

Porcinæ, Pisces, Caseus, Radices, Olera) & fructibus horariis quibuscunque interdico; quibus substituo carnem Ververcinam, Vitulinam, Pulorum, Cuniculorum, & cætera *ἐπιπτα*. Volo etiam ut vel his parcissime utatur, tantum ut ægri vires non labascant. *Potus*, vino in genere abdicato, ut & liquore omni sive spirituofo, sive acescente, *Hydrogala* esto, ex tribus aquæ coctæ partibus & lactis unâ, nisi quod in prandio & coena Cerevisia tenuis in parvâ quantitate possit indulgeri. Ad contemperandam insuper inflammationem, & mitigandum ardorem urinæ, refrigerantem aliquam *Emulsionem* ad sequentis normam compono, in Purgationum interstitio frequenter potandam. *R. Sem. Melon. & Pepon. an. ʒ℥. sem. Papav. albi ʒij. Amygdal. dulc. excorticat. n. viij. contund. simul in mortario marmoreo, sensim affundendo aq. Hord. ℥. iß. Colaturæ adde sacchari Crystallini q. s. m. f. s. a. Emulsio.*

In temperamentô admodum sanguineô, & affectû pertinaciorè, post mensem catharsi datum, aut circiter, ut plurimum *sanguinis Uncias octo vel novem* è brachio dextro detrahendas suadeo; ut maturius celebretur venæsectio author non sum, ne hæc *ἀποφύσει* contagium penitus inferatur. *Injectiones* in urethram non magni facio, utpote quæ sive acrimoniâ sua mordaci, sive stipticitate non rarò magis officere soleant, quàm prodesse: verumtamen sub morbi exitu *Aqua Rosacea* in pauca quantitate potest injici.

Hæc methodô, quæ mihi semper pro votô cessit in Gonorrhoeâ sanandâ, meliorem nondum comperi; maximè in iis qui facile purgantur. In iis enim qui purgantur ægrius, curatio, licet nunquam fallax, tamen non nisi post longum temporis spatium perficitur. In his itaque sanguis iterum mittendus, & acuenda sunt Cathartica, tum etiam repetenda sæpius, atque in eorum usu diutius est perseverandum, aut clysteres modo jam signato usurpandi. Etenim *Catharsis* hîc ad instar omnium est. Atque in hoc affectu, si in alio quopiam, vere asseritur, quod qui mundificat bene, bene sanat: modò ab *Aquis Mineralibus* sibi temperet, quas certò mihi constat morbi reliquias è corpore eliminandas vi astringente & plus satis sanativâ arctius constringere, & quasi clavò figere trabali; unde quod sæpius observavi, *Scroti tumores* enascebantur quoties in morbi principio, vel statu, pejoraque adhuc symptomata, ut *Carunculæ*, si quando sub ejus exitu potarentur. Quod quidem ego fidenter assero, quantumlibet ex more hodiè recepto *Aquæ Minerales* in dictò casû haud rarò præscribantur.

Neque sum nescius quantum se ventitent Practicorum nonnulli in hujus symptomatis curatione, quâ breviorè temporis spatio, quâ remediis magni nominis & tituli absolvendâ; interim observatione plus satis frequenti certò deprehendi, materiam, quæ eliminanda fuit, astringentium vi in corpore detentam maximum ægris dedisse malum, ex quo persæpe sanguinis massam de novo subiens ipsam demùm *Lues* parit. Nec majore cum fructu, licet periculo minore decoctum *Lignorum exsiccantium* usurpatum comperi; quo scilicet,

scilicet, sub prætextu *Specificorum*, tum universum ægri corpus, tum præ cæteris affecta pars jampridem nimis incallescens ulterius adhuc inflammantur; nonnunquam etiam *Gonorrhœa* quæ paulo antè evanuerat, quod me observasse memini, denuò in conspectum prodit.

Animadvertendum est autem, quòd si ægri glans præputio undiquaque contegatur, atque ejusdem ora præ inflammatione usque adeò tumida, dura, ac callosa reddantur, ut nullo modo queat reduci; laterem lavat quisquis *Gonorrhœam* remediis purgantibus, fortissimis licet, & quotidie ad nauseam repetitis, aggreditur, nisi eodem tempore id agatur ut pars ita affecta ad statum sibi naturalem redeat, sublatis & duritie & tumore, undè *Gonorrhœæ* novus utrique fomes subministratur. Quod quidem ego admolior *Fotum* sequente. ℞. Rad. *Althææ*, & *liliorum* an. ℥i℥. fol. *Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. & Melilot.* an. M. j. sem. lini & *Fœnugræci* an. ℥℥. Coq. s. q. aq. font. ut f. *Fotus*, parti affectæ admoveendus per horæ unius spatium bis vel ter in die. Peractâ fermentatione partem affectam Oleo è semine lini recenter extracto perungendam curo, deinde *Emplastrum è Mucilaginibus* alutæ agninæ inductum labiis præputii tumidis circumponendum. Quòd si *Ulcus* vel in ipsius præputii labiis, vel in subjectâ glande hærens suâ callositate facit ut illud non nisi ægrè possit retrahi, præter fotum jam dictum sequens etiam *Linimentum* præscribo. ℞. Unguent. *Basilici* ℥vj. Unguent. è *Nicotianâ* ℥ij. Præcipitat. aq. Ros. lot. & optimè lævigat. ℥℥. m. f. *Linimentum*, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post *Fotus* præscripti usum.

Ubi verò, sive quòd justo maturiùs *Gonorrhœa* sistatur, sive ab exercitio vehementiori, aut aliâ quacunque de causa, *Scrotum* jam morbi sedes, ab eadem in tumorem insigniorem attollitur, prædictum *Fotum* bis in die parti affectæ admoveo, modò non imminuantur & dolor & tumor, *Cataplasmate* vulgò noto ex *Oxycrato* & farinâ *Fabarum*. Hæc dum foras peraguntur, non desino remediis & Catharticeis, & Refrigerantibus, quæ modò præscripsimus, intrò sumptis, tum etiam *Diætâ* supra dictâ hostem urgere; neque mihi religio est quovis hujusce mali tempore sanguinis ℥jx. vel x. è brachio isto detrahare quod testiculo tumefacto respondet, si tumoris magnitudo & vehementia doloris id mihi suadeant. Atque hæc hæctenus de *Gonorrhœâ*.

* Cùm verò eò usque invakuerit morbus, ut jam *Venereas Lues*, vel *Lues confirmata* præcisè dici mereatur, alia omnino porta quærenda est, & duriori huic nodo cuneus itidem durior est adhibendus: quandoquidem nullum adhuc experimentum, quod sciam, adferri possit extirpati hujusce morbi, nisi per *Salivationem* ab *Hydrargyro* excitatam: quicquid tam doctorum nonnulli, quàm indoctorum de aliis sanandi modis satis temerè & audacter effutiverint. Cùm itaque *Salivatio* omnem hîc numerum absolvat, id tantum mihi incumbit, ut quæ in ea excitanda tum etiam regenda, & ratio

(qualis qualis ea demum fuerit) & observatio rationi suffragata mihi dictaverint, edisseram.

In principio autem ne conjectura quidem assequi possum, quid sibi velint crebra ista monita, quibus de corpore remediis *Catharticis* & *Digerentibus*, Balneo puta & cæteris id genus, ritè præparando, ita seriò cavetur; Ut de Venæ-sectione jam taceam, cui nonnulli hîc loci primas deferunt. Quum enim, si veritati sit litandum, eò res redigatur, ut *Veneno* Salivatio procuranda sit, (neque enim adhuc innotescit salubre aliquod medicamentum, quo possit excitari, neque æger sine ejus ope in tuto collocari potest) quæritur utrum corpori constantibus adhuc viribus, vegeto & valenti, ac proinde frangendis inimici conatibus haud impari; an eidem missione sanguinis & tenui diætâ jam debilitato rectius committatur Venenum. Haud dubiè fatiùs esse duxerit æquus rerum æstimator nihil agere, quàm ita importunè satagendo nocere. Quid quod experientia testatur, nullis evacuationibus, aut alio modo infirmatos, salivationis impetum multò melius sustinere, quàm eos, quorum quasi ante prælium incisi sunt nervi?

Misso itaque damnofo omni hujusmodi præludio, statim atque accerfor *Unguentum* præscribo ex *Axungia Porcinæ* ℥ij. & *Mercurii crudi* ℥i. Neque oleum aliquod è calidioribus, neque aliud quid admisceo; cùm deterius fiat Unguentum, si quod adjecta ista frænum injiciant, & nihilo efficacius, si nihil prorsùs agant: Et fortasse additamenta ejusmodi sub nomine *Correctivorum*, idem hîc præstant (si quid tamen præstant) quod *Catharticis* adjuncta judicè experientia, solent præstare; tormina nempe excitant, & catharsin reddunt laboriosiore, à lucta scilicet inter Antidotum & Catharticum, cujus vis omnis purgans in eo posita est, quod naturæ hominis inimicetur. Verùm ut *tertiâ parte* dicti *Unguenti* brachia, crura, & tibias ad tres noctes continuas (primam qua accerfor includo) manibus suis æger perungat injungo; ita tamen, ut neque axillas, neque inguina attingat uspiam, & abdomen panno laneo tenuiore circumposito, & posterius confuto, à linimenti contactu diligenter muniat. Post tertiam inunctionem gingivæ ut plurimum intumescunt, & *Ptyalismus* suboritur. Si verò intra tres dies post ultimam inunctionem idem haud procedat, tum gr. viij. *Turbith. Mineral. in Conserv. ros. rubr.* exhibeantur ægro, qui post singulas vomitiones aut sedesumat haustum liquoris possetrici calidè. Cùm expuere inceperit, id jam medico negotii tantum est, ut gradum salivationis scrupulosè expendat, ne invocatis temerè suppetiis, salivationem eò usque evehat, ut æger de vita periclitetur. Ubi jam *Ptyalismus* statum debitum fuerit adeptus (in quo expuuntur ut plurimum libræ quatuor spatio *Nycthemeri*) vel symptomata, etiamsi parcius expuat æger, evanuerint, (quod plerumque contingit post quartam diem à statu salivationis) & indulium & tori lintea aliis, quæ à quo ultimò lavabantur usurpata aliquandiu fuere, sunt permutanda: cùm priora ista unguento infecta salivationem & magis quàm erat opus

opus intendere, & longius protrahere, quàm ægro expediat, apta nata sint. Quod si fortè priùs elanguescat salivatio quàm symptomata penitus disparuerint, extimulanda subinde est *Mercurio dulci ad ʒj.* pro dosi exhibito.

Nonnunquam accidit, præsertim in corporibus *εὐμεταβλήτοις*; quòd post unam vel alteram inunctionem (nempè simul ac Hydrargyro sanguis affici inceperit) natura illicò per intestina hunc hostem expellere satagat, undè non solum dejectiones mucosæ & tormina ventris, ut in iis qui dysenteria laborant, eveniunt, verùm etiam curatio morbi impeditur, utpote qui salivationi tantum modò cedere soleat. In hoc casu à Mercurio sive extra applicito, sive intrà assumpto, prorsùs abstinendum, donec hæc symptomata penitus evanuerint; atquè porrò dictus alvi fluxus (qui plerumque accidit, antequam salivatio bene assurgat) sistendus est usu *laudani liquidi*, ita dosim augendo atque repetendo prout urget symptoma; aut *Diascordii sesquidrachma*, aliquoties prout opus fuerit, devorata. Diarrhœa tandem cohibita, salivatio debito modo procedere solet, quæ antea vix appareret.

Convalescente de cæteris ægro, nisi quod os adhuc exulceretur, (qui genuinus & ptyalismi fructus) salivatio quæ jam indies imminuitur, nec purgatione nec alio modo quocunque sistenda est: fieri enim potest ut etiam post consopitum dolorem, atque exsiccata ulcera aliquid de morbi fomite adhuc in corpore delitescat, bella denuò moturum, nisi sibi permittatur sputatio illa moderata, quæ postquam redintegrata sanitate homo se auræ liberiori aliquandiu exposuerit, desitura est. Periculosum itaque esse arbitror ptyalismi jam abiturientis & mox evanituri reliquias *Catharsi* deducere, vel *Lignorum decocto* exsiccare velle; à qua praxi, quæ vulgò obtinet specie vel Mercurii è corpore eliminandi, vel corrigendæ ejus malignitatis, nascuntur sine dubio frequentes istæ *Recidivæ*, quæ miseris accidunt, sanitatem tandem aliquando post tantum impenfarum, tot exantlatos labores, tantum tædii devoratum anhelantibus, ad quam etiam certò pervenissent, si salivatio non nisi suo tempore determinaretur. Longè itaque consultius esset, Ptyalismum promoveri *Mercurio dulci* semel in hebdomade exhibito, etiam postquam omninò convaluerit & jam sub dio versetur, (quod & ego per menses aliquot fieri aliquando jussi) quàm eundem præmaturiùs inhibere.

Quantumlibet autem à catharsi in salivationis declinatione ob jam dictas causas abhorream, fieri tamen potest ut in ejusdem statu ea nec prætermitti possit, nec debeat, quoties scilicet re malè gesta eo usque fuerit evecta salivatio, ut jam ægri vitæ metuatur: quo in casu non tutum modò est, sed & necessarium etiam Cathartico ingesto Ptyalismum ad eum gradum deprimere, ut cum ægri *εὐφορίᾳ* procedat, qui deindè suo juri relinquendus.

Si quis jam quærat, an nudà Salivatione contenti esse debeamus, nec Catharticis, nec aliis remediis solennibus in usum, post eam peractam, revocatis? Respondéo, præter jam dicta, quibus & ratio astipulatur, & experien-

tia, me velle doceri quam ob causam magis sit necessarium purgare post Salivationem, quàm Salivationem excitare post Catharsin, cum remedia purgantia (*Scammoniata* maximè & id genus acria) malignitatis quidpiam in corpore relinquunt, quod naturæ tamen committimus, cujus vi tandem subjugatur istud, quicquid est veneni, eo scilicet qui purgatus fuit ad regimen consuetum, exercitium, & liberio rem aëris usum se recipiente. Atque id porrò libenter scire velim, quâ demum arte freti Mercurii reliquias per Catharsin expellere conamur, cum genuinam illam ac propè unicam methodum (per salivationem scilicet) quâ natura id efficere solet ac debet, non solum negligamus, sed etiam impediamus? Hujusmodi autem hallucinationes minimis istis rationis scintillis imputandæ sunt, quibus nos miseri mortales tantum præditi, ad veritatem in profundo demersam non penetrantes, quamlibet ejus umbram & speciem amplectimur, pro Junone, quod ajunt, captantes nubem; mox colloquia miscentes, præjudicia malè fundata ita penitus nobis invicem infigimus, ut tandem phantasmata nostra & delirantium insomnia pro principiis Apodicticis haberi velimus; cujus specimen, ni fallor, præ manibus nobis est.

Quamvis autem in plerisque Curatio modò jam dictò absolvatur, viz. *Inunctione* per tres noctes continuas, & exhibito *Turbith Minerali*, Ptyalismo haud ritè procedente, *Mercurio* item *dulci* ad vices aliquot, eodem justo citius fatigante; seriò tamen animadvertendum est, in quibusdam reperiri idiosyncrasiam sive temperamentum quoddam peculiare tam salivationis respectu, quàm purgationis, (atque eadem plerumque in iisdem, ut qui ægrè purgantur, ægrè etiam ad Ptyalismum perducuntur) ita ut in nonnullis Methodus laudata vix gingivarum exulcerationem queat efficere, multò minùs salivationem eam procurare, quæ malo eradicando par sit. In hujusmodi ægris Medico summopere cavendum est, ne animo nimium obstinato salivationem importuniùs urgeat, recalcitrante naturâ, atque ab isto evacuationis genere prorsus abhorrente; quod qui minùs intellexere, ægros haud paucos letho dederunt: Etenim in corporibus ita factis, quotiescunque medicamenta, sive externa illa fuerint, sive interna, pertinaciter ingeminaveris, loco salivationis perfectæ nil præter ventris tormina, & dejectiones dysentericas obtinebis, naturâ per hanc portam Hydrargyri virus amoliente; vel dolores ventriculi & ægritudines, sudores frigidos, horrendaque alia symptomata accerfes, ita ut æger tantum non agat animam, fortè etiam mox eam evomat. In his licet Medico concedi possit, ut postquam ad dies quatuor vel quinque à postremâ inunctione salivationem frustra præstolatus fuerit, inunctionem jam sæpè dictam, & *Turbith Minerale* denuò repetat, (interjectis inter singulas inunctionum vices diebus aliquot) religiosè tamen cavere debet, ne cum tanto conamine salivationem incassum sollicitaverit, eam per vim invitæ naturæ extorquere pergat. Hic itaque modus, quantum ego judicio valeo, Medico tenendus est, ut ubi primùm vel ægritudo ventriculi, vel ventris tormina succedant,

dant, statim sibi temperet à remediis adhibendis donec ea penitus evanuerint symptomata; pluribus enim & fortioribus remediis ad cogendum *φύσιν ἀντιπατήσας* salivationem accumulatis, *Dysenteria* certò certius tormina ventris, & ventriculi ægritudinem Mors excipiet. Cum ex adverso si lentè festinet, & moras trahat, *Mercurii dulcis* ℥j. semel aut bis in septimana exhibendo, vel per se, vel cum ʒj. *Diascordii*, si æger in *Diarrhœam* propensior sit, tandem aliquando cum bonis ægri rebus optata potietur arenâ. Quantumvis enim *Ptyalismus* ad plenum nunquam assurget, æger tamen copiosius quàm pro more solito expuet, & foetor justæ salivationis comes neque immunitiorem hanc destituet: unde evincitur sanguinem & humores eam sive putrefactionem, sive alterationem, quæcunque ea demùm sit attigisse, quæ vel parit salivationem, vel cum ea nascitur. Atque hac Methodo universa hujus morbi symptomata tandem expugnabis, concessò utique debitò temporis spatiò.

Observandum est autem, quòd licèt salivatio remedia alia, qualiacunque ea fuerint, in extirpanda *Lue confirmatâ* longè exuperet, *Gonorrhœam* tamen cum *Lue* concurrentem neutiquam valet sanare; nec sistetur illa, hac jam penitus devicta: undè rectè colligitur nullam vim specificam Mercurio inesse quâ *Venerea Lues* immediatè debellari possit; quamlibet *Specificum medicatum* fortè dici mereatur, in quantum mediante ptyalismò morbum expellat, pari fermè *καταχρήσει* (quod aliàs subinnui) atque scalpellum Chirurgicum Laterali morbo Specificum queat appellari. Sed ut ad rem redeam. Quoties *Lues* & *Gonorrhœa* unâ stabulantur, vel ante Salivationem, vel ea jam peracta, *Gonorrhœæ* curatio tentanda est; quod & tutius fit, me judice, & facilius etiam post finitam salivationem, cum *Luem* habens comitem *Gonorrhœa* ægrius dometur; quæ verò à prægressa salivatione quadantenus subacta fuit, minori negotio expugnari soleat. At verò Catharticis religiosè abstinendum est quo usque vel minimæ salivationis reliquiæ supersint; Quamobrem *Turbith Minerali* semel aut bis in hebdomade exhibito securius rem committemus, quàm aliis Purgantibus quibuslibet, cujus vi promovebitur aliquantulum ptyalismus, dum interim materia *Gonorrhœam* comitans paulatim excernetur.

Porro observandum est, si tumor offi alicui, *Exostosis* vulgo dictus, infideat, qui etiam tamdiu permanferit, ut os jam carie afficiatur; incassum prorsus erit sive salivatione, sive alia aliqua methodo curationem aggredi, nisi etiam huic malo obviam eatur; ac proinde os ope *Caustici* denudandum, & quamprimum idem, quod ajunt, *exfoliandum*, usu scilicet remediorum quæ intentionem hanc implere solent.

In *Ore exulcerato*, quod Salivationem passis ita familiare, si vel æger dolori ferendo par non sit, vel eo usque illud excorietur ut sanguine diffuat, idem nocte dieque vel *aquâ Rosarum Damascenarum*, vel *lacte aquæ permisto*, vel *hordei*, *radic. Althææ*, & *semin. Cydoniorum decocto* sæpissimè proluendum est. Unicum hoc symptoma memorabile, quod scio, salivationi

livationi accidit, saltem quoties ea more debito administratur; & sanè si *dolor & oris exulceratio* arte aliqua protelari potuerit, haud multo esset molestior morbi hujus curatio, quàm est aliorum aliquot longè minus famigeratorum.

Dietam quod spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus in *Salivatione*, saltem donec ad finem jam ferè vergat, ac in *Catharsi* imperanda censeo: Cumque ei qui medicamentum aliquod purgans assumpsit, id tantum incumbat, ut se in cubiculo à vi frigoris defendat, & cibis *εὐπείπτους* moderatè vescatur, nondum mihi constat quo nomine vel lecto semper addicatur qui *Ptyalismum* subit, vel à victu modico arceatur, qui scilicet naturæ cum veneno conflictanti vires animumque addat; unde etiam naturâ tanto oneri succumbente, haud pauci, spiritibus, atque omni vitæ robore, diaphoresi, purgationibus, & jejuniis supervacuis (præter vulnus ab *Hydrargyro* inflictum) tandem penitus exhaustis, miserè confecti sunt; Persæpè etiam morbo jam pulso, æger eâ spirituum copiâ quâ erat opus ad redintegrandam sanitatem destitutus, præ imbecillitate concidit; aut si forte *Libitinam* valeat effugere, tot tantisque cruciatibus vitam redimit, ut tanti non sit vivere. De quibus Poëta è Neotericis haud ineleganter:

Graviora morbis patimur remedia;

Nec vita tanti est, vivere ut possis, mori.

Hic autem in promptu est istam objectionem diluere, quâ fit ut nonnulli hîc morbo, (scilicet in statu ejus modò dicto) malè multati in *Galliam* commigrare cogantur, ut ab eo liberentur? Cujus rei hanc esse rationem, quantum judicare possum, existimo; Hujusmodi ægris, œconomia illorum corporum eversâ ac viribus prostratis, apud nos aër crassus ac humidus resarciendis minùs idoneus est, cum iste *Galliæ*, utpotè qui salubrior ac magis serenus, spiritus corporis & vires deperditas instaurare aptus sit: Non quòd Practici ibidem degentes, utut docti quidem, methodum quâ hic morbus devinci possit, melius calleant, quàm nos hîc in *Angliâ*. Sed ut ad *Dietam* revertar.

Existimo itaque (& experientia mecum facit) quòd præter jusculum *Avenaceum*, *Panatellam*, *Lac cerevisiatum*, & *Cerevisiam* tenuem tepescitam, &c. juscula insuper è carne *Vitulinâ*, *Pullorum*, atque alia ejusmodi in mediocri quantitate ægro & possent concedi, & debeant; atque ut, ubi primùm eo usque subsederit gingivarum tumor ut dentes conferere valeat, *Cuniculorum*, *Pullorum*, *Agnorum* carnes, atque ejusmodi teneriores, at parçâ manu, sint indulgendæ; ut vel in lecto se contineat, vel ad ignem se deat, prout hoc vel illud magis allubescat animo: Cum enim *Ptyalismo* expugnetur hic morbus, non *Diaphoresi*, hariolando non sum, quorsum æger, nulla urgente necessitate, nimio calore maectetur.

Dicta Methodus uti expeditior est, cum neque tot dies corpori ante salivationem præparando inutiliter insumendos, nec frequentes istas purgationes,

nes, aut decocta solennia post salivationem; ægris imponat; ita certissimum eandem longè faciliorem esse, minus itidem periculosam, & minus recidivæ obnoxiam: quod experimento suo discet qui quis in altera praxi versatus, ad hanc se demum conferet. Mihi saltem ex animi sententia successit in quamplurimis ægris, quorum nonnulli salivationis tædium & laborem plus semel irritò conatû exantlaverant, recidivam semper denuò passi, ex occasionibus, & propter causas quas suprà memoravimus.

Non est autem, Vir Candidissime, cur tuam fidem verborum ambagibus anxie sollicitem, qui jam dudum de probitate mea persuasissimus, existimationi etiam nostræ favere dignaris. Plura itaque de hoc morbo non addo, cum mihi neutiquam placeat, nec placebit unquam, longis verborum ambagibus & sermonibus, ἀποσιτιστικῶς nucleum involvere, quo rei caput, seu *Nili* fons, ægrius innotescat. Quantulicunque autem sit hoc opusculum sive pretii, sive molis, id ut boni consulas rogo: cum illud eò præcipuè sine elaboraverim, ut & in bonum publicum cederet, & quò in te essem animò palàm testarer: quantumlibet autem magni te faciam, major tamen adhuc tibi honos debetur & à me, & ab iis quibus summa illa tua eruditio, morum suavitas, animique candor, cæteræque virtutes laude dignissimæ ita clarè elucescunt. Haud equidem tibi assentor, quoties profiteor me tuam amicitiam, ex quo me primùm ea condecorabas, inter illa, quæ mihi comparavi, pretiosissima luculentissimaque semper habuisse. Inter alia enim in brevi vitæ curriculo à me observata eximium est istud, (quod etiam filio meo commendatissimum esse volo) hominum sc. probitate cæterisque virtutibus præcellentium consuetudinem semper mihi commodo vertisse atque emolumento; atque ex adverso pravorum amicitiam, (nisi ea potius combinatio, sive etiam conjuratio dicenda sit, quæ in virtute non fundatur) quamvis nec dictu, nec vultu quidem me læserint unquam, tamen nescio quò pactò, tandem aliquando aut mihi, aut rebus meis mali, aut damni quippiam affricasse. Vale, Vir Humanissime, & amare perge

Tui semper Observantissimum

THOM. SYDENHAM.



Innumeri propè Autores scripsere de Lue venerea, quam paucis explicat Clariss. noster Autor. Longum nimis foret illorum vel partem aliquam hic recensere, pro pleniori fœdi ejusce morbi, ac ipsius curæ, illustratione. Sufficiat itaque Doctissimi alius Angli perbreve, sed verè accuratam, eòdem in argumentò Dissertationem addere, cujus hæc est inscriptio.

GUALTERI HARRIS, M. D.

Celeberrimi Medicorum Londinensium Collegii, Socii.

D E

LUE VENEREA, ejusque Origine, Naturâ & Curatione,

D I S S E R T A T I O.



Hic morbus tam gravis & acerbus est; tam latè serpit, & perniciem suâ undique spargit; tantis cruciatibus miseros plerumque opprimit; & pristina sanitas tam difficulter restituitur, ut ab annectendo quædam eò spectantia non potuerim prorsus abstinere. Primordia hujus mali quæ pudendis solis labem inurunt, contemptui & ludicro habeant, si ita placet, ganeones & Belli nostri, & petulantibus facetiis, tanquam nugas & crepundia, ea excipiant; sed quodocunque aut prima illa inquinamenta aut succedentia, in sanguinem denuò transferentur, atque per totum corpus virus distribuetur, poenas insipientiæ debitas illi abundè persolvent.

De Origine hujus morbi ambigitur, an ab omni ævo, post homines natos, extiterit; an superiori ferè sæculo in *Europam* ex *Indiâ* Occidentali fuerit advecta. Multa sunt testimonia, aut saltem suspiciones non contemnendæ, de antiquitate hujus Luis, quanquam tot ferè Regna non ita pridem contrà ejus Natales probrosos decertarunt, alterum in alterum illud opprobrium rejiciens, quot urbes olim *Homerum* sibi gloriôsè vendicârunt. Certè nomen ejus legitimum usque ad nostra hæc sæcula in tenebris latuit. Nec forma & figura hujus Monstri à prioribus Medicis satis clarè & distinctè sunt descripta, neque ante novam suam denominationem nisi confusè admodum cognita. Hoc autem procul dubio scimus,

scimus, plurima olim apud nos Nosocomia leprosis recipiendis fuisse extructa; & multum fallor, si unica & singularis domus apud nos etiamnum maneat, Leprosis vulgò recipiendis peculiariter dicata. Porro Venerei contagii eadem semper causa tyrannidem exercuit, nempe vaga & promiscua scortatio; nullisque sæculis defuerunt meretrices infames, quæ corpore prostituto vilem quæstum facerent: *posita verò causa ponitur etiam effectus*, quemadmodum & *sublatâ* semper tollitur. Quibuscumque enim in regionibus, quibuscumque demum locis prostibula ista, ac corruptelæ juventutis vulgares prorsus exulant; legumque asperitas scortationem omnem coërcet, deest etiam unâ cum impuris scortis Lues hæc Venerea. Ubicumque verò lupanaria palam permittuntur, remisso magistratu aut dissimulante; vel ubicumque meretriculæ latebras aliquas foedas securre nanciscuntur; eadem Lues cum horridâ malorum turbâ, cumque omni suo miseriarum famulitio, longè lateque dominatur. Atque, ut mihi quidem videtur, in utero impuro meretricum vulgarium, quæ plurimis viris, quantumlibet sanis, sese prostant & commiscant, certo & naturaliter progignitur Lues, perinde atque in nido ex ovis nascuntur volucres. Et quoniam *corruptio optimi est omnium semper pessima*, cur non ex seminis prolifici, & in tantos naturæ usus destinati, corruptione prava & incongruâ venenata illa Lues possit *phosphorus* propagari? Et nullus dubito, paucissimos uspiam esse scortatores, qui, quantumvis poenas meritas aliquandiu effugerint, non ferius aut citius in la-

queos illos inciderint, qui non turpi & funesto illo veneno fuerint tandem aliquando contaminati.

Sanè Lues hæc perniciosa est Supremi Judicis tremendum quoddam flagellum, instar ensis illius stricti capiti Damoclis inter epulandum impendentis, omnibus scortatoribus semper interminans, quod sapientes ab impuris amplexibus facile deterrebit, quodque insipientes severissimis flagris aliquando cædet. Quis enim mulierosus certus esse potest, meretriculam qualemcumque sibi uni, ut videtur stipendia facientem, non aliis pluribus fuisse prius, aut denuò fore pervulgatam, atque ideò obnoxiam venereo inquinamento, utcunque ista mendaciis suis, perjuriisque usitatis, pudorem aliquem comminiscatur?

Neapolitanus hic morbus vulgò nuncupatus est, & ab obsidione *Neapolitanâ* primum ejus contagium originem traduxisse ut plurimum creditur, anno scilicet post *Christum* millesimo, quadringentesimo, nonagesimo tertio; cum *Neapolim* castris suis circumdaret *Carolus* octavus, Gallorum Rex. Sed cum rumorum popularium tanta sit incertitudo, ut sapientes vix quicquam pro certo pronuncient, quod non manifestis & sibi notis testimoniis confirmatur; cum aliorum morborum primus exortus in tenebris æque permaneat, cum ita constitutum sit rebus humanis, ut in singulis sæculis quædam continuo pereant, oblivioni tradantur, & alia quædam rursus emergant & succitentur, cum virus Venereum in omnes ferè regiones totius orbis, quantum nobis innotescit, ab oriente ad occidentem, à septentrione ad

meridiem, jamdiu spargatur, & usquequaque diffundatur; cum denique Medici aliquot gravissimi Luem istam infamem ante obsidionem illam Neapolitanam contagio suo virulento Europam jamdudum invasisse constanter affirmant, sanè difficile est aliquid certi & indubitati in re ita obscurâ stabilire & decernere; quam antiquam Luis profapiam admodum apertè indicare videatur antiqua, ac permanens causæ existentia, nempe scortatio illicita, vaga, & promiscua, primordiis fortè rerum humanarum, aut saltem effræni hominum libidini, ac corruptelæ meretriciæ coæva.

Sed ut hanc rem paulò altius perscrutemur, Hippocrates, cujus autoritas apud omnes doctos plurimum valet, libro tertio de Morbis Epidemicis, plurima horrenda symptomata enumerat, quæ ad formam Venereorum quàm proximè accedunt: ut, pustulas magnas, & pustulas corpore universo erumpentes, maximèque caput impetentes, ulcera fœdissima circa pubem & pudenda, inflammationes Erysipelatodes malignas & depascentes, diarrhæas & cibi fastidia, tabes multas, aut atrophias, nunc sine febre nunc cum febre contingentes; carnum, nervorum, & ossium mutilationes ex decidentia magnas; a carie præcedente, prolapsus partium abscessibus corruptarum, & denudationes femoris integri, tibiæ, aut pedis totius, prolapsus brachii, aut cubiti totius, & omnium miserimas carnum jacturas, cum pubem pudendaque malum affecerit; ichores ulcerum & abscessuum puri absimiles, & pure omni dete-

rioros, capillorum defluvia, fluxiones ad pudenda multas, dolores gravissimos cum vigiliis, ulcera oris serpentia, & tubercula tam interna quàm externa circa inguina, aut bubones, tubercula faucium, ulcerationes pudendorum, & similia, quæ quidem breviter tradit, & more suo conciso. An verò hæc omnia à Peste verâ, an à Pestiferâ hæc Lue oriantur, in utramque partem ut differant, par est doctis liberum relinquere.

Quicquid verò de turpibus Luis natalibus sit statuendum, certè dolendum est maximè, Curationem tantæ Ægitudinis, omnes corporis partes, tam internas quàm externas, à capite ad calcem, polluentis, è manibus Medicorum, doctorum & peritorum ita profugisse, atque Chirurgis, nec non tonsoribus imperitis, ignarisque quibuslibet vulgò concedi. Quis enim tam fatuus & insulsus, quis tam illiteratus ardelio, qui non Medicafter in hoc morbo circumforaneus facile evadat, sine instituto, sine sumptu, & sine arte? qui non curationem Luis, aut saltem Gonorrhœæ infallibilem perfriçtâ fronte polliceatur; Quales autem hi sunt Medici? Sartores ut plurimum & fabri, similesque artifices, propinatores inertes & decoctores, qui in officinis suis fidem prius labefactaverant. Quàm infelix igitur & misera & Infectorum conditio, qui duplices sustinent pœnas, damnanturque tum atrocissimi morbi cruciatibus, tum rudis agyrtæ ignorantiae periculosa! Quasi levissimi quilibet affectus peritiam Medicam jure efflagitarent, morbus verò

rò minimè anceps, medullisque penitus infixus, cuius illiterato possit tutò demandari!

Ut autem summum discrimen Lue Infectorum manifestius appareat, considerandum est, hunc morbum frequenter esse Protei-formem, & post primam ejus subjugationem, sæpe novas postea induere facies. Illud equidem facile adducor ut credam, propterea quòd tot tabidos, & atrophiam confectos, pulmonibus ferè intactis, nec nisi secundariò læsis, viderim perire. Et nisi ex acuto aliquo morbo illos contigerit extinguì, marcore & atrophiam vix intellectam tandem contabescere semper observavi. His lac Asininum, pectoralia, narcotica, & similia, primam venenatam causam nihil respicientia, ad supremum usque diem frustra exhibentur. Chirurghi salivatione absolutâ, & mercede laborum acceptâ, integram sanitatem audacter promittebant; atque denuò ægrotantes, longè diversis symptomatis quàm prius affecti, neutiquam somniant de reliquiis fomitis venenati, aliquamdiu consopiti, & intus delitescents, sed sub novâ formâ revirescentis. Interim Medicus quantumlibet peritus, nihil causæ Venereæ facile suspicabitur, atque ægrotus partim ex vercundia, partim præteritæ curationis securus, de pristinis rebus oblivioni jam traditis nullam mentionem facit. Heu quanto igitur discrimine versantur hujusmodi ægrotantes, cum nec ipsi de causâ ægritudinis primariâ ne verbum mullitent, cumque Medici contra morbum incognitum, Andabatarum more, cœcutientes

militent! Certè Autores nonnulli, magis emunctæ naris, veritatem horum suboluerunt, cum ita prudenter illi consulerent, quoties aut dolor Ischiaticus, aut Rheumaticus, aut alius valdè pertinax, remediis propriis & usitatis nequaquam cederet, ut ad Diætam sudorificam, è Ligno sancto, Salsaparillâ, & consimilibus, tanquam ad sacram Anchoram confugeremus.

Ex his Luis reliquiis spretis, & aliquamdiu abditis, non solummodò pendet valetudinaria, & misella parentum, æquè ac aliorum scortatorum conditio; sed & hinc morbi aliquot puerorum tralatitii, & ferè immedicabiles, & quos nominare minimè convenit, nè nati infantes, viri tandem facti, contumeliam, moestitiam, atque animi perturbationem aliquam exinde immeritò patiantur. Quamlibet enim majus est reverà dedecus à vitiorum suorum, quàm natalium, turpitudine & infamia, tamen novi viros eximios & fortes, clarâ & illustri stirpe, sed illegitimè prognatos, qui præter modum dolore opprimebantur, quoties de natalibus suis spuris mentionem aliquam factam ex susurris clanculariis in communi hominum consortio illi suspicarentur. Atque in eâ re major est Turcarum justitia & sapientia, apud quos nemo parentum culpam in filios iniquè transfert, & nulla est ignominia natis ex partu illegitimo prodiisse.

Porro statuendum est Luem Veneream esse morbum venenatum, & maximè deleterium. Et quanquam non ita repentè interficiat, ut ictus

& morsus animalium venenatorum, tamen temporis aliquo spatio, modò longiore, modò breviorè, vitam infectis certissimè adimit, nisi remediis propriis & salutaribus sanitati pristinæ tempestivè restituantur. Paucis igitur agamus de veneni hujus cæterorumque naturâ, & breviusculâ comparatione. Inter alias notas sunt signa venenorum, insignis faciei totiusque corporis pallor, & extremorum perfrigeratio, quæ in Venereis sunt maximè conspicua. In venenis assumptis, natura materiam venenatam omnib; expellere nititur in superficiem corporis & partes externas, undè maculæ variæ, papulæ, & exanthemata oriuntur: Similiter in Lue Venereâ prodeunt maculæ, interdum parvæ, lentiginum instar, interdum latiores, eæque modò rubræ, modò flavescentes; & primum circa frontem ac tempora, deindè caput reliquum, tandemque per totum corpus diffusæ; nec solummodò maculæ, sed & pustulæ & tubercula in cute erumpunt. Venenis per os assumptis, calidis dico & erodentibus, magnum exoritur incendium in faucibus, & ventriculo, atque intestina doloribus aut torminibus exquisitis cruciantur: Lue infecti faucium inflammatione, & paulatim exulceratione, semper corripuntur; ventriculus illorum sensim proster-nitur; & quanquam artus dolorum sævitiam & atrocitatem ut plurimum ferunt, tamen plus semel novi, aut intestina, aut hypochondria eisdem diris cruciatibus affecta, iisque tempore vespertino recrudescuntibus, quos artus ut plurimum & magis regulariter sustinent. Denique Vene-

na propria sua & peculiaria medicamenta, sive Antidota, ut ritè expellantur, requirunt: Lues, nisi propriis & quali specificis Antidotis perniciēs ejus virulenta depellatur, vulgaria omnia pharmaca, & methodos omnes quantumlibet doctas, solet aspernari.

Sed natura hujus Veneni est alia atque alia, tum secundum regiones magis ad Septentrionem aut Meridiem positas, tum secundum Temperamentorum varietates. Etenim in Hispaniâ & Lusitaniâ, de hoc morbo (sæpe tam mitis iste est illic) vulgò colloquuntur, quemadmodum nostri solent de Liene & Scorbuto. Siquidem illorum Medici ad febricitantes matronas nobilissimas ac virtute præditas accersiti, solenniter quærunt, an Lue Venereâ laborent, sicut nostri de Catameniis, quanquam & verecundè interrogant. Et in illis regionibus, ubi Veneni aliqua portio indefinenter perspirat, Infecti multi sese totam vitam hoc morbo comite satis placidè traducere nonnunquam posse, sæpè confitentur. Apud nos verò longè aliter se res habet, & hæc Lues ferocem & immanem tyrannidem exercet. Nullus hic symptomatum & cruciatuum finis, nisi aspera aliqua, aut diuturna mitior, medicatio interponatur, donec aut dolores contorquendo, aut ulcera depascendo, aut ichor venenatus ossa corrumpendo, miseris finem imponant, & lacerum putridumque cadaver tandem abjiciatur, pabulum sanè ingratum, & vix vermibus acceptum.

Quin etiam juxta Temperamentorum diversitatem Venenum hoc diffi-

miles

miles vires apud nos obtinet. Temperies Melancholica, & Biliosa ejus exterminationem ægrius sustinent, quàm Sanguinea, & Phlegmatica. Multò facilius restituantur juvenes, quàm ætate provecti. Idemque est dicendum, de Scabie, Herpete, & nonnullis aliis morbis varia temperamenta affligentibus. Et sicut Temperamentorum differentia efficit, ut Cathartica longè dispares effectus obtineant; hoc corpore mitissimis medicamentis faciliè purgato, illo fortissimis ægrè cedenti; utque idem dejectorium medicamentum eodem pondere diversis hominibus exhibitum, in uno celerem ac violentam, in alio tardam ac mitem, & in alio nullam omninò operationem concitaverit: ità & de Venenis dicendum est, quòd illa citius aut ferrius interimere soleant, non modò ex propriâ & innatâ vi perniciosâ, sed secundum fortiolem aut debilio-rem repugnantiam naturæ ejus, qui venenum accepit. Nam opinio ista vulgaris ficta est & falsa, quæ *Indos*, ab iisque *Italos*, ita artem veneficam statuit calluisse, ut in statutum diem, aut tempus prædeterminatum, siue fuerit septimana, siue mensis, siue annus, Venenatos omnes certò conficere possint. Natura enim unius quàm alterius, quemadmodum dictum est de catharticis, veneno magis se opponit, & lethale virus re-primat, aut frustratur.

Sunt qui Luem arbitrantur, fractis & attritis senio viribus tyrannidem suam fermè omnem jam deposuisse, & ad interitum suum cum senectâ demum vergere. Eademque apud plures doctos sententia jamdiu obtri-

nuit, quandoquidem blanditiis verborum tam literati quàm aulici spe vana ductis nonnunquam se accommodant, & gratiam lenociniis solent sibi conciliare. Qui verò sic sentiunt, nosocomia hodierna paulisper adeant, aut Chirurgos probos ac exercitatos consulant, videant ulcera multiplicia, cancrofa; & depascentia, tophos & gummata, os- sium caries, & carnum putrilagines; videant tabes, lipothymias, cachexias, denique totam Pandoræ pyxidem ibidem apertam; exaudiant etiam horrendas miserorum exercitationes, gemitus acerbos, & ululatus permolestos; tandemque dicant, an Venus egregiâ illâ mansuetudine mancipia sua hodierna excipiat; dijudicentque pariter, utrùm Mars an Venus plures ex numero viventium tollat; uter denique istorum amafiorum exitium pejus & frequentius cultoribus suis inferat.

Quod ad Therapeiam attinet Luis, alii Salivatione curationem moluntur; alii sine Hydrargyro, & nescio quibus ineptis Arcanis eandem audacter pollicentur; alii denique emeticis, & catharticis Mercurialibus, & Diætâ Sudorificâ intercalatâ, similibusque, venenum illud penitus subigere annituntur.

Medici fermè omnes, totumque Chirurgorum sodalitium, uno consensu, Salivatione tanquam brevissimâ, & maximè efficaci methodô, Luis curationem aggrediuntur. Nec denegandum est cuiquam in Arte Medicâ mediocriter versato, Salivationem esse omnium Methodorum, quas hætenus excogitavit peritia Medica, maximè expeditam, atque efficacem,
ad

ad virus illud Venereum valdè obtundendum, & malignitatem ejus perniciosam abundè frangendam, si minus ea valeat non rarò ad venenum illud penitus delendum. Certè in his regionibus Borealibus, frigoris prædominio obnoxiiis, ubi labes Venerea tantà immanitate sævit, Salivatio præ aliis adhuc notis inducias maximè veloces, perniciæ dilationem, & symptomatum omnium vehementium cessationem obtinet celerissimam; nec non in quibusdam infectis, & potissimum in junioribus, curationem perfectam aliquando complet. Sed si consideretur horrenda illa, terribilis, & nonnunquam intolerabilis medicatio, tantis cruciatibus & periculis extremis stipata, saltem exoptanda est, & omnium votis exposcenda, alia aliqua jucundior methodus, tutior illà minusque molesta.

Potentissimum, & efficacissimum salivandi genus est id, quod per inunctionem Mercurialem excitatur, & quod solum, tanquam *dignum nodo cuneum* Sydenhamius noster præclarissimus laudat. Sed refert scire, attentèque contemplari, in quot vitæ discrimina Salivatio ista conjicit infectos; quot ex eà solent vulgò interire; quàm horrendas capitis, fauciumque efficit intumescencias, suffocationem repentinam frequenter minitantes, & vix fræno manus peritissimæ rectè gubernandas. Nôrunt quidem alyptæ quàm periculosas diarrhoeas, dysenterias, lipothyrias, in temperamentis maximè Mercurio repugnantibus, ista crebrò producit; sed aliam vix exercebunt artem, vix quærent alyptæ, nisi quam

in tyrocinio à Magistris suis didicerunt. Tanta verò est in hoc Salivationis genere humorum fusio, tanta succorum omnium corporis sæpè exantlatio, ut nil mirum sit, si spiritus vitales unà dissipentur; & maximè si in hâc terrâ, aliter sælicissimâ, ubi Melancholia tantum obtinet imperium, complures ex tam rapidâ fluidorum profusione succumbant ac pereant. Quàm fugax scilicet voluptas acerbissimas sustinet sæpenumero poenas! Quantâ curâ & industriâ Sirenum illarum veneficarum blanditiæ sunt ab omnibus fugiendæ quicunque aut sanum corporis temperamentum conservare volunt, aut vitam longævam jucundâ lenique senectute finiendam cupiunt.

Porro si facultates Hydrargyri tantâ copiâ in corpus intromissi, ac sanguinis motu circulari omnes corporis partes pervadentis, velut in Salivatione vulgari contingit; si illius vires naturæ humanæ tam noxias, ac inimicas; si virus ejusdem nervis & cerebro peculiariter adversum, attestante id paralyfi, & tremoribus frequentibus; si onus & tormina, quæ ventriculo & intestinis vulgò infert; si pallidissimum plumbeumque colorem, quem vultui impertit; si denique quòd à veteribus omnibus medicis Hydrargyrum in catalogo Venenorum annumeretur, diligenter perpendamus: sanè Medico probo incumbit, quando duobus Venenis tam Morbi quàm remedii unà convenientibus sit necessariò occurrendum, de Antidoto aliquâ propriâ, salutari, & excellenti, sollicitum esse. Et si tela ad hunc morbum

ritè

ritè expugnandum magis apta & idonea unquam reperiantur, è Medicorum pharetrâ magis magisque denuò instructâ, potius quàm ex aliorum quorumcumque sive armamentario, sive officinâ, nî plurimum fallor, certò extrahentur.

Et quidquid delirum vulgus, alique nonnunquam saniore judicio præditi, contrâ sentiant, sanè nescio, an quisquam omnium morborum qui miseros mortales solent excruciare, judicium acerrimum, Medici periti & exercitati, potius quàm agyrtæ aut indocti alicujus artificis, requirat ac mereatur, quàm Lues ista immanis & venenata.

Quanquam verò Salivatio omnibus aliis Methodis ubique palmam præripuit, tamen notatu dignum est, quod *Julius Palmarius*, Medicus Parisiensis clarissimus, & eruditissimus copiosius differuit, qui Magni illius *Fernelii* fuit discipulus, & qui librum de Morbis Contagiosis tum doctè tum eleganter scripsit. Ille Salivatione, quantumlibet tunc populari, quantumlibet nunc vulgò usitatâ, vix centesimum quemque Lue correptum, perfectè sanari tradit; sed recidivo illos morbo, ex scintillis aliquamdiu consopitis recrudescente, nonnunquam citius, nonnunquam post plures annos affici, & languescere. Atque alii, inquit, decies, alii duodecies, suo tempore Salivationem frustra sunt experti, tantâ interim cum doloris acerbitate, maiorumque miserrimorum acervo, ut forti viro multò satius sit semel mori, quàm vitam morte pejorem sic proferre.

Ego itaque hæc animo diu mul-

tumque evolvens, nunquam complecti potui, quamobrem *Fernelii*, *Palmarii*, aliorumque medicorum doctissimorum methodi tutiores ac jucundiores tam paucos sectatores consequutæ sint, & praxi hodiernâ ita præscribantur, nisi ob has potissimum rationes:

I. Medici illi præclarissimi odio adversus Hydrargyrum nimis acri flagrant, propter noxas illas gravissimas quas sæpius infert corpori. Et *Fernelius*, primus omnium Medicorum, curationem Luis sine quocunque Mercurialium usu interno, & fortè nimis temerè suscipiebat, & palam pollicebatur; Amuletis suis selectis ac saluberrimis, Diætæ Sudorificæ, victui tenui & frugi, & catharsi intercalatæ solummodò confisus. Et certè propter ausum ac tentamen tantum, tamque salubre generi humano, ni fortè minus fælix fuisset successus, omni laude dignissimus est egregius ille Medicus, quam in pestiferò hóc morbo usus illius medicamenti periculosi, quod à Plinio vocatur *Venenum omnium rerum*, summè necessarius nobis hactenus videtur. Nam *malum ovum malo corvo* apprimè convenit. *Palmarius* autem Hydrargyrosi vulgari infensus fuit, tum ob perniciem ejus, tum propter extremos cruciatus, doloresque asperrimos, quos inuncti sustinere necessariò damnantur; tum denique, quia proposita sua curatio per Guaiacum & Amuletum, aut per Alexipharmaca sua Hydrargyro conjuncta, tutior fuit, & longè salubrior inunctione vulgari, sputantium vires exhaustienti. Quo circa alias Luem extirpandi methodos,

tutiores, ac magis salutare, nec non jucundiores, licet nonnunquam paulò cunctabundas, fusè proponebat.

2. Chirurghi uno ore Salivationi præ aliis curandi modis favere videntur, aut quia præmiis donantur majoribus, istò modò valetudini prospicientes, summâ cum assiduitate, infectumque sub imperio quodam despotico, vitæ ac mortis clanculum in conclavi, remotis aliis plerumque arbitris præterquam nutrice, tamdiu tenentes; aut quia durante tyrocinio nullam aliam æquè certam Lui mendedi artem illi hætenùs didicerunt; aut quia aliam discere vix unquam volunt.

3. Quoniam Chirurghi technis suis hanc Medicinæ partem, quantum in illis fuit, tanquam sibi jure propriam ubique arripuerunt; & Medici, sive ob molestias tam foedæ curationis, sive aliis negotiis impediti, illam provinciam quasi derelictam nimis neglexerunt, ac vilipendêrunt.

4. Quia curationes temporaneæ & Palliativæ in hoc morbo, ut in aliis non nullis, magis placent, ægrisque gratificantur, quàm Eradicativæ, quæ magis operosæ sunt, & exercitatione non parvâ egent. Quam ob rationem induciæ multorum dolorum gravissimorum Narcoticis derepentè comparatæ, & ægrotantibus sæpè magis placent, & medicis nonnunquam præferuntur, quàm quæcunque alia, permanentibus interim aliquamdiu doloribus, salutaris medicatio. His adde, Salivationem symptomata omnia Venerea ita ut plurimum tollere, ut nulla recidivæ suspicio impræsentiarum restet, aut præmii procraftinandi ratio convalescentibus ampliùs appareat.

Quod ad Impositores illos imperitos, turpissimos lucriones, ac nebulones vulgares attinet, qui sine Mercurio, sine regimine, sine quâcunque molestiâ, & nescio quibus *Arcanis* insulsis, curationem brevissimam, nec non infallibilem, omnibus Lue infectis cum insigni impudentiâ publicè pollicentur, argumento sunt Bacillino quàm Medico digniores, & fascibus Magistratuum aut collistrigio, prout veteratores perfidi, sunt potiùs castigandi, quàm disceptationibus, aut ullis rationum momenti accipiendi.

Denique tertium Lui Venereæ mendedi genus, quod posthabitâ Salivatione solenni per inunctionem institutâ, & spretis deceptorum insciorum fallaciis, cathartorum aut emeticorum Mercurialium vi & efficacia, cum Diætâ è Lignis & Radicibus exsiccantibus, ac regimine debito, conjunctorum nititur, fusioem orationis copiam planè requirit. Sed nè tot impostores & agyrtæ dolis & insidiis suis hinc ansam aliquam avidè arripiant, vela dicendorum contraham, & pauca haud prorsus inutilia jam dictis adjiciam.

Et I. Notandum est, Ligna exsiccantia, Gummi, corticem, & lignum Guajaci, lignum Sassafras, atque Radices Salsaparillæ & Chinæ, tantum ferè emolumenti naturæ humanæ conferre, & debilitatæ suppetias salutare præbere, quantum damni & nocimenti Hydrargyrum corpori infligit. Sunt hæc salubria quædam hujus morbi venenati, licet imperfecta, pariter atque Mercurii ipsius Alexipharmaca, quandoquidem & citra Mercurii auxilium opera &

ra & oleum nostrum sine fructu perdi solent. Et quanquam illa ex se nunquam apud nos scopum attingunt, Hydrargyro prætermisso, venenumque Venereum nequeunt penitus delere & extinguere, tamen robur nativum erigunt & foveant, palloremque huic morbo congenitum, in vividum ac sanum colorem certo certius immutant.

2. Notandum est Cathartica deleteria dicta huic morbo expugnando, qui vires corporis validissimas ipse infringit, & robur summum facile comminuit, quandoque minus convenire, quàm mitiora & blandiora medicamenta. Et quoties fortior & validior requiritur catharsis, illa longè tutius obtinenda est, in debilibus scilicet naturis, sennâ, rhabarbaro, agarico, jalappâ, epithymo, poly-podio, mannâ, hermodactylis, aut eorum quibusdam, additis etiam ceu stimulis, sale mirabili, cathartico amaro, polychresto, prunellæ, aut crySTALLIS tartari; his, inquam, sæpè securius & commodius alvus movetur; neque plura eorum identidem repetita ita corpori imbellium nocent, quemadmodum scammonium, colocynthis, & helleborus, quæ aut ventriculum conturbant, aut intestina corradunt, gravibusque torsionibus excruciant, aut visceribus omnibus, partibusque principibus, malignâ suâ qualitate sunt infensa.

3. Quanquam Mercurialia, & Hydrargyrosis, in omnibus temperamentis Lue inquinatis indiscriminatum vulgò usurpentur, tamen notandum est, corpora crassa, obesa, phlegmatica, & frigida, ab illis maxime omnium lædi, & constat inju-

rias insignes quas Hydrargyrosis talibus facit, vix unquam postea deleri, adeò ut non minus discriminis à medicamento quàm ab ipso morbo illis contigerit. Atqui Sanguinea, Biliosa, & præfervido calore redundantia corpora, incommodo minore Hydrargyri usum paulò copiosorem sustinent, quàm aut prius nuncupata, aut Melancholica Temperamenta. Etenim calida & sicca viscerum intemperies, contrariis quibus pollet facultatibus Hydrargyrum, corrigitur, emendatur, & nonnunquam insigniter juvatur, atque bilis ferocientis acrimonia plurimum demulcetur.

4. Quotiescunque Lue jam pridem infecti, qui Ptyalismum prius subierunt, aut qui aliis modis ad tempus tantummodò sunt restituti, morbo recidivo è latibulis erumpente, aut novam formam sortito, turbas novas commovente; quoties, inquam, illi in atrophiam, neque à pulmonibus tabidis, neque à Lumbricis pendente, inciderint, quanquam Diarrhoeâ admodum violentâ exhaustantur, à Narcoticis quibuscunque abhorrendum est Medico, & restringentibus interdendum. Nam Malignitate veneni Venerei intus delitescens sic imminutâ, & per sentinam corporis depositâ, propria Antivenerea optato eventu non diu frustrabuntur, & corpusculum strigosum deleteriâ Lue penè confectum, præter expectationem rursum pinguescet.

5. Cum virus Venereum sit benè retusum ac fractum, omnisque symptomatum ferocia refrænata; at fomes venenatus haud penitus extinctus

sub cineribus deliteſcat, novos poſtea tumultus ſuſcitaturus: quemadmodum & in aliis nonnunquam caſibus, ubi ſymptomata anomala, doloresque vagi infirmos detinent, Medicamenta nervina, arthritica, amara, & antiſcorbutica *ſalubria*, aliquamdiu uſurpata, catharticis blandis identidem intercalatis, reliquias Veneni iſtius infracti tutò proſtigabunt, integramque tandem ſanitatem præ aliis reſtituere valebunt. Si quidem talia corruptelæ humorum deſeteriæ contraria, ſanitati tuendæ amiſſæque recuperandæ, vitæ producendæ, ſtaminibusque vitalibus tenuioribus confirmandis apprimè conducunt.

6. Infantes à nutricibus lactantibus infecti, quanquam maculis, puſtulis, ulceribusque ſcatent, quanquam & nocturnis illis doloribus erunt excruciat, facillimè omnium reſtituuntur. Farina ſarſaparillæ ferè inſipida, ſaltem nullo guſtu ingrato, aut ſaſtidiſo prædita, panatellis aut pulculis ſuis, ut par eſt, *commiſta*, addito etiam, ventriculi gratiâ, Santali citrini polline, nullâ pariter nauſeâ donati, catharticisque debitis intercalatis, tenerrimæ ætati, ut lætè nonnunquam obſervavi, ſalutem perfectam reddidit. Quòd verò infantuli à contaminatâ nutrice infecti, tanquam à Peſte quâdam, ſint ante inceptam curationem quamprimùm amovendi, non opus eſt ut admoneamus.

Denique 7. infectis, cùm curatio modis mitioribus magisque benignis ac ſalutaribus quàm Salivatione illâ acerbâ & excrucianti inſtituatur, non eſt iis perſiſtendum ad certum


quendam ac determinatum dierum numerum, ſed nunc brevius, nunc diutiùs, pro ratione veneni, naturæque reſuſtantis, remediis immorandum, quo uſque ſub regimine debito venenum penitùs ſubigatur, & ſymptomata omnia prorsùs evaneſcant.

Antequam finiam, nequeo tacitè prætermittere errorem popularem infulſum, at valdè pernicioſum, qui longè latèque inauſpicatò increbuit. Nimirum didicit, aut fortè audivit ignarum vulgus, ſi quiſpiam infectus cum ſanâ muliere mutuis amplexibus ſe commiſcuerit, à labe omni Venereâ ſe confeſſim fore tutos & immunes. Quot innocuæ virgines inter alias ex hoc ſtupido errore perierunt! Sed cum ſanguinem pervafeſcit virus peſtilens, & viſcera afflatu illo impuro imbuantur, credat etiam plebecula inſipiens pari ratione, ſe clavam *Herculi*, quod aiunt, & fulmen *Jovi*, extorquere poſſe, & ſe montes excelfos, virtute cuiuſdam incantamenti, poſſe radicitus avellere, & alio verſum transferre.

Ut verò finem faciam, nonnullis videri poſſum nimis acriter perſtrinxiffe morbum Venere clementi prognatum, Deâ ſcilicet illâ amabili, cui tam Principes ſummi, quàm vulgus inſimum, vota ſua nimis frequenter faciunt, & cuius illecebræ pectora ferè omnium æſtu quodam impotenti facilè percellunt. Acrius, inquam, huius morbi ſævitiam perſtrinxiffe videar, quàm plurimi medicatſtri, qui eundem in poſtremis habere ſolent, ac pro nihilo, ut aiunt, ducunt; ut ſcilicet artis cuiuſdam exquiſitæ, quam alicubi didicerunt, oſtentationem glorioſè faciant;

cient; atqui ut reverâ crumenas incautorum aliquando emungant, ut familiares suos opprimant, omniaque ad quæstum commodumque proprium iniquè referant. At verò longè præstat medico probo, liberalibusque disciplinis instituto, verum dicere, quàm quæstu quovis duci, communique utilitati quàm suæ consulere. Medici rerum statûs, modò res sint benè partæ, nemini poeniteat. Nam pauca nonnunquam desiderium explent, permulta animum rarissimè satiant. Paucitas rerum commodè benèque vivendo necessariarum facile suppletur, virisque bonis rarius deest. Sed in Superfluis accumulandis nullus vulgò finis gravissimarum sollicitudinum, nullum molestiarum maximarum tædium rapinarum terminus; quasi dira illa execratio, aut fascinatio, avaros injustosque semper comitaretur, ut in opulentiâ inopes, in abun-

dantiâ egeni vitam prorsus inquietam traducere damnarentur. Præcipiti cursu breviuscula labitur vita. Nec magna pompa impedimentorum necessaria est, ut amoena sit profectio, neque requiritur tanta viatici copia, ut breve iter conficiatur. Præclare illis actum puto, in quibus in benè agendo deponitur vita. Nec sapientibus *lugendam esse corporis mortem, quam animæ immortalitas consequitur*. Etenim *tum demùm nos verè victuros* constat, *cùm è vitâ hâc excefferimus*. Quid eò olim eximie dixerit Philosophus (pectore specumido, consolationis pleno, animoque futuris gaudiis admodum aspirante) in senectam vergens, & *Senectutem ornatissimè laudans*? Si in hoc, inquit, erro, quòd animas hominum immortales esse credam, lubenter erro: nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo.





DISSERTATIO EPISTOLARIS

A D

GUILIELMUM COLE, M. D.

D E

Observationibus nuperis circa curationem VARIOLARUM
Confluentium;

Nec - non

DE AFFECTIONE HYSTERICA.

Humanissimo Viro,

THOMÆ SYDENHAM, M. D.



Iraberis fortasse, Clarissime Vir, quisnam importunus interpellator graviora tua interturbet negotia: sed veniam, confido, dabis, postquam intellexeris, eâ potissimum de causâ hanc tibi molestiam creari, ut grati animi sensa exprimat venerabundus Tui cultor. Quippe tantos ex elaboratissimis tuis circa Morbos acutos commentariis, agnosco me accepisse fructus, ut ad grates authori persolvendas me prorsus obligatum teneam. Tam accuratè singulas annorum, aërisque quas tractandas suscepisti, Constitutiones, cæptò antehàc inauditò, observasti; tam genuinas, facileque obvias, pro singulis, qui in illis occurrebant, affectibus sanandis, indicationes excogitasti; tantoque ingenii nitore totum opus exornasti, ut meritò tantam sagacitatem, tam indefesso labori junctam, suspiciamus; unde & ægrotos, & medicos tibi æternùm devincis.

Quanquam verò cuncta, quæ pertractas, accuratè adeò absolvisti, ut pronum sit de singulis in laudes tuas erumpere; præ cæteris tamen
haud

haud mihi temperare possum, quin impensè tibi gratuler methodum tuam circa Variolarum curationem; cujus ope, quin feralis ille hactenus affectus terrificam suam exuat larvam, interque facillimè curabiles (nisi malignitas, vel quiddam valde insolitum accesserit) se sistat, nullus ambigerem, si per nutriculas (turbam rarò non inimicissimam hominum saluti) liceret, quæ calido suo regimine, & medicamentis omnia usque adeò pessum dant, totque ubivis in sepulchrum ante tempus præcipitant, ut meritò Tu, Doctissime Vir, humani generis Vindex audire merearis, qui ægrotis, miserè, cumque extremo vitæ discrimine palantibus, te ducem fidissimum præbes, ut in salutis viam, si ductum tuum sequi volent, redeant. Ut de me loquar, quanquam meis fidere ratiociniis aliquatenus reformidarim, diu tamen credidi, Variolarum eruptionem, sicut non ipsum esse morbum, sed febris crisim, sic par reliquis crisibus desiderare regimen, in quibus, omnium Medicorum effatis sancitur, totum negotium naturæ committendum, si cuncta rectè procedant; id quod plerumque in isto affectu cernitur, nisi plus justo prius exagitatus fuerit sanguis. Postquam verò, perlecto aureo tuo libro, senseram tandem panicos esse, qui me aliosque tam diu detinuerunt, timores, aususque fueram juxta tui præcepta (reclamantibus licet quandoque non solum vulgo, sed etiam Medicis) ægros regere, tantum inde emolumenti iis, ubi in ubtemperantes incidi, obvenisse comperi, ut, quicquid alii senserint, me felicissimum reputem, cujus in manus tantus devenit thesaurus. Porro & ubi ad Variolis confluentibus laborantes (quod tamen haud admodum sæpè contigit) accitus fuerim, non dubitavi, quanquam animam jam agere viderentur, ad paregorica, tuâ fretus autoritate, confugere, idque successu haud pœnitendo, imò verò stupendo. Tam multum equidem hâc in parte præstitisse mihi videris, ut nil superesse, quod vel aliorum, vel etiam Tui industriam exerceat, facile crederem, nisi nuperrimè à doctissimo Viro, amicoque meo integerrimo, D. Kendrickio, (qui humanitatem tuam plurimùm celebrat) audivissem, te innuisse novas quasdam (quas & ad praxin ritè exercendam perutiles fore non possum non augurari, utpote à te factas) circa idem subjectum tibi occurrisse observationes, quas nisi publico impertias, & in tui famam, & in humanum genus injurius eris. Proinde (si quid apud te ignoti valeant preces) haud graveris, obsecro,

cro, Celeberrime Vir, eas in lucem emittere.

Sed ne hîc subsistam: Nempe ab eodem accepi, rariora quædam tibi observata fuisse circa *Affectus*, *Hystericos dictos*; qui sanè sicut doctissimorum Medicorum, ab omni memoriâ, exercuerunt, imò lassarunt ingenia, sic (proh nimis sæpe) & medicandi traditas methodos eludunt; documentaque dant, quàm parùm tutum sit, in *Philosophicis*, nostræ rationi nimium fidere, nisi iis in rebus, quarum certitudinem à sensuum testimonio petere valeamus. Plurimum, Dignissime Vir, ulterius & à præsentî sæculo, à posteris, haud dubiè mereberis, si & quæ circa hanc materiam meditatus es, propalare dignatus fueris. Hoc saltem à te mihi impetrare liceat, ut æqui bonique consulas, quòd, non mei solùm, sed publici etiam causâ, ignotus tibi licèt, petere non erubuerim; utque me inter innumeros eos habeas, qui tibi se quàm maximè devotos profitentur,

Devotissimum

Vigornix,
17. Novemb. 1681.

GUILLIELMUM COLE.



Spectatissimo, Doctissimoque Viro

GUILLIELMO COLE, M. D.

SI usque adeò Philautiæ indulgerem, Ornatissime Vir, ut eas quæ ad me nihil attinent laudes mihi arriperem, ægrè admodum me ab aliquali animi elatione continere valeam, laudatus tantopere à laudato viro, qui eruditissimis suis lucubrationibus orbi literario, mihi verò nec de facie, quod sciam, innotescit. At verò quòd me tanto, licet immerentem, honore dignatus fueris, id demum humanitati tuæ acceptum refero; cùm maximos quosque & præstantissimos viros ita natura comparaverit, ut non tantùm leviter errantibus, ut fit, æquiores sint, sed etiam in mediocrium studiis deprædicandis, datâ vel quâlibet ansâ, ingenuo suo candori morem lubentes gerant. Cujus quòd & in ipso me, & meis istis conatibus, ut ut tenuibus, publico tamen commodo destinatis, præclarum edideris specimen, gratus agnosco.

Ea quod spectat, quæ à me præstolaris, five jam editis de *Variolis* observationibus addenda, five etiam de *Passione Hysterica* de novo tradenda, ita habe. Horum primum idcirco aggressus sum, ut quæ olim deficere viderentur, ex iis quæ experientia jam annosior mihi suggererat, possam facere. Alterum verò ideo in me recipiendum duxi, tum quoniam *Affectus Hystericos* omnium, post Febres, morborum frequentissimos occurrere, tum quia emolumenti aliquid è levidensibus meis observationibus capi posse existimarem. Neque tamen diffiteor aliam quandam, præter hanc publicum juvandi spem, mihi causam subfuisse, ut otium scilicet benè locarem, & tædium brumalium noctium honestius fallerem; cum jam ingravescente ætate non amplius Congerrones foras quæram. At quicquid id fuerit, quod me primum instigaverit, me non ita atque speraveram inceptis ac votis meis parem esse sentio, cum continua illa cogitationum series, quâ mens obstinatius desigenda est, mihi jam à multis annis *ποδαγρώντι* nunquam non officiat, maximè verò, jam appetente Senectâ. Cum itaque tam opportunè appulerint humanissimæ tuæ literæ, brevi Respon-
sionis limite expediam eorum summam, quæ prius fufius deducenda meditabar.

Sumpto itaque à *Variolis* exordio, illud prælibandum censeo, quod scilicet ea Febrium Intermittentium species, quæ primum Anno 1677. uti alibi diximus, caput extulit atque etiamnum regnat, Anno videlicet, quo hæc conscribo, 1681. hæ Febres, inquam, pro more Epidemicorum omnium, iis maximè tempestatibus grassabantur, quæ cum earum indole magis faciebant, per annos istos omnes, quibus vigeabant, alienâ autem tempestate appetente, iis protinus Epidemicis cedebant, quibus illa magis favebat. Exempli gratiâ, ingruente hyeme, nunquam non *Tussi*, & *Febribus Peripneumonicis* ab illa pendentibus locum dabant, ut & *Variolis*. Redeunte autem Vere dicta Febris postliminiò reversa est. Ita Anno 1680. postquam Febris hæc per Autumnum omnia fuerat depopulata, *Variolæ* brumali tempore eam excipiebant, ubique locorum grassantes. Anno autem vertente, 1681. sc. Febres intermittentes denuò recrudescebant, haud usquequaque Epidemicæ, fractis jam & succisis earum viribus, unde etiam *Variolæ*, hîc illic sparsæ, unâ cum illis subpullulabant. Æstate verò jam ingressâ *Variolæ* increbrescere quotidie, tandemque *ἐπιδημιώταται* factæ stragem haud vulgarem edebant.

Hoc anno, sc. 1681. luce meridianâ, quod aiunt, clarius mihi constabat, quod jam olim ratio suadere videbatur, ægrum scil. lectulo noctes atque dies continuos non prius addicendum esse, quàm *Variolarum* examen omne in conspectum se dederit: Etenim tum Veris, tum etiam Æstatis tempe-
rie ficiore diutius, quàm post eorum, qui nunc sunt homines, memoriam invalescente, (adeò ut omnis fermè ubique locorum herba exaruerit) sanguinem ferè omnis illa humiditas, quam aër aliàs solebat suppeditare, destituebat; ex quo *Variolas* jam grassantes major quàm pro morbi indole

inflammatio accendebat, cæteraque exinde nata symptomata præter modum sæviebant. Atque hanc ob causam, si quid ego judico, *Maculæ Purpureæ* plenam Exanthematum eruptionem haud raro præveniebant, & quæ eas extrudebat vehementior inflammatio, debitam sanguinis crasin interturbans atque disperdens, etiam ante justam materiæ morbificæ expulsionem, præmaturam mortem accersebat. Id verò maximè factorum sævitiam promovebat, quòd tam exanthemata ob supra dictam causam ita facillimè confluerent, vel ipsa aeris intemperie id mali sponte suâ procurante, quod alias ferè solent Scioli & Medicastrî, regimine & Cardiacis calidioribus in ipso morbi limine inauspicatò imperatis atque admotis. Etenim (quod diligenter animadvertendum est) post omnium vel exquisitissimas observationes, rei cardo in hoc vertitur, ut in Variolosis salutis spes omnis in *Exanthematum paucitate* reponatur; discrimen in eorundem *multitudine*: & prout plura sunt hæc, vel pauciora, aut moritur, aut vivit æger. Interea fatendum est, & *sanguinis mictum*, & *maculas purpureas*, quæ ita certè mortem prænunciant, quandoque accidere, vix ullo adhuc comparente Variolarum indicio, vel etiam paucissimis pustulis erumpentibus; hæc verò ut Variolas denso agmine confluentes ut plurimum comitantur, ita aliquando tam præproperè invadunt, ut ægrum ante plenam eruptionem è medio tollant, sicut jam præmonuimus.

In proclivi est autem, ut mihi videtur, rationem reddere, quare æger plus minusve periclitetur pro majore minoreve exanthematum numero; cum enim quælibet Pustula *Phlegmonè* primò sit, licet sub exigua mole, mox in *Apostema* evadat, fieri non potest, quin *Febris secundaria* à *Pure* jam in fieri pendens, magis minusve exacerbetur, pro puris excoquendi quantitate jam in morbi statu; quod in mitissimo confluentium genere, die à primò morbi insultu *undecimo*, in mediocri *decimo quarto*, in crudissima verò & ægrius domabili specie, *decimo septimo* fieri consuevit. Quemadmodum enim (quod est notandum) *Confluentium Variolarum* genus. *Distinctum* quod dicitur, ratione periculi imminentis, in tantum superat, quantum ab ipsa *Peste* superatur, ita etiam suprà dictæ tres Confluentium species aliæ aliis præsentius discrimen adferunt. Quòd insuper tam in ætate quam sexu locum habet; cum nemini non sit notissimum, Adolescentem in ipso juventutis flore multò magis periclitari ab hoc morbo, quam vel foeminam vel impubem. Sed hæc obiter.

Neque sanè mirabitur tam ingens discrimen à majori pustularum numero pendere, qui secum reputaverit, quòd si cujuslibet sive humeros, sive brachia, sive aliam quamlibet partem *Phlegmonè* (vulgò à Boyle) fortè invaserit, idem tempore maturationis, quâ jam Pus fit, febricitavit; cum scilicet, sanguis à purulentis particulis, per venas ex lege circulationis in ejus massam resorptis, incitatus, Febriculæ fomitem subministret. Quanto magis Medicus ubi primis morbi diebus ægrum invisens, faciem ad instar pulveris è limatura acicularum undique respersam contemplantur, mortem

prædicet uno aliquo è diebus jam memoratis involaturum; idque præ indomita vi Febris succedaneæ, quam, pro ratione quantitatis puris & innumeris istis apostematis in sanguinem rejecti, desævire necesse est. Quæ quidem hominis funesta ruina aliquot diebus antequam ingruat, facile prævideri potest, utut belle se habere æger, & sibi videatur, & astantibus etiam in hujus morbi Historiâ minùs exercitatis.

Quocirca si non aliunde periclitetur æger (purpureis maculis & sanguinis mictu jam sepositis) quàm ex pustularum frequentia, seriò mihi perpendendum est, quibus potissimùm de causis ita densæ protruduntur, & si tutò fieri potest, iisdem omni ope coercendis incumbendum. Quod quidem rei caput est, & in quo præcipuè ægro suppetias ferre queam; cum periculosa plenum sit alex quicquid moliamur, jam constituto non in hac specie morbo; nec si tandem mortem æger evaserit, id tam meæ debetur solertia, quàm vel insigni narium Hæmorrhagiæ, vel fortuitæ alicui, quæ morbo accidebat, mutationi. Profusissima autem illa crebrarum pustularum eruptio, si quid ego conjicere possum, à præcipiti nimis materiæ Variolosæ assimilatione ortum ducit; quæ quidem præcipitatio maxime videtur contingere, vel quòd ægri natura medicamento ad instar *Cardiaci*, calore & spiritu plus satis turgat, vel quòd ipse æger, sive præmaturè se lectulo includendò, sive adhibitis *Cardiacis* calidioribus, aut liquore quovis spirituofo, fermentum plus debito exaltaverit; quibus omnibus modis disponitur sanguis ad excipiendas & intimiùs admittendas morbi impressiones, ipsaque natura, seu furiis agitata, præ exuberanti materiæ Variolosæ copia & plenitudine, omnem ferè succorum & carnum molem in exanthemata evomere satagit.

Nullâ verò magis *προφάσει* promovetur immodica materiæ Variolosæ assimilatio, quàm si æger intempestivè se lecto addicat, viz. ante diem sextum à prima invasione; vel quartum inclusivè ab eruptione, quo tempore jam omnis pustularum cohors in conspectu est, nec sunt plures expectandæ.

Et licet moderatus lecti calor etiam post elapsos dies istos Phrenesi, vigiliis, aliisque symptomatis accersendis nonnihil conferat, ea tamen ejusmodi sunt, quæ à medicamentis cum judiciò propinatis vinci possint; cum ingens illud vitæ periculum, quod die undecimo instat, ab innumeris istis pustulis prognatum, omnem medicam opem respuat & aspernetur.

Hic itaque seriò monendum est, ægrum nullo pacto se lectulo interdium debere committere, si sibi cavere velit à nimio pustularum confluxu, nisi sexto die jam advesperascente, unde se plurimum usque refocillari sentiet: à quo tempore vix se continebit à jugi in lecto decubitu, si insignior fuerit pustularum *συρρομή*, tum ob acriorem jam pustularum molestiam, tum quod ab ipso sessionis habitu in animi deliquium sit propensior: quòd cum sæpenumero animadvertendum, in mentem mihi venit, ex communi hujus morbi lege naturam ipsam quasi digito mihi monstrasse, quo

primum morbi tempore æger lectulo continuò adjudicandus est.

Sed ut non solum dicti Problematis veritatem adstruam, quod tanti est momenti ad minuendum à Variolis impendens periculum, verum etiam ut in iisdem à carceribus, ut ita dicam, ad metam pertractandis, rationem nostram quasi manu ducam, non abs re fuerit, opinor, quoddam quasi Schema totius morbi animo depingere, & diligenter expendere, quæ sit ejus natura, ac qualis methodus; quo demum ex certo sensu hominum, fidissimis observationibus utentium, non ex opinione incerto Phantasiæ fundo innixâ, rem clarè dijudicare valeamus.

Imprimis itaque ejus essentia (quantum nos rerum essentias conjecturâ assequi valeamus) in peculiari quadam sanguinis *inflammatione* comprehendi videtur, in qua, Natura primis aliquot diebus id negotii habet, ut particulas inflammatas præparet subigatque, quò facilius in corporis ambitum eliminentur; quo tempore, mota seditione, & perturbato jam sanguinis statu, Febris ut accedat omninò necesse est: quinimo incensæ ac jam furentes particulæ, per omnem circulantis sanguinis ditionem tumultuantes, ventriculi ægritudines, dolores capitis lancinantes, & quæcunque alia Symptomata præcedunt expulsionem, necessariò excitant, prout has vel illas partes motu agitæ appellant. At cum jam victrix Natura rebelles particulas in corporis habitum propulsaverit, ut prius in sanguine, ita deinceps in carnea mole id quod superest Tragoediæ peragitur. Et sicuti Natura non alia quidem methodo quam accensa Febre materiam in sanguine peccantem novit amoliri, ita etiam non nisi factò Apostemate massam carneam à re qualibet extranea liberat: ut si forte sentis aut quippiam ejusmodi carni inhæserit, partes circumjacentes mox Apostemate obsidentur, nisi id quicquid est molesti protinus extrahatur. Hæ itaque particulæ in carnibus demum stabulantes, primùm *Phlegmonas* haud ita spectabiles excitant, in quibus latitant; quæ quidem augescentes in horas, atque efferationes & inflammatiores redditæ, tandem in *pus* & vomicas desinunt; quo quidem tempore fieri non potest, quin aliquid ex illa Apostematum colluvie, in massam sanguinis, per venas circulari motu reducti, resorbatur; quòd si sanies ista nimia copia sanguini ingeratur, non tantum febrem accersit, cui ægri vires planè sunt impares, sed etiam omnem ejus massam putredine, ceu veneno quodam, inquinat. Sed neque hoc mali caput est: quin etiam ab intensiore Febris calore, postremis hisce diebus à nimia puris vi excitato, *Ptyalismus*; qui variolis confluentibus comes indivisus esse debet, præproperè sistitur, unde ægro spiritus continuò intercluditur. Quòd si dicta materia purulenta parcius sanguini infundatur, insurgens Naturæ robur secundaria hujus Febris impetum nullo negotio reprimit, & abscessulis indies magis, magisque exarescentibus, æger brevi convalescit.

Si vera sit hæc & justa hujus morbi Historia, cæcus sit oportet qui non videat, omnem ejusdem in utramque partem eventum, à Curationis fundamento rectè aut secus primis in diebus jacto, pendere. Nam si calidorum, & præcipuè jugi lectuli usu, calentes hæ ac spirituosæ particulæ acuantur, necesse

necesse est ut affimilandi facultas (quâ jamdiu plus satis pollent) adhuc intendatur & augeatur.

Adde quod sanguis & reliqui humores his modis excalefacti, fortiori particularum impressioni promptius cedunt, unde plures quam res postulabat, emergunt pustulæ, & æger nullâ necessitate cogente in vitæ discrimen conjicitur. Quando oppositum huic regimen, & modicè frigidiusculum, atque aëris usus liberior, non tantum fervidarum ac ferocientium particularum vim retundit, sed etiam condensat obfirmatque humores, quò se validius spiritibus morbi-
ficis opponant, atque eorundem sustineant impetum, unde non major materia Variolosæ copia conflatur, quam pro genuina morbi indole.

Sed nec unico hoc incommodo, quod scilicet nimia materiae morbigicae quantitas affimiletur, & superexaltetur fermentum morbi, multatur is, qui justo citius ad lectum damnatur: at ex eodem fonte sæpissimè profluunt tum mictus sanguineus, tum etiam maculæ purpureæ, æstivo maxime tempore, atque in juventa adhuc florētibz. Utraque hæc symptomata, nisi fallor ego, ortum ducunt ab æstu & furore, in quem agitur sanguis à ferventibus & spirituosis particulis, à quibus exagitatus atque insigniter attenuatus, vasorum claustra diffringit, nunc in mictu sanguineo, quoties in renes irruit, nunc purpureis in maculis, quoties per arteriarum extremitates in musculos & cutem terminatas, percolatur, unde totidem quasi *sphaceli* oboriuntur iis in partibus, in quibus extravasatus sanguis coagulatur. Atque ut præcaveri facile poterant duo hæc symptomata primis morbi diebus, quibus plerumque emicant, regimine & diætâ in frigidum vergentibus, ita ubi jam actu comparuerint, pariter operam ludet, qui iisdem mederi conabitur, ægrum lecto includendo, & Cardiacâ exhibendo, ac luderet anicula, quæ nimiam aquæ in olla ebullitionem, igni fomitem subministrando, sufflaminare satagat.

Sed ut verum fateamur, utut offendantur Dogmatici, & hujus rei ignari, ac proinde iniqui iudices, non solum malè tutum fuerit, ægrum primis diebus lectulo jugiter affligi, verum enim verò est ubi æger libero aëri omnino est exponendus, si æstas scilicet fuerit, atque æger ætatis florem nondum prætergreffus, aut liquoribus spirituosis assuetus, præsertim si morbus nimiae computationi originem debeat. His inquam in casibus, præcipitem nimis pustularum eruptionem haud equidem arbitror satis coerceri posse, tum à lectulo abstinendo, tum etiam à Cardiacis; at sanguis etiam sine horum subsidio, spirituum præfervidorum & morbo congenerum largo penu auctus, magno cum impetu, at explodatur quasi, necesse habet; atque insuper tanta humorum congeries in exanthemata facesset, ut præ nimia puris copia in sanguinem regurgitantis sub fine morbi, æger quasi obrutus, fato omnino succumbat.

Quamvis haud rarò fermentum immodicè exaltatum tantam colluviei Variolosæ vim conficiat, ut æger incipiente adhuc morbo à mediò tollatur; cum scilicet materia morbum committens, tum præ nimia sui copia, tum præ motu inordinato ac confuso in sanguinis massa excitato, se nequit extricare.

& foras educere, cuius loco mictus sanguineus & purpureæ maculæ tragœdiæ catastrophe fiunt. Quod etiam & in Morbillis, & in Febre, Scarlatinâ dictâ, sæpiusculè occurrit, ubi scilicet intempestiva opera in iisdem ad eruptionem vehementius sollicitandis infelicitè collocatur.

Neque sanguinis missio, quantum mihi videtur, licet maturè celebrata, ita efficaciter præproperam materiæ Variolosæ assimilationem cohibere valet, ac sanguinis contemperatio ab aëre intromissô, maximè si statim ab emissô sanguine æger lectulo committatur, & cardiacis calidioribus mañtetur, his etenim modis, sanguis propensior redditur excipiendis adventitii caloris impressionibus, quàm ante venæ sectionem fuerat. Et sanctè assero, insignissimum ferè omnium, quos mihi unquam videre contigit, è Confluentium genere morbum, & qui ægram undecimo die jugulaverit, juvenulæ supervenisse, ubi primùm à Rheumatismô usitatâ illâ methodô copiosæ & iteratæ venæsectionis fuerat liberata. Atque hinc mihi primum innotuit, Phlebotomiam non perinde, atque ego prius arbitrabar, Variolis intra iustos limites coercendis conducere: Tametsi sæpenumero observaverim, reiteratam catharsin sanguine nondum inquinato, subsequentes Variolas laudabiles & distinctas ut plurimùm reddidisse.

Neque verò me fallit permulta esse, quæ contra sententiam hanc nostram, quâ ægrum interdiu lecto eximimus, possint objici; eaque haud exigui tum apud hominum vulgus momenti, tum etiam apud minùs hâc in palæstrâ exercitatos; quos Iudices appellare solet vulgus medicorum, ut eorum auctoritate malè fundata theoremata statuminent, utpote quæ magis, & quasi ad amussim horum captui quadrent, quàm quæ ab ingeniis penetrantioribus maturè sunt excogitata; unde sequitur, ut cum pars hominum longè maxima exteriori tantùm rerum cortici contemplando apta nata sit, paucissimi autem veritati in profundo latitanti inde extrahendæ pares sint, Sciolli isti τῶν πολλῶν suffragio adjuti, primas faciliè ferant, hi autem perspicaciores calumniantium maledicentiâ excipiantur, Πολλοὶ γὰρ καρδιόφθοροι, παύροι δὲ τε Βάνχοι. Qui tamen æquo id animo ferunt, veritate freti, & saniorum, paucorum licet, consensu. Primò itaque objicietur, quòd lecto abesse primis morbi diebus pustularum eruptioni officiet, & ex consequenti ægritudinem, aliaque symptomata ab impedita eruptione pendentia, in longum ducet. Hoc verum esse minimè nego, cùm experientia ferè quotidiana ei suffragetur. Quærendum est autem, ubi gravius periculum, vel in sufflaminanda paulisper materiâ Variolosa, atque ea de causa ægritudinem à non eruptione pendentem aliquantisper protrahendo; vel ex altera parte nimis urgendo morbi fermentum, & tam insignem materiæ Variolosæ quantitatem assimilando, ut æger ad orci fauces sistatur à Febre secunda, die morbi undecimo. Si rem rectè expendamus, liquebit, opinor, paucissimos ideò fato defunctos, quòd exanthemata feritùs ocys non efflorescerent, nisi fortè ex iis aliquot, quorum sanguis præ nimia excalescentia, motu inordinato, quasi cestro quodam, percitus, materiæ morbificæ leniter

excer-

excernendæ otium non concedebat ; quod à meis partibus militat , non pugnat mecum. Neque enim extimescendum est , quin , si nihil prorsus agamus , materia Variolosa (utut primis hisce diebus hinc illinc transvolans , quamcunque occupaverit partem , fatiget , unde vehemensiora illa symptomata , vomitiones enormes , dolores variis in partibus , &c. enascuntur) tandem tamen à victrice natura debellabitur , & in corporis habitum extrudetur , præsertim cum ægri alvus hucusque ut plurimum adstricta , pustularum eruptionem , feram licet , certam tamen fore spondeat. Ast è contrario quot quantique letho patent aditus , quoties pustulæ intempestivè & nimio opere exiguntur ? Longum foret omnes percurrere : præcipuos jam indigitavimus. Sunt autem hi , 1. Nimirum auctus exanthematum numerus , cui ex æquo respondet Febris ultimis diebus succedentis majus minusve discrimen. 2. Minus sanguineus & maculæ purpureæ , quorum utrumque ab extravasato sanguine oritur , qui plus justo attenuatus , & quasi præ æstu ferociens , disruptis vasorum repagulis , qua data porta ruit. 3. Ut supra dictum est , debitæ eruptionis suppressio totalis , à nimis sedulo in præcipitanda eruptione conamine , quo non magis scopus medico propositus attingitur , quam si quis id agens , ut densa hominum turba spatiosis ædibus inclusa , seriatim & servato ordine inde exiret , machinâ chartaceâ pyrio pulvere refertâ ac in medio displosâ usque adeò omnes percelleret , ut singulis ad portam omni ope contendentibus , proindeque constipato agmine in ejus faucibus hærente , exitus universis , quasi cuneo facto , præcluderetur.

Jam si quis roget , quorsum debita materiæ Variolosæ separatio non perinde primis hisce diebus promoveri possit , si æger moderato lectuli calore foveatur , ac si ab eodem arceatur ; sciscitabor ego ex adverso , an non testetur experientia quemlibet lecto inclusum tempore brumali , stragulis modicè contextum , foco non accenso , magis percalescere , quam si idem probè vestitus in eodem cubiculo extra lectum versetur. Quod si de differentia notabili satis constet tunc erit quærendum , quænam ex his methodis magis apta sit ad reprimendam exuberantem fermenti Variolosi agitationem ; ad quam metam , si quid nostra mediocritas judicando valet , à Medico , incipiente morbo , præcipuè collimandum est , & prout ab eadem plus minusve is aberraverit , ita cum malis bonisve ægri rebus medicinam fecerit.

Incautioribus id verò præsertim hæc in re imposuit , quòd se animadverterint ægrum suapte sponte in sudores proclivem , qui cum jugiter manarent , quoties lecto contineretur æger , æstus febriles haud parum minuebant , secus ac in iis , qui non sudabant. Primum autem perpendamus , quam ob causam Febri coercendæ ita impensam navemus operam , quum sit illa solennis naturæ machina , quâ , tum in præparanda , tum in eliminanda materia quavis inimica in sanguine latenti , præcipuè utitur. Quis autem non videt , quòd dum ita sedulo sudorem provocemus ad mitigandam

Febrem,

Febrem, eâdem operâ, ceu Fructum præcocem, humorem crudum & inconcoctum extrudentes, atque iis ipsis sudoribus immaniori postmodum Febrî ansam præbeamus; cum hîc modô serum sanguinis (quo tum ipse sanguis, tum etiam recens natæ fervidæ istæ & Variolosæ particulæ diluuntur) forâs propellitur; his interim particulis vires fumentibus, & ferociam, eo quod jam liberæ sint à colluvie serosa, quam sudores exhauriant. Verbo dicam, Febris aliorumque symptomatum alleviatio à provocato sudore, & pustulis exinde præmaturè exactis, quamplurimis malè cessit, qui eam ob causam, vitam cum morte die undecimo commutarunt.

Observandum est autem, me ægro primis morbi diebus lecto interdicere ex hypothesi tantum Variolarum è Confluentium genere subsecutarum: Namque distinctum genus quod attinet, modò certò prævideri possit, ut nulla ægro imperat necessitas se in lecto jugiter continere, ita illum ab eodem nullus abigo; cum exanthematum paucitas, sive hanc, sive illam viam incendentem in tuto collocet.

Nihilominus non usque adeò mihi assentor, ut ea, quæ jam tradidi, ex autoritate judicii mei (quod scio quàm sit exiguum) credenda autumem. Et profectò, ita parum firmas, & nullius ferè ponderis hominum quorumcunque opiniones semper duxi, ut proprias etiam ubique pro suspectis habuerim, quoties cum aliorum sententiis pugnant: quod & hîc etiam mihi usu veniret, nisi Phænomena practica quasi uno ore rationis judicio suffragarentur. Secluis enim practicis observationibus, id quod vel mihi, vel alii cuilibet pro ratione habetur, nihil fortassis erit aliud, quam rationis umbra aut phantasma, hoc est, mera opinio. Et quoties inter homines fuerim, certior inde redeo, quàm sit periculosum, vel acutissimo ingenio præditis, cerebrum in qualibet sive Arte sive Scientiâ indagandâ agitari perpetim & quasi concalefieri, nisi factum ipsum veri ac falsi judicem ac sequestrum constituant; quodque istiusmodi magni Opinatores, ut cum Cicerone loquar, in controversiis purè speculativis, gradibus vel spatiis infinitis, quantum cuiquam possit innotescere, à veritatis scopo aberrant. Cum qui ad illa tantum applicuerit animum, quæ Praxis certò determinare queat, si quid fortè fuerit hallucinatus, nullo negotio ab errore liberabitur, ad hanc ceu ad Lydium lapidem probatis, quas animo conceperat, rerum Ideis. Nam in hîc nostro negotio, an non mihi licet observare à quo maximè regimine adhibito, mitius aut sævius Variolarum genus producat, atque adeò conformem rei evidentiae sententiam animo producere? Quod si alii idem fecerint, satis habeo. Iniquissimum est autem, cum ne semel quidem per omnem vitam fuerint experti, quantum ægro profit noceatve jam sæpè memorata è lecto interdiu immunitas, me tanquam falsarium convitiis proscindere. Quod si jam olim vera, licet inopinabilia, sentientes calumniandi libido obtinuisset, nemo quicquam tentasset quo invento homines juvari possint. Et sanè quorsum ego has mihi facefferem molestias, nisi repetita sæpe & ferè quotidiana experientia,

rientia, hanc methodum vulgari istâ longè tutiorem esse, inelamaret? Non sum usque adeò delirus atque inops mentis, ut famam mihi quæram ab exagitata atque explosâ eorum opinione, qui, si plausum venarer, omni obsequio mihi ambiendi erant; neque malitiæ tam deploratæ cuiquam videri possim, ut hominibus, etiam seculis aliquam multis post mea fata nascituris, ex meâ, si quæ erit illa, autoritate insidias struam, & vel mortuus quod horreo referens, perinde ac vivus, illos occidam. Ut ut sit, hâc ego methodo meos ipsius liberos, sanguine & propinquitate conjunctissimos quosque, & quotquot se mihi liberè permiserunt omnino curavi. Si quid deliquerim, in eo à me erratum est, quòd obstinatæ contra sentientium pertinaciæ, ne durus ac præfractus haberer, aliquoties cessi, atque hâc de re eorum fidem appello, quibus maximè familiaribus usus sum: Sed hoc ad infelicitatis meæ cumulum accessit, quòd aliquoties, etiam ubi astantes, ea quæ suaferam omnia per integrum morbi cursum fuerant aspernati, ægri tamen fatum (etiam si à colore quem promovebant amici & curatrices, me ad ravim usque reclamante, extincti) mihi crimini dabatur. Quâ de causâ accedente insuperabili τῶν πολλῶν præjudicio, benè mecum agi putarem, si nunquam deinceps ad Variolis laborantes accerferer.

Haud equidem inficias eo, Variolas, quocumque demum modo tractentur, nonnunquam tamen insigniter confluxuras, unde etiam nunquam vacant periculo, quicquid suppetiarum afferatur; id autem assero (quod mihi satis esse debet) diuturnâ atque iteratâ sæpe sæpius experienciâ innixus, eum in longè minori discrimine versari, qui à primo morbi insultu lecto interdium, & carnibus omnino abstinuit; nec nisi potum tenuiorem sibi indulgit, quàm qui statim lecto adjudicatus, medicamenta etiam Cardiacâ assumpsit. Hæc enim methodus, quod suprâ etiam innuimus, aut plurimum densam nimis exanthematum segetem cohibebit, & ex consequenti etiam immodicam Febris secundariæ effervescentiam, quæ non solum suo Marte perimit, sed etiam salivam (de quâ in hujus Morbi Historia fusè egimus) præproperè incrasando, ægro perniciem ultimis morbi diebus minitatur. Quid quod hoc pacto tum sanguinis mictus, tum maculæ purpureæ præcaveri possint; quæ duo symptomata primis morbi diebus invadunt, idque persæpe nullo adhuc manifesto eruptionis indicio: quod etiam in Morbillis, Scarlatinâ Febre, atque Acutis aliis ab intensiore inflammationis gradu ortis, fieri assolet. Mitto jam jucundissimum istud refrigerium quo se æger perfundi animadvertit ab aëris appulsu liberiore, quoties à lecto calente dimittitur; quod etiam singuli, quibus id per me licuit (maximas agentes gratias, quasi vitâ & spiritu receptis, hâc aura postliminio vescerentur) pleno ore agnoverunt.

Unde mihi subiit cogitare, quanto sæpius fucum nobis facit illa, quam talem esse opinamur, ratio, quàm sensus iste certissimè nobis cognitus; quodque in morborum curatione, plus dandum est ægrorum appetitionibus & desideriiis impensioribus (modò perquam enormia non fuerint, & quæ vitam ipso facto extinguant) quàm magis dubiis ac fallacibus Medicæ Artis regulis.

Exempli gratiâ. Febre ardente laborans, tenuioris potûs refrigerium liberaliori manu concessum iri vehementer efflagitat; Artis jam Theoremata Hypothesi alicui innixa, quæ sibi alium scopum proponit, quocum pugnat liquoris frigentis indulgentia, appetitui adversantur, & hujus loco medicamentum Cardiacum imperant. Idem æger alimenti omne genus, dempto potu tenui, maximopere fastidit; hic Ars, maximè illa quam profitentur Curatrices & Amici adstantes, omnino comedendum esse acriter contendit. Alter post diuturnum ab eâdem causâ languorem, absurdi aliquid, & quod fortè nocere posse videatur, obnixè petit; Ars iterum molesta se opponit, & mortem intentat morem non gerenti; nisi fortè ipsius artifex sanum illum prudentissimi Hippocratis Aphorismum probè concoxerit, *Cibus & Potus paulo deterior, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus* (hoc est minus gratis) *est anteponendus*. In his omnibus, naturæ ut videtur, aberrationibus, quilibet in Praxi medicâ vel mediocriter versatus, modò animum diligenter adverterit, facile concedet ægros haud paucos, ubi primùm spreto Medici dictamine, Genio suo obsecundaverint, se meliùs habuisse. Neque hoc sanè mirabitur, qui secum reputaverit, sapientissimum rerum omnium Conditorem Statoremque universa tam exquisito ordine absolvisse, ut sicuti omnia naturæ mala ad concinnandam totius operis harmoniam egregiè conspirent, ita eorum singula divino quodam artificio, propriæ essentiae quasi intertexto, donantur, quo subiectum eadem mala à se amoliantur; quod in morborum quàm plurium Acutorum exitu naturali satis cernitur, (*Acutos* dico, qui ut plurimum Deum habent Authorem, sicut *Chronici* ipsos nos) uti etiam in propensionibus istis quæ tales comitantur morbos, & ad ægrum ab illâ pernicië liberandum viam struunt, quam Ars adfert, quoties in fatuos cadit. Atque in hoc sanè bene cum hominibus agitur, quorum genus universum aliter se perquam malè habuisset, tum cum Ars medica intra breves *Hellados* cancellos tota staret; quæ quidem eam ferè ad terrarum orbem proportionem habet, quam habet ignobilis aliqua Villa ad nostram hanc *Britanniam*. Et quid vel impræsentiarum de tot tantarum regionum incolis fiet, cùm omnis *Asia*, *Africa* omnis, atque omnis etiam *America* (demptis aliquot nuperis Coloniis haud ita populosis) atque insuper magna *Europæ* pars, Arte medicâ prorsus destituantur? Attamen ut eleganter Comicus, viros rationis ac virtutum usu præstantes, ab eorum grege, qui formam humanam vitâ ad instar brutorum ἀλ' ὧν ἀεὶ conspurcant, distinguens, Ὡς χάρειν, inquit, ἐς' ἀνδρωπῶν, ἀν' ἀνδρωπῶν ᾗ. ita etiam Ars medica, si reverâ Ars fuerit, & non solum nomine tenus, maximum est donorum omnium quæ hanc vitam respiciunt, tantoque cæteris omnibus præferendum, quanto ipsa vita iis quibus in illâ gaudemus, præcellit.

Sed ut ad rem redeam: Quantumcunque conducat plerumque ægro ut primis morbi diebus lecto non addicatur, est tamen (quod observandum) ubi etiam antè eruptionem omninò addici debeat. Exempli gratiâ, *Infans*
de

de symptomatis Dentitionem comitantibus jam securus, derepente *Spasmo* corripitur: in hoc casu cogitandum est mihi, convulsionem istam fortassis à naturæ conatu quo *Variolas*, *Scarlatinam Febrem*, aut *Morbillos* in corporis habitum protrudere satagit, pendere, licet hucusque lateant sub cutis tegmine. Ut itaque tam periculoso symptomati eamus obviam, *Emplastro Epispastico* nuchæ mox applicito, lecto quamprimùm committendus est; exhibito insuper medicamine aliquo *cardiaco*, cui etiam *Paregorici* pauxillum est admiscendum, quo & potentius morbi causam eliminet, atque etiam tumultum à quo oritur *Paroxysmus* consopiat: Verbi gratiâ, puero trienni, *guttæ v. Laudani liquidi in Aquæ Epidemicæ cochleari uno* (aut quid simile) sunt propinandæ. Et profectò suspicor admodum, ne dicam certus sum, millenos aliquot infantes, & nonnullos etiam ætate provectiores, idcirco letho fuisse datos, quòd non satis animadverterint Medici hujuscemodi Convulsionem nihil aliud fuisse, quàm morborum jam dictorum prænuncios: cum enim Practici paulò incautiores, paroxysmos hosce revera symptomaticos pro affectibus Essentialibus habeant, Enematis sæpe repetitis & aliis evacuationibus eos aggressi, Variolarum eruptioni officiunt, ac proinde permanentiores etiam reddunt paroxysmos istos; quos tanto molimine opprimere student, quique alias, ubi primùm pustulæ eruperint, suâ sponte certo certius evanescerent. Hic autem, fausto lætoque omine (quod alibi diximus) Variolæ, quæ cum spasmo teneriores pueros invadunt, rarò insigniter confluunt, unde æger longè tutius lecto conceditur primis hisce diebus. Licet observaverim Variolas, quoties *Affectus Comatosos* à tergo insequuntur, admodum confluere; quo in casu ipsemet Vesicatorium, & Paregoricum, quale suprâ descripsi, potius adhiberem, quàm ut ægro jugem lecti usum ante eruptionem permetterem. Quin imò animadverti ejusmodi *Convulsionem* quandoque (oppidò tamen rarò) *Intermittentium Februm Paroxysmos* præcedere; *Affectus* verò *Comatosos* cum dictis paroxysmis unà invadentes & non nisi cum iisdem terminantes, tam in infantibus quàm adultis persæpe vidi, quorum similiter nulla in curatione ratio habenda est, sola autem Febris, utpote morbus primarius & essentialis, omni ope est expugnanda. Si enim Comatosis hisce Affectibus Febrem comitantibus curandis præcipuè incumberem, ac proinde Venæ-sectione, Catharsi, atque Enematis repetitis, sopori vincendo operam navarem, Febrem inde magis accenderem, & ex consequenti eò usque augerem Coma (quod mihi erat tollendum) ut æger tandem ab eo æternum consopiretur; quando si in Febre debellandâ totis viribus contendam, symptomata omnia ab eâdem pendentia nullo negotio unà faceissent. Quod seriò notari velim, cum in hac re tam crebrò, tamque fataliter errari soleat. De hoc verò alio in loco fusiùs dixi.

Aliquod etiam (quod proximè tradam) quantumlibet ægro conferat ut lecto interdium absistat, nihilominus non potest id solatii eidem indulgeri, ægritudine sc. *vehementiori*, *intensiori Febre*, *Vomitu enormi*, *Vertigine*, *Artuum dolore* quasi Rheumatismo laboret, & similibus contra,

indicantibus : quæ quidem symptomata omnino sæviora si fuerint, maxime in sanguineis & ætate florentibus, ingentem materiæ Variolosæ copiam intus natam, & discrimen haud vulgare, à pustulis exitum certatim quærentibus ac mox valde confluxuris, præfagiunt. Cum itaque frænum fermento ita exorbitanti omni ope injiciendum sit, attamen hinc quidem illud continuo lectuli calore adjutum ferociet magis, illinc verò præ nimia ægritudine eodem abstinere nequeat ægrotans, nisi suppetias afferamus; has ob causas omnino necesse erit, rebus sic stantibus, *sanguinem* primum è brachii venis educere, & post aliquot horas *Emeticum* eradicativum ex *Infusione Croci Metallorum* exhibere, quod non solum materiam, à quâ oritur ægritudo ista insolentior, foras propellit, sed etiam ægrum ita refocillat, ut jam quasi sanus lectulo abesse queat. Neque huic soli methodo innitendum est ad infringendas fermenti vires, sed quo magis æger in tuto collocari possit, præter evacuationes jam memoratas percommodum erit *Vitrioli Spiritum* potui tenuiori, quoties eum haurit, liberaliùs immiscere, etiam usque ad plenam pustularum eruptionem. Non obstantibus tamen hisce evacuationibus, tum etiam usu potius refrigerantis, æger nihilominus non nisi nocturno tempore lectulo permittendus est, si quidem fieri potest, quoniam hæc universa longè minus ad inhibendam præproperam materiæ Variolosæ assimilationem faciunt, quàm una sanguinis contemperatio à novo aëre per pulmones subinde recipiata: quæ quidem sola mirum in modum ægritudinem symptomatice, de qua supra, sublevat confestim, quod à me non uno experimento comprobatum est. Hæc autem methodus paulò insolentior non nisi in ætate florentibus, quorum quidem sanguis sive à Venere, sive à Baccho incaluit, atque in aliis (Infantes tenellulos semper excipio) quos unà cum Variolis vehementiora atque enormia ista symptomata jam dicta adoriuntur, necessario requiritur. Ubi sanguis non usque adeò accenditur, neque ita urget symptomatum violentia, uti materiæ Variolosæ præmaturè assimilandæ longè minor est suspicio, ita ex consequenti & evacuationes præmemoratae, & Vitrioli Spiritus omitti possunt.

Longior in his fui, quia sat scio Curationis exitum sive lætum, sive funestum, ab ea potissimum, si non in solidum, ratione pendere, qua æger primis morbi diebus tractatur. Jam verò omni pustularum acie quasi in campumeductâ (quod *diè* ab invasione *sexto*, quarto autem inclusivè ab eruptione primâ fieri jam diximus) haud amplius interrompendus est ægro lecti usus per reliquum morbi decursum: qui quidem ut ante hunc diem concedi non debeat: ita ut diutius differatur, vix patitur ægri status, modò confluentibus Variolis laboret. Hoc autem est genus (quod notari velim) de quo hactenus verba fecimus. Quæ enim & pauca & distincta emergunt Exanthemata, parum habent momenti sive in hanc, sive in alteram partem, si vel mediocriter in arte valeat is qui medetur. Quanquam etiam in genere hoc, utut suoapte ingenio omni periculo vacet, haud pauci (quod serió dolendum est) Libitinæ cesserint, quoties sc. malo suo fato in eos inciderint, qui

qui in promovendo calore spem omnem ponentes, cum morbo ad jugulandum ægrum, licet inscii, conspirabant.

Tempore ab hoc Pustulæ augescere & corporis superficiem undique concalescere incipiunt, at caput imprimis, unde æger, nisi fuerit infans, ad somnum difficilior est, & inquietudine vexatur: Quod proximo loco in hoc morbo diligenter expendendum esse arbitror; prout enim sedatior fuerit sanguis, ita debitum augmentum & magnitudinem acquirunt pustulæ, atque ex adverso, pro ratione orgasmi quo tumultuatur dictus sanguis, pustulæ marcescent, intercepto ulteriori progressu; unde non solum peccantis materiæ eliminatio sufflaminatur, sed insuper singularum phlegmonum œconomia & genuina crasis interturbatur; indeque vel non omnino debito tempore ad separationem pertingunt, vel ichor demum fit puris vice, & loco flavi liquoris favum colore referentis, nigricans aliquis humor, vel succus alius non naturalis, & à genuinis Variolarum pustulis alienus, egeritur. Quapropter Medicamenta *Paregorica* æquè indicari in variolis Confluentibus mihi videntur, ac indicatur quodvis remedium in quovis morbo; cum hîc quasi *Specificæ* sint, perinde ac Cortex Peruvianus in Febribus intermittentibus: quamvis haud ignorem Paregorica non virtute aliquâ præcisè specifica operari; sed isti solum Indicationi respondendo, qua sanguini & spiritibus consopendis & in ordinem redigendis operam damus. Atque hic quidem sanguinis & spirituum motus inordinatior (Variolarum Confluentium in adultis comes individuus) Anodynorum usum præ cæteris deposcit; necdum ei satis innotescit hujusce morbi Genius, qui ista Vigiliis tantum deberi existimat. Sicuti enim fieri quandoque potest, ut etiam non dormiens bene compositis ac sedatis fruatur spiritibus, (quod ab assumpto Laudano persæpe accidit) ita etiam nonnunquam fit, ut spiritus vehementius agitati laudabili pustularum eruptioni officiant, etiam ubi æger multum dormiat, quod observatione dignum.

Ut de genere Anodynorum jam loquar. Tametsi ego à multis annis *Laudanum liquidum* satis auspiciò exhibuerim, quoties huic Indicationi satisfaciendum erat, nihilominus *Syrupum de Meconio* ipse præferendum censeo; licet enim utrumque ad eundem scopum dirigatur, tamen Laudanum paulò magis calefacere mihi videtur, Syrupus autem minùs. Dosis quod spectat Syrupi, ea non solum ægri ætati est adaptanda, sed & symptomatum gradui, & quæ homini, qui sedatos habet spiritus & probè compositos, nimia fortè erit, alteri cujus spiritus ferociunt magis, vix sufficiet. Exempli gratiâ, ponamus in genere sex Drachmas plerisque convenire, jam in Variolosis, quoties id remedii indicatur, vix intra *Unciam*, si quid præstare velimus, est subsistendum; quæ quidem quantitas singulis vicibus morbo decurrente imperanda est. De adultis agimus impræsentiarum, etenim si infantibus propinetur, dosis pro ratione ætatis erit minuenda. Et sanè Paregorica non perinde indicantur in infantibus Variolosis, ac in adultioribus, cum illi in somnos perdurante morbo proniores sint. Quamvis & in his quo-

ties à morbo periclitantur magis , à Paregorico abstinere multùm extimescerem. At , quod dicere animus mihi erat , difficile est admodum Paregoricorum dosin , quocumque in casu ista indicantur , certò determinare. Etenim sive in quocumque *Spirituum motu inordinatiori* , sive in vomitu *enormi & alvi fluxu* , sive etiam in dolore atrociori , (in quibus affectibus tribus præsertim usum paregoricorum indicari alibi docui) eâ methodò sunt exhibenda , ut si prima dosis metam non attingat , alia atque alia debito tempore assumatur , donec tandem medicamentum Medici votis responderit , non tam ad ingestam Anodynì quantitatem , quàm ad effectum quod in ægro producendum erat , respectu habito , quod ubi primùm successerit , nec citiùs , Paregorici usu ita copioso ac frequenti cessandum est : interposito tamen semper inter singulas doses spatium aliquo , ut pernoscere valeamus utrum dosis ultima , id quod quærimus præstiterit , antequam nova ingeratur. At ubi semel finem propositum obtinuerimus , dosis Anodynì in morbi progressu exhibendi , jam minor pro re nata definienda erit.

Exempla haud pauca in promptu mihi sunt , quibus eis quæ hætenus tradidi fidem astruam , at unicum impræsentiarum adducam. Aprilis 13. Anno 1681. Quædam è nostrâ viciniâ , nomine *Crosse* , ad me accedens atque flens , obnixè petiit ut filium ejus decennem adirem , qui à die quarto malè habens , Variolis , ut ipsa metuebat , jam laborabat. Ego à podagrâ , quæ me tunc temporis excruciebat , detentus , Pharmacopolam , quo uti soleo , rogavi ut ægrum inviseret , ac mihi de ejus statu referret : rediens ille mihi narravit pueri matrem è nescio cujus mulierculæ consilio , *pulverem Comitissæ* & alia calidiora remedia filio propinasse , quin & stragula adjecerat matris indulgentiâ , sub quibus quasi defossus latebat æger , ut horum pondere sudores (ad quos ceu ad sacram anchoram in hoc morbo foeminæ confugiunt) exprimeret ; ad hæc magnam *Posseti* calentis vim , *floribus Calendulæ & cornu Cervi incoctis* , ægro infuderat ; unde adaucto Febris calore , tantam spiritibus confusionem induxerat , ut præter modum deliraret æger , totis adstantium viribus vix lectulo affixus , ac incondita quædam , furentium ad instar , submurmurans. Nondum tamen in lucem prodibant exanthemata , vel saltem obscure , sed denso agmine cutim impetebant , inhibita planè eruptione ab hac methodo violentiore , quæ ad eam sollicitandam destinabatur. Jubeo ut è lecto eximatur quantò ocyùs , neque eundem nisi noctu ingrediatur ante lapsum *sextum diem* : dein ut syrupi de Meconio unciam dimidiam statim sumat , quo ne hilum proficiente , post horæ spatium eandem dosin repetò , at nullo cum fructu ; quippe quòd sanguis tam immani furebat orgasmo , ut non nisi unciis duabus cum dimidiâ (spatium tamen inter singulas semiuncias interjecto , quò liqueret quid postrema dosis præstiterat) intro assumptis frænari posset ; quo factò , unciam dimidiam tantùm singulis noctibus hauriendam præscripsi usque ad finem morbi : quæ

quidem illam spirituum requiem, quam crebrior exhibitio paraverat, tueri jam partam valebat. Unde etiam convaluit æger.

Hic minimè reticendum est, quòd in quantacumque demùm dosi, & quantumlibet repetitâ exhibeatur, primis hujus morbi diebus Narcoticum, modò sanguinis æstus atque enormis spirituum agitatio magnopere ferociant, vix scòpum attingere poterit id, nisi æger à lectulo eximatur: Calor enim lecti calorem morbi ulteriùs augetur atque incendit; proindeque vim ita magnam Narcotici exhibere necesse erit, cui fortean Natura impar fuerit: Quod etiam usu venit, etsi haud tanto vitæ discrimine, quando Cortex Indicus exhibetur in Febre Intermittente, ægro per ejus usum in lecto se continente. Et hoc, ni fallor, in causa fuit quod curatio hujusce Febris nonnunquam protelata fuerit, quæ alias altius absoluta esset, & quandoque etiam si Febris Remittens tantummodo, & non interstincta erat, eadem adeò intendebatur, ut mortem ipsam æger haud effugerit.

Missis autem casibus extraordinariis, in quibus nullo non morbi tempore indicari potest hoc remedium, ego istâ primùm nocte exhibendum suaserim quâ lecto jam in totum addicitur, *sextâ* nempe à prima invasione, à quo tempore usque ad *diem decimum septimum* omni vesperi est propinandum, vel saltem donec æger *ἔξω βέλων* quod aiunt, fuerit constitutus. Sexto enim die caro Phlogosi-quasi corripitur; unde caput ab humoribus exinde concalescentis turbari incipit & vacillare.

Curandum est autem sedulò, ut Anodynum temporius sumatur hîc, quàm in aliis morbis: quoniam quidam caloris & inquietudinis quasi paroxysmus Variolosos sub vesperam semper affligit; & quandoque accidit quòd, nisi maturiùs exhibeatur sub ultimis morbi diebus, æger, derepente paulò hebetior factus, mox incalescat, post de ægritudine queratur, quæ brevi in ipsâ morte terminatur; attonitis haud parum amicis, qui paulò ante magnam de ægro, ceu convalituro, spem foverant. Cui tanto malo occurri fortean poterat Anodyno confestim ingesto. His itaque diebus, *undecimo* verò præ cæteris, Paregoricum temporius propinandum impero, etiam horâ quintâ sextave pomeridianâ, utque in promptu sit, si quando fortè ægritudo ex improvîso invaserit. Quin imo persuasissimus sum nonnullos ex mihi notis ideò fato functos, quòd dicto medicamento, re jam postulante, destituerentur; cujus ope, si adfuisset, adhuc inter vivos numerari potuissent. Atque hoc in loco maximè, si in quo unquam alio, *Occasio præcepti est.*

Quapropter cum tam ingens discrimen impendeat, si Narcoticum vel fat citò non fuerit propinatum, vel si è diverso ita præmaturè, ut ejusdem vis paregorica & spirituum sedatrix exoleverit, quàm illud repetendum veniat; idcirco cum res in lubrico sit, tutissimum omnino est Anodynum statim horis tam manè quàm serò exhibere, ultimis sc. & periculossimis morbi diebus. Neque hoc tempore syrupi dicti uncia semper sufficit,

sufficit, cum ea quantitas nihil magis præstet in intensiori sanguinis inflammatione & spirituum animalium exorbitantia insigniore, quam uncia dimidia in morbo mitiore. Quinimo iterata experientia me edocuit, *Sesquiunciam* in juvenibus & sanguineo temperamento præditis pro singula dosi, violentiæ symptomatum, quæ tunc ingruunt, & in quibus præcavendis toti sumus, frangendæ parem tantum esse; quodque hæc ipsa dosi in talibus subjectis, atque iis temporibus, mane & sero, non tuto tantum, sed cum magno etiam ægrorum commodo, repeti possit, donec illi convalescant.

Neque verò hoc reticebo, quod in ultimis diebus Variolarum egregie confluentium quandoque necesse habui enim ter in spatio diei naturalis, i. e. Octavâ quaque horâ, Narcoticum exhibere; quando scilicet vel ob violentum spirituum orgasmum, vel ob eorundem confusionem, ægritudinem aliqualem inducentem, longiora ab usu ejus intervalla haud concederentur. Hoc autem notandum, quod si tam frequens Diacodii exhibitio ægro nauseam creet (quod in dictis diebus sæpe accidit) hoc in casu *Laudanum liquidum* propinandum; cuius gutt. xvj. idem valent, ac ℥j. syr. de *Meconio*, nempe si eodem modo præparetur, quem in *Libro de Morbis acutis & in Cap. de Dysenteria* ibidem descripsimus.

Objicient, sat scio, illi, quibus hæc minus placent, materiam peccantem à Narcotico toties & in tam larga dosi repetito, fixam iri, & Ptyalismum retundi. Quibus respondeo, omnino fatendum esse Salivationem aliquatenus immui, nunquam tamen ita penitus cessare, ut non longissimis ab assumpto Anodyno intervallis, atque ejus vi jam fatiscente, nonnihil recrudescat, imò verò gemino hoc commodo stipetur. Primò quod æger, viribus à Narcotico instauratis, pituitam validius expectorare valeat. Dein quod Saliva, quæ excreatur, licet parciore sit, rectius tamen excocta est, quam si Anodynum non fuerit exhibitum. Proximo loco, Ptyalismi defectus hic partialis plusquam compensatur faciei manuumque tumore, qui ex repetito Paregorici usu & certior est & major in iis diebus, quibus hæc partes solent intumescere: facies scil. ab octavo die usque ad undecimum, (quo tempore ferè incipit subsidere) manus vero ab undecimo, usque dum pustulæ eas obsidentes maturuerint. Atque fidenter assero, neminem in hoc morbo probè versatum posse negare utriuslibet horum tumorum absentiam, quo tempore se debent ostendere, pejoris esse ominis, quam Ptyalismum interceptum. Me quod attinet, longe tutius esse autumo Ptyalismi compescendi discrimen subire, quam à Narcotico abstinere: quod ita impensè morbus hic efflagitat, ut in eo rudis sit oportet & parum observationi deditus, qui ægros suos subsidio tanto defraudet.

Non verò ita capienda sunt, quæ hactenus disserui, ac si ego quotidianum Diacodii usum, vel eâ quæ convenit dosi, in tenellulis Infantibus, qui Variolis Confluentibus laborant, suaderem, nisi morbus periculum grave intentet, idque duabus de causis; primò, quia usque adeo non calent

calent infantes, atque illi, quorum vitæ fax plenius accensa jam luculentius ardet; dein quod Narcoticorum jugiter assumptorum vim non ita benè ferat ætas mollior, & magis infirma. Adde quòd sponte suâ somno ferè perpetuo morbi tædia fallunt Infantes. Nihilominus quoties vel phrenesi illi corripuntur, vel pustulæ mali moris sunt, Anodyna omninò indicantur, horum enim utrumque sanguinis atque spirituum animalium motum interturbatum plus satis evincit.

Duo hæc, quæ adeo prolixè tractavimus, nempe ista methodus, quâ inhiberi debet præproperea materiæ Variolosæ primis in diebus assimilatio, tum & altera, quâ motus spirituum inordinatus ab externarum partium inflammatione excitatus, est præcavendus, duo sunt quasi Cardines, in quibus omnis hujus morbi Curatio vertitur, quandoquidem quæ ex eo oriuntur mala, quòd utrique huic discrimini non satis occurreretur, funesta illa symptomata invitant, quibus Variolarum tragoedia absolvitur. Quocirca cum præcipuæ hæ fuerint Indicationes Curativæ, ubi iis modo jam tradito fecero satis, nihil amplius mihi restat agendum, in quantum sc. Medicus sum, non verò formularum medicarum Præscriptor: Quas ego duas, sive Artes, sive Dotes, sive etiam Provincias appellare libeat, toto cœlo à se invicem distare arbitror.

Unum adjicio, si *Epispastico* opus fuerit, id peramplum & satis acre ægri Nuchæ applicandum, quod ita opportuno tempore fieri debet, ut neque præmaturè appositum vim epispasticam ante diem undecimum, in quo summa rerum agitur, amiserit; neque in eum ipsum diem rejiciatur, quo jam tardius adveniens, illo temporis articulo obesse possit, præ calore & æstu, quem sanguini imprimit, cum Febre Secundaria vix pari Marte tunc deceranti. Opportunissimè itaque applicatur Epispasticum nocte illâ, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto Paregorico, quod tunc erat exhibendum. Apposito per id temporis Vesicatorio, dolor, quem ejusdem morfus adferet, desinet ante diem illum, quo æger, vel agonizaturus, & materiæ peccanti eo ipso tempore dabitur exitus, quo eo est opus ad vincenda mala ista, quæ illum diem præstolantur. Hoc enim primum tempore, quod in hujus morbi Historia fusè deduxi, facies, quæ hætenus inturgescebat, jam detumescere incipit, & salivatio, quæ hucusque pleno anne fluebat, decrescere, condensato jam, & non nisi ægrè excreto, qui eam excitabat, humore. Ut verò mittamus Epispasticum illud tum faciei detumescentiæ, tum etiam imminutæ Salivationi quadantenus substitui, Febri insuper Secundariæ perdomandæ aliquatenus conducit, quæ nunc temporis invalescit, sanguine quasi obruto & penitus infecto puris copiâ à totidem abscessulis resorptâ; adeò ut in omnibus ferè, quos unquam tractavi, Variolis laborantes, observaverim, pulsus in carpo salientem ægrè percipi posse hoc tempore, utut facile se pridie hujus diei & postridie etiam, digito exploratori se proderet.

Sed inter ea, quæ à capite sive derivant sive revellunt, nihil æquè mihi

videtur operari ac *Allium* pedum plantis applicitum. Quod *Allium* revera attrahat, manifestum est à vesiculis, quas sæpe excitat; & à dolore illo non ferendo, quem nonnunquam, licet raro, affert, etiam non excitatis vesiculis, humores scil. in partes illas invitando; unde dolor tam vehemens quandoque exortus est, ut cataplasmate è mica panis similaginis in lacte cocti eundem sedare necesse habuerim: In adultis itaque qui Variolis Confluentibus laborant, *Allium* incisum & linteo involutum plantis pedum admove-re soleo, à die octavo, in quo primum facies intumescit, donec jam morbus periculo omni vacet, singulis diebus renovandum.

Neque interim istud mihi prætereundum est, ægrum scil. à carnibus, durante morbo, arcendum omnino esse, & cerevisiam lupulatam eanique tenuissimam tantum pro potu concedendam. Jusculis avenaceis, pomis coctis, & jam dictâ Cerevisiâ commodissimè interea vitam tolerabit. At verò instante jam maturatione, ubi particulæ purulentæ in sanguinis massam regurgitantes eandem tabo suo inquinaverint, utile erit cochlearia vini aliquot, singulis auroris & noctibus ægro indulgere. Stragula quod attinet, & Iodices quibus æger in lecto est contegendus, neque plura sint illa, neque pauciora, quam quibus sanus utebatur. Quin & liberum ei sit, quoties voluerit, se ab hac in illam lecti partem transferre, quo præpediri possint sudores isti symptomatici, quos ægro nocere satis opinor, evici. Eodem pacto etiam præcavebitur efferatior exanthematum phlogosis excitata à nimio calore, quem carnes contrahunt, quoties æger semper eodem in loco, cæu palo defixus, jacet. De hoc autem alias prolixius disserui.

Casum nuperrimum, seu specimen integræ hujus Praxeos, subnectam. Hac ipsâ hyeme me accerserat foemina nobilis, Domina *Dacres*, ut quendam suum nepotem, Dominum *Thomam Cheut*, temperamento perquam sanguineo & ætate florentem Medicus curarem. Pridie coeperat febricitare vehementer; colluviem biliosam in magna copia per vomitum rejiciebat; dorsum plurimum dolebat. His malis solatium quærens & levamen, lectum petebat, & tum stragulis acervatim injectis, tum calidis assumptis liquoribus sudores per diem integrum omni ope sollicitabat, sed frustra, cum tanta ad vomendum proclivitas, & alvi fluxus, licet modicus, omnem sudorificorum vim eluderent; Oleum interea Febris igni affuderat, quo illa multum increverat. Ego jam Variolas brevi exorituras suspicabar, easque insigniter confluxuras, tum ob ætatis vigorem, tum etiam quod sanguinem multum excalesce- rat irritò sudoris extorquendi conatu, (quo quidem, si modo æstare ægrotaverat, & micrum sanguineum & maculas purpureas certo advocaverat) tum verò maxime, quod semper observaverim in juvenibus immani vomitione, agri- tudine, & dolore præter solitum vexatis, Variolas infu-erentes ultra modum confluxisse. Meum itaque esseratus, ut nullum non lapidem moverem, quo præproperam materiæ Variolosæ assimilationem obstruerem, à lecto illum arcebam, nisi statis prius horis somni. Die sequenti (tertius is erat) Variolis nondum comparentibus, sanguinis uncias octo è dextro brachio manè extrahi curabam:

curabam : optimus erat ille floridusque , cum adhuc spirituosum tantum *μιασμα* exceperat , nondum verò putredinem illam , quam conciliat longior morbi mora , & in eorum sanguine ut plurimum conspicitur , qui nuper ab hoc morbo convaluerint. Horâ quintâ post meridiem diei ejusdem , Infusionis Croci Metallorum unciam unam exhibui ; ex qua satis commodè vomebat , & ægritudine levatus , longè melius habere visus est , jam haud invitus à lecto abstinens , à quo priùs ægerrimè se divelli patiebatur , ægritudine & vertigine mactatus. Die quarto manè accedens , exanthemata , quibus præcavendis tanta fueram molitus , eo numero prodeuntia conspexi , ut ab insigniori quem minitabantur , confluxu , ægri vitæ metuendum esset. Diligenter itaque cavebam , ne lecto interdium committeretur , consulebam etiam , ut Cerevisiam tenuem Spiritu Vitrioli instillato acidulatam potaret. In his ad sextum usque diem perseverabat ; quibus diebus licet non ægrota- ret , sed aurâ liberius vescens multum reficeretur , tamen alvo subinde laxiore fuit. Jam sub meridie non valebat ulterius , quod hic fieri assolet , se à lecto abstinere , decubuit itaque usque ad finem morbi , me non reluctante , cum nunc erupissent pustulæ omnes , quæ , non obstante meo omni conamine , plus satis confluebant. Quamvis enim pauciora erant exanthemata iis , quæ in nonnullis observavi ab hoc morbo extinctis , plura erant tamen , quàm ple- risque eorum , qui sanantur , solent prodire. Hæc primùm nocte Syrupi de Meconio Unciam unam in Aq. flor. Paralyf. propinabam , singulis deinceps noctibus repetendam ; suadebam etiam , ut non aliis stragulis , quàm quibus sanus assueverat , tegeretur ; ut Jusculis Avenaceis , & Hordeaceis , non- nunquam etiam pomo cocto vesceretur ; Cerevisiam etiam tenuem hauriret. Die octavo Allium incisum & panno lineo inclusum pedum plantis appli- candum curavi , & renovandum quotidie , donec extra aleam consisteret. Post hæc pro augescentium pustularum genio omnia cedebant , usque ad decimum diem ; quo tempore manè eum invisens , licet mediocriter se ha- beret , Febris tamen Secundariæ quendam quasi prodromum deprehendi , cum jactatione aliquali. Mox itaque procellam veritus imminentem , Pare- goricum suprâ laudatum exhibui , à quò tranquilla omnia & pacata ; eâ- dem nocte Syrupi de Meconio Sesquiunciam præscripsi. Sequenti aurorâ , diei scil. undecimi , cum post exolefcentem vim Anodynî , quod hesternâ nocte sumpserat , jam de novo esset irrequietior , Diacodii iterum Ses- quiunciam extemplò ingessi , vesperti item tantundem , atque eandem do- ctim manè & serò ut assumeret quotidie consulebam , donec omnino con- valesceret. Paruit æger ; neque aliquod nos deinde symptoma exter- ruit , nisi quòd urina ei quandoque supprimeretur , (malum junioribus hoc in morbo familiare) quam tamen genubus innixus in lecto reddebat , Ptyalismum quod ipectat , quantumvis salivæ copia frequenti Anodynorum in tam larga dosi repetitione aliquantulum interciperetur , tamen longiore ab eorum usu intervallo pituitam concoctam excreabat , ac facies manus- que debito tempore pro votis intumescebant. Die decimo octavo è lecto

surgerebat, & tunc primum iusculum ex pullorum carnibus indulgebam, in quo per gradus indies ad victum consuetum redibat. Die vicesimo primo sanguis mittebatur ex brachio dextro ad uncias octo, qui Pleuriticorum sanguinem emulabatur, & puris ferè instar erat. Denique ab quatuor vices, spatium interposito, purgatus fuit.

Hic subinnuam, quod quoties in his pagellis dies ab invasione v. g. sextum, undecimum, &c. nominaverim, non ita accipi id velim, quasi Variolæ Confluentes tertio nunquam non die erumpere; cum satis sciam quantoque ita accidere, etiam in iis, qui vel maxime confluent, ut pustulæ non nisi post aliquid à die tertio temporis spatium se exerant. Eruptio autem ut plurimum in diem tertium ab invasione incidit, & ut plurimum, qui (e. gr.) die Lunæ confluentibus Variolis primum laborare incipit, die Mercurii sequenti pustularum primitias in cute summa deprehendet, & Jovis dies ab illo die Lunæ secundus, undecimus ille erit, periculi plenissimus, nisi interposuerit se Medicus.

Atque hic iterum repeto Theoremata hæc omnia ad Confluentes tantum Variolas referri debere, quæ in genere distincto nullum prorsus usum habent, nec ab illo exposcuntur. Et tam sibi quam aliis imponunt, qui attollunt cristas, quoties eos sanaverint, quibus Exanthemata numero pauca, & æque intermixta efflorescebant. Si tentare libeat, quantum in Arte valeant, in Variolis Confluentibus vires experiantur; maxime quoties vel florentes ætate, vel eos qui immodicâ vini ingurgitatione nimium incaluerint, hic morbus invaserit. Ne in levioribus exercitati, ita toto coelo aberrant, ut se eos servasse existiment, quos ipsi adstantes non occiderint.

Verum dissertatiunculam hancce non prius finiam quam ubi retulero quæ mihi, dum hæc scriberem, suo ore narravit Amicissimus Dominus Carolus Goodall, M. D. Collegii medicorum Socius, atque impræsentiarum Censor, quod mihi idè faciendum duxi, quo melius iis fidem conciliem, quæ cum hic, tum alibi & de Petechiis, & de mictu sanguineo affirmavi: utrumque nempe hoc symptoma quoties Acutis morbis accedit, atrociori sanguinis inflammationi omnino deberi, ac pròinde Refrigerantia indicare remedia. Casus se ita habuit.

Juvenis annorum quasi 27. habitu corporis extenuato, & calido temperamento præditus, Febre violentâ & continuâ correptus est mense Junio, Anno 1681. Lingua erat sicca & scabra, sitis vehemens, pulsus celer, dolor regionem cordis scrobiculo vicinam diserviciabat, dorsum verò imprimis, (in quo jugiter deserviebat) sanguinem subinde mejebat, tum & Petechiæ coloris subfusi collum, pectus, & carpos dense insidebant. Die sexto accessit Medicus, & ægrum de vitâ periclitari à nimia urina sanguinolentâ excretionem comperiens, Indicationes curativas ad sanguinem refrigerandum, incrassandumque, & tum etiam ad vasorum oscula, quæ in Renibus relaxata dehiscebant, obturanda dirigendas censebat.

Præmissis itaque tum Vena sectione, tum Bolo lenitivo, ægrum, ut in lecto, quantum.

quantum fieri potuit, se abstinere, seridè monuit, cum à continuo lectuli calore mictum sanguinis promoveri non dubitaret: suadebat etiam ut in culcitra corio tectâ ager potius dormiret, supinus non nisi rarissime jaceret, lac aquæ permistum ut potaret, Panatellâ, oryza lacti incoctâ, pomis coctis, sive folis, sive aquæ fontanæ intritis, & saccharo edulcoratis vesceretur. Medicamenta ordinabat sequentia.

℞. El. ros. rub. 3vj. cort. inter. Querc. 3℔. Sem. Plantag. parum contus. ʒiij. Aq. Font. ʒiij. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem: infundatur in vase clauso calore leni per quatuor vel sex horas. Colat. add. aq. Cinnam. hord. ʒiij. Sacch. albiss. q. s. ut f. Tinctura gustui grata, de qua sæpiusculè bibat die noctuque.

Enema è lacte cum Syrupo Violaceo injiciebatur horâ à meridie secunda: & horâ somni sequens Haustus propinabatur.

℞. Aq. fl. Paralys. Plantag. Cinnam. hord. an. 3℔. Aceti stillat. ʒij. Syr. de meconio 3vj. M.

Die septimo, symptomatis vix se remittentibus, Enema jam descriptum singulis diebus injiciendum curabat, tum etiam Emulsionem, Haustumque ad hunc modum præscribebat.

℞. Sem. Cichor. Endiv. Lactuc. Portulac. an. ʒij. Sem. Cydon. Papav. alb. an. 3℔. Amygd. dulc. ex cort. in ʒiij. contundantur simul in Mortar. marmor. sensim affundendo Aq. Hord. ʒiij. colat. add. sacchar. Crystall. q. s. f. Emulsio, de qua bibat cochl. xij. quartâ quaque horâ.

℞. Aqu. fl. Paralys. Nymph. germin. Querc. Plantag. an. 3℔. Aceti stillat. Aq. Cinnam. hord. an. ʒiij. confecti de Hyacinth. 3℔. syr. de meconio ʒj. M. f. Haustus horâ somni sumendus.

Die octavo, cum adhuc instaret Febris, sanguis Urinæ immixtus copiosius exiret, & Petechiæ in præmemoratis partibus numerosæ comparerent, omnia hæc symptomata à sanguinis calore, tenuitate & acrimoniâ, oriri conjectans, sanguinem secundâ vice detraxit, liberaliorem cerevisiæ tenuis usum, cui Vitrioli spiritus ad gratum acorem prius instillabatur, concessit: quam cum fastidiret æger, possetum è succo limonum & lacte ei indulgit, uti etiam limonum pulpam in taleolas divisam & saccharo involutam. Addebat & sequentia.

℞. Conf. Lujul. Cynorrhodum ʒiij. confecti de Hyacinth. ʒiij. Diascord. 3℔. coral. rub. preparat. sang. Dragon. Bol. Armen. an. ʒj. Syr. e. Symphyt. & Piosell. q. s. ut f. Opiata, de qua capiat quantitat. Avellanæ sextâ quaque horâ, superbibendo haustulum seri lactis succo limonum facti, & sacch. alb. edulcorati, vel decocti Vulnerarii Spiritu Vitrioli acidulati.

Haustus hesternâ nocte præscriptus repetatur, cum Syr. de Meconio 3x.

Nono die Petechiæ paulatim evanescebant, Urina minùs sanguine scatebat, quique inerat sanguis facilius separabatur, & matula fundum libentius petebat: hortabatur itaque ægrum ut in Remediorum horum usu perseveraret, & diebus aliquot elapsis sequentia adjiciebat, ad eundem scopum collimantia.

℞. Conf. Ros. rub. per setacetum traject. & Vitriolat. ʒiv. balsum. Lucatel.

3ij. Bol. Armen. Sang. Dracon. Spec. Electuar. Diacoral. an. 3j. Syr. è Coral. q. s. ut f. Elect. de quo cap. quant. Nuc. Moschat. bis de Die, superbibendo haustum Emulsionis sequentis.

℞. Sem. Lactuc. Portulac. an. 3ij. Cidon. ʒi. Papav. alb. 3ß. Amygd. dulc. excort. n. v. contund. in mortar. marmor. sensim affundendo Aq. Plantag. ℥ij. Aq. Cinnam. Hord. 3ij. Colat. add. Sacch. q. s.

His remediis, favente numine, æger intra septimanas tres à Febre & horrendis illis quæ memoravimus symptomatibus liberatus, Petechiis abolitis, atque urina tum colorem naturalem, tum consistentiam recipientem, paulatim ad sanitatem & vires pristinas rediit.

Quamvis autem symptomata ista jam dicta Febri continuæ accrescerent, non verò illi morbo, de quo nos supra egimus; cum tamen quoties utrumlibet ea comitantur, a vehementi inflammatione & sanguinis nimî attenuatone, unde sanguis per oscula vasorum quasi vi exigitur, semper ortum ducant; nullus dubito quin par Methodus in tantâ causarum paritate omnino sit adhibenda, quantum sc. fert utriusque morbi Genius. Quamobrem Virum Optimum rogabam, ut mihi per illum liceret hanc ejus Curationem hic subnectere. Quam quidem si quis vel mihi insensissimus, (cum autem alienos mores è propriis æstimans, nullum inimicum habere sperem) præstiterat, tamen veritate victus, præclarissimam eam fuisse omnium, quas unquam novi, curationum, lubens faterer: quum jamdiu compertum habeam quam sit fatale Febricitantibus sanguinem cum Urinâ excernere. Cum verò idem amicitiam mihi sit conjunctissimus, quantò cum animi proliubiò & Veritati & Viri Amantissimi famæ mihi litandum erat. Hic enim ille est, qui cum pauci admodum me vel minimum quid in re medicâ sive indagandâ, sive etiam excolendâ profecisse asserere auderent, maledicorum torrenti se medium obicere sustinuit, atque me pari zelo ac fide tutabatur, quo Parentem Filius. Quantumlibet autem beneficio tam insigni devinctus, nunquam tamen nisi eas, quas commeruit laudes, prædicarem, cum perinde fere sit improbum sive opprobrio, sive laudatione indignos afficere, quandoquidem utrinque à veritate discedatur. Nemo itaque mihi vitio vertat, si Virum hunc ego nemini, inter eos qui mihi hætenus innotuere, probitate secundum fidenter affirmaverim, cum in tot annorum spatio, quibus eo familiariter usus sim, nec dicto quemquam lædere, quanto minus facto, sibi permiserit. Quantum verò in ea quam profitetur Arte præcellat, modo Deus vitam ei concesserit, brevi satis elucescet; cum Eruditioni haud vulgari, quâ omnes Medicinæ tam Antiquæ quam Modernæ tractus perlustraverit, exquisitissimam in subtilioribus Praxeos minutis indagandis solertiam (sine qua nemo unquam Medicinam merita cum laude faciet) cautus attulerit: Unde etiam Aegrorum suorum votis, Bonus Felixque cum primis respondet.

Hæc demum sunt quæ ipse de hoc morbo sentio, quæ non mihi suggestit phantasiæ imaginatricis temeritas, sed Phænomena Practica edocuere.

Neque

Neque sanè capio, quì fieri possit, ut fallatur is, qui cogitationes suas omnes mera ac nuda ejus sive Artis sive Facultatis Praxi limitat & determinat, quam sibi perdiscendam & cum laude exercendam proposuit: aut è contrà quì possit fieri, ut non tam in ipso se, quam in aliis decipiendis omnes vitæ annos prodigat ille, qui in iis excogitandis operam disperdit, quæ cum Praxi nihil prorsus habent commune. Et sicuti haudquaquam faustus probusve *navis ad Clavum Gubernator* fuerit ille, qui non tam ad breviam & saxa submarina agnoscenda evitandaque, quam ad causas Fluxus Refluxusque maris speculandas animum adverterit, (quod quidem cum Philosopho sit dignissimum, ab eo tamen perquam est alienum, cui id tantum negotii datum est ut navis non submergatur) ita neque Medicis, cui non alia quam curandorum morborum provincia decernitur, quantumlibet ingenio cæterisque animi dotibus valeat, in Arte verè Medica proficiet, qui non tam in occulta & tortuosa illa Methodo, qua Natura morbos parit alitque (a qua etiam eorundem Historia pendet) indaganda, atque in remediis eidem adaptandis omnes animi vires intendat, quam in curiosis & *παραπρος* speculationibus cerebrum fatiget, ad homines orco eripiendos (quod spondet Medicina) ne hilum facientibus. Quæ quidem prævaricatio non solum in causa est, quod genus Humanum commodis illis & emolumentis privetur, quibus a plurimorum ingenio, animique dotibus augeri potuisset, sed etiam effecit tandem, ut quæ Medica appellatur, revera Confabulandi Garriendique potius sit Ars, quam Medendi. Atque eo tandem devenum est, ægris vivendum moriendumve sit, prout Philosophus vel conjectando scopum attigerit, vel ab eodem aberraverit, quod in lubrico semper est atque ancipiti, cum primi isti speculationum repertores, non minus quam eorum mancipia, & servum pecus, de cerebro istis commentis bello quasi internecino invicem digladiantur, attamen nemo fortasse omnium ipsam veritatem assequatur. Quamvis enim, si mentem serio applicuerimus, quid de facto agat Natura, & quibus in operatione sua utatur organis deprehendere valeamus, modus tamen quo illa operatur, mortales, aut ego fallor, semper latebit. Neque hoc mirum est, cum longè (imò supra omnem humanum captum longè) credibilis sit nos misellos homunciones ab illustri vitæ lucisque regione exulantes, methodum qua in fabricanda machina usus est sapientissimus Artifex, capere nullatenus posse: quam Fabrum Ferrarium rudem prorsus & imperitum, nescire quo pacto concinnetur Automaton Horarum index, cujus structura & motus exquisitissimam artis elegantiam præ se ferunt. Sicuti de facto constat Cerebrum omnis tam Sensus quam Motus fontem esse, tum etiam & Cogitationum & Memoriae officinam, & tamen non est possibile a diligentissima ejus inspectione contemplationeve mentem usque adeo illuminari, ut intelligere possit, quo pacto substantia ita crassa & quasi pulpa quædam, neque operis, ut videtur, usque adeo affabrè elaborati, usui ita nobili & facultatibus tam præcellentibus queat sufficere; neque exinde assignare quis potis est, qua ratione ex

naturæ

naturæ ejus vi & structura partium, siue hæc siue altera ista facultas necessario fuerit exerenda.

Atque hæc de Variolis Confluentibus : Quibus si adduntur quæ in Historiâ Morborum Acutorum de hoc affectu traditi, summam habes eorum quæ mihi hætenus innotuere, eaque omnia diligentissime quod à me fieri potuit, trutinata atque expensa.

Accingo me jam (quoniam tu id postulas, Vir Eruditissime) ad ea exponenda, quæ de *Affectioibus Hystericis* hætenus observatione comperi. Quas quidem, perobscuram & difficilem, præ cæteris qui homines vexant, morbis, diagnosin habere, tum etiam ægrius curationem admittere, lubens fateor. Attamen ut potero morem ubi geram, ea, quæ Epistolæ convenit, brevitate, quam sanè à me exigit valetudo infirmior & quasi vacillans, hac præsertim anni tempestate, qua mihi verendum est, ne si pertinacius cogitationibus indulsero, Podagræ mox paroxysmum accersam. Paucis itaque expediam, quæ hic habeo dicenda, methodo, qua uti soleo, insistens; brevem sc. morbi Historiam tradens secundum vera Naturæ Phænomena, tum etiam medendi rationem subnectens quæ mihi optimè cessit; quamque non tam librorum lectio, quam experientia propria, Magistra hæudquaquam infida, jam olim suggessit.

Hic morbus, si rectè calculum pono, Chronicorum omnium frequentissime occurrit; & sicuti Febres cum Appendicibus suis duas partes Tertias, ad Chronicos morbos simul sumptos si comparentur, complent; ita Affectus Hystericus (vel isti saltem qui eo nomine insigniuntur) ad reliquæ partis Tertię dimidium assurgunt, hoc est, Chronicorum pars media sunt: Foeminarum enim paucissima (qui sexus Adultorum dimidia est pars) ab omni horum affectuum specie prorsus liberæ sunt, si istas excipias, quæ laboribus assuetæ durè vitam tolerant. Quin uno non pauci ex iis Viris qui vitam degentes sedentariam chartis solent impalescere, eodem morbo tentantur. Et quamlibet omnis retrò Antiquitas symptomata illa Affectibus Hystericis adnascentia Utero semper vitio verterit, si tamen *Affectiones Hypochondriacas* vulgò dictas, quas Splenis aut Viscerum nescio quorum obstructioni imputamus, cum mulierum Hystericarum symptomatis conferamus, vix ovum ovo similis, quam sunt utrobique Phænomena, deprehendemus. Neque tamen reticendum est, Foeminas multo crebrius hoc morbi genere corripì quam solent Mares, non quod se Uterus magis male habeat quam alia quævis corporis regio, sed ob causas infra explicandas.

Sed nec spectabilior est hujus morbi frequentia, quam varietas illa multiformis qua se ostendit, & nullos fere non æmulatur ex iis affectibus quibus atteruntur miseri Mortales. Quamcunque enim corporis partem insederit, symptomata, qualia ei competunt parti, statim producit: Et nisi Medicus tam sagaci quadam solertia & *senonni*, quam in Arte peritia valeat, fraus ei fiet, atque isti symptomata à morbo aliquo essentiali hujus vel illius partis, non verò ab affectione HystERICA, pendere arbitrabitur.

Quan-

Quandoque v. gr. *Capitis* arcem occupans, *Apoplexiam* facit, quæ similiter *Hemiplegia* solvitur, eam omnino referens *Apoplexiam*, qui tum ætate, tum mole corporis grandiores siderantur, & quæ ex eo nascitur, quod, *Cerebri* *Cortice* pituitæ copii referto ac scatente, *Spirituum* animalium meatus ac semitæ intercludantur: à qua quidem causa, quæ feminis *Hystericis* accidit *Apoplexia*, oriri nullatenus videtur, cum eandem haud infrequens adoriatur confestim à partu, magni sanguinis vi simul ejecta, & vel partui laboriosiori, vel vehementiori alicui animi commotioni debetur.

Quandoque *Spasmos* horrendos gignit, *Epilepsiæ* per similes, *Ventre* & præcordiis guttur versus intumescenibus, & nixus ita fortes edente ægra, ut licet alias mediocrium tantum fuerit vitium, jam omni adstantium ope vix retineri queat, incondita interim atque inarticulata quædam vociferans, & pectus feriens. *Fœminæ*, quibus hæc species, quæ *uteri Strangulatus* vulgo audit, familiarior est, temperamento sunt ut plurimum plusquam solet sanguineo, & habitu corporis ad *Viragines* accedente.

Nonnunquam *exteriorem Capitis partem* occupat, *Pericranium* inter *Craniumque*, dolorem vix tolerabilem adferens, in quadam tantum particula quæ transverso pollice contegi possit, jugiter defixum. Dolorem hunc etiam comitantur *Vomitiones* enormes. Hæc species *Clavus Hystericus* mihi est, illas præ cæteris fatigans, quæ *Chlorosi* laborant.

Nonnunquam in *partes* incidens *vitales*, ita vehementem *Cordis Palpitationem* excitat, ut quæ eam patitur *fœmina* pro indubitato habeat, sonitum *Cordis* in *Costas* arietantis etiam ab adstantibus omnino debere percipi. Hæc species eas maxime infestat, quæ extenuato sunt corpore, & crasi minus firmi, quæque *Extabeicentium* pene formam præ se ferunt; tum etiam *Juvenículas* *Febre Albi* pallecentes.

Nonnunquam *Pulmones* oblidet, unde æger creberrime tussit & fere sine intermissione, nihil prorsus expectorans: & quantumlibet hæc *Tussis* species non ita valido nili thoracem concutiat atque illa quæ *Convulsiva* dicitur, *Explosiones* tamen longe frequentiores sunt, æger præterea non ita sensu valet. Hæc autem *Tussis Hystericæ* species oppido rara est, *fœminas* pituita scatentes præ cæteris exagitat.

Nonnunquam in *Colon*, & regionem *Scrobiculo Cordis* subtensam impetum faciens, dolorem vix ferendum infligit, *Iliacæ Passioni* haud absimilem, ubi ægra immodice vomit, colluviem quandam viridem, *Bili*, quam *Porraceam* appellant, fere parem, nunc etiam insoliti alicujus coloris, rejiciens. Sæpe etiam postquam ægra ad multos dies jam dicto dolore, (qui vel *Stoicorum* *anæsthesia* expugnaret) & continuo vomitionis conatu tantum non fuerit enecta, tandem *Ictero* intensione omnem corporis superficiem ad instar *Croci* tingente, solvitur *Paroxysmus*. Ægra interea diris mentis angoribus pressa, omnem recuperandæ *Sanitatis* ipem prorsus abjicit: quæ quidem animi dejectio & quasi *desperatio* quædam, non magis, quantum

ego observavi, ab hac Hystericorum Affectuum specie sejungitur, quam sive dolor, sive Vomitus præmemorati. Atque hoc genus in istis præcipue locum habet, quæ corporis habitu laxiore crudoque sunt, tum & in his, quæ Infantes grandiusculos, cum ingenti sui & naturalium vitæ flammæ dispendio, sunt enixæ.

Quandoque hoc malum in alterutrum ex *Renibus* incurans, atrocissimo quem illic parit dolore, *Paroxysmum Nephriticum* omnino mentitur, idque non solum doloris genere locoque quo sævit, sed & adictis Vomitionibus immanioribus, tum etiam nonnunquam ex eo, quod dolor per Ureterum ductus propagetur. Ita ut ægrè admodum dignosci queat, utrum hæc symptomata ab incluso Calculo, an verò ab affectu aliquo Hysterico enascantur, nisi fortè Casus aliquis acerbior ægræ animum paulo antequam corriperetur discrucians, aut materiæ viridis per vomitum rejectio, symptomata ista Affectioni potius Hystericæ quam Calculosæ tribuenda esse docuerint. Sed neque *Vesica* ab hoc Pseudosymptomate atque eментito Affectu immunis est; cum non tantum ipsa ab eo doleat, sed & Urina supprimatur, perinde ac si Calculus eam obstrueret, qui tamen nullus est. Rarissimè autem cernitur postrema hæc species Vesicam attingens, quæ verò Renum calculum imitatur, non ita raro. Utraque eas solet invadere foeminas, quarum vires repetitis sæpè paroxysmis Hystericis jam fractæ sunt, & sanitas corporis detrita.

Nunc in *Ventriculum* decumbens, continuas *Vomitiones* excitat, nunc etiam *Diarrhæam*, quoties scil. in Intestina effunditur: at neutrum horum symptomatum sequitur dolor, licet in utroque persæpe compareat dictus ille succus viridis. Utraque hæc species iis familiaris est, quas frequentiores paroxysmi Hysterici debilitaverunt.

Atque ut hic morbus omnes ferè partes *Internas* infestat, ita etiam nonnunquam & *Exteriores*, carnemque musculosam occupat, *maxillas* sc. *humeros*, *manus*, *crura*, *tibias*, nunc dolorem adducens, nunc tumorem: in quo genere is qui tibias distendit tumor præ reliquis conspicuus est. Cum enim in Hydropicorum tumoribus duo hæc semper observari possint, ut tumor sc. sub vespèram se majorem exhibeat, tum etiam ut postea instar mædientis, vestigium digiti fortius impressi formamque referat; jam in hoc altero, tumor matutino tempore protuberantior est, nec digito cedit prementis, aut vestigium ullum manet. Plerumque etiam tibiæ alterutram tantum inflat: de cætero sive magnitudinem spectes, sive etiam superficiem Hydropicorum tumores ita ad amissim æmulatur, ut ægrè se haud facile ab ea quæ inedit sententia, dimoveri patiantur.

Sed neque ipsi *Dentes* (quod vix credas) ab hujusce morbi insultu se possunt defendere; licet neque vel minima cavitas, neque humoris alicujus defluxus, saltem qui percipi queat, doloris sive ansam præbuerit, sive vehiculum; qui nihilominus nec mitior est, nec contractior, aut expugnata facilior. Isti verò tum dolores, tum tumores, quibus afficiuntur,

tur, partes exteriores, quas supra memoravimus, eas præcipuè foeminas adoriuntur, quæ, longâ paroxysmorum Hystericorum ferie ac impetu violento tantum non exanimatæ, vitam ducunt vix vitalem.

Inter omnia verò morbi hujus tormenta, nullum se tam crebrò ingerit quàm *dolor in Dorso*, quem certo certius persentiscunt, quotquot vel levissimè hoc affectu tanguntur. Quin imo id habent effectum commune dolores prædicti, quod illa, cui inhæserant regio, etiam post eorum discessum, tenera sic & quasi fustibus probe fuerit dedolata, tactum refugiat; quæ quidem teneritudo sensim evanescit.

Hoc interim observatu dignissimum est, quod non rarò notabilis quædam *externarum partium refrigeratio*, symptomatis his omnibus viam quasi sterinit, & plerumque non nisi paroxysmo finito dispellitur: quam quidem refrigerationem haud semel isti ferè, quâ rigent cadavera, parem comperi, pulsus nihilominus rectè se habente.

Addo, quod Hystericæ ferè omnes, quotquot ego hætenus tractavi, de *spirituum* dejectione sive *subsidentia* (ut cum illis loquar) conqueruntur; pulmonis regionem indigittantes, quoties locum, in quo hæc spirituum contractio seu subsidentia sentitur, volunt designare.

Demum mulieres Affectione Hystericâ laborantes, nunc in *risum* effundi, nunc in *lachrymas* pariter immodicas solvi, nullâ *προφάσει* manifestâ, sive illum, sive has extorquente, nemini non est notum.

Inter omnia verò, quæ in hoc morbo comparent Phænomena, illud maxime proprium est, atque ab eo ferè inseparabile, quod sc. ægræ *urinam* subinde reddant planè *limpidam* ad instar aquæ e rupibus scaturientis, idque satis copiosè; quod quidem ego sigillando percontando, in omnibus ferè didici signum esse Pathognomonicum eorum Affectuum, quos in Foeminis *Hystericos*, in Maribus *Hypochondriacos* appellandos censemus. Atque in Masculis nonnunquam observavi, quod mox ab excreto lotio coloris Citrini (imò verò proximo temporis momento) violentiori aliquo animi motu derepente percussi, statim urinam, CrySTALLUM claritate æmulantem, magnâ copiâ & impetu diu continuato ejecerint, eò usque se malè habentes, donec urina pristinum colorem induerit, & paroxysmus simul evanuerit.

Quin & omnibus tam Hystericis, quàm Hypochondriacis, quibus scilicet jam malum inolevit, id accidit, ut *flatus* quandoque *nidorosos* e ventriculo emittant, quoties aliquid comederint, licet moderatè tantum & proratione appetitûs, tum etiam aliquando *acidum* eructent, acetum sapore referens, quoties in os ascenderit: læsâ nempe utrobique concoctione, & succis proinde à naturali statu interversis.

Neque hoc tantum nomine infelices sunt, quod corpus ita malè affectum & quasi conquassatum, ad instar ædium ruinas undiquaque minitantium, tantum non corruat & fatiscat, cum magis adhuc animo ægrotent, quàm

corpore; Cum enim desperatio planè insanabilis de huiusce morbi natura sit, indignantur admodum quoties aliquis vel minimam de sanitate recuperanda spem injecerit; facile interim credentes omnia sc. quæcunque in homines cadere possunt incommoda, quæque adeò fert rerum natura, perpeffuros, tristissima quæque sibi ominantes, atque timorem, iram, zelotypiam, suspiciones, & si quæ atrociora sunt animi pathemata, vel ex levissima, vel etiam nullâ datâ ansâ, arripientes, & sinu foventes irrequieto anxioque; ab omni interim gaudio, spe, lætitiâ abhorrentes: quæ si fortè occurrant, quando hæ raræ aves sunt, velocissimè avolant, animum interim haud minus vehementer exagitantia, quàm solent moestiora illa *πένθος*, ita ut nullibi mediocritatem servant, in una levitate constantes; nunc amant præter modum, mox odio eisdem sine causa prosequuntur: nunc hoc illudve sibi agendum proponunt, mox à proposito resiliunt, & quod cum eo pugnat, aggrediuntur, sed neque hoc peragunt, ita animi pendentes, ut nunquam liceat quietam mentem consistere. Quodque de Superstitiosis asserit Orator Romanus, nostris hisce Melancholicis pulchrè quadrat, *Perfugium videtur omnium laborum & sollicitudinum esse somnus, ac ex eo ipso plurimæ curæ, metusque nascuntur*; cum funera tantùm in somniis, & denatorum Amicorum umbræ repræsentantur. Ita tam animo quàm corpore excarnificantur, quasi hæc vita omnis Ignis esset Expurgatorius, in quo scèlera alio in statu perpetrata jam luerent atque expiarent. Neque hoc tantùm Maniacis accidit & furiosis, quos dicimus, sed etiam illis, qui, si hos animi impetus excipias, prudentiâ ac judicio valent, quique & meditationum profunditate, & sapientiâ orationis longè eos superant, quorum mentes his cogitationum aculeis nunquam fuerint excitatæ. Ita ut non sine ratione observaverit Aristotèles, Melancholicos cæteris ingenio præstare.

At verò tam horrendus animi status, qualem supra delineavimus, non aliis competit, quàm iis, qui diu multumque cum hoc morbo conflictati, tandemque subjugati quasi victas manus dant, maxime si res adversæ, animi moerores, sollicitudinesve, nimia in literarum studio assiduitas, atque animi contentio, cum prava corporis diathesi conspirantes, oleum camino adjecerint.

Dies me deficeret, si omnia quæ affectus Hystericos gravant symptomata enumerare velim; tam diversâ atque ab invicem contrariâ specie variantia, quàm nec Proteus lufit unquam, nec coloratus spectatur Chamæleon. Proinde rectè mihi videtur rationem subduxisse *Democritus* (quantumlibet in morbi causa hallucinaretur) ubi in Epistola ad Hippocratem missa disertè asserit: *Sexcentarum ærumnarum, innumerarumque calamitatum authorem esse Uterum*. Neque tantùm multifaria sunt ista, sed nec regulâ aliquâ aut Typo uniformi se contineri patiuntur, quod in aliis hominum affectibus tamen usu venit, sed quasi farrago sunt quædam *φαινομένων* incomposita atque inordinata, unde perarduum est hujus morbi Historiam describere.

Causæ autem hujus morbi *Procatareticæ* seu externæ, vel sunt vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius, violenta quædam animi commotio à repentino aliquo, sive iræ, sive doloris, sive etiam timoris, & similium Pathematum insultu. Quoties itaque me consulunt Fœminæ de hoc illove corporis affectu, cujus ratio è vulgaribus Morborum dignoscendorum Axiomatis nequeat reddi, nunquam non diligenter ab eis exquiro, An non eo de quo conqueruntur malo, tum præcipue fatigentur, cum tristitia, ærumna, aut alia aliqua perturbatio eas malè habeat; quod si annuerint, jam satis superque mihi constat morbum in hac, de quâ agimus, Tribu censendum; præsertim verò si diagnosi id clariùs illustrèt, quod sc. certis aliquot temporibus urinam limpidam & CrySTALLI æmulam, eamque copiosam simul excernant. His verò animi motibus, qui usitatiores sunt hujus morbi *εποφάσεις*, accedunt vel Stomachi vacuitas ab inediâ pertinacior, vel nimix humorum evacuationes, sive à sanguine intemperanter effuso, sive ab Emetico, aut Cathartico, cui impares erant ægræ vires.

Jam verò ab hac totius morbi imagine, secundum vulgatissima ejus *φαινόμενα* depicta, proximo loco ejus *Causæ Efficientes internæ* sive *επενεχόμενα* mihi veniunt pensitandæ, quantum eas, ex omnibus quas descripsimus Circumstantiis simul junctis, expiscari valeam. Pendent ergo Affectiones istæ, quas in fœminis Hystericas, in maribus Hypochondriacas insignire libet, quantum ego judico, à spirituum Animalium *ἀταξία*, unde facto impetu in hanc illamve partem plus quam pro ratâ densi nimique feruntur, spasmos uti & dolorem excitantes ubi in partes sensu exquisito præditas irruunt, atque organorum, tum ejus in quod se ingerunt, tum istius à quo abscedunt, functiones pervertentes; cum utrumque ab hac tam iniquâ partitione, quæ naturæ œconomix penitus adversatur, haud parum detrimenti capiat.

Cujus quidem *ἀταξίας* origo atque *causa Antecedens*, est debilior dictorum Spirituum Crasis, sive nativâ ea fuerit, sive etiam adventitia, unde quavis *εποφάση* dissipatu faciles sunt & eorundem systema nullo fere negotio dirimitur. Quemadmodum etiam *Homo* quidam *Exterior* conspicitur ex partibus sensui obviis compaginatus, ita procul dubio & *Interior* est quidem Homo è debitâ spirituum serie & quasi Fabricâ constans, solo rationis lumine contemplandus. Hic verò cum temperiæ corporis intimiùs conjunctus & quasi unitus, tanto ægrius faciliusve de statu suo deicitur, quanto major est minorve ea, quam à natura sortimur, Principiorum constituentium firmitas. Quamobrem Fœminas longe plures quam Masculos hic morbus aggreditur, quoniam videlicet istas natura magis delicatulo rarioreque habitu (ceu vitæ molliori, & hominum deliciis destinatas) blanda donavit; Mares autem toroso corporis robore, utpote qui laboribus exantlandis in tellure colendâ, & repastinanda, & feris, quibus alantur, capiendis, aliisque similibus, apti nati sint.

Dictam autem Spirituum *ἀταξίαν* hujus morbi causam esse, Phænomena jam descripta satis probant; quorum præcipua tantum attingam; à no-

tissimo illo Affectu Hyfterico, qui *Uteri Strangulatus* vulgò dicitur, initium faciens. Hic jam Spiritus, factò, quasi agmine in ventre inferiore, catervatim magnoque impetu in fauces irruentes, spasmos excitant per omnem quam transeunt regionem, ventrem inflantes ad instar Globi prægrandis, qui tamen nihil aliud est quam partium spasmò tentatarum convolutio & quasi conglobatio quædam, quæ non nisi magnâ vi reprimi potest & coerceri. Partes interim externæ mallaque carnea à spiritibus, jam aliò raptis, magnâ ex parte destitutæ, eo usque frigescunt persæpe, non in hac solâ Affectûs Hyfterici specie, sed in aliis omnibus, (quod prius adnotatum) ut cadavera non frigeant magis. Pulsus interim qualis sanarum est, nec ægra ab hoc frigore de vitâ periclitatur, nisi illud ab evacuatione aliqua enormiori præcedente originem ducat.

Idem etiam dici potest de violentiori isto Affectu Hyfterico, qui externa facie *Colicam Biliosam*, vel etiam *Passionem Iliacam* æmularur: in quo ægra dolore vix tolerando in regione Cordis Scrobiculo circumposita, unâ cum immâni materiæ herbam colore referentis, evomitione, discruciat. Quod quidem symptoma haud al unde nasci existimo, quam à vehementi spirituum densè conglomeratorum in dictas partes impulsu, unde & spasmus, & dolor, & earum totalis facultatum subversio.

Neque ex eo quod ista quæ in hoc Affectu sive per os, sive per sedem egeruntur, colore quandoque viridi tingantur, statim conficitur morbum hunc in humoribus residere, aut atrocissimum illum dolorem ab humoris aliqujus acrimonia partem cui inhæret dilanantis, produci; quem idcirco pro minera morbi habeamus, ac proinde Remediis tam αἰώ quam κατὰ Cathartics radicitus extirpandum censeamus. Etenim de facto constat, ægritudinem illam, qua laborant Navigantes (a spirituum animalium agitatione ortam, in fluctuanti ac irrequieto mari) colluviem coloris planè herbacei ex hominum vel sanissimorum ventriculo exantlare, ut primum in mare longius sunt proVecti, quibus tamen ante semihoram ultimò elapsam non inerat Bilis hæc, quam Porraceam appellare libet. Annon & Infantes in Paroxysmis Convulsivis, in quibus spirituum Animalium maxime res agitur, tam per superiora, quam per inferiora materiam ejusdem planè coloris ejiciunt? Quibus addendum est id, quod experientia ferme quotidiana docet, sc. quantumlibet ejusmodi sive foeminas, sive infantes iteratâ Catharsi exhauferimus, attamen color jam dictus in eis, quæ vel per vomitum, vel per sedem exeunt, usque visetur. Quin etiam à Pharmacis tam Emeticis quam Cathartics frequentius propinatis uberior materiæ viridis nascitur seges, cum ab utroque genere spirituum ἀταξία provehatur: quæ vel, nescio quo modo istarum partium fermentum destruit ac pervertit, vel in ventriculum intestinaque vi spasmorum succum aliquem alienæ indolis intorquet, qui humores ejusmodi coloribus inficere potis est. Chymiciæ Sectatores, licet nondum ita bene cum illis sit, ut quæ in Organis suis πολετέχνοις Medicamenta elaboraverint, majus aliquid in morbis debellandis

landis præstent, quàm quæ contunduntur in Mortario, vel in Ollâ decoquuntur, tamen curiosorum *περιεργία* eo usque gratificari norunt, ut duos liquores æque limpidos clarosque ostendentes, ex iisdem invicem commissis saturatum colorem aliquem, quasi præstigiantes, possint exhibere. Et profectò, ita lubrica est & evanida Colorum speculatio, ut nihil certi ex illis, de corporum in quibus apparent naturâ, queat deprehendi. Neque magis sequitur ea quæ colore viridi sunt, acria esse omnia, quàm omnia quæ sunt acria, viridi esse colore. Re itaque undique perpensâ, satis liquet dolorem immanissimum qui hâc Colicâ Hystericâ laborantes penè exanimat, tum etiam materiæ viridis rejectionem, à Spiritibus nimio impetu in partes sub cordis Scrobiculo positas incurfantibus, atque easdem spasmo contrahentibus omnino excitari.

Huic etiam Spirituum enormitati tribuendum est symptoma istud, quod superius *Clavi Hysterici* nomine indigitavi, in quo Spiritus ab omni corporis ambitu in certo Pericranii quasi punctulo concentrantur, dolorem haud minùs perterebrantem, quàm si Clavus ferreus in caput vi adigeretur, accersentes, unâ cum insigni materiæ viridis evomitione. Quæ quidem Spirituum ab universo corpore quasi in punctum contractio non multum abluat ab istâ radiorum Solis collectione, quæ fit ope Vitri Incensorii: utque hi vi unitâ exurunt, ita & isti ob eandem rationem dolorem infligunt, membranas quasi diserpentes lacerantesque junctis viribus.

Deinde ab hâc inordinatâ Spirituum agitatione sanguinem perturbante, exoritur Symptoma illud, tam Hystericis, quàm Hypochondriacis haud insolens, ut suprà notavimus, quod nempe sæpenumero *urinam* reddant *claram* limpidamque simul & copiosam: cum enim sanguinis œconomia subinde interpellatur, quod importatur serum satis diu retinere nequit æger, sed illud priùs dimittit, quàm istis particulis salinis, quarum opè color ad Citrinum traduci debuerat, imprægnari potuerit. Cujus rei quotidianum habemus experimentum in eis, qui, cum plus satis liquoris, maximè tenuioris atque attenuantis, ingurgitaverint, lotium mox limpidissimum excernunt. Quo in casu sanguis ab ea feri quantitate, cui retinendo prorsus impar est, planè devictus, illud omnino limpidum amittit, nec dum à corporis succis infectum, ob moram iusto brevior.

Tertius jam agitur annus, à quo Nobilis quidam me sibi Medicum volebat, qui *Colicam Hypochondriacam* pati mihi videbatur, ad *Passionem iliacam* fere accedentem doloreque & vomitu enormiori; quo morbo diu multumque fuerat vexatus, & tantùm non fractus. Per omnem morbi decursum sedulus animadverti, quod ubi pessime se habuerit, *urina* limpi-da & exors coloris semper fuerit, quando verò paulo melius, ad Citrinum vergeret illa. Hunc die quodam adiens, *urinam* conspexi quam tribus vicibus excreverat, in Matulis totidem reservatam, Citrino colore præditam; lætus ipse hilarisque cibum ex *εὐπείροις* aliquem jam assumere medi-

meditabatur, invitante, quod mihi dicebat, appetitu : in quo temporis articulo superveniens quidam eo usque bilem commovebat, ut extemplo ægro-
tans, Matulam deposceret, quam urina limpidissima crySTALLUM colore æmu-
lante, ferè implevit.

Fortè etiam à Spiritibus sanguinem ita molestantibus pendet *Ptyalismus* ille Hystericis familiaris, cum ad multas Septimanas salivam expuant tenuem, perinde ac si Unguento ex *Mercurio* fuerint delibutæ : durante enim hoc turbido sanguinis statu, in quo excretionibus ad naturæ methodum exigendis impar is est, ferum motum hunc inversum fortè sibi vendicans non jam in Renes pro lege naturæ exoneratur, sed per arteriarum extremitates in glandulas deponitur, & per *Ductus salivales* salivæ forma prodit. Idem dici potest de nocturnis istis sudoribus, quibus fœminæ Hystericæ nonnunquam profunduntur, qui non ab alia causa fluunt, quàm à feri sanguinis diathesi, quæ in corporis habitum gestit effundi, ob modò memoratam sanguinis *ἀταξία*.

Frigus quod attinet, quo toties algent partes externæ in Affectibus Hystericis, luce clarius est, illud ex eo accidere, quòd Spiritus suam in illis stationem deferentes, nimio opere in hanc illamve partem inferant : Nec est dubitandum, quin tam *Fletus*, quàm *Cachinnus*, quem tollunt haud rarò Hystericæ, etiam nulla data ansâ, à Spiritibus Animalibus procuretur, Organa, quæ his functionibus Animalibus inserviunt, magna vi pulsantibus.

Obiter dicam, Mares etiam, quamvis rariùs id eveniat, Fletui ex nulla *ὑποφάσει* quandoque obnoxios reperiri. Accersabar aliquando ad Virum tam ingenio, quàm genere nobilem, qui nonnisi paucis diebus à Febre convaluerat, alterius Medici consilio usus, qui & sanguinem detra-
xerat, & pharmacum Catharticum ter exhibuerat, tum etiam carnibus illi interdixerat. Hunc ubi vestitum conspexerim, & de rebus quibuscumque cum judicio differentem audierim, rogabam quorsum me conveniret; respondit Familiaris quidam ejus, modò expectarem paulisper, res ipsa loqueretur; confidens itaque & sermones cum ægro trahens, mox observavi labrum inferius pendulum protrudi cum motitatione crebrâ, (uti solent Infantes morosiores fletum adornare) & exinde ægrum in tantas solvi lachrymas, quantas vix aliàs vidi unquam, cum gemitu ac suspiriis tantum non Convulsivis. Qui tamen repentinus torrens non ita multò post detumuit prorsus. Hanc ego Affectionem à spirituum *ἀταξία*, (partim à morbi diuturnitate, partim ab evacuationibus, quas *ὑποφάσει* necessario exigebat, ortâ) pendere existimabam : partim etiam ab exinanitione, & abstinentiâ à carnibus, quam etiam ad dies aliquot posteaquam convaluerat, imperaverat Medicus, quo eum à recidivâ præstaret securiorem. Hinc eum pronunciaui extra omnem Febris aleam jam constitutum; symptomataque prædictum, inanitioni tantum deberi, ac proinde suadebam, ut pullum Gallinaceum assum in prandium juberet parari, & simul Vinum

modicè hauriret, quo facto, & carnibus deinceps moderatè vescens, nunquam deinceps Eletum hunc Convulsivum passus est.

Ut tandem finiamus (cætera enim, quæ in hoc morbo spectantur Phænomena, jam missa facio) ab hac ipsâ Spirituum inordinatione nascitur perturbatio illa, & varians subinde tam animi, quàm corporis intemperies, quæ tum in Hystericis, tum Hypochondriacis dominatur: cum enim utrisque desit ea spirituum firmitas, quæ in robustioribus atque iis, quorum facultates jugi spirituum vegetorum subsidio actuantur, si semper invenitur, impressiones rerum minus gratarum nequeunt perferre, sed vel irâ vel dolore subito perciti, perinde sunt irritabiles, atque illi, quorum *ἡνυμονικὸν* mollius & debilius vel natura primò procudit, aut longior ægritudinum sive series, sive mora tandem reddidit. Etenim animi robur & constantia, quamdiu hoc corporis litoris incrustatur, firmitudine spirituum eidem famulantium maximè pendet, cui quidem supremum in scâla materiæ gradum constituunt, in ipso *Entis Immaterialis* confinio positi: Cùmque Animi compages, si fas est ita dicere, longè magis affabra sit & delicata, quàm est corporis structura, utpote quæ in harmonia facultatum præstantissimarum & penè divinarum consistat, si hujus *οὐσίας* quoquomodo fuerit interrupta conturbataque, major inde consequetur ruina, quanto præcellentius erat & magis exquisitum opificium, dum integrum perstaret. Et hic quidè miserorum quos depinximus, animoque fractorum status nescit, cui malo non citius remedium adferet pertinax aliquod vel insolentissimi Stoici Decretum, quàm *ὀδοντα λυγῶν* præcaverit is, qui firmiter statuerit, se nullo modo permissurum, ut dentes dolore pertententur.

Satis itaque jam constat opinor, omnem hunc morbum ad spiritus animales non ritè dispositos referri debere; nec à semine aut sanguine menstruo corruptis; (quod asserunt nonnulli Authores) & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec à siccorum, nescio quâ perversâ depravatione, sive etiam humorum acrium congestione, ut alii volunt, sed ab iis quas modò assignavimus causis. Quòd enim morbi fomes in materia non delitescat, unica hac instantia satis elucescet. Fœmina v. g. quæ rectissimâ semper valetudine uti solet, modò delicatula sit illa, & teneriore corporis habitu, si fortè errore aliquo, sive Emetico, sive Cathartico quovis fortiore nimium fuerit debilitata exhaustaque, certo certius symptomate aliquo, ex iis, quibus hic morbus stipatur, multabitur; quod tamen ejusmodi Vomitus vel Catharsis amoliretur magis quàm invitaret, si morbi minera in humore contineretur. Idem dici potest de immodico sanguinis dispendio, sive phlebotomiâ is fuerit extractus, sive in puerperio debito copiosius manaverit, uti & de exinanitione, & justo longiore à carnibus abstinentia, quæ omnia ad Affectus Hystericos præcavendos potius facerent, quàm ad eosdem accersendos, si illorum fomes in materia aliqua involveretur: cum è diverso non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent dictæ Evacuationes.

L I. Quamvis

Quamvis autem satis pateat originarium hujus morbi fomitem in humoribus nullatenus stabulari, fatendum est tamen (quod res est) spirituum ἀραξίαν illam, cui morbus debetur, humores putridos in corpore coacervandos gignere, cum tam illarum partium functio, quæ vehementiori spirituum impulsu distenduntur, quàm earum, quæ illis privantur, omnino pervertatur. Cumque harum pleræque *Organa* sint quasi *Separatoria*, excipiendis Cruoris recrementis designata, si earum functiones quovis modo lædantur, fieri non potest, quin ingens sæculentiæ colluvies accumuletur; quæ quidem eliminata fuisset, totaque proinde sanguinis massa depuratio facta, modò singula organa munus suum explevissent, cui nullo modo defuissent, si debita spirituum œconomia universa invigorasset. Huic ego causæ adjudico *Cachexias* insigniores, ἀνορεξίαν, sive *Appetitus prostrationem*; in Juvenulis *Chlorosin*, sive *Febrim albam*, (quam quidem *speciem* esse *Affectionis hystericae* nullus dubito) aliamque omnem malorum Lernam, in qua immerguntur *Misellæ*, quotquot hoc morbo diu elanguerunt, quæ omnia à succis putrescentibus in sanguine congestis, atque exinde in organa varia depluentibus, succrescunt. Hujus farinae est *Hydrops Testium* in foeminis, quæ jam diutius affectu *Hysterico* laboraverint, natus à succis depravatis è sanguinis massa in Organa rejectis; unde perversis eorundem facultatibus, primò steriles fiunt mulieres, & destruitur prorsus œconomia partium, indeque serum & sanies gignuntur, quæ non tantum *Nodulos ovaque Testium* inferciunt, sed etiam in *Tunicarum* interstitia se insinuantia, *Testes* in molem ingentem elevant, quod in earum dissectionibus cernitur, quæ hoc morbo pereunt. *Diatheſis* interim *Hysterica* horum aliorumque humorum similium causa est primaria, quamlibet ejusdem cum illa *Profapiæ* non fuerint.

Quemadmodum in *Febre quartana*, quâ vel pancreaticè valens quispiam corripitur, si modò duos tresve dies in locis paludosis ac lacustribus egerit, primò, spirituosum quoddam μίasma morbi hujus sanguini imprimitur, quod diuturnius inhærens, læsa tandem naturæ œconomia, omnes corporis succos inquinat, alienâ prorsus indole eos imbuens, unde æger (maximè si ætate grandior fuerit ac in senium jam vergat) *Cachexiis* aliisque malis obnoxius redditur, quæ *Febribus Intermittentibus* diu affligentibus superveniunt. Quæ tamen *Febres* non sunt profligandæ remediis, quibus rectissimè expurgantur hujusmodi humores, sed *Specificis* iis, quæ abigendis istis *Febribus* immediatè dicantur.

Ex omnibus, quæ nos hætenus congeſſimus, abunde mihi constare videtur, præcipuam in hoc morbo *Indicationem Curativam* eam esse, quæ sanguinis (qui spirituum fons & origo est) corroboracionem indigitat; quo factò spiritus invigorati eum fervare possint tenorem, qui & totius corporis, & singularum partium œconomia competit. Cum vero hæc spirituum ἀραξία (quod suprâ fieri posse concessimus) morâ longiore humores vitiaverit, è re fuerit eosdem jam corruptos & *Phlebotomia* & *Catharsi* prius imminuere, modò ægræ vires permiserint, quàm ad sanguinem corroborandum nos accingamus:

cingamus : quem quidem scopum vix assequi poterimus, quamdiu fœculenta humorum colluvies se mediam, quasi obicem, interposuerit. Quandoquidem autem *Dolores* atrociores, *Vomitiones* & *Diarrhææ* enormes ita nonnunquam effereſcant, ut inducias non ferant usque quo primariæ illi fortificandi sanguinis intentioni possit satis fieri, quandoque ab effectis consopendis (missâ aliquantisper causâ) Curationis tela necessario ordiendâ est, exhibito scilicet. Medicamine *Anodyno* : dein spiritibus, quorum crasis infirmior morbi causa est, rectificandis opera danda est, quo ejusmodi symptomatis deinceps occurratur. Cumque experientia doceat permulta esse, quæ foetoris exhalatione repellendis spiritibus seditionem molientibus, & in loco suo continendis apta nata sint, (quæ idcirco *Hysterica* audiunt) neque illa sunt negligenda, quoties dictis intentionibus implendis operam navamus.

Ad hanc ego metam collimans, venam in brachio secari jubeo, dein ut purgetur ægra tribus quatuorve auroris continuis. Per hos dies, in quibus *Venæsectio* & *Catharsis* celebrantur, ita planè nihil emolumenti capere ægra, ut in pejus ruere, sibi videatur, cum dictæ Evacuationes tumultu concitato ἀταξίαν promoveant, quâ de re ægram diligenter præmoneo, ne animum despondeat, suadente morbi Genio : utut fuerit, vitiosi isti humores, quos à morbo diuturniore coaggeratos supponimus, quadantenus sunt detrahendi, antequam primariæ Intentioni percommode satisfacere queamus.

Post has Evacuationes, ad sanguinem confortandum & proinde etiam spiritus ex eo prognatos, *Remedium* aliquod Martiale seu *Chalybeatum* ad dies *triginta* præscribo assumendum, quo non aliud certiùs hîc votis respondet. Etenim massæ sanguineæ, jam effoetæ & languescenti, volatile quoddam Fermentum, ceu calcaria, subdit, à quo excitantur & quasi eriguntur spiritus antea jacentes & suo pondere pressi. Cujus rei indicium est vel apertissimum, quod quoties *Chalybs* in *Chlorosi* propinatur, pulsus derepentè major fit & celerior, exteriora corporis incalescere ; facies non amplius pallida & mortuis concolor, sed vivida cerni & sanguine purpurata : Attamen hîc notandum, quod non semper *Venæsectio* & *Cathartica* *Chalybis* usui sint præmittenda, cum viribus admodum imbecillis & diuturnitate morbi attritis fractisque omitti ea possint ac debeant, & cum *Chalybe* statim incipiendum ; quod diligenter advertendum.

Commodissimè verò, aut ego fallor, in *substantia* exhibetur ; atque ut nec observavi unquam ipse, nec fando accepi, eum ita sumptum cuivis nocuisse, ita certiore me fecit experientia multiplex, nudam *Chalybis* substantiam & felicius & brevioris temporis spatio curationem absolvere, quàm si is quovis, ex iis qui vulgò feruntur, modò fuerit præparatus. Cum tam in hoc quàm in aliis melioris notæ remediis, id quandoque præstiterit Chymicorum officiosa sedulitas, non tantum ut *σπασμώδεα* non sint, sed etiam à perversa eorundem diligentia & opera plusquam otiosa, magis evileſcant. Audivi etiam (quod si modò verum sit, asertitiorem hanc nostram fortiter sustinebit) ipsam *Mine-*ram, prout à terræ visceribus effoditur, crudam efficacius in morbis subju-

gandis operari, quàm Ferrum ignem jam passum & fusione depuratum: cuius rei fides tamen penes Authorem sit, me nondum experto, siccine se res habeat, an verò aliter. Id certò scio, nullum remedium præclarum atque ἐξαιρέσιον uspiam gentium fuisse procusum, quod non à natura præcipuas vires acceperit: unde Θεῶν Χεῖρας, non verò Hominum præcellentiora quævis medicamina Antiquitas grata compellavit. Quòd verò nativâ quidpiam bonitate præstans & efficacîâ, mirandos edat effectus, quacunque demum formâ inge-
ratur, testes hîc adduco Par illud nobile, Papaveris lachrymam sive *Opium*, & *Corticem Peruvianum*. Neque enim tantum in medicamentis præparandis medica cernitur peritia, quàm in iis seligendis appropriandisque, quæ Naturâ, suo igne elaborata atque evecta, liberali manu porrigit. Id tantum nobis agendum restat, ut medicamenta in eam formam reducantur, quâ vel eorundem substantia, vel saltem vis & efficacia melius corporibus nostris impertiri queat: cui muneri obeundo facultates nacti sumus plus quàm pares. Post Chalybis substantiam, ejusdem *Syrupo* lubentiùs & præ cæteris utor. Fit autem è ferri aut Chalybis limaturâ, in Vino Rhenano in frigido infusa, usque dum vinum satis imprægnatum fuerit, quo factò liquor colatus cum sacchari quantitate sufficienti in Syrupi consistentiam excoquendus est.

Nec mihi solenne est toto illo spatio, quod ægra Chalybeata sumit, Catharticum aliquod statis intervallis exhibere. Cùm tam in genere Hysterico quàm Hypochondriaco, Chalybis vires à Cathartico intercidi atque infringi mihi videantur. Quando enim id mihi palmarium sit, ut spiritus in ordinem redigam, atque eorum systema redintegrem firmemque, quod toto vix Octiduo refarciveram Chalybis ope, Cathartico vel lenissimo exhibito die unicâ rursus demolior; atque ita diruta extruendo, atque à me extructa subruendo, & ægros & operam ludo, vanus & infelix Ardelio. Qui quidem mos cùm etiam in usu Aquarum Mineralium obtineat, quæ Ferri mineræ sunt participes, haud mihi dubium est, easdem exinde minus efficaces reddi. Non sum nescius quosdam fuisse sanatos, Catharticis non tantùm intercalatis, sed etiam quotidie cum chalybe propinatis, quod tamen non tam Medici prudentiam, quàm Chalybis virtutem ἐνερgetικὴν mihi comprobat, cùm, si ea omittantur, breviori temporis spatio Curatio succedat.

Neque sanè video in aliis affectibus multis præter jam dictum, quid emolumenti, sive potius quid non incommodi tam repetita Catharticorum exhibitio ægris adferre queat. Quamvis enim haud negandum sit, quin Intestina ex impuritatibus liberent ea, & pariter è massa sanguinea humores noxios in ea stabulantes aliquantulum extrahant; è contra tamen haud minus certum est, quòd frequenter repetita in corporibus imbecillis (maximè verò in ætatibus tenellis) plurimùm officiant; cum ex hac προφάσις ingens humorum colluvies in viscera eliciatur, atque iis in partibus deposita fermentationes præternaturales invitet; ex quibus deinceps *Tumores* in infimo ventre oriuntur, tanto magis indies mole augescentes, quanto sæpius æger purgetur. Atque id demum accidit, ut istæ partes præ imbecillitate & caloris nativi (jam sub humorum onere:

onere quasi obruti) defectu, *tabe* facile afficiantur ac putrescant. Quandoque etiam, Oeconomyâ viscerum ob causas jam dictas penitus eversâ, *Glandulæ* præternaturales, *Strumæ* soboles, & id genus similia Mesenterio accrescunt, & ad mortem viam sternunt. His rationibus adductus tutissimum esse iudico in *Infantibus* post evacuationes universales, easque perpaucas, eò Indicationem Curativam dirigere, ut confortentur sanguis & viscera. Quod *Vinum Hispanicum* vel solum, vel *Herbis corroborantibus* alteratum efficere pote est, modò manè & serò cochlearia aliquot (pro ratione ætatis ægri) satis diu exhibeantur. Cum verò quæ exterius admoventur, tenera Infantium corpora facile penetrent, proindeque sanguinem ipsum qualicumque virtute suâ penitus afficiant, è re erit in *Tumoribus* qui ventrem eorum occupant, sive *Scrophulis*, sive *Rachitidi veræ* originem illi debeant, *Linimentis* uti, quæ sanguinem ac viscera corroborandi ac pariter labem aliquam morbificam iis inductam delendi vi pollent. Ut *℥. Fol. Absint. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. Chamædr. Chamepit. Scordii, Calaminth. vulg. Parthenii, Saxifrag. pratens. Hyperic. Virgæ Aur. Serpill. Menth. Salviæ, Rutæ, Card. benedict. Puleg. Abrotan. Chamomel. Tanacet. Liliior. Convall. (omnium rec. collectorum & incisorum) an. m. j. Axungiae porcinae ℥iij. sevi ovini, & vini Clareti an. ℥ij. Macerentur in ollâ fictili super cineres calidos per horas 12. Deinde ebulliant ad humiditatis consumptionem, & postea colentur, ut fiat Unguentum; quo venter ac *Hypochondria* illinantur mane & sero per 30. vel 40. dies continuas, uti etiam *Axillæ utraq.* Quoad *Rachitidem* autem hoc notandum, quòd in tumoribus istis qui ventres Infantium post longas *Intermittentes Febres* olim infestarunt, veræ *Rachitidi* non multum abluentes, repetita Catharsis omnino videretur indicari, cum ante usum *Corticis Peruviani* istæ Febres in diuturnitatem longam se extenderent, ac proinde sedimentum deponerent, huiusmodi Tumorum causam, quæ idèò non nisi purgatione repetitâ abigi poterat: Attamen in *Rachitide verâ* Cathartica locum non habent, nisi ut semel vel bis ad plurimum æger purgandus antequam usum Alterantium aggrediatur. Per totum autem tempus quo partes illiniuntur: intus assumat vel vinum modò dictum; vel, si fieri possit, pro potu omni bibat Cerevisiam, in quâ quantitas sufficiens herbarum prædictarum, vel earum saltem aliquam multarum, unâ in doliò inclusa fuerit. Denique hoc quod innui diligenter advertendum volo, cum non paucos Infantes atque pueros à Catharticis sæpe repetitis (quæ fortè ventris tumor invitaverat) interemptos fuisse satis sciam. Sed hæc obiter.*

Si quis objecerit, *limaturam Chalybis*, nisi æger subinde fuerit expurgatus, in visceribus hærentem, ei, qui illam devoraverit, nocere posse; respondeo primùm me nihil unquam tale in quoquam deprehendisse: deinde longè verisimilius esse eandem mucò & excrementitiis partium humoribus involutam unâ cum istis tandem omnem elabi, quàm medicamentis purgantibus.

exagitata, quæ adstrictiones insolitas, & Viscerum torsiones contractionesque afferunt; quæ quidem compressione, Chalybis particulæ viscerum tunicis impactæ in iisdem penitus defigi possunt.

Interea dum Chalybs administratur, (ad confortandum scil. sanguinem & spiritus Animales) Remedia vulgò dicta *Hysterica* in usum quasi obiter revocanda sunt, idque eo modo atque ea forma, quæ maximè conveniunt ægris; quæ quidem si in formâ solidâ fuerint deglutitæ à minus fastidiosis, potentius longè spiritus in officio & loco suo retinebunt, quàm si in liquidâ hauriantur, hoc est, sive Decocta, sive Infusa. Ipsa enim substantia ventriculum diutius sapore suo afficit, & corpus inficit penitus.

In summâ, indicationibus, quas suprà attigi, universis satisfactorius, paucula hæc & vulgaria præscribere soleo; quæ licet nihil magnifici præ se ferant, ut plurimum tamen id præstant, quod volo.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad ℥viiij.

℥. Galban. in tincturâ Castor. solut. & colat. ℥iiij. Tacamahac. ℥ij. f. Emplast. Umbilico admovendum.

Sequenti manè aggrediatur usum sequentium Pilularum.

℥. Pilul. Coch. maj. ℥ij. Castor. pulv. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iv. f. Pilulæ n. iv. Cap. horâ quintâ matutinâ superdormiendo. Repetantur per duas vel tres alias vices, idque singulis vel alternis auroris pro ratione virium, aut operationis.

℥. Aq. Ceras. nigr. Rutæ, & Brion. comp. an. ℥iiij. Castor. in nodulo ligat. & in vitro suspens. ℥℞. Sacchar. Crystall. q. s. f. Julapium, de quo capiat cochlearia iv. vel v. in omni languore; instillando primæ dosi, modo paroxysmus urgeat, spir. C. C. gutt. xx.

Post Pilulas purgantes modò suprà descriptò sumptas, utatur & sequentibus.

℥. Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. extracti Absynth. f. Pilulæ n. ij. sumat summo manè, repetanturque horâ quintâ pomeridianâ, per dies xxx. superbibendo haustum Vini Absynthitis.

Vel pro usu quotidiano, ℥. Limatur. Chalyb. & extract. Absynth. an. ℥iiij. ms. asservetur pro usu. Capiat in iisdem temporibus gr. xvj. vel ℥j. in pilulas tres redact.

Vel si forma boli magis arrideat, ℥. Conserv. Absint. Roman. & conserv. flaved. Aurantior. an. ℥j. Angelic. condit. Nucis moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. ℥℞. Zingib. condit. ℥ij. cum s. q. syr. Aurantior. f. Electuarium. ℞. Electuarii præscript. ℥℞. Limaturæ Chalybis probè triti gr. viij. cum s. q. syr. Aurantior. f. bolus, sumendus mane, & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo haustum vini Absinthitis.

℞. Myrrh. elect. & Galban. an. ℥℞. Castor. gr. xv. cum s. q. Balsami Peruv. f. Pilulæ, è singulis Drachmis xij. sumat ij. singulis noctibus, superbibendo Aq. Brion. comp. Cochlear. ij. vel iv. per totum decursum hujus processus.

Sin autem Pilulæ ultimò præscriptæ ventrem moverint, quod in corporibus

poribus quæ facillimè purgantur præ *Gummi* quæ insunt quandoque fit, tum sequentes substituantur.

℞. *Castor.* 3j. *sal. succini volatil.* 3℔. cum s. q. extract. *Rutæ* f. *Pilulæ exiguae* numero xxx. cap. iiij. singulis noctibus.

Hic autem observandum, quòd *Chalybeata* in quacunque forma aut dosi exhibeatur, foeminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducant, idque non solum primis diebus, (quod ferè omnibus solenne est) sed etiam per totum tempus quo illis utuntur; in hoc casu non statim *Chalybis* usus dictis temporibus interrumpendus, sed, quò melius eundem ferre poterint, *laudanum* aquâ aliquâ hysterica mistum singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

At ubi symptomata mitiora sunt, & res sine Ferro introsumpto transigi posse videtur, (in minore sc. morbo) satis habeo sanguinem mittere, atque alvum solvere ad dies tres quatuorve, ut supra diximus: Dein *Pilulas Hystericas* alterantes præmemoratas manè & serò per x. dies capiendas imperare. Quæ quidem methodus in affectu leviori rarò à scopo aberrat. Imò *Pilulæ* solæ, vel omissis *Phlebotomiâ* & *Catharsi*, sæpe magnos effectus edunt.

Seriò interim animadvertendum est, nonnullas foeminas *Idiosyncrasia* quadam, ab *Hystericis* illis medicamentis (quæ plerisque hujus morbi symptomatis levamen afferunt & solatium) ita penitus abhorrere, ut non solum non juventur, sed etiam insigniter ab eorum usu lædantur. In his itaque omnino sunt omittenda ista: *Φύσεως γὰρ ἀντιπατάζουσιν*, ut divinus Senex, *κέρειά πάντα*. *Invita Minerva* nihil quicquam moliendum.

Quæ quidem *Idiosyncrasia* adeò insignis ac frequens est, quòd respectu ad eam non habito ægræ in discrimen vitæ conjici possint, idque non solum quoad *Hysterica*, sed quoad multa Remedia alia: Cujus impræsentiarum instantiam unicam adferam. Fæminæ nonnullæ *Variolis* laborantes *Syrupi è Meconio* usum ferre non possunt, utpote à quo *Vertigines*, *Vomititiones*, & id genus symptomata ad affectus *Hystericos* pertinentia, accersantur, quibus tamen *Laudanum liquidum* apprimè conveniat. Quod & dum hæc scriberem in *Adolescentulâ Nobili* observavi, cui *Variolis* laboranti cum sextâ ac septimâ nocte syrupum dictum exhibuissem, symptomata prius memorata singulâ exhibitione ei ingruebant, neque pustularum inflammatio debito modo procedebat; sed cum imposterum *Laudano* uteretur, à Symptomatis dictis prorsus immunis erat, faciei tumore ac pustulis indies augescentibus, &, quod non minus læti ominis erat, *anxietas* ista, cum *inquietudine* quadam tam mentis quàm corporis, (quæ quasi *paroxysmus Variolarum* solet esse) prorsus tolleretur, quoties *Paregoricum* hoc propinabatur, ægra mox vires atque animum exinde recipiente. Hoc obiter.

Atque ita *hystericus Affectus* quoad plurimum sanantur, ut & pleræque mulierum, quas appellant, *obstructiones*, at præ cæteris *Chloroses*, seu
pallidi

pallidi virginum colores, uti etiam *mensium suppressiones* qualescunque. Atamen si sanguis usque adeò effoetus fuerit, tantaque proinde spirituum *aragia*, ut Chalybs præscriptâ methodo usurpatus malo vincendo par non sit, adeundæ *Aquæ minerales* aliquæ Ferri minerâ saturæ, quales sunt nostræ *Tunbrigenses*, aut aliæ nuper repertæ. Harum enim virtus Chalybeata, tum ob insignem quantitatem quâ hauriuntur, tum etiam ob earundem cum natura convenientiam intimius sanguini permiscetur, & potentiùs morbos expugnat, quàm Ferrum quocunque demum artificio nobilitatum, ut volunt Ciniflones imprudentiores.

Hoc autem præ cæteris inter bibendum observandum, si ægritudo quævis ad symptomata affectionis hystericæ referenda accidat, hoc in casu per diem unum alterumve æger aquis absistat donec symptoma illud transitum Aquarum alias impediturum, penitus abeat. Etenim tametsi hæ Aquæ humoribus agitandis ac proinde spiritibus confusioi inducendæ minùs aptæ natæ sint, quàm Cathartica vel lenissima ex Officinis deprompta, aliquantulum tamen idem præstant, quatenus sc. diureticæ sunt; ut taceam quòd sæpe etiam ventrem movent. Quod si ipsæ Aquæ humores ac spiritus excitando turbandoque aditum sibimet ipsis præcludant, quò minùs facile transeant, videant illi quàm importunè agunt, qui medicamenta *purgativa* per harum usum imperant, semel aut bis in septimana assumenda, vel, quod adhuc ineptius, ipsis aquis immiscenda præcipiant; Unde fit tam in his quàm in aliis aquis mineralibus, ut non solùm non promptius, sed & planè tardiùs ac difficilius eadem operentur.

Hic mihi non reticendum, quòd tametsi his Aquis ferrum inesse in principiis solutis nonnullis videatur (quod idem planè ac si *ferrum liquidum* supponamus) nullus tamen dubito quin eadem nonnisi simplices aquæ extent virtute mineræ per quam transeunt imprægnatæ ac infectæ. Quod cuipiam liquidò constabit, si aquæ communis congiis aliquot satis magnam vim Clavorum veterum ex calceis equinis extractorum infuderit. Sentiet scilicet aquam hanc cui pulvis *Gallarum*, *fol. Tea*, vel similia fuerint immista, eodem planè colore infici, ac si aqua esset fontis Mineralis. Neque sanè diversos effectus hæ aquæ sive artificiales sive inartificiales (utrum enim mavult quis appellet) epotæ edent, modò tempore æstivo, atque aère salubri assumantur.

Sed utut hoc sit, si ob contumaciam ejus hic affectus ferreis aquis minùs cedat, adeundæ sunt *aquæ calidæ Sulphuræ*, quales sunt nostræ *Bathonienses*; atque æger, postquam tribus auroris continuis eas intus assumpserit, sequenti die *Balneum* ingrediatur, & postero die iterum eas bibat; idem faciendo alternatim per duos menses integros. Etenim tam in his quàm aliis, cujuscunque demum generis sint, hoc sedulò notandum, quòd in earum usu eo usque ægro persistendum, donec non tantùm levamen aliquale sentiat, sed, quo minùs symptomata omnia brevi postliminiò revertant, donec omnino convalescat.

Theriaca Andromachi, vel sola, si crebrò diuque usurpetur, magnum
est

est in hoc morbo Remedium. Neque verò in hoc solo, sed in aliis quam plurimis à caloris & concoctionis sive Digestionis defectu ortis, omnium fortè potentissimum, quæ hætenus nobis innotuere, utut à plerisque fastidiatur, quòd & pervulgata sit, & à tot jam sæculis cognita.

Vina Hispanica, Gentianâ, Angelicâ, Absinthiô, Centauriô, Corticum Aurantiorum flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot cochlearia ter in die potentur, admodum conferunt, modo ægra tenui non fuerit biliosoque corporis habitu. Profectò vel *Vini Hispanici simplicis* liberalior haustus horâ somni aliquot noctibus, meo suasu propinatus Hystericis nonnullis perquam salutaris fuit, cum ex eo robustior universi corporis habitus redderetur, ipsæque adeò foeminæ è Cachecticis vividæ simul ac vegetæ fierent.

Ad hæc *Peruvianus Cortex* eximias mirandasque vires in sanguine & spiritibus confortandis invigorandisque habere nonnunquam deprehenditur, cujus *Scrupulum unum manè & sero* ad septimanas aliquot deglutitum, sanam firmamque corporis crasin (tàm *Viris Hypochondriacis*, quàm *Hystericis* Foeminis diu multumque ægrotantibus, dejectâque jam quasi corporis œconomiâ restituisse, ipse observavi. In nullo autem Hystericorum Affeetuum genere felicius succedit, quàm in illo quo *Spasms* afficiuntur foeminæ, nixus edentes fortissimos, & plusquam muliebres, pectora simul ferientes. Interim tamen confitendum est, quòd hoc medicamentum non ita certò crebroque huic malo succurrat, ac *Febribus Intermittentibus*. Quamvis verò (ut id obiter dicam) in harum curatione egregia præstet, ne dicam miracula, dictus Cortex, atque eodem tum ipsi nos libenter utamur, tum Uxoribus Liberisque usurpandum imperemus, quoties res postulet; sunt tamen quibus haud minus jam displicet, quòd tam certò subitoque morbos expugnet, quàm olim displicebat, quòd non nisi nuper his terrarum oris innotuerat. Quo quidem fato tum Optimi quique Viri, tum etiam præstantissima quæque ad *σπασμώτατα* Remedia semper ferè urgentur. Veruntamen ad hanc notam, seu Lydium Lapidem, indolem nostram licet adductam experiri, atque exindè dignoscere, Hominesne boni simus, an verò probrosi; pro gradu sc. quo vel exultamus; vel dolemus ac ringimur; quoties Publica Res hominum communi aliquo beneficio, ac Numinis favore, augetur.

Si quæ verò ex remediis suprâ recensitis minus convenient, quod temperamento bilioso ac tenui præditis sæpè accidit, tunc *Diæta Lactea* possit usurpari. Etenim Mulieres aliquot (quod primâ statim fronte mirabitur quis) cum Affeetibus Hystericis diu conflictatæ etiam iis, qui omnes Medicorum conatus spreverant eluserantque, tandem Lacte solo aliquandiu vescentes convaluere. Atque illæ quidem maximè quæ ea specie laborabant, quam ego Colicam Hystericam appello, quæ non nisi à Narcoticis potuit deliniri; quibus itaque per intervalla repetendis multum assueverant hæ Foeminæ, dolore recrudescente ut primum emarcuerit Anodynæ virtus. Id verò in hac curandi methodo præcipuè mirandum, quòd cum Lac frigidum tantum crudumque ali-

mentum præbeat, Spiritus nihilominus ejus usu corroborentur invigorenturque. Nec tamen hoc à ratione abhorre illis videbitur, qui secum reputaverint, Lac, cum simplex omnino nutrimentum suppeditet, naturæ minus in coquendo negotium facessere, secus ac solent cibi ac liquores magis compositi; quodque perfectissimam illam Concoctionem æqualis sanguinis spirituumque crasis necessariò sequatur. Illud etiam est animadvertendum, quòd non nuda Spirituum debilitas per se considerata, sed eorundem debilitas ad sanguinis statum comparatorum, ἀταξίας, quam patiuntur, causa sit. Fieri enim potest, ut infanti spiritus satis firmi robustique sint pro sanguinis ratione, qui tamen debitam ad sanguinem adulti hominis proportionem non teneant. Jam verò cum ex jugi Lactis usu & Diætâ, quantumvis illa sit cruda atque invalida, sanguis mollior & tenerior evadat, si spiritus ab eo nati sanguini pares tantum sint, satis bene se res habet. Non omnibus tamen contingit, quantumlibet è lacte aliàs juvari potuerint, ea incommoda superare posse, quæ primis ferè diebus apportat, quòd nempe tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis in statu conservandis sustentandisque minùs sufficiat.

At verò nihil ex omnibus quæ mihi hæcenus innotuere, adeò impensè sanguinem spiritusque fovet firmatque, ac diu multumque singulis ferè diebus *equo vehi*. Cùm enim in hâc Gymnasticæ specie impetus fermè omnis in ventrem inferiorem fiat, in quo vasa Excretoria (quotquot sæculentiis, in sanguinis massa stabulantibus, educendis à naturâ instituuntur) sita sunt; Quæ tanta functionum perversio, aliave organorum naturalis impotentia vel fingi potest, cui tot succussionum millia eodem die ingeminata idque sub dio, opem non attulerint? Cujus calidum innatum usque adeò deferbuerit, ut hoc motu non excitetur, & denuò effervescat? Quæ verò sive præternaturalis substantia, sive succus depravatus in aliquo harum partium sinu recondi potest, qui non hoc corporis exercitio, vel in statum naturæ consentaneum perducatur, vel quaqua versum dissipetur elimineturque? Quid quòd sanguis perpetuo hoc motu indefinenter exagitatus ac permixtus quasi renovatur ac vigescit. Quæ quidem methodus licet Fœminis vitæ desidi atque imbelli assuetis, minus accommoda sit, utpote quæ à motu, maximè in principio, possint lædi, Viris tamen est aptissima, & sanitatem præ cæteris conciliat.

Nostrorum quidam in *Sacris Antistes*, Vir prudentiâ atque eruditione celeberrimus, postquam diu studiis intemperantius incubuerat, omnesque animi, qui permagnus ei est atque excelsus, nervos feriis cogitationibus nimio opere intenderat, tandem in *Affectum Hypochondriacum* incidit, quo diutius lacerante, omnia corporis Fermenta erant vitiata, Concoctionesque penitus subversæ. Medicamentorum Chalybeatorum tædium plus semel devoraverat: Aquas Minerales ferè omnes, cum Catharsi sæpè repetitâ, fuerat expertus: Uti etiam Antiscorbutica omnium generum, pulveresque Testaceos quamplurimos, sanguinis edulcorationem promittentes. Ita partim morbo, partim medicatione per tot annos continuatâ, tantum non fractus, *Diarrhœa Colliquativa*.

liquativa (quæ in *Tabe*, aliisque Morbis Chronicis, ubi omnes omnino Digestiones sunt prostratæ, mortem anteire solet) demum corripiebatur. Ubi me tandem consuleret, statim mecum reputavi Pharmacis nullum amplius locum relinqui, cum tot tantaque nullo cum fructu jam deglutiverat. Suadebam itaque ob causas suprâ memoratas, ut statim se Equo vehendum curandumque traderet; modicò primùm itinere, quale ferre possit valetudo ita infirma, ut, nisi iudicio valuisset rerum interiora altius penetrante, nec ad tentandum quidem illud exercitii genus potuisset adduci. Rogabam autem, ut quotidie in eo persisteret, donec ex animi sententia convalesceret; majora indies spatia gradatim conficiens, donec tandem ad tot miliaria ascenderet, quot uno die percurrunt prudentiores ac moderati Viatores, qui iter longiusculum negotii alicujus gratiâ susceperunt: Nullo interim sive ad cibos, sive potum, sive etiam aëris temperiem respectu habito, sed ad instar Itinerantis omnia, prout fors dederit, exciperet. Ne longior sim, hanc ille viam incescit, productis gradatim itinerum spatiis, donec tandem ad vicesimum, imò ad tricesimum usque lapidem quotidie vectaretur: cumque se longè melius habere post pauculos dies experiretur, ipso rei eventu penè mirabili animatus in eodem cursu ad menses aliquam multos perseverabat, quo temporis spatio plura miliarium millia, quod ipse mihi narrabat, emensus est, donec tandem non convaluerit modò, sed satis validum etiam vegetumque corporis habitum fuerit indeptus.

Neque magis *Hypochondriacis* prodest hoc exercitii genus, quàm *Tabidis Phthificisque*, quorum nonnulli mihi sanguine juncti multum terrarum equo vectore peragrantes, ex meo consilio, sanitati sunt restituti; cum certò sciam me vel Medicamentis quantivis pretii, aut aliâ methodo, quæcunque demum ea fuerit, nihil magis iisdem proficere potuisse, quàm si multis verbis hortatus fueram, ut rectè valerent. Neque in levioribus tantùm malis, crebrâ tussi & macie stipatis, id remedium obtinuit, sed & in *Tabe* tantùm non deploratâ, ubi *nocturnis sudoribus* jam etiam accesserat *Diarrhæa* ista superius dicta, quæ Phthisi confectis mortis prænuntia solet esse, atque adeò ut plurimum ultima rerum linea. Verbo dicam. Quantumcunque exitialis *Phthisis* & sit & audiat, utpote quâ intereunt duo ferè Trientes eorum quos morbi *Chronici* jugulant, hoc tamen sanctè assero, quòd neque *Mercurius* in *Lue Venerea*, neque *Cortex Peruvianus* in *Intermittentibus* efficaciores extent, quàm in *Phthisi* curanda *Exercitium* jam laudatum; modò æger curet, ut linteamina lecti probè fuerint arefacta, atque etiam ut satis longa itinera emetiatur. Attamen hoc notandum quod vitæ *animum* prætergressis multo diutiùs in hoc exercitio persistendum, quàm infra istam ætatem positis. Atque hoc multiplici experienciâ, quæ vix me fefellit unquam, didici: Et licet equo vehi Phthificis præcipue conferat, tamen & itinera curru facta mirandos sanè effectus quandoque ediderunt.

Sed ut ad propositum revertar. Hæc est generalis hujusce morbi curandi ratio, quâ causæ originariæ, quæ est debilior sanguinis crasis, occurritur; ac

proinde extra Paroxysmum tantum locum habet. Quoties verò *Paroxysmus* invaserit adjuncto quolibet ex prædictis symptoimate, si tale aut tantum sit malum ut inducias ferre nolit, donec, sanguine & spiritibus corroboratis, quasi per ambages sanari possit, confestim ad Remedia *Hysterica* ista confugiendum est, quæ odore viroso ac gravi Spiritus, ut dixi, exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant, sive intra corpus fumantur, sive naribus admoveantur odoranda, sive exterius applicentur; cujusmodi sunt *Assa foetida*, *Galbanum*, *Castoreum*, *Spiritus salis Armoniaci*, & quicquid est denique quod odorem tetrum admodum ingratumque spirat.

Hic enim quod res est dicam. Quaecunque foetent, ea omnia Intentioni huic apprimè inserviunt, sive natura, sive etiam ars ea putido odore donavit. Atque, ni fallor, *Spiritus C. C. Sanguinis humani*, *Urinæ*, *Ossium* ac similibus, inde præcipuas suas vires acquirunt, quòd, dum vi ignis præparentur, Empyreuma contrahant tetrum ac malè olens, quasi essentiae eorum intimius annexum. Quod pariter cernitur in fumis à Corio, Pennis, & id genus Animalium partibus, cum exuruntur, exhalantibus. Etenim id habent commune singulæ Animalium substantiæ, ut inter exurendum fumum emittant olidum & olfactui ingratum; qui si importuno igne affatim eliciatur, ac Organis excipiat condensatus is in liquores istos abit ac convertitur, qui *Spirituum Volatilium* nomine insigniuntur, quique facultates eas facile reportant, quæ subjectis suis haud primitus inerant; utpote qui *Ignis* solummodò *Creaturæ* existunt, & singuli eorum eandem planè Virtutem cum cæteris nanciscuntur, ex quacunque demum substantiâ (modò *Animalis* ea sit) producantur extrahanturve.

Proximo loco animadvertendum est, quòd si paroxysmum comitetur *Dolor* aliquis intolerabilis in quâcunque demum parte, aut *Vomitio* enormior, aut etiam *Diarrhœa*, tunc præter *Hysterica* jam laudata, *Laudanum* in usum revocari debet, quod solum vires habet his symptomatis cohibendis prorsus partes.

At verò in iis doloribus sedandis, qui Vomitiones excitant, cavendum est sedulo, ne illi sive Laudano, sive alio Paregorico mitigentur, non præmissis debitis Evacuationibus, nisi patientiam ferè humanam omnem vicerint. Primum, quia tanta nonnunquam sanguinis & humorum copia est aggesta (maximè in foeminis sanguineo, & Masculis proprio habitu præditis) quanta Narcotici vel efficacissimi, ejusque sæpius repetiti, operationem valeat sufflaminare. Unde in talibus sanguis è brachii venis necessario est extrahendus, & Catharticum eis propinandum est, antequam ad Laudani usum accedamus: his enim ritè peractis, quod prius vel in maximâ dosi exhibitum, nihil proficiebat, jam in dosi mediocri scopum attinget. Deinde quia multiplici experientiâ edocti sumus, quod quoties ægra paulatim Laudano assueverit, non præmissa evacuatione debitâ, necesse habuit ob dolorem mox ab evanescente remedii virtute denuò revertentem, Paregoricum rursus ingerere, idque quoties.

quotidie annos aliquot continuos, dosi subinde per gradus auctâ, ita ut nullo modo jam à Laudano abstinere queat, licet omnes ab illo digestionēs vitentur & functiones naturales debilitentur. Quamvis non sentiam Laudani usum siue Cerebro, siue Nervis, siue Facultatibus Animalibus immediatè nocere. Judico itaque ego, quod expertus loquor, Evacuantiâ Anodynâ debere præmitti: v. g. Viraginibus & foeminis in quibus sanguis prædominatur, Vena secanda est, & alvus subducenda, præsertim si non jam à longo tempore paroxysmo fuerint correptæ. Si verò foeminæ debiliores, & quæ temperamenti à prioribus illis planè diversi sunt, hujuscemodi paroxysmo & dolore affligantur, atque eodem subinde haud ita pridem laboraverint, sufficiet eorum ventriculos Congio uno, plus minus, lacti Cerevisiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere; dein largam dosin imperare siue *The-riacæ Andromachi*, siue *Electuarii Orvietani*, & cochlearia aliquot liquoris alicujus spirituosi & gustui non ingrati cum paucis Laudani liquidi guttulis superbibenda.

Quod si ægra jam pridem vomuerit, antequam accerferetur Medicus, & metus sit ne si Emeticis ulterius sollicitetur, in furorem agantur spiritus, & ægræ vires nimium dejiciantur, hoc in casu *Laudanum* sine morâ propinari debet, eò dosi modò numeròque, quæ symptomatis magnitudinem ac durationem non tantum exæquare possit, sed & vincere.

Duo autem hîc præ cæteris diligenter sunt notanda. Primò, quòd cum semel post evacuationes justas & necessarias, Laudano uti cœperimus, eâ dosi, atque illâ toties repetitâ, sumendum est istud Pharmacum, donec symptoma omnino fuerit debellatum; interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit antè noscamus, quàm alteram repetamus. Sed de hoc fusiùs alibi egimus. Deinceps dum Laudano morbum aggredimur, nihil prorsus movendum est, nihil evacuandum, cum vel mitissimum illud Ene-
ma è lacte Saccharato possit destruere, quicquid reparaverat Paregoricum, & tam dolorem quàm vomitionem postliminio revocare.

Utut verò dolores, quod jam innuimus, suprà memorati importuni sint in Anodyno efflagitando, tamen Vomitiones enormes & dosin ejusdem longè maximam & sæpissimè repetitam indicant, cum ab inverso motu ventriculi peristaltico (quo in eo contenta versus inferiora erant protrudenda) remedium Paregoricum prius eliminetur per oesophagum, quàm opis aliquid afferre queat, nisi post singulas Vomitiones Narcoticum de novo toties quoties iteretur, idque in forma potissimum solida; aut si in liquida detur, vehiculum ita parcum esse debet, ut ventriculum imbuat tantum, & præ materiæ inopia ab illo sursum evehi nequeat. v. gr. *Guttæ aliquot in cochleari uno Aq. Cinnamomi fortioris*, aut similis. Monenda interim est ægra, ut statim ab assumpto Laudano conquiescat, ac caput præsertim quantum fieri potest immotum teneat; quando vel levissimus capitis motus præ cæteris omnibus Vomitionem provocet, unde medicamenti modò deglutiti jactura fit. Quinimo etiam cessante & quasi perdomita Vomitione, expedit Anodyno ad

pauculos dies mane & sero exhibito, ceu injecto fræno, recidivam præcavere. Quod itidem post dolorem Hystericum Narcotico sedatum, aut Diarrhoeam, omnino observari debet.

Atque ita demum methodo jam tradita & *Dolori & Vomitioni* symptomatice mederi in promptu est; à quibus, cum aliorum persæpe morborum speciem præ se ferant, Medicis facilius imponitur, quàm ab aliis quibuscumque symptomatis, quotquot manum medicam deposcunt, de quo pauca subjungam v. gr. in ista Hystericæ Affectionis specie jam descriptâ quæ *Paroxysmum Nephriticum* imitatur, quis non videt quanta sit paritas morbi utriusque & similitudo, tum quòd pars eadem utrobique doleat, tum quòd in utroque affectu vomituriant ægræ, cum tamen à causis ita ab invicem variantibus pendeant, & tam impari methodo debeant sanari, ut quòd in hoc lædat, in illo juvet, & è contrâ? Si enim sive *Calculus*, sive *Arænulæ* Renum substantiam atterentes, dolorem inferant, atque ex partium consensu Vomitionem, nihil æquè conducet ac prælonga & frequens Causæ Antecedentis per Phlebotomiam-revulsio, tum ut dilatentur laxenturque meatus, per quos Calculus excludendus est, Enematis emollientibus sæpenumero repetitis, aliisque ejus generis remediis internis: Quibus Medicamenta Diuretica, & Lithonriptica addenda sunt. Jam si dicta symptomata à Calculo nullatenus oriantur, sed à spiritibus Animalibus nimiam copiam Renes impetentibus, (quo in casu Paregorica tantum indicantur, nec vel Enema è mitioribus, post primas Evacuationes, sine periculo injicitur) in quanto vitæ discrimine versetur infelix ista de cujus jam corio luditur, non opus est dicere. Idem potest affirmari de affectu illo Hystérico, qui *Colicam Biliosam*, vel *Iliacam Passionem* simulat. Hic ubi pro concessio habeatur Affectum istum (licet indolis omnino sit diversæ, imò contrariæ) Colicam Biliosam esse, & ab humore acri in viscera per Arteriarum Mesentericarum oscula excreto nasci, (in quem errorem dolor intolerabilis, & viridis color qui in materiâ cernitur tam per os quàm per sedem expulsâ, Medicum incautiores & cogitationibus minus assuetum haud ægrè perducant) quæ methodus tam commoda, quàm ut in contemperandâ, remediorum Refrigerantium atque Incrassantium ope, humorum acrimoniâ operam locemus? Atque, quo humores è visceribus exterminantur, præter Enemata quotidiana, ut Cathartica frequenter propinemus; inter cætera verò etiam Mercurium dulcem Diagrydiatis permixtum ad plenioris materiæ morbificæ eradicationem? Quàm malè autem cum ægris agatur, quantumque eis periculum immineat, dum huic methodo insistamus, si Affectus qui Colica biliosa censetur, re ipsâ Hystericus tantum fuerit, aut Hypochondriacus, nemini non liquet: cum clament experientia, quos post primas evacuationes universales (quæ humorum putrescentium, quos peperit *ἀραξία* jam sæpe dicta, quique Anodynis obstaculo esse possint, saburræ amoliendæ dicantur) nihil jam restat nisi ut tumultuantes spiritus consopiamus, donec tandem symptomata evanuerint, atque iis cessantibus opportunè Chalybeata impereamus, vel si quòd aliud est remedium quòd sanguinem accendendo at-

que

que invigorando morbum radicitus extirpet. Meum non est plurimas atque ingentes illas calamitates enumerare, quas Fœminis contigisse ipse novi, ubi Colica hæc Hyſterica à Bile ortum ducere exiſtimaretur. Veruntamen affirmo Evacuationes sæpe repetitas, quæ quidem in Colica Bilioſâ omnino indicantur, dolorem vomitumque non ſolum non compescere, ſed irritare magis, ſpirituum ſc. perturbationem, quæ vera horum ſymptomatum cauſa eſt, promovendo. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metatheſi derepentè in cerebrum factâ, deſinit in *Spasmos*, à quibus ægra brevi è medio tollitur; idque vel maximè, ubi poſt alias evacuationes diutius repetitas, ſuadente colore viridi eorum quæ per os è ventriculo excernuntur, Emeticum fuerit propinatum. Verbo dicam. Si quid ego obſervando didici, imprimis cavendum eſt, ne Symptomata Fœminis Hyſtericis familiaria ab aliis quos sæpe æmulantur morbis, diagnoſi errante putentur oriri.

Hic non eſt reticendum, quod præter errores jam recensitos, à quibus Fœminæ Affectibus Hyſtericis obnoxia de vita periclitantur, permultæ inſuper errore non minus funeſto dictis Affectibus multantur eâ tempeſtate, quâ hic morbus, licèt ſuâ naturâ non ſit lethalis, tamen vi malorum ἐπιγνομιῶν ac ſubſequentium haud paucas è medio tollat. Exempli gratia: Fœmina teneriori atque infirmo corporis habitu Infantem parit, cui omnia fæliciter & ſecundum naturam cedunt: Obſtetric, ſive rudis & imperita, ſive jaſtabunda, & quàm præclarè ſuo illa munere functa ſit palam oſtentans, ſuadet ut Puerpera paucis à partu diebus ſurgat, & ſe à lecto aliquandiu abſtineat, hæc morem gerens, ſtatim à primo corporis motu *Affectione Hyſtericâ* corripitur, & pro ratione qua morbus inaugeſcit, *Lochia* primum imminuuntur, deinde ſiſtuntur penitus; quorum ſuppreſſionem præmaturam longa ſymptomatum ſeries excepit: quæ, niſi permagna tam diligentia quàm in medendo peritia intercedat, ægram brevi perimunt. Nonnunquam enim *Phreneſi* laborant ex hac occaſione, quæ indies efferatior reddita *Spasmos* primum, dein mortem affert: Si verò mortem evadant, mitius aliquantulum infaniunt, quandoque ad ultimum vitæ terminum. Nonnunquam poſt lochiorum ſuppreſſionem in *Febrem* incidunt, quæ vel in earum, quæ tum graſſantur, Epidemiarum caſtra tranſit, vel ab eâ ſolâ pendet origine. Adde quòd iidem Affectus Hyſterici, quibus Lochiorum ſuppreſſio imprimis debetur, jam magis ſæviunt, tanquam ex ſe denuò nati. Diu eſt à quo mihi ſubiit in mentem, quòd ex eis quæ moriuntur Puerperis, vix Decima quæque, ut modèſtè computemus, vel ex eo perit quòd vires partui neceſſariæ eam defecerint, vel ex doloribus partum laborioſiorem comitantibus; at eo maximè nomine, quòd debito citius lecto exurgat, excitatis à motu illo paroxyſmis Hyſtericis, à quibus cum ſiſtantur *Lochia*, mox ingens ineluctabile ſymptomatum turba ingruit. Quamobrem iſtis quæ me audiunt ubique Authorum, ut ad diem ſaltem *Decimum* uſque in lecto ſe contineant, ſi modò naturâ paulò debiliores ſint, præcipuè ſi *Vaporibus*, qui vulgò dicuntur, jam

jam pridem fuerint tentatæ. Præterquam enim quòd ista, quâ in lecto fruntur, quies, à malis jam toties commemoratis eas immunes præstet, non interruptis lecti calor spiritus pariter reficit tum à pariendi doloribus, tum ab evacuationibus in hoc casu solennibus exhaustos fractosque; quin imò & naturæ suppetias fert, atque omnes, quas gestationis tempore mulier congefferat, cruditates digerit & amolitur.

Verùm, si ab admissio hoc errore quodvis è dictis symptomatis supervenerit, Indicationes Curativæ eò dirigendæ sunt, ut spiritus ab hoc motu jam irrequieti redditus sedentur, & ut *Lochia* rursus fluant, quandoquidem eorum suppressio horum symptomatum causa sit proxima atque immediata. Neque tamen huic methodo pertinaciùs insistendum, sed exhibitis aliquandiu remediis quæ in hoc casu cum successu usurpari solent, si votis ea non respondeant, ab iis temperandum est; cùm neque fortiora hîc locum habeant, neque in mitiorum usu perseverare debeamus, propter attritas & serè prostratas Puerperarum ita affectarum vires. Exempli gratia, ubi primùm *Lochia* jam suppressi constat, è re fuerit foeminam è vestigio lecto addicere, mox *Emplastrum Hystericum* umbilico admovere, atque quamprimùm *Electuarium* sequens propinandum imperare. Ut *R. Conserv. absinth. Roman. & rutæ an. ℥j. trochisc. è mirrha ℥ij. castor. croci Angl. sal. volatil. salis Armoniaci, & assæ fætidae an. ℥ss. cum s. q. syr. de 5. radicibus, f. Electuar. Cap. ad magnitudinem nucis moschat. majoris, tertiâ quâque horâ, superbibendo seq. Julapii cochl. iiij. vel v. R. aq. rutæ, bryon. comp. an. ℥iij. sacchari Cand. q. s. ms. f. Julap.* Atque hæc, si statim à primo suppressionis indicio exhibeantur, hoc malum plerumque devincent. Sin autem dictis Remediis eo usque continuatis donec tota quantitas assumpta fuerit, *Lochia* adhuc supprimantur, hoc in casu *Laudanum*, unâ saltèm vice, tentandum. Hîc *Laudanum*, quantumlibet suapte indole adstringat, cùm tamen spirituum perturbationem, à quâ solennis *Lochiorum* evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimùm juvare, & *Emmenagogis* nihil proficientibus, *Lochiorum* fluxum postliminio revocare possit. Commodissimè verò *Narcotica* unâ cum *Hystericis* & *Emmenagogis* propinantur; v. g. *Laudani liquidi guttæ xiv. in Aquâ Bryoniæ composita; vel Laudani in forma solida granum unum semis cum scrupulo dimidio Assæ fætidae in Pilulas duas redactum.* Sedulò interim animadvertendum est, quod si telo hoc semel misso scopum non attingamus, nec sequantur *Lochia*, *Opium* nullo modo est repetendum, ut in aliis casibus fieri solet ac debet: Etenim si reiteretur hîc *Paregoricum*, *Lochia* ita potenter sistet, ut ea nullâ deinceps arte provocari queant. Verum enim verò si & hoc minus succedat (interjecto aliquo temporis spatio, quo certiores simus quid istud præstiterit) ad medicamenta iterum *Emmenagogis* *Hystericis* permixta redeundum est, & dein ad *Enematis ex Lacte saccharato* injectionem. Verum quod de *Opio* suprâ, hîc de *Enematis* dicendum est; nisi enim primo injectum *Lochia* educat, nihil prorsus à pluribus est sperandum: cùm unum humo-

humores leniter sollicitando, ut fluant Lochia efficere possit, plura vero eadem aliò divertant. His itaque peractis, (quæ tamen leviter tangenda sunt) tutissimum est, & Prudentis Medici officium, temporis *συνμαχίας* præstolari; cum singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si ægra *Vicesimum diem* superaverit, jam ferè in vado est. Etenim cum à morbo, quisquis is fuerit, jam diuturniori foemina aliquantisper respiraverit, viresque quadantenus receperit, eam methodum valebit ferre quæ aptissima videbitur isto malo averruncando, quod à Lochiorum suppressione accreverat: quando remedia obstinatius ingesta, primis ne hilum promoventibus, tum etiam spirituum perturbationem, à quâ morbus oritur, augere possint, quod sedulo advertendum velim.

Nuper Matrona, tam natalibus quàm moribus honestis ac probis, me sibi Medicum volebat: huic ex modò dicta occasione statim à partu paroxysmis Hystericis affectæ, Lochia penitus defecerant. Conabar medicamentis suprà memoratis eadem proritare; at frustra, Affectione Hysterica vehementiore omnem opem medicam respuente. Unde, cum ita demum eam salvam fore præviderem, si nihil prorsus molirer, rem omnem Tempori, Medicorum facile Principi ac Coryphæo, committendam censui. Hoc meum consilium ad diem usque decimum quartum optimè illi cessit; quotidie enim illam invisens, nullo die eam in pejore loco, quàm pridè fuerat, prehendi: Post hunc mulierculæ adstantes, quas hætenus à noxa illi sub officii specie inferendæ ægrè arcueram, Maritum impellebant, ut sine mora sanguinem è pede uxori extrahi curaret: quo facto, Paroxysmi Hysterici adeo invalescebant, ut intra paucas horas Spasmi accederent, & non ita diu postea, ærumnarum requies, Mors.

Et si fas mihi sit liberè quæ sentio effari, jamdiu in ea Hæresi fui ut arbitrarer me, non tantum in dictis Puerperarum morbis, sed etiam in Acutis omnibus, ubi Curationem ab hac illâve, quâ uti placet, methodo certo insecuturam polliceri nequeam, & Viri & Medici Boni Probique pulchrè defungi munere, quoties nihil omnino tento, modò ægrum invisens, illum non se pejus habere hoc die quàm heri habuit comperiam, nec cras habiturum quàm hodiè conjecturâ assequi possum. Cum si in ægro curando eâ methodo incedam, de cujus efficaciam nondum mihi certò constet, tam ab experimento quod ex eo capturus sum, quàm ab ipso morbo is periclitabitur: Neque ita facile geminum discrimen effugiet, ac simplex erat evasurus. Quamvis enim impræsentiarum nullum vel incipientis Convalescentiæ signum manifestum se prodat, certissimus tamen sum morbi Acuti cujuslibet naturam non ferre ut quis eo semper laboret, ac proinde dies quilibet res ægri magis magisque in tuto collocat, vel saltem Medico ansam præbet, ex quâ opportuniùs ac certius morbum feriat confodiatque, quàm in præcedentibus liceret. Quod quidem uti de Acutorum plerisque verè affirmatur, ita præcipuè de Puerperarum morbis, quibus error vel leviusculus

fatalis esse possit ; & in quibus ita parùm valeamus naturalem illam Evacuationem regere , à cujus suppressione mala , de quibus diximus , proveniunt.

Cùm verò *Affectus Hysterici* non semper primariæ causæ , spirituum nempe debilitati nativæ , sed adventitiæ aliquando originem suam debeant , hujusmodi itaque causam , antequam finiam , hîc recensere libet , quæ frequentissimè *Vaporum* , quos appellant , pararia existit. Atque ea est *Fluxus mensium immodicus* , sive in *Puerperio* , sive extra idem invadat. Quoad primam speciem , ea primis diebus post partum laboriosioremaximè infestat , & longâ symptomatum hystericorum catervâ stipatur. Et sicuti in primis hisce diebus solum ingruit ac urget , ita etiam brevi se proripere solet. Etenim si victus paulò incrassans instituat , facile abigitur ; cui & sequens potus addi poterit.

Assumatur *aq. plantag. & vini rubri an. ℥j. Coq. simul ad tertias , & deinde edulcoretur s. q. sacchari albiss. Cujus , cum frigescat , capiat ℥ss. bis vel ter in die.* Interim *Julapium* aliquod *Hystericum* , at satis mite , subinde propinetur , & *nodulus* seq. naribus admoveatur. *R. Galban. & Assæ fœtid. an. ℥ij. Castor. ℥iiss. sal. succini volatilis 3ß. ms. f. nodulus.* Vel *R. spir. salis Armoniac. ℥ij.* quem sæpius olfaciat.

Quod verò ad hujusmodi *extra Puerperium fluxum* attinet , licèt idem omnium tempore fœminis accidere soleat , eas tamen paulò ante tempus illud quo sponte sua omnino menses cessaturi , sæpissimè invadit ; circa ætatis scilicet annum 45. si modo temporius fluere inceperant , circa autem 50. si serius in vita prius prorumpebant. His , uti dictum , paulò ante totalem eorundem discessum (instar Candelæ jam fere absumptæ deflagratæque , quæ subito flammam edit insigniorem , mox penitus disparituram) cum magno impetu affatim excidunt , & ob copiam sanguinis ingentem qui continuo excernitur , in paroxysmos hystericos ferè continuos miseras dejiciunt. Hîc licèt *Hysterica* tam interna quàm externa obiter usurpanda (fortiora devitanda ne fluxum ulterius ea provocent) omnis tamen curationis cardo in menstruis cohibendis vertitur , quæ hunc in modum quàm primùm sistenda.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥viij. Seq. manè exhibeatur potio purgativa communis , quæ repetenda est tertiâ quâque die per duas alias vices ; & singulis noctibus per totum morbi decursum sumat Paregoricum ex syr. de meconio ℥j.

R. Conserv. rosar. siccar. ℥ij. trochisc. de terrâ Lemn. ℥iiss. Cort. granator. & Coral. rubr. præp. an. ℥ij. lapid. hæmatit. sang. dracon. & bol. Armen. an. ℥j. cum s. q. syr. è Coral. simpl. f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. Moschat. maj. mane & quintâ pomerid. superbibendo seq. Julapii Cochl. vj.

R. Aq. germin. quercus & plantag. an. ℥iij. aq. Cinnamom. hord. & syr.

syr. de rosīs siccis an. ℥j. spir. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.

℥. Fol. Plantag. & urticæ an. q. s. contundantur simul in mortario marmoreo. & succus exprimatur, qui postea clarificetur. Cap. cochl. vj. frigidè ter vel quater in die. Post primam purgationem applicetur Emplastr. seq. regioni lumborum. ℥. Emplastr. Diapalm. & ad Herniam an. part. equal. mss. extendatur super Alutam, & f. Emplast.

Diæta refrigerans incrassansque imperanda, nisi quod è re erit semel vel bis in die Vini Clareti haustulum Ægræ indulgere, quod etsi minùs conveniat in quantum ebullitionem ciere aptum natum sit, ad vires tamen refocillandas concedi possit. Atque hæc quidem methodus ut fœminis hoc modo affectis apprime proficua sit, ita eadem iis, quibus *Abortus* periculum imminet, non minùs confert. Atqui Cathartica & Succī hîc omittantur.

Est & alia, etsi minus frequens, affectuum hystericorum causa. Nempè post partum laboriosiore Uteri procidentia, magnam hujusmodi malorum Illiada secum trahens, quæ tamen citò ac facilè hoc modo sanatur. ℥. Cort. quercus ℥ij. Coq. aq. font. ℥iiij. ad ℥ij. sub finem addendo Cort. granator. contus. ℥j. rosar. rubr. flor. granator. an. M. ij. deinde adde Vini rubri ℥ss. Colatura sit pro Fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè, horis duabus antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum donec symptomata penitus evanuerint. Sed de his plus satis.

Habes tandem, Humanissime Vir, eorum summam quæ à me in hujusce morbi sive Historiâ, sive Curatione hætenus fuerint observata. Restat ut si quid fortè peccaverim, ista minus quàm oportuit accuratè describens, veniam à te petam; tum ut opellam hanc, eo animo exaratam ut gratias tibi referrem, quòd alia nostra conamina, qualia qualia illa fuerint, tuo calculo probare haud dedigneris, æqui bonique consulas. Quæ quidem Gratulatio mihi ita rarò obvenit, ut vel nihil prorsus ab hominibus sim promeritus, vel candidi ingenuique isti, quos eâ mentis præstantiâ natura effinxit, ut grati esse nôrint, perpauci sunt; Vix totidem quot *Thebarum portæ, vel divitis ostia Nili*. Quo non obstante pergo adhuc, imò & pergam, in ediscendâ promovendâque quoad potero Methodò curandorum morborum, atque iis, qui me minus in Praxi valent (si qui sunt ejusmodi) instruendis. Famæ meæ interim arbitrium penes alios sit. Æqua enim lance & scrupulosè expendens, Hominesne juvare præstet, aut ab iisdem celebrari, prius illud præponderare comperio, & maximi sanè momenti esse Animi Tranquillitatem; Famam verò populique halitum plumâ leviolem aut bullâ, atque umbrâ insomnii magis evanidum. Quod si opes ejusmodi nominis celebritate partæ majus aliquod pondus habere videantur, fruantur illis per me licet, qui jam corraferint. Meminerint tamen Mechanicorum nonnullos, artes vel sordidissimas exercentium, uberiores quotidie quæstum facere, & majorem Auri Argentique vim posteris legare; neque tamen in hoc Brutis Animalibus superiores evadere; qui sibi suisque pro sua indole prospiciunt; & si recta ex animi

arbitrio & virtute, nata excipiamus (quorum non est capax Brutorum natura) hos planè exæquant Belluæ, imò & alios qui non eum sibi vitæ scopum proponunt ut prosint quamplurimis. Commendatum me habeas, rogo, Virò sagaci & eruditissimo Domino *D. Kendrick*, tibi mihiq̃ue amicissimo, utpote cui debeam quod tuum in me ita propensum animum resciverim, eamque qua me complecteris amicitiam, eo internuncio, didicerim. Conabor quantum in me est, mutuas officiorum vices reddere, & par pari referre, utpote qui sim jure meritoque, Vir Dignissime,

Londini,
Jan. 20. 1681.

*Tibi Devotissimus, Tuique
semper Studiosissimus*

THOMAS SYDENHAM.



DE Variolis hætenus Clarissimus noster Autor, in variis hujusce Operis locis, ac præcipuè in primis ultimæ hujus Dissertationis paginis, accuratissimè pro more scripsit, ejusque morbi contagium inter homines tum juniores, tum etiam adultos & senes, ita subinde se spargens, ut ejus necessitatem, si ita loqui liceat, vix ex centenis paucissimi evadant, abundè explicuit, curamque, tam atroci quandoque morbo aptissimam exhibuit. Verum in eòdem argumento aliquid se nobis offert infrequentius ac minùs familiare; contagium scilicet Variolicum Armenta quandoque invadens, de quò doctè ac pereleganter commentatus est Clarissimus Ramazzini, postque eum Clariss. Dnus. Herment, Medicus in Galliis Regius, ac Peritiss. Dnus. Drouin Legionis Prætorianæ, ibidem chirurgus Primarius, in id à Rege Christianissimò deputati. Horum autem ultimorum Schedas hìc omittimus, unicâ Clarissimi Ramazzini Dissertatione, quam jam exhibemus contenti. Illa autem sic inscribitur, & hæc est.

DE CONTAGIOSA EPIDEMIA

Quæ in Patavinô Agro, & totâ ferè Venetâ ditione
in BOVES irrepsit,

DISSERTATIO *habita* in PATAVINO Lyceô

A

BERNARDINO RAMAZZINI

Practicæ Medicinæ Professore Primario.

Die IX. Novembris MDCCXI.

Serenissimo VENETIARUM DUCI

JOANNI CORNELIO *dicata.*

SI veri speciem præfert quod vulgò dici consuevit, & apud Sapientes quoque receptum, Consuetudinem vim quandam legis obtinere, ut, qui illam violarit, si non plecti, laudari tamen haud quaquam mereatur, qualem mihi legem ipsemet imposuerim, modò quamvis serò nimis agnosco. Etenim cum annus iste secundi Sexennii, ex quo in hoc celeberrimo Lyceo Practicam Medicinam profiteor, sit complementum, ac quotannis in solenni studiorum Instauratione, ut diù feriatam Juventutem ad Studia capeffenda allicerem, Oratione aliqua proludere consueverim, nunc mihi jam effoetis corporis atque animi viribus, quando ætas prædatrix omnia secum aufert, mag-

num onus incumbere video, si consuetudini meæ nondum interruptæ obsecundare velim, ac vestram expectationem non omninò fallere. Audendum tamen ratus, in unum coactis, qui supersunt spiritibus, ita me comparaveram, ut quod antea præstiteram, hoc anno quoque pro viribus præstarem. Post aliquot igitur meditationes, argumentum non incuriosum, ut reor, nactus fueram, circa quod ingenii mei vires exercebam, cum præsens hæc autumnalis Constitutio præter modum insolens, atque ominosa, Opus quod moliebar, & ad umbilicum penè deduxeram, mihi è manibus excussit, & aliud argumentum à Medicis amœnitatibus longè diversum suscipere coegit, vestra tamen attentione A. O. non

indignum. Nemo non novit, quàm inopinatè, quàm violenter Bubulum genus dira Contagio pervaserit flammæ ad instar, quæ ope nulla humana consopiri, nedum restingui potuerit: Hæc primum quidem in Vicentino Agro suboscure observari cœpit, mox in Patavinum transgressa, apertè se prodidit, ac longè latèque effusa, usque ad ipsa Urbis Pomœria, tam magnam ac horrendam Boum stragem edidit, ut tum Rura, tum Civitatem mœrore, ac metu compleret. Mœret rusticana Plebs, imò stupet attonita, dum ampla Bovilia vacua, ac deserta intuetur, dum quotidie fere Tumulos adspicit, in quibus sepulta sunt Fortunæ suæ pignora, propriis natis forsitan etiam cariora, dum Bobus extinctis, Equos ad Frumenti sationem parum aptos cogitur sufficere.

*Quid labor, aut benefacta juvant,
quid vomere terras*

Invertisse graves?

Sic miserandam Agricolæ fortunam deflere libet cum Poëtarum Principe, qui tertio Georgicorum huic non abssimilem Boum cladem carmine descripsit. Mœrorem dissimulare nequeunt Cives, & Nobiles Viri, dum prædia sua, & Villas, præcipuo ornatu, & patrimonio orbata intelligunt, atque etiam vident. Tristatur, ac dolet Plebs urbana, dum Annonæ, rerumque omnium, quæ ad victum spectant, caritatem brevi secuturam prænoscit. Nemo est igitur, quæcunque sit ejus conditio, qui damnum aliquod non sentiat, & graviora quoque non timeat. De hac igitur tam portentosa Boum clade hodierna hac mea Dissertatione,

seu potius prælectione, quam hoc Anno ad tractatum de Febribus, ac præsertim de Febre maligna ac pestilenti, sum habiturus, verba facere constitui, hujus morbi Indolem, causas pervestigando, quibus remediis illi obviam sit eundum.

Nec obtrudat quisquam, in hoc tam celebri Lyceo, ab hac Exedra, quæ ordinis sui primatum obtinet, indecorum esse pro Hippocratica doctrina M. Varronis, Palladii, Columellæ, Vegetii, aliorumque Veterinariæ Artis Scriptorum documenta tradere; regeram enim ego, magnum Hippocratem, cui nullius rei scientia vilis habita est, non puduisse de Boum morbis verba facere, in Libro enim de Articulis, rationem adfert, cur Bobus tam facile contingant femorum luxationes. Præterea si Congruentia, quæ omnibus in rebus momentum habet non leve, hic quoque suam meretur animadversionem, tractatio de hac Boum Epidemia nostri muneris est, Illustrissimi, & Spectatissimi Professores, Vobis quaeso succurrat, quoniam in loco nos simus, & Professorium munus exerceamus? Nonne in Lyceo, cui à Majoribus nostris Bovis nomen est inditum? neque inauspicatò, quando Bos iste suis mugitibus, hoc est Doctrinæ robore totum litteratum Orbem implevit, ut nulla pars sit tam longè dissita, quæ ad illius celebritatem non reboet, ac ubi non colatur magis illius nomen, quàm olim Serapis in Ægypto. Si ergo sub signo Bovis militamus, si Bos iste nos pascit, quis erit tam vecors, seu tam malignæ Indolis, qui indecorum putet provinciam hanc suscipere, quam de-

detrectare velle impium, & nefas esset; eoque magis, quò ab Excellentissimo Magistratù, qui sanitatis tutelæ Venetiis præsidet, ac postremò ab ipso SERENISSIMO PRINCIPE demandatum est celeberrimo hujus Civitatis Medicorum Collegio, seriò exquirere, quænam sit hujus morbi conditio, quæ causa, & quibus præfidiis ferocienti in dies malo possit occurrì.

Affectiõnis genus, quod Bubulo generi bellum ad internecionem usque videtur indixisse, ex frigore, rigore, horripilatione, mox ex calore acri, & vehementi per universum Corpus diffuso cum pulsus frequentia, febrem esse satis liquet, malignam verò, exitialem, pestilentialem etiam, si mavis, esse apertè testantur, quæ illam comitantur symptomata; qualia sunt, magna anxietas, & gravis anhelitus, etiam cum stertore, & in principio Febris, stupor & species quædam veterni, continuus ex ore, & naribus graveolentis materiæ descensus, foetidissima alvi proluvies, interdum etiam cruenta, anorexia, & abolita penitus ruminatio, pustulæ quinta vel sexta die per totum corpus erumpentes, ac tubercula variolarum speciem referentia, communis tandem omnium eodem modo circa quintam, & septimam interius, cum Boves paucissimi evadant, iique fortè potius quædam, quàm remedium dynami. Hæc quidem ex se patent, quid verò intus patiantur miserandi Boves, cum jacent anxii, ac stertentes, ac dum stant immoti, capite usque ad terram demisso, conjectare equidem possumus, sed ex mutis animantibus, quæ

per nutus nihil significare possunt, nil certi rescire possumus, quod forsitan in causa est, ut difficilior sit curatio. Causam igitur hujusce malignæ febris pro viribus perscrutemur.

Omnibus epidemiis, si à sporadicis affectibus differre debent, id peculiare inest, quod communem causam habeant, sive ab Aëris vitio, sive à corruptis alimentis, aut ab aliquo contagioso fomite prognata fuerit, qui ab uno corpore in aliud transmigret, illique eandem labem communicet. Dissimulare quidem non licet, tempestatum hujusce anni non adeo legitimam fuisse temperiem, juxta illarum naturam, Æstatis præsertim, quæ Veris speciem præferre visa est non admodum latrantè Syrio, nec Cicadis arbuta rumpentibus. Annus tamen in universum non insalubris fuit, neque multum in quæstu Medicis, ac Pharmacopolis; nec solum in hac Civitate, sed in aliis quoque, & in transpadana regione, ut per litteras accepi, ut parum verax visus fuerit Hippocrates, quod *cum æstas veris similis est autumnales morbos expectare oporteat*. Nulla in aëre à Meteorele chis portenta visa sunt, nulla in herbis, & frugibus apparere rubiginis signa, quemadmodum Anno elapso, quo carbunculari morbo laborarunt fruges, nec tamen noxam ullam persensere Armenta, & Pecudes; in fructibus tum Æstivis, tum Autumnalibus, qui omnes ferotini fuere, nullæ deprehensæ sunt notæ, quas nebularum uredo inulserit.

Coelum equidem non consului, ut

viderem, num ex aliquo maligno astrorum influxu, pestilentiae bubuli gregis causam divinare liceret, ut ex Saturni cum Marte syzigia, in Tauri signo, quemadmodum olim Marfilius Ficinus, in Consilio quodam Thufco Sermone edito, ut ab omnibus intelligeretur, Pestis quæ Anno 1478. totam Etruriam, ac præcipuè Florentiam, depopulata est, causam retulit in conjunctione Martis cum Saturno in signo humano (quasi Asterismorum in hæc inferiora virtus ab inditis nominibus esset petenda, ut si fortè huiusmodi conjunctio obfervaretur in signo Arietis, aut Piscium, posset aliquis ovilli generis, aut marini populi excidium prædicere.) Sed postquam, cum Juvenis essem, Pici Mirandulani libros adversus Astrologos legi, Judiciariam à studiis meis valere jussi. Aërem itaque, & pascua, ab hoc crimine quod hujus morbi in causa fuerint absolvere fas erit. Quis enim unquam sibi persuadeat, campos, & prata, talem ab Aëre humorem combibisse, qui folis Bobus tam dirum esset venenum, cæteris verò animantibus, quæ easdem herbas pascere, esset omnino innoxius? Aliam igitur causam comminisci oportebit, quam nonnisi à Contagioso fomite licebit deducere, cujus rei non simplices conjecturas, sed argumentum habemus apodicticum.

Jam satis constat, & in acta publica relatum, ex Boum turmis, quos è Dalmatia & conterminis regionibus, mercatores in hæc loca solent adducere, Bovem unum à cæteris secessisse, qui à Bubulco repertus, & perductus in latifundium Illustris-

fimi, & Reverendissimi Comitis Trajani Borromæi, Canonici Patavini, pro hospitio, eadem labe qua erat infectus, hospites suos fecidavit, illo enim paucos post dies mortuo, paulatim eodem morbi genere omnes miserè periere, uno tantum superstiti, cui in collo factum fuerat setaceum. Casus iste totam viciniam perterrefecit, sed nulla juvit diligentia, ut domus suas, & casas à flamma nimis vicina præservarent. Istæ itaque contagio paulatim serpens, totam Patavini agri amplitudinem brevi pervasit, quin postremò Padum transgressa, Æmiliæ Populis idem minatur excidium.

Quoniam autem morbofi seminii ea est indoles, ut facile sobolescat, & in immensum se propaget, si in subjectum proprium, & muniatum, ut vocant incidat, cujus rei amplissimum specimen habemus in lue gallica; quæ ex Indiis occidentalibus, à paucis navigantibus ad nos delata, Italiam primò, mox universam Europam, fœdissima, & ineluibili labe citissimè inquinavit; Non est quòd miremur, si per aporias, & effluvia, quæ ad modum atmosphæræ expirant à Bobus ægris, ab extinctis, à Stabulis, à Pascuis, quæ ipsimet Boves pascendo infecerint, promptius autem & facilius ab ipsis Bubsequis, & illorum vestibibus, (pesti enim volupe est, in lana molliter cubare) non est inquam, quòd miremur, si hæc contagio tam longè latèque se se effuderit. Ubi igitur hæc Aura venenata subtilissima Bovem aliquem antea sanum afflarit, spiritibus vitalibus, & seroso latici se consocians, dum in Orbem

Orbem agitur, naturalem sanguinis consistentiam lædit; & viscerum fermenta corrumpit; quare naturales viscerum functiones paulatim vitari, & debitas excretiones coerceri necessum est, quod paulatim fieri fas est credere, non enim subito ac Bos aliquis venenum istud hauserit, vel quoquomodo illud susceperit, non illico inquam virulentiam perferit; ut qui à cane rabido commorsus fuerint, ad longum tempus sibi sani videntur, at postea ex improvviso, ad aquæ conspectum palam faciunt, quam dirum venenum intus gestarent. Naturalem sanguinis consistentiam ab hoc contagioso fomite lædi paulò ante diximus, suppono etenim, imò pro certo habeo venenum istud esse de illorum genere, quæ sanguinem potius figant, & coagulent, quàm dissolvant; id primùm attestantur symptomata, quæ febrem comitantur, nempe anxietas, gravis anhelitus, stertor, & stupiditas, ocularis quoque inspectio, dum à Laniis Boves extincti dissecantur, qui licet adhuc calentes parum aut nihil sanguinis effundunt. Bos præterea piger ac tardus ex sua natura est, & Carnes habet duras, & *graves ad stateram*, ut ait Hippocrates, data nimirum paritate molis ad carnes cæterorum Animalium, idcirco illius sanguinem talem esse oportet. Taurinum sanguinem inter venena recensuit Dioscorides, eò quòd epotus ad coagulationem in stomacho sit facilis, Prævotius autem propter flatulentiam; Themistoclem sanguine taurino calido epoto sibi mortem conscivisse, ex Plutarcho, in ejusdem vita habemus. Mirum itaque non est si vene-

natus hic fomes, in hujus animantis genere sanguinem ex sua natura crassum coagularit. Hanc cruoris concretionem in malignis febribus observârunt Scriptores, uti Petrus Salius, qui refert in quâdam ex malignâ febre extinctâ repertum fuisse in Arteria magna sanguinem ita concretum, *ut prehensio illius sanguinis altero principio, totus sanguis coalescens, ita integer eductus fuerit, perinde ac gladius è vagina extrahi solet.* Idem quoque aliquando in pestilentiis accidere testatur Richardus Lover in tractatu de corde: Nisi autem talis esset in hac Epidemia sanguinis conditio, non protraheretur ad tot dies febris; ubi enim sanguis est nimis dissolutus, & vis deleteria humorum corruptioni prævalet, febrilis calor est adeò mitis, ut ægri interdum se febrile non putent, sed citissimè intra unam vel alteram diem occumbant. Postquam igitur fermentificus, & pestifer hic fomes per venas, & arterias tanquam per cuniculos totum corpus peragravit, tunc, tanquam hostis ex insidiis erumpens feritatem suam patefacit, febrem malignam excitando, quæ intra quintam, aut septimam, laniem suam absolvit, indiscriminatim Boves aratores, Tauros, Vaccas, Juvencos, Vitulos jugulando.

Hujus autem Pestis primam originem, num Bos ille peregrinus eam aliunde susceperit, vel in ipso primùm genita fuerit, exquirere ad rem nostram parum refert. Necessè est enim quemadmodum in libro de Contagione tradit Fracastorius, ac pariter Joseph Aromatarius, in libro de rabie contagiosa, quòd ad aliquod

Animal tandem fit deveniendum, in quo productum fuerit morbosum seminum. Extra enim controversiam est non solum in Brutis, sed etiam hominibus per varios corruptionis gradus, generari posse venena, ac talis naturæ humores, qui ad alia corpora symbolica, & analogia facile transeant: sic qui tabe pulmonari laborant, consanguineos suos facile inficiunt, si cum illis consuetudinem habeant; Lippitudinem contagiosam esse vetus est observatio.

*Dum spectant oculi læsos læduntur
& ipsi,*

*Multaq. corporibus transitione
nocent.*

In Boum cadaveribus, quotquot Lanionum secespitæ subjecta fuere, coram Excellentissimis Anatomes Professoribus D. Molinetro, & Viscardo, id singulare in omnibus repertum est; in Omaso nempe, corpus quoddam durum, & compactum, ventriculi parietibus fortiter adhærens, magnæ molis, & intolerandæ graveolentiæ; in aliis verò partibus repertæ sunt hydatides, in cerebro, pulmonibus, sicuti etiam ingentes vesicæ solo flatu plenæ, quæ dissectæ diram Mephitim exhalarent, ulcera in radice linguæ, & ad illius latera vesiculæ sero plenæ. Illud verò corpus durum, & compactum ad instar calcis, quod in Omaso observatur, primum productum esse contagiosi miasmatis, pro certo habeo, dum tacite sævitiem suam exercens stomachicum fermentum labefactat, & corrumpit; non enim est credibile post febrem excitatam conflare hoc corpus intra paucos dies, dum Boves ubi primum febrile coeperint,

quodcumque alimentum adversantur, nec quidquam, nisi liquidum per os infundi potest: cætera verò, quæ memoravimus, malignæ febris producta esse, facile crediderim, sed omnium Phænomenorum exactam rationem adferre velle non patitur unius horæ ambitus; ampla enim materia suppeteret ad integrum tractatum conscribendum.

Verum ne amplius vos morer, A. O. ad ea properabo, quæ sunt dicenda, conjectando nempe quem finem habitura sit hæc contagio, & num aliquid gravius portendat, ac quod magis refert, quid addendum. Quoad primum in hac Epidemia, idem quod in cæteris evenire solet, secuturum existimo, nimirum quod post tot tentamina, tot experimenta, ac præsertim post observatam methodum, quam morborum Medicatrix Natura servat in iis Bobus sanandis, quos maligna febris non sustulerit, felicior curatio possit institui, ac forsitan hujus veneni verum, & specificum remedium reperiri, quo malignum istud miasma penitus extirpari possit. Levamen quoque aliquod expectare licet ab adventante Hyeme, ac à ventis aquilonaribus, qui tanquam Aëris scopæ australes flatus pessimæ semper indolis procul abigant, quales venti per totum Octobris Mensem dominatum obtinuerunt. Memoratu dignum est, quod de ventorum potestate supra humana corpora refert Vitruvius. *In insula Lesbos (inquit ille) Oppidum Mitylene magnificenter est ædificatum, & eleganter, sed positum non prudenter. In qua Civitate Auster cum flat, homines ægrotant, quando*
Corus

Corus tussunt , cum Septentrio , omnes in salubritatem restituntur. Quantum sævierit Pestis Octobris mense , Austro , & Euronoto flantibus , satis vulgatum est , cum plures dies adeo nefasti fuerint , ut neque quotidianis hecatombis , interdum etiam geminatis , furialis hæc , & execranda febris mitior fieri , nedum placari potuerit. Scio equidem , calori , & frigori morbos pestiferos non admodum auscultare , cum aliàs fuerit observatum , in summo æstu , & summo frigore pariter sævisse hominum pestem ; attamen cum feralis hic morbus , qui celeris est motus , ortum habuerit æstivo tempore , incrementum , atque etiam suam acmen autumnali , sperare licet , quòd hyemali tempore finem , & sui desitionem , ope divina sit habiturus.

Num autem hic Epidemicus Bovini populi morbus longum in tempus perseverans , humanis corporibus labem aliquam affricare valeat , ut nonnulli suspicantur , non alienum est disquirere. Si in morbis malignis , qui ratiocinia nostra persæpè eludunt , quidquam ponderis habent rationum momenta , sperare licet homines intactos , & illæfos relicturum esse ; etenim si trium mensium spatio lues ista alia Ruminantia , & Cornigera non attigit , quamvis inter ea magnus sit symbolisimus , nec Equos , fues , ac alias Sylvestres feras hætenus quidquam læsit , non apparet ratio , cur homines , qui ab istis Animantibus tam longè distant , debeat afficere.

Non sum nescius inter futuræ pestilentiae signa , quæ plurima sunt , recenseri solere non Boum solummo-

dò , sed aliorum quoque animantium stragem , qualis ea fuit , quæ Ægyptum insulam depopulata est , de qua Ovidius :

Strage Canum primo , Volucrumque Aviumque Boumque.

ac ea , quam memorat Livius , quæ in Sicilia Romanum exercitum , & Carthaginensem pene delevit , de qua Silius Italicus :

Vim primi sensere Canes , mox nubibus atris

Fluxit deficiens penna labente , Volucris.

Cui aliam non absimilem refert Dionysius Halicarnasseus , quæ primò Equorum , Boumque armenta invasit , mox pecudes , & alia quadripedia aggressa est , deinde Pastores , & Colonos attigit , & totum Romanum agrum pervagata , Urbem invasit. Ast illorum temporum pestilentiae non in solis Bobus , sed in omnibus animantibus , ut ipsis etiam Maris Piscibus non parceret , (qualis ea fuit , quam Lucretius carmine descripsit) sævitiem suam exercere , ut quæ ab Aëris vitio ortum duxissent ; de quo non habemus quod suspicemur ; in solis enim Bobus , & facilius in iis , qui habitiores , & pinguiore essent , quàm in gracilibus , hæc lues alimentum invenit , quo rabiem suam pasceret. Magna tamen curatione utendum est in tumultandis cadaveribus , terra altè defossa , quemadmodum publica edicta præscribunt : si quid enim timendum , præcipuè à nimia cadaverum copia , ex quibus minus aptè humanis , ac postea putrefactis , redeunte Vere , pravi halitus Aërem inquinare possunt. Bonum autem esset , in

loco inculto, seu in pratis, quæ arationi non sunt subjecta, cadavera humare. Ubi enim de morbo contagioso agitur, nunquam satis cavemus, dum cavemus. Quoniam autem, solutis in liquamen Cadaveribus, necesse erit terram subsidere, censerem, bonum esse novam terram superingere, in illam conjiciendo graminis, aliarumque herbarum semina. Refert Petrus Forestus Delphis apud Batavos Peste jam sopita, & cœmeterio Templi vetusti, cadaveribus oppleto habitam consultationem inter medicos, nūm Calce, aut Lapidibus illud cœmeterium esset obruendum, ac decretum fuisse ut multa terra superinduceretur, atque in eam varia herbarum semina conjicerentur, *ut crescente gramine, & clausis spiraculis lues minus denudò suppullularet.*

Silentio tamen præterire non licet, observatam aliquando pestem in solis Bobus, ac postea secutam hominum pestilentiam; interdum etiam hominum Pestem in Boves terminasse. Primum exemplum habemus ex Livio, qui scribit pestem magnam in Boves ingruisse, sequenti anno ad homines vertisse. Secundum verò apud Ripamontium Chronistam Mediolanensem, qui in Libro de Peste, quæ anno trigesimo exacti nuper seculi cispadanam, & transpadanam regionem pessimè mulcavit, pestilentia hominum, pestem Boum subsequutam refert. Hisce tamen duobus monumentis totidem habemus, quæ opponamus nec longè petenda. Primum à celeberrimo Fracastorio, qui in Opere doctissimo de Contagione scriptum reliquit, Anno

decimo quarto supra sesqui millesimum diram pestem in solos Boves irrepsisse, quæ in tractu Forojulien-si primum nata, exinde usque ad Euganeos, postmodum in Veronensem agrum, aliasque Venetæ Ditionis regiones delata, magnam Boum cladem ediderit eodem fermè modo, ac iisdem symptomatibus, ut hæc nostra illius soboles videatur. Alterum monumentum suggerunt nobis manuscripti Artis Lanionum, quibus non est deneganda fides, quales libri in hac Civitate asservantur, in quibus ad posterorum memoriam ab Antonio Faccio scriptum legitur, Anno nonagesimo nono ejusdem seculi, quo vixit Fracastorius, adeò gravem in Boves pestem grassatam, ut publicis Augustissimi Senatus Veneti Edictis vetitum fuerit, ne Caro Bubula, Caseus recens, Butyrum, Lac sub capitali pœna in hac Civitate divendi possent, sed solis carnibus Vervecinis vesci liceret; attamen iis annis nihil sinistri, præter rei familiaris damnum hominibus obtigisse, certò scimus; habemus igitur unde spes nostras alamus.

Utrum autem, grassante hac Epidemia, carnis bubulæ sanæ creditæ adeò tutus sit usus, ut noxam ullam humanis corporibus non possit inferre, abs re non erit disquirere. Res equidem suspitione non vacat, etenim, etiamsi Bos antequam ad lanienam ducatur, fuerit observatus vegetus, atque hilaris, ac postea in illo jugulato, & excoriato, nullæ in visceribus deprehendantur corruptionis notæ, quæ in cæteris, qui ex hoc morbo intereunt, deprehenduntur, attamen certi non sumus, quòd

quòd Bos ille contagiosum fomitem non gestaret, quod aliis etiam communicare posset: credibile est enim, paucos apud nos esse Boves, qui afflatum hunc malignum non persenserint; licet sani degant, morbofi enim seminii ea est subdola malitia, ut hominum iudicia non rarò fallat; persæpe enim evenit, ut qui illud in se continet, & secum circumfert, læsionem nullam sentiat, nec forsitan sensurus sit, in alium tamen ejusdem speciei possit facile transferre. Hujus rei exemplum habemus in gallico morbo; non rarò enim contingit, ut aliquis à muliere infecta luem suspiciat, nec quidquam sentiat, & Uxori postea eam communicet, sic ut illa paucos post dies gonorrhœa, vel bubone corripiatur; ex quo fit, quod non leves rixæ, & jurgia inter conjuges oriantur, & Uxor pudicitiae suæ conscia virum maledictis incessat, quod ab illo tam fœda labe inquinata fuerit, ille autem, qui se perfectè sanum agnoscit nec quidquam de infectione suspicatur, de conjugis fide non parum dubitet. Qua de re legendus Paulus Zachias, Mercurialis, Gaspar à Rejes. Circa esum carnis bubulæ memoratu dignum est quod refert Theodoricus Skenkius in Hist. humor. gen. cap. 2. his verbis: *olim decertatum Venetiis, & Patavii inter Lanios, & incolas, quod illi ex Hungaria Boves advectos, emptos & mactatos in Macello venditassent, quos tamen Cives lue quadam infectos fuisse noverant, cum fluxu alvi cruento tentati plurimi periissent, translato nimirum ab uno ad alterum contagio. Hac de re consulti*

Medici Patavini, in ea fuere sententia, Carnes hujusmodi esui adhibitas innoxias esse, eo quòd esset contagium particulare, & specificum, ac omnis malitia fuisset emendata ac discussa à prævia agitatione gymnastica, antequam Boves mactentur. Contrariam opinionem sustinuisse Medicos Venetos tradit Christophorus Fridericus Garamannus in Operè suo eruditissimo de Mortuorum miraculis, eo quia carnes hujusmodi essent contagiosæ, & cadaverosæ. Fabius Paulinus Medicus Utinensis controversiam hanc dirimere aggressus est, suam enim sententiam dixit, nimirum si necessitas urgeat *in cibum carnes vocare, sale aut aceto prius probè esse macerandas, visceraque cum aliis interaneis esse abjicienda, cum in iis causæ morbificæ focus & Nidus existat.* qualis cautio num sufficiat, & omnem dubitationem tollat, liberum cuique esto iudicium.

Quid ergo agendum in tam exitiali morbo, qui bubuli generis extinctionem videtur interminari? In id unum incumbendum esse, persuasum habeo, ut per universalia alexipharmaca (quando particulare, & specificum hujus Veneni remedium non habemus) miasma istud pestiferum extingatur, aut saltem enervetur, ut natura roborata illud ad cutis ambitum ableget, atque extrudat, quando per ulcera, pustulas, & tubercula in iis. Bobus, qui evasere, sponte excitata ipsamet natura, nobis indigitavit, qua via sit incedendum. Crediderim itaque in curatione hujus malignæ febris, ea Methodo procedendum, quæ à bonis Medicis servatur in curanda

variolosa puerorum febre, distinguendo tempus ebullitionis à tempore expulsiōis; tempore nimirum ebullitionis erit cautè utendum remediis calidioribus, ne intendatur calor febrilis, & plus æquo effervescat massa sanguinea, cui facile succedit perturbata coctio, quam Natura rectrix intendit, qua in re non leviter peccatum esse censeo, cum hujus febris initio ad calidiora cardiaca ventum fuerit, & præcipuè ad vina meraciora cum multa theriaca; quare præposterum remediorum usum, stragem longè majorem edidisse censeo, quàm febrem ipsam. Non desunt Medicæ Praxis docti Scriptores, qui in variolosis constitutionibus in principio febris præcipitantibus utendum esse volunt. Dum hæc sub prælo essent, apud amicum ea legi, quæ Illustrissimus D. Joannes Maria Lancisius Clementis XI. P. O. M. Archiater meritissimus, ac Intimus Cubicularius perdoctè, & eruditè, ut solet in omnibus, de hoc morbo consultus, scripsit; nam inter varia monita, hoc habet, quod cardiacis acida sint maritanda. In Febris itaque principio moderatè agendum per alexipharmaca, in progressu verò morbi, & despumationis, & expulsiōis signis liberalius Bezoardicis utendum.

Ut autem ad remediorum materiam descendamus, quando id unum est, quod expetitur, & à nobis exigitur, nequaquam verò nuda verba. Quoad præsidia externa, sanguinis missio visa est improsperè cessasse, idcirco coepta est omitti; nihil tamen sævitiae suæ remisit morbus; imo trüculentior factus est. Equi-

dem in omnibus Epidemiis suspecta est Phlebotomia, sicuti purgatio, unde Celsus: *Sanguinem non facile mittere, alvum non facile ducere*; in febre tamen variolosa passim mittitur sanguis, in pueris bimis, aut trimis per cucurbitulas scarificatas, & quibusdam in locis etiam per venam sectam, in principio tamen febris. In hac itaque Boum febre, non salubrem tantum, sed necessariam fore venæsectionem crediderim, ad sarcinam minuendam, ut mitior fiat ebullitio totius massæ sanguineæ, & per sua vasa circulatio. Cum enim, ut diximus, Bovis cruor ex sua natura sit valde crassus, & ad facilem concretionem pronus, atque venenum istud de illorum sit genere, quæ massam sanguineam coagulandi vim habent, quo precor remedio laboranti Bovi, & anhelanti ob sanguinis concreciones in vasis sanguifluis, in pulmone, in Corde, quàm per ipsam sanguinis missionem promptius, & facilius poterit succurri? Animadversione dignum est, quod lues ista, Boves robustos, & valde obesos facilius corripiat, macilentos verò, qui vix ossibus hæreant, prætergrediatur; propterea in hac febre, quæ non absimilis est iis, quas appellant inflammatorias (quales sunt, quæ in pleuritide, peripneumonia, angina observantur) sanguinem in fervorem actum, & alioquin ad coagulationem aptum, detrahere, salutare consilium erit. Clamitet autem ad ravim usque contra hanc operationem quisquis velit; non enim video, (si tamen per analogismum in curanda hac febre licet procedere, ut in curatione febris

bris pestilentis, quæ homines corripit) ego, inquam, non video, cur miseranda hæc Animalia, dum februnt, & oculis lacrymantibus, opem aliquam quodammodo implorant, hoc magno remedio debeant destitui; morbi enim magnitudo, plethorica dispositio, ob pascua hoc Anno solito uberiora, phlebotomiam manifestè exposcunt, in principio tamen febris, dum vires validæ permittunt, quam doctiores Medici in febre pestilenti, uti Sennertus, Septalius, Antonius Ponce, Sancta Crux, Fracastorius, & alii gravissimi Scriptores admittunt. Certè vires horum animalium, in ipso etiam vigore morbi satis validas esse observavi, è stabulis enim educti, & per campos circumducti experiundi causa, num herbam aliquam velint pascere, robustè incedunt, & suæ libertati relictæ, ad stabula promptè recurrunt. Circa porro venarum delectum, non adeo laborandum; ubi enim ad vasorum plenitudinem tollendam mittitur sanguis, parum refert, an ab hac, vel illa vena mittatur.

Inuisiones quoque lato ferro candenti faciendæ in collo utrinque, sublata enim eschara, apparebunt ulcera, quæ vesicantium loco esse poterunt; aures quoque rotundo ferro perforandæ, indita postea radice hellebori, ut Veterinarii Scriptores suadent; similiter sub mento perforanda palearia, injecto postea funiculo, quem setaceum vocant, indiget enim Natura aliquo emissario, per quod venenum istud exanthlet; nulli enim comperti sunt evasisse Boves, nisi per pustulas in cutè excitatas, multum crassæ, ac foetidæ materiæ fundentes, nec Bovem ul-

lum, qui sic purgatus fuerit, recidivam passum fuisse adhuc accepi; nam ex Hippocratis oraculo in sexto Epidemiorum; *Quidquid suppuratur non revertitur; ipsa enim maturatio, & judicatio simul, & abscessus.* Observatione dignum est, quod refert laudatus Fracastorius, ait enim, eos *Boves, quibus labes à faucibus ad armos descendebat, & inde ad pedes, sanatos fuisse, quibus autem hæc permutatio non fiebat, ut plurimum interiisse.* Linguam, & palatum, aceto, & sale colluere sæpius oportebit, frictiones pluries in die faciendæ ad faciliorem perspirationem obtinendum, ac ut cutis paratior sit ad recipienda rejectamenta nervorum & arteriarum in glandulas. Cum persæpe in faucibus generentur tumores & crustæ, uti fit in variolis, ut nihil per os possit infundi, compertum est baculum salignum viridem Butyro inunctum, longitudinis ulnæ, & amplius per os inditum, valde contulisse ad impedimentum illud tollendum.

Quoad præsidia interna, hæc è triplici regno erunt petenda. E vegetabili plantas multas habemus cardiacas, quarum magna est supellex; Decoctio itaque in aqua fieri poterit ex foliis Scordii, Cardui Benedicti, Dictamni Cretici, Centaurii, Radicibus Gentianæ, Tormentillæ, Scorzonæræ, & similibus, quibus addi poterunt cicoracea & ad illarum calorem temperandum, quæ decoctio, bis, vel ter in die per os infundi poterit ad duas, vel tres libras. Cum verò febris ad statum pervenerit, decoctio ista ex prædictis

etis plantis debebit esse saturatior ad expulsionem promovendam. Camphora quoque magnum antipestilentiale, accensa, & in aquam conjuncta, potionem efficiet aptam ad pestiferum Miasma perdomandum, & Diaphoresim promovendam. Pulveres quoque ex iisdem plantis parati, & in aqua cardiaca dissoluti, exhiberi poterunt.

Ut autem præter universalia alexipharmaca, quæ pro malignæ febris curatione à vegetabilium classe abundè suppetunt, aliquod singulare proponamus, placet expendere, num solenne illud antipyreticum, h. e. cortex peruvianus, vulgo China Chinæ, ad malignam hanc febrem expugnandam salutare remedium esse possit. Equidem hoc præsidii genus in febribus periodicis miranda præstat, ac præsertim in tertianis intermittentibus malignis, quæ in ipso impetu accessionis, ægros interdum necant, quarum febrium in Constitutionibus meis epidemicis Mutinensibus mentionem habui; hoc enim febrifugum, fermentum illud malignum, sive penitus restinguit, sive ita enervat, ut periculum illud tollatur, ne æger in ipso febris accessu intereat; at in febribus continuis, & inflammatoriis, perrarò ex corticis peruviani usu, febrem solutam observavi; si tamen habenda fides Richardi Mortoni rationibus, & experimentis, qui in quacunque febre venenum quoddam spiritibus vitalibus hostile agnoscit, cur in hoc Bovini generis morbo experiri non licebit hujus febrifugi virtutem? Istæ enim Boum febris continua, & acuta, à febribus continuis ab ali-

qua inflammatione comitatis, quæ homines corripunt, nullatenus differt; licet Joseph Aromatarius ex Antiquorum doctrina differentiam aliquam statuatur inter febres brutorum, & febres hominum, ut brutorum febris *κραιπνὴ*, hominum vero *πυρετός* vocitetur. Possent itaque uncix tres pulveris Chinæ Chinæ (quando hujus remedii largior dosis esse cœpit, quàm olim) infundi in libris decem vel duodecim aquæ cardiacæ, seu vino non admodum generoso, quæ infusio inservire poterit pro quatuor, vel quinque dosibus, bis illam in die exhibendo, in febris tamen principio, & cum primum Bos ægrotare cœperit.

Sua quoque remedia suppeditabit regnum animale; Cornu Cervi primas tenebit, infusio itaque ac decoctio, & quæ ex eo parantur remedia erunt ex usu. Pulvis viperinus, qui febrilem calorem non adeo intendet, bis in die exhiberi poterit ad drachmam unam, in aqua cordiali tepida pariter dissolutus; efficacior tamen esset vipera una, vel altera in aqua cordiali decocta: febris enim ista intra paucos dies cursum suum absolvit. Quoniam autem inter cætera symptomata, gravi anhelitu, & stertore Boves premuntur, sperma ceti-tanquam remedium aptum ad dissolvendas sanguinis concretiones, & in asthmate usurpari solitum, præscribi poterit ad drachmas duas in vinò tepido dissolutum. Mineralia quoque, ut quæ non tam facile à calore nativo, & digestiva facultate alterantur, uti vegetabilia, & animalia, sed integris viribus corpus pervadunt, symbolum suum confe-

ferent. Antimonium diaphoreticum, paratu facile, & exiguæ impensæ, quod nihil aliud est, quàm Antimonii crudi in pulverem contriti, cum æquis partibus Nitri, in crucibulo, vel mortario Æneo per carbonem ignitum, aut bacillum ferreum candentem, conflagratio, ter, vel quater repetita, addita semper novæ conflagrationi æquali portione salis nitri, erit proficuum remedium ad obtinendam illam, quæ expetitur, expulsionem diri veneni ab intimis ad extrema. Quoniam verò repertos ajunt esse lumbricos, & Ascarides in intestinis, quod perfacile est credere, cum etiam in pestilentiis hominum observari soleat verminatio, non solum in ventriculo, & intestinis, sed etiam in aliis partibus, quod in scrutinio Pestis tradit Pater Athanasius Kircher è S. J. & animatam putredinem appellat, ad remedia anthelmintica erit confugiendum; Mercurii infusio, ad libram semis super cineres calidos, in aliqua ex prædictis aquis optimum erit remedium, cæteris quæ decantantur præferendum; quando enim inter helminthicos scriptores disputari solet, num acida, an dulcia ad vermes necandos sint usurpanda, Mercurium, licet insipidum, id valenter præstare, & frequenti in usu esse, pro certo habemus. Idem quoque efficiet Mutinensis Agri petroleum; præter enim id, quod vermes enecat, putrescentiam quoque corriget, & diaphorescos erit stimulus. Nostrates rustici, cum vitulos habent verminantes, quod facileprehendunt ex odore, quem Vituli expirant, cum lacte exhibent istud

petroleum, ad guttas aliquot per os infundendum.

Quoad alimentum, potiones parari poterunt, ex farina hordei, tritici, panis contriti ad instar ptisanæ. Pro potu laudatur fœni puri, odorati, mense Maji collecti, in aqua Maceratio, quod potionis genus hisce animalibus gratum esse observavi. Externorum quoque habenda est ratio. In loco calido Boves detinendi, & custodiendi stragulis cooperti, cavendo quantum licet ab Aëre frigido; quotidie stabulum suffumigando ex baccis Juniperi, Galbano, & similibus.

Atque hæc quidem ad Therapœiā; modò pauca quædam documenta pro hujus meæ prælectionis Coronide, in prophylaxeos gratiā lubet proponere, quando longè præstantius est præservare, quàm curare, sicuti satius est tempestatem prævidere, ac illam effugere, quàm ab ipsa evadere. Cum igitur Boves ab agris post labores in stabulum ad hyemandum jam sint deducti, ut milites ad castra hyberna, magna diligentia studendum erit, ut ea loca in quibus Boves sani degere debeant munda sint, quantum fieri potest, ac sæpè suffumiganda, quæcunque animalia, ut fues, oves etiam ab illis arcendo. Solent rustici, ut stabula hyeme sint calidiora, finum, & excrementa Boum in iis cumulare, sed satius si quotidie alvinas fœces aliò adsporent. Consilium salubre erit parietum crustas abradere, eò modò, quò Judæi ex legis edictò jubebantur cubiculorum, in quibus leprosus aliquis habitasset, parietes crusta denu dare; & flore calcis obducere, solum

autem in hoc casu muros eradere sufficiet; timere enim licet, ne recentis calcis odor hyemali tempore Bobus inibi conclusis possit officere. In id quoque erit incumbendum, ut pura, & munda sint illorum alimenta, cavendo, ne foenum, paleæ, & alia, à pluviis; & illuvionibus fuerint inquinata, parcius quoque erunt alendi, ne plus æquo pinguescant; non enim hoc anno polysarcia, sed sanitas procuranda. Æstate quidem, quo tempore, in frugum tritura, aratione, & plaustrorum vectura exercentur, ac multum est quod diffatur, plenius sunt alendi; aut hyeme, hoc anno præcipuè, quo suspecta est saginatio, & macies tutior visa est, moderata diæta in iis nutriendis erit utendum.

Frictiones pluries in die adhibendæ, non solum manu, sed strigilibus quoque; multum enim conferent ad sanguinem in sua fluiditate continendum, simulque ad superfluitatem exauriendam, si præsertim frictionis sint validæ: habet enim hoc præsidii genus varias facultates, modo implendi, modo extenuandi. Celsus ex Hippocrate scripsit; *Frictione, si vehemens sit, durari corpus, si lenis molliri, si multa minui, si modica impleri.* Si nimis pinguescant, quandoquidem hoc anno copiosa erit bubuli generis annona, posset etiam institui phlebotomia, sed diæta si fuerit conveniens, venæ sectionis, atque etiam purgationis erit vicaria. Postremo cum ex observatione Boum, qui in hac tempestate evaserint, satis constat, naturam per crustas, & ulcera excitata in corporis ambitu, & multam saniei expurgationem, morbosum illud miasma,

luem hanc expugnasse, sanum consilium foret emissarium aliquod in bobus sanis aperire, per quod si qua sint vestigia morborum seminii, illa sensim extrudantur. Aureum documentum habemus ex Hippocrate in 6. Epid. ad rem nostram accommodandum, hisce verbis. *Decubitus quidem, in quibus facta tollit, hæc ante facta prohibet.* Locus quidem subobscurus est, uti sunt Hippocratis Oracula, sed illum egregiè explicat Vallesius; ait enim, decubitus à natura factos, *qui sunt aliorum morborum medela, eosdem morbos antevertere, & præservare, si tales decubitus arte procurentur, non simpliciter tamen, quemcumque decubitum, sed illum, qui facta tollit.* Non inutile igitur foret sanis Bobus, palearia sub mento candenti ferro perforare, atque funiculo indito, apertum illud diu servare, ut per illud paulatim egerantur impuritates illæ, quæ hujus contagiosi fomitis sunt soboles, & in capite potissimum acervari solent.

Sed cur ingenii mei tenuitatem frustor, ac divexo, ut morbi hujus naturam, & causas explorem, ac Medicinæ præcepta ad veterinariam traducam? Jamdudum veram, & immediatam hujus ferini morbi causam agnovit, ac patefecit Purpurati Principis, ad hujus Urbis incolumitatem coelitus demissi admiranda pietas & sollicitudo: nullam aliam scilicet esse causam, quam Deum justissimum criminum vindicem, nobis iratum; sicuti etiam idem unicum & verum aperuit antidotum, decretis ad plures dies supplicationibus ad coelestem iram placandam. Magna sanè frequentia clausis ubique Officinis, ad excelsam

excelsam hujus Urbis Basilicam concurrere est, ut nunquam aliàs tantum in unum populi conventus fuerit observatus, nec tanta erga Superiores reverentia, ac pietas. Neque verò fervor hujusmodi postea refrixit, uti aliquando fieri consuevit, sed perstitit, magno ad alia celebriora Urbis Tempia Populi confluxu, quin cœteris Civitatibus, quæ eodem malo premuntur, exemplo fuit, ut ad divinam opem implorandam publicis precibus confugerent. Hæc tam subito mutata rerum facies & recens nata hic, & alibi pietas, quam graviorum malorum metus expressit, in mentem revocant magnam illam Romanæ Urbis consternationem, quam Livius hujus Civitatis immortale Decus, tam egregiè descripsit, quando nimirum Annibal, fufis, ac deletis Romanis exercitibus, ex improvise Romam petiit, ac illam tam arcta obsidione preffit, ut trepi-

dantis Civitatis clamores audiret; subito enim terrore percussus Romanus Populus, ad Tempia, & Aras Deorum turmatim concurrebat, ut victimas mactaret, & pro publica salute vota conciperet; visebantur mulieres passis crinibus, effusæ in lachrymas, cum parvis liberis ad Tempia convolantes, ac ibi ad Simulacra Deorum armillas, annulos, aurea monilia appendere, ferreas scilicet Poenorum catenas, & asperrima vincula metuentes. Hanc eandem consternationem eleganti carmine descripsit Silius Italicus. Labet hîc Carmina hujus Poetæ verè aurea ad rem nostram apponere.

*Tanta adeò, cum res trepidæ,
reverentia Divum*

*Nascitur, & raræ fumant felici-
bus aræ.*

Num hisce temporibus congruant hi duo versus, Vobis A. O. judicandum relinquam.





THOMÆ
SYDENHAM, M. D.
TRACTATUS
DE PODAGRA
ET HYDROPE.

*Non fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum, quid
Natura faciat, aut ferat. Bacon.*

Doctissimo Viro

THOMÆ SHORT, M. D.

Coll. Med. Lond. Soc.



N tibi, Humanissime Vir, Tractatulum de Podagrâ & Hydrope,
loco spissioris voluminis quod animo destinaveram; Historiam
intelligo Morborum Chronicorum, eorum maximè circa quos mea
Praxis potissimum versata est. Cum verò omnem cogitandi vim
atque omnes nervos his rebus plus satis intendendo, atrocior
podagræ paroxysmum mihi accersiverim quàm quo alias, ut pu-
to, fueram multandus, res ipsa monebat, ut has lucubrationes vel invitus po-
nerem, & mihi tandem ipse consulere, hos tantùm morbos duos quadantenus
expedivisse contentus. Quoties enim ad hæc studia me recipiebam, toties &
Podagra

Podagra recurrebat. Hoc itaque operis, quale demum id est, accipere digneris; quod Tibi duabus potissimum de causis dicandum censeo. Primum, quod earum, quas jam olim in publicum dedi, Observationum, à quibusdam despectarum, utilitatem aliquam non tantum me coram atque in os, sed etiam coram aliis agnoscere atque asserere nullus dubitaveris. Deinde quod ex aliqua consuetudine quam mutuam habuimus, Consilia in commune pro Ægrorum commodis conferentes, Ego tuum Geniumprehenderim ad Praxin Medicam apprimè factum: quodque tametsi doctrinâ omnis generis inclarescas, Te tamen natura ad eas potius subtilitates determinaverit, quæ è praxi nascuntur, quàm ad inanes speculationes: quæ duo haud minori intervallo à se invicem distant, quàm Sapientum res seriæ ac maximi momenti à puerulorum ludo ac crepundiis distinantur: Et fortasse (nisi me fallit observatio mea) perrarò in eodem subjecto conveniunt. Quæ tua sagacitas juncta opportunitate, quam tibi suppeditavit ingens Medicandorum copia ad Experimenta stabilienda, Te ad Artis nostræ fastigium evexit: Et morum comitas versùs omnes haud vulgaris existimationem, quam nactus es, facile tuebitur. Si qua heic differui neque tibi cui ista inscribo, nec paucis illis, at spectatæ probitatis viris quos amicos habeo, vitio dari possint, haud multum alios morabor, qui nullâ aliâ de causâ mihi infensissimi sunt, nisi quod aliter tam de ipsis morbis quàm de eorum Curationibus sentiam, atque illi sentiant. Quod ut ita non fieret penes me nullo modo fuit, quando sic à naturâ factus atque dispositus sim, ut quod temporis alii libris legendis, id ego omne meditationi impendere soleam, neque tam quæram, an alii eadem mecum asserant, quàm utrum quæ ego trado cum veritate consentiant: utpotè qui rumores & vulgi plausum haud magni faciam. Et sanè quid tanti est, si officio Civis Boni strenuè perfunctus, & publico commodo etiam cum privato damno inserviens, nullam tamen exinde gloriam reportem? Cum si rem rectè perpendam, consulere Existimationi meæ, qui jam senex sim, brevi perinde erit ac si Non-enti consuluissem. Quid enim mihi post obitum prodesse queat, ut octo Elementa Alphabetica in istum ordinem redacta, ut nomen meum componant, eorum linguis jactentur qui non magis aliquam mei Ideam animo possint effingere, quàm ego jam queam concipere qualesnam tandem illi futuri sunt, qui omnes & mortuos prioris seculi ignorabunt, & aliis tum dialectis tum moribus utentur, pro rerum humanarum omnium Inconstantia ac vicissitudine. At quorsum ego de aliorum judicio sollicitus sim? Si meo aliquo conatu in promovendâ & morborum & eorundem Curationum scientiâ aliquantulum promeritus fuerim, haud diu istâ laude fruar: Atque è diverso, si cui minus placuerint mea scripta, vix puto me alia additurum; cum non patiatur ratio sanitatis meæ, ut mundo ulteriores, rem medicam tractando, molestias faceffam. Et profecto vel in hoc Tractatulo quem jam edo, cum manus tremula calamus regere nequirit, operam mihi commodatam ab Amicissimo viro D. Joanne Drake, Baccalareo in Medicina ex Æde Christi apud Cantabrigienses, agnoscere debeo: Quem quidem virum & nativus morum Candor & vitæ Integritas amicum perquam exoptabilem; Animi verò dotes tam à natura subministratæ, quàm studio excultæ Humano generi utilem

admodum reddent & beneficium, ubi eam Artem exercere placuerit, quam ita probè callet. De cætero rogandus es, Vir Spectatissime, ut huic meo in te officio, si permolestior fuerim, veniam concedas: quod tamen non aliunde nasci existimes velim, quàm ex illo honore & obsequio quibus te meritò, atque ex animo prosequitur

Tibi addictissimus
Tuique observantissimus

Londini,
Maii 21. 1683.

THOM. SYDENHAM.

DE PODAGRA.

PROcul dubio æstimabunt homines, vel morbi, de quo agimus, naturam *Πονόγον*, ac ferè incomprehensibilem esse, vel me, quem jam ab annis triginta quatuor vexavit, ingenii tardissimi ac prorsus hebetis, cum meæ tam de ipso morbo, quàm de ejus curatione observationes ita parum votis respondeant. Utut tamen se res habeat, ego bonâ saltem fide tradam, quæ hætenus rescivi omnia, difficultates salebrasque, sive rationem morbi ipsius, sive curationis methodum spectantes, Tempori, Duci veritatis, evincendas complanandasque relinquens.

Podagra eos plerunque senes invadit, qui postquam meliores vitæ dies mollius ac delicatius transegerint, Epulis lautioribus, vino, aliisque liquoribus spirituosius liberalius indulgentes, tandem ob pigritiam ætatis ingravescentis semper comitem, ea corporis exercitia penitus omisere, quibus juvenes assueverant. Ad hæc, isti, qui huic morbo sunt obnoxii, Crania habent grandiuscula, Habitu corporis ut plurimum sunt pleniori, humido & laxo, & Constitutionem habent omnes luxuriantem virosamque, ditissima atque optima vitæ stamina.

Non quòd *Podagra* eos solùm adoriatur, qui crasso & corpulento habitu donantur, cum aliquando etiam, etsi rariùs, graciles & macilentos invadat; neque quòd hic morbus in omnibus senium præstoletur: quandoque enim etiam ætate florentes corripit, quoties scilicet infoelicia morbi semina à parentibus, quasi ex traduce acceperint; vel si hoc non fuerit, immodicæ Veneri præmaturius indulserint, aut exercitiis omnino valedixerint, quibus priùs etiam vehementioribus utebantur; edaciores insuper fuerint & liquores spirituosos immoderatiùs hauserint, postea derepente ad liquores tenues & refrigerantes se contulerint.

Si quem non nisi jam senio confectum primùm adoriatur, nunquam postea vel tam statas habet periodos, vel tam immaniter sævit, quàm si juniorem

occupaverit ; tùm quòd vita ut plurimum elabitur antequam morbus naturalibus Symptomatis stipatus ad *ἀκμήν* pervenit , tùm etiam quia calore nativo & vigore corporis imminutis , nec ita jugiter , nec vehementer in Articulos displodi potest. At si quem maturiùs laceffat , quamvis nec sedem adhuc figat , nec eum ita malè tractet , sed incertâ periodo pro datâ ansâ ingruat , leviter ad paucos dies torquens , & nulla methòdo invadens recedensque , sensim tamen castra metatur , legem sibi ponens , typumque præformans , tam quoad anni tempus quo arma quotannis movebit , quàm quoad paroxysmi durationem : ad hæc , ferociùs quàm primo insultu debacchatur.

De hoc morbo dùm ita regulam typumque servat , libet primò differere : postea de ejusdem Phænomenis Anomalis atque incertioribus , quoties scilicet vel præpostero inidoneorum Medicamentorum usu , de statu suo dejectus fuit , vel ob subjecti debilitatem & languorem , ad propria & genuina Symptomata nequit assurgere. Quoties itaque *Regularis* est *Podagra* , hoc ferè modo Ægrum aggreditur. *Januario* exeunte , aut incipiente *Februario* derepentè & nulla ferè præensione antecedente ingruit , nisi quòd ventriculi cruditate atque *ἀπεψία* ad septimanas aliquot æger laboraverit ; corporis insuper intumescentiâ quasi ventosâ & gravitate , quæ indies augetur , donec tandem detonet Paroxysmus ; quem paucis diebus præit terpor & quasi flatuum descensus per femorum carnes , cum affectione *σπασμωδία* , tùm etiam pridie Paroxysmi Appetitus voracior , non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur , Horâ verò secundâ post mediam noctem excitatur à dolore pollicem pedis ut plurimum occupante , quandoque verò Calcaneum , Suram , aut Talum : Hic dolor eum refert qui ossium dislocationem comitatur , cum sensu quasi aquæ tantùm non frigidæ partis affectæ membranis affusæ. Mox sequitur Rigor cum Horrore , & Febricitationi aliquali. Dolor autem hic primò remissior gradatim intenditur , (& pari passu Rigor atque Horror recedunt) idque in singulas horas , donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit , se ad varietatem officulorum Tarsi & Metatarsi , quorum ligamenta obsidet , perbellè accommodans , nunc tensionem violentam , vel ligamentorum istorum dilacerationem , nunc morsum canis rodentis , quandoque pressuram & coarctionem exprimens : adhæc , ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta , ut nec linteorum super-incumbentium pondus , nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre valeat. Atque hinc fit ut nox non tantùm in cruciati transigatur ; sed etiam cum irrequietâ partis affectæ hæc istâ rotatione , & mutatione sitûs quasi perpetuâ. Neque minor est totius corporis jactatio incessans , quæ semper Paroxysmum , maximè verò accedentem , comitatur , quàm torti membri agitatio & dolor. Hinc etiam mille conamina , sitis tum ipsius corporis , tum membri affecti mutatione assiduâ , doloris sedationem incassum exambiunt : quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam , (decurso scilicet Nycthemeri spatio à primo appulsu Paroxysmi) quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem & diffationem aliqualem , subito à dolore respirat , licet hanc ille liberationem isti membri affecti posituræ , quâ postremò usu erat , immeritò acceptam

acceptam referat. Jam leni madore perfusus somno concedit; à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit; cum solum antehac (quod in omnibus Podagricorum Paroxyfinis solenne est) insignior intumescencia venarum membro vexato intertextarum se in conspectu dederat. Sequentie die, forte etiam ad biduum triduumve, si materia Podagræ generandæ apta fuerit copiosior, dolet nonnihil pars affecta, idque vehementius die jam advesperascente, levatur autem sub Galli cantu. Intra paucos dies, alter pes eodem dolore torquetur quo is, qui prior doluit, vel si prior iste jam dolere desierit, debilitas quæ eum infirmaverat, mox evanescit, tam viribus quàm integrâ sanitate isti pedi statim restitutus, perinde ac nunquam laboraverat, si modò dolor pedem nuper tentatum ferocius lancinet. Nihilominus easdem hîc excitat Tragoedias, quas prius in altero pede, tam quoad doloris vehementiam, quàm durationem. Quandoque etiam primis morbi diebus cum materia peccans adeò exuberat, uti ei capiendæ pes unus impar sit, utrosque simul pari vehementiâ fatigat: sed ut plurimum pedes successivè, uti diximus, aggreditur. Postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur Paroxyfmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servant, quòd dolor noctu recrudescat, manè verò remittatur. Atque ex serie horum *Paroxysmorum* (sit verbo venia) constat Paroxyfmi qui dicitur Podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate. Neque enim censendum est, quoties quis cum hîc morbo ad menses duos vel tres fuerit conflictatus, unum illum Paroxyfmi fuisse, sed seriem potius & catenam Paroxysmorum, quorum posterior quilibet priore & mitior fuit & contractior, donec tandem materia peccante prorsus absumpta æger pristinam obtinuerit sanitatem: quod in vegetioribus, & iis quos Podagra rarius invisit, diebus sæpe quatuordecim fit; in senioribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus, iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi morâ fractiores jam sunt, non prius valedicit quàm æstas jam adultior eam fugaverit. Ad quatuordecim primos dies Urina coloratior est, quæ post separationem sedimentum rubrum & quasi arenulis refertum deponit; nec æger ut plurimum nisi tertiam potulentorum quæ assumpsit partem per Vesicam reddit; Alvus item ad dictos primos ferè dies constipata est. Appetitus prostratio, Rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum Paroxyfmi comitantur. Recedentem Paroxyfmi excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maximè inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto Veneno desquamantur. Morbo jam discusso, ægri tum *in vigilia*, tum Appetitus redeunt pro ratâ doloris quo sæviebat Paroxyfmi nuper elapsus, & in eadem proportionem servatâ vel acceleratur vel differtur sequens Paroxyfmi. Nam si hic ultimus ægrum pessimè mutaverit, sequens Paroxyfmi non nisi anno ad idem punctum revertente denuò accedet.

Atque hoc se habet modo Podagra Regularis Phænomenis genuinis propriisque se ostendens. Cum verò vel ab indebitâ medicatione turbatur, vel ob diuturniorem morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem perver-

pervertitur, neque par est natura eidem, methodo consuetâ, eliminando, Phænomena multum sunt diversa à jam descriptis. Nam cum hætenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, (qui peccantis materiæ sedes sunt genuina, quæ cum alias quolibet partes occupat, certissimum est vel morbi methodum inversam esse, vel corporis vigorem paulatim jam imminutum) jam itaque manus, carpos, cubitos, genua aliasque regiones occupat, ea jam, sicut pedes olim solebat, discrucians. Quandoque enim unum pluresve digitos distorquens fasciculo *radicum Pastinacæ* similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemque concretiones circa Articulorum ligamenta tophaceas generans, quæ Articulorum cuticulam ipsamque cutem destruens, nudos *tophos*, *cretam* vel *oculos Cancro- rum* æmulantes, aciculâ eruendos exhibet conspectui. Nonnunquam materia morbum committens Cubitis impacta tumorem subalbum excitat ferè ad ovi magnitudinem, quæ sensim inflammatur cum rubore. Est ubi Femur occupans sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens id acrius urget, motum omnem inhibens, ut quasi clavo transacto lectulo affixum nè latum pilum à loco in quo est se queat dimovere. Et quando, vel propter totius corporis inquietudinem huic morbo ita familiarem, vel urgente necessariò aliquò vitæ officiò, æger aliorum operâ est movendus, omni cautela opus est ne fortè vel nimia motûs contrarietas dolorem accersat, qui eò tantum nomine potest tolerari, quòd confestim evanescat. Quæ quidem corporis latio ita cautè & delicatè peragenda, haud exigua pars est ærurnarum, quibus Podagra oneratur: Dolor enim vehementior non per omnem Paroxysmum extenditur, si modò pars affecta omnino quiescat.

Cum Podagra antehac non nisi exeunte hyeme soleret invadere, post duos tresve menses pro more recessura; jam per annum integrum vexat ægrum, demptis duobus vel tribus mensibus calidioribus atque æstivis. Et quod insuper est observandum, quemadmodum *Paroxysmus* major sive *generalis* jam protrahitur quàm olim fuerat; inveniatur, ita etiam *Paroxysmi* isti *particulares*, ex quibus generalior componitur, singuli diutius sæviunt: cum enim antehac particulares isti non ultra unum alterumve diem excruciant, jam ubicunque sedem figant, maximè si pedes vel genua occupaverint, non ante diem decimum quartum castra movent: Primo ad hæc, aut secundo post appulsum die, æger præter dolorem, aliqualem etiam ægritudinem patitur, atque simul omnimodam Appetitûs prostrationem.

Postremò, cum antequam malum usque adeo incruduerat, æger non solum longioribus frueretur Paroxysmorum intervallis, sed etiam durante istâ intermissione rectè valeret tam artubus quàm reliquo corpore, facultatibus singulis naturalibus officio suo debitè fungentibus; jam artus habet ferè undiquaque contractos atque impeditos, ita ut quamlibet stare possit, fortè etiam aliquantisper procedere, gressu tamen ita claudicante ac permolesto prorepit, ut etiam cum ambulet, quiescere videatur: & si ultra vires ambulare perstiterit quo pedibus rectius valeat, quanto magis ipsos ambulando confirmat, & dolori ex-

ciendo minus obnoxios reddit, tanto morbi fomes, nunquam per hoc omne intervallum perfectè dissipatus, visceribus periculosius imminet, cum in pedes ita liberè nequeat effundi; qui hoc morbi tempore vix unquam doloris sunt expertes, sed sensatione aliquà plus minusve molestâ perpetuò tentantur.

Quin etiam multis aliis symptomatis infestatur æger, ut venarum Hæmorrhoidalium dolore, Ructu nidoroso, cibi jam manducati & in Ventriculo putrescentis gustum referente, quoties vel aliquid è Dyspeptis assumpserit, vel eam tantum cibi quantitatem quæ sano competit. Appetitus languet uti & totum corpus præ inopiâ spirituum. Denique ideo tantum vivit ut calamitosus sit & miser, non ut vitæ dulcedine vel minimum fruatur. Urina, quam prius coloratior, maximè in Paroxyfmis & in pauca quantitate solebat reddere, jam illam tam colore imitatur quàm copiâ quæ in *Diabete* excernitur. Dorsum aliæque partes molestè pruriunt maximè sub horam somni.

Id etiam in hoc morbo, quoties jam confirmatior est, incommodi accidit, quod ab Oscitatione, imprimis verò matutinâ, ligamenta ossium Metatarsi vehementer convelluntur, cum sensu quasi coarctationis vel compressionis fortissimæ à manu validâ. Quandoque etiam nullâ Oscitatione præcedente, æger jam se somno committens ictum quasi clavæ Metatarsum confringentis de repente per sentiscit, unde cum ejulatu expergiscitur. Tendines Musculorum quæ tibias suffulciunt subinde spasmo corripuntur ita acri & violento, ut dolor quem excitat, si vel tantisper duraret, omnem humanam patientiam dejiceret vinceretque.

Post multos dirosque cruciatus & carnificinam diuturniorem, ceu pignus missionis quàm mors jam in propinquo stans mox est datura, Paroxyfmi subsequentes ægrum quoad dolorem clementius tractant, (naturâ partim ab onere materiæ peccantis oppressa, partim ob senium, eandem in corporis extremitates jugiter ac strenuè relegare non amplius valente) ac loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad Diarrhœam superveniunt. Hæc symptomata, dum vigent, artuum dolorem leniunt, quæ pariter evanescent, quoties articulos dolor fatigat, atque ita nunc dolore, nunc ægritudine quasi alternatim lacescente, Paroxyfmi longas moras neçtit. Animadvertendum est enim, quòd ubi quis ad multos annos Podagra laboraverit, dolor singulis Paroxyfmis gradatim imminuitur tandemque ægritudine potius conficitur quàm dolore. Quem enim in his patitur dolor, quamlibet sint productiores, vix ad decimam partem ejus assurgit doloris quem pati solebat, cum viribus esset magis integris. Nihilominus hæc ipsa morbi inclementia pensabatur ut plurimum longiore intercapedine, quæ paroxyfmos intercedebat, tum sanitate qua interea satis commoda utebatur. Namque hoc in morbo dolor amarissimum est naturæ pharmacum, qui quò vehementior est, eò citius præterlabitur Paroxyfmi, atque insuper & longior erit intermissio & magis perfecta; & vice versa.

Neque tamen dolor, claudicatio atque impeditus partium affectarum motus,

tus, ægritudo, aliaque symptomata jam descripta, hujusce morbi tragoediam absolvunt: *Calculus* insuper *Renum* in quamplurimis parit hic affectus, tum ex eò quod æger diu supinus recumbat, tum etiam quòd ferientur Organa secretoria à debitis sibi functionibus; sive etiam quòd *Calculus* ejusdem materiæ morbificæ in genere portio quædam sit, quam ego litem non dijudico. Quæcunque verò sit hujus mali origo, nonnunquam ægri animum moestissima interpellit contemplatio, *Calculus*ne an *Podagra* immitior sit. Quandoque etiam *Calculus* lotii per meatus urinarios in *Vesicam* transitum impediens, ægrum de medio tollit, lentas *Podagræ* moras haud ampliùs expectantem.

Nec satis est ægrum ita miseris modis dilaniari, ut nec sui jam fuerit compos, alienæ opis prorsus indigens, sed & hic accedit miseriarum cumulus, quod durante *Paroxysmo*, animus etiam ceu contagio afflatus, eò usque corpori compatitur, ut haud facile sit dictũ utrò horum æger calamitosius doleat. Non enim rectius *Podagræ*, quàm iracundiæ, *Paroxysmus* omnis dici potest; cum mens & ratio usque adeò ab infirmato corpore enerventur, ut vel levissimo affectuum motu impellantur & vacillent: unde non magis ipsi quàm aliis gravis est. Quid quòd & cæteris quoque passionibus est obnoxius, timori videlicet, sollicitudinique, atque aliis id genus. A quibus pariter torquetur, donec morbo evanescente, animus quoque pristinâ tranquillitate receptâ unà convalescet.

Tandem æger (ut funestissimi hujus morbi *Catastrophen* semel expediam) visceribus à *Materiæ* peccantis incubatu complexuque ita læsis, ut *Secretionis* organa non amplius suo munere fungi queant, unde & sanguis quasi limo & fæculentiis refertus stagnat, & materia peccans non jam, ut olim solebat, in corporis extremitates disploditur atque rejicitur; tandem inquam ο τῆς - ἀθλιῆς vitam afflictissimam & jam diu non vitalem cum morte ærumnarum requie feliciter commutat.

At verò (quod mihi aliisque, licet tam fortunæ quàm ingenii dotibus mediocriter instructis, hōc morbo laborantibus solatio esse possit) ita vixerunt, atque ita tandem mortem obierunt magni Reges, Dynastæ, Exercituum Classumque Duces, Philosophi, alique his similes haud pauci. Verbo dicam, *Articularis* hicce morbus (quod vix de quovis alio affirmaveris) Divites plures interemit, quàm pauperes, plures sapientes, quàm fatuos. Naturâ quasi digitò monstrante, quàm parum iniqua sit omnium Parens & Arbitra, quàm Partibus non studeat; cùm eos, quibus alicubi defuit, alio aliquo bonorum genere cumulatiùs ditare soleat: profusiorẽ verò erga alios munificentiam æquâ malorum parte admixtâ diluat & contemperet. Adeò ut ubique gentium rata sit lex atque inviolabilis, nullum hominem vel ex omni parte beatum, vel per omnia miserum ac calamitosum posse inveniri, singulos autem utramque experiri sortem. Quæ Boni atque Mali contemperatio, fragilitati nostræ & mortalitati ita propria, nobis fortasse apprimè conducit.

Podagra Foeminas perrarò infestat, easque non nisi jam *Vetulas*, & *Viragines* seu corpore masculorum habitum æmulantes. Graciliores quæ vel in

adoleſcentiâ , vel conſtanti ætate ſymptomata patiuntur Podagram mentientia , ea ipſa vel affectibus Hyſtericis , vel Rheumatismô quô jam olim laborarunt , & cujus fomes non ſatis initio fuerat eliminatus , accepta referunt.

Neque Pueros , neque Juvenibus minores Podagrâ verâ atque genuinâ vexatos hætenus obſervavi : Nonnulli tamen mihi noti ſunt , qui priuſquam eam ætatem attigiffent, leviculam aliquam quaſi velitationem præſenſerant; quorum nempe Patres etiam tunc hõc morbô tenerentur cum iis generandis operam darent. Atque hic expliciſ morbi huius Hiſtoria.

Omnes animi nervos variis huiusce morbi Phænomenis contemplandis acriter intendens , illum *Αρτηρία* ſeu labefactatæ , tam in partibus quàm ſuccis corporis univerſis Concoctioni ortum debere exiſtimo. In iſtis enim qui huic morbo ſunt obnoxii , cum jam vel ætate fuerint conſecti , vel effrænata morum licentiâ ſenectutem præmaturiùs accerſiverint , Spiritus Animales per totum corpus deficiunt, immodicô functionum in Juventutis calore vegetiſſimarum exercitiô conſumpti; verbi gratiâ , præpropere nimioque Veneris uſu, inſanis improbiſſimiſque laboribus , quibus ardenter atque indefeſſè voluptatibus interviunt , & his ſimilibus. Acceſſit etiam ſive ab annis , ſive ab inertia , exercitiorum corporis, quibus olim aſſueverant, intermiſſio vel ceſſatio repentina (quorum uſu tum ſanguis invigoratior, tum partium tonus firmior & conſtantior ſolebat reddi) unde jam corpus flacceſcit, & Concoctiones non amplius rectè promoventur; è contra verò, ſuccorum corporis recrementa quæ talium exercitiorũ ope priuſ excernebantur , dehinc in Vafiſ , ceu morbi ſeminiũ , reconduntur. Nonnunquam & ſtudioſum ſeu Meditatio de re quâpiam ſeriâ ac diuturna malum auxit, quâ ſcilicet ſpiritus defæcatiores & magis volatiles à concoctionum penſo quod debuerant abſolvere nimium avocantur. Adde quòd huic morbo obnoxii non ſolum ciborum in genere ferè ſunt appetentiores , ſed & eorum maximè qui difficillimè ventriculo cedunt ; quos cum haud parciùs devorent, quàm tum ſolerent cum exercitiis uterentur , non jam iis digerendis pares ſunt. Neque tamen dicta voracitas & liberalior ciborum ingeſtio ita frequenter (licèt id haud rarò contigerit) Podagræ viam ſtravit , ac veſana & immoderatioſ vini Compoſitio ; unde Fermenta Coctionibus variis dicata penitus proſternuntur , præcipitantur ipſæ Coctiones , & Spiritus naturales ab halituum adventitiorum copia ſubjugantur diſpergunturque. Jam verò cum unò eòdemque tempore & Spirituum (qui Coctionis inſtrumenta ſunt) vigor imminuatur , atque inſuper ingens humorum colluvies ſanguinem opprimat, omnino neceſſe eſt, ut ſingulæ Coctiones haud ritè peragantur , dum ita obruuntur ſingula Viſcera , unde Spiritus jamdiu fatiſcentes nunc etiam ſuffocantur : Nam ſi à ſolâ Spirituum debilitate penderet hic morbus , Infantes, Fœminas , atque eos quos ægritudo diuturnior maceravit , pariter invaderet ; cum ferè viroſiſſimos quoſque adoriatur , & robuſtiſſimis naturæ principiis præditos ; quos tamen non aggreditur , donec caloriſ & Spirituum Naturalium defectum ſive declinationem , humorum quoque congeſſio excipiat , à quibus ſimul junctis Concoctiones vitiatæ pervertuntur.

Porro ut Causarum, quas enumeravimus, singulæ Indigestionem promove-
rant, ita earum pleræque laxitati Habitus & Musculorum corporis procurandæ
non-nihil contulerant, unde porta crudis indigestisque humoribus intromitten-
dis panditur, quoties isti ad exteriora protruduntur. Quoties enim in sangui-
ne diutius stabulantes tam mole quàm prava diathesi macti fuerint, tandem
calorem putrescentem acquirunt; & cum non ampliùs è natura regi possint,
prorumpunt in speciem, & in Articulos depluunt, calore atque acredine do-
lores exquisitissimos in ligamentis membranisque ossa contegentibus excitan-
tes; quæ vel à seniô, vel luxû atque intemperantiâ labefactata laxataque facile
humoribus impetum facientibus locum concedunt. Hic verò humorum Po-
dagram generantium prolapsus, qui Paroxysmum constituit seriùs ocysive
contingit, prout ansa hujusmodi humoribus in motum ciendis data fuerit.

Jam vero *curationem* quod spectat; (ut primò quæ sunt omittenda subin-
nuam) licèt, si humores respiciamus atque indigestionem, unde isti trahunt ori-
ginem, primâ fronte videri possit Indicationes Curativas imprimis ad humo-
res jam factos evacuandos, dein ad Coctiones roborandas, (unde aliorum
humorum succrescentium aggestio possit præcaveri) collimare debere, quan-
doquidem hæ sunt Indicationes magis generales, quibus in plerisque aliis mor-
bis Humoralibus satisfaciendum est: in Podagra nihilominus Naturæ quasi
prærogativa est materiam peccantem suô modô exterminare, & in Articulos
deponere, per insensilem transpirationem diffundam. Namque haud plures
tribus proponuntur modi, quibus causam Podagræ continentem ejicere valea-
mus, Venæ-sectio scil. Catharsis, ac Diaphoresis per sudorem: nulla verò ex
his methodus scopum attinget unquam.

Imprimis Venæsectio, quantumvis magna polliceatur, tum in humoribus,
qui in procinctu stant, & quasi descensum meditantes, tum in istis, qui jam
jam Articulos obsiderunt, evacuandis; manifestò tamen pugnat cum indicatio-
ne illa, quam Causa Antecedens, quæ est Indigestio à spirituum (quos sangui-
nis detractio magis imminuit opprimitque) depravatione ac defectu ortâ, si-
bi vendicat. Non est itaque adhibenda Phlebotomia, vel ad præcavendum
Paroxysmum qui timetur, vel ad istum, qui jam adest, mitigandum, in iis
nempe, qui ætate jam sunt provectiores. Quamvis enim qui educitur sanguis
Pleuriticorum & Rheumatismo laborantium Sanguinem ut plurimum referat,
attamen Venæ-sectio haud minus insigniter in hóc morbô officere ægro, quàm
in duobus prædictis prædesse cernitur. Etenim si sanguis in intermissione,
quantumlibet diu post Paroxysmum, fuerit extractus, periculum est, ne à san-
guinis & humorum agitatione novus succrescat Paroxysmus, qui & priore diu-
turnior futurus est & symptomatis enormibus stipandus, sanguinis robore &
vigore quibus adjutoribus morbi fomitem strenuè ac constanter excutere de-
buerat, exinde retusis. Atque hóc incommodi toties etiam accersitur, quoties
ineunte Paroxysmo vena pertunditur. S. mox à Paroxysmo feriatum vena, in-
gens periculum est, ne natura, dum sanguis adhuc languidior est, & nondum
pristinas vires à morbo succillas redintegraverit, ejusmodi vulnere importunè

infecto usque adeò infirmetur & succumbat, ut Hydropi aditus aperiatur. Veruntamen si æger adhuc Juvenis fuerit, & ab immodica potatione excalefactus, sanguis initio Paroxyfmi potest detrahi, sin autem in Paroxyfmiis subsequentibus Phlebotomia jugiter utatur, Podagra quàm citissimè etiam in juvenibus inveterascet, & intra paucos annos latius imperium seu potius tyrannidem propagabit, quàm aliàs in multis extendere valuisset.

Deinde, Catharsin quod attinet, sive *ἄνω* sive *κάτω* animadvertendum est, quòd cùm naturæ lex sit inviolabilis atque ipsi hujusce morbi essentiæ intertextæ innexaque, morbi fomitem semper in Articulos rejici debere; nihil prorsus aliud præstabunt Remedia sive Emetica, sive Cathartica propriè dicta, nisi ut materia peccans, quam natura in corporis extremitates protruserat, in sanguinis massam denuo revocetur; undè accidit, ut quæ in Articulos eliminari debuerat, in aliquod è visceribus fortè irruat, atque ita æger, qui in nullo prius discrimine versabatur, jam de vita periclitetur. Quod iis fatale esse haud rarò observatur, qui medicamentis purgantibus vel ad Podagram præcavendam, vel (quod adhuc pejus est) ad leniendum Paroxyfsmum assueverant. Etenim cùm natura à methodò sibi familiari exturbata fuerit, quâ, utpote securissimâ optimâque, materiam morbificam in articulos ablegat, dum humores intrò versus intestina sollicitentur, loco doloris in juncturis, quem vel nullum habent vel certè perexiguum, ventriculi ægritudine, alvi torminibus, Lipothymia, & longo Anomalorum Symptomatum agmine miseri quasi enecantur.

Ego certè persuasissimus sum, à jugi & sæpè iterata experienciâ edoctus, Catharsin omnem, tam per Lenientia, quàm per Fortiora Medicamenta, qualia pro more Articulis expurgandis destinantur, plurimum nocere; sive in Paroxyfsmò ad minuendam materiam peccantem, sive in fine ad dissipandas morbi reliquias, sive in perfectâ intermissione & rectâ valetudine, ut venturo Paroxyfmo occurratur, Purgatio in usum revocetur. Etenim tam mei ipsius quàm aliorum periculò compertissimum habeo, Catharsin quovis horum temporum administratam, ita parum votis respondisse, ut malum, quod debuerat averruncare atque avertere, accerferet. Primùm itaque Purgatio sæviente adhuc Paroxyfsmò adhibita, naturæ, in materiâ morbificâ separandâ & in Articulos deponendâ occupatæ, negotium facessens, magnam spirituum *ἀταξίαν* nonnunquam excitavit, unde non tantùm Paroxyfsmus magis invalescebat, sed & æger in vitæ discrimen haud obscurè conjiciebatur. Deinde Cathartica in fine Paroxyfmi usurpata, cùm morbi reliquias amoliri debuerint, id tantùm egère, ut recens Paroxyfsmus de novò suppullularet, haud mitior priori istò; atque ita æger spe falsâ lactatus ea sibi fabricat mala, quæ non fuerat perpeffus, nisi humores denuò in rabiem agerentur. Quod genus incommodi ipsemet plus semel expertus sum; artis medicæ opem præposterè implorans ad extirbandas, ut mihi videbatur, reliquias morbi. Postremò quod Purgationem attinet, certis intervallis & integrâ sanitate repetendam, ut Paroxyfmo eatur obviam, atque ei aditus præcludatur; etsi, quod est fatendum, non ita præsens periculum est, ne nova accessio invitetur, atque fuit in casu jam dicto, cùm æger

æger nondum *ἔω βίαις* omninò fuerit, tamen etiam hoc tempore Paroxysmum parit, idque ob causas suprà memoratas, quo malo si fortè ægrum non statim multaverit, nullatenus tamen eum à morbo liberat, quantumlibet constanter & debitis intervallis Cathartica hæc illave assumpserit. Quinimò nonnullos novi huic morbo obnoxios, qui Catharsi non solum Vere & Autumno, sed & singulis mensibus, imò & septimanis continuis, celebratâ, sanitati litabant, neque tamen horum quisquam Podagram effugit: quæ exhinc crudelius perun- que & immanioribus symptomatis eos impetebat, quàm si ab omni medicatione sibi temperassent. Licet enim jam dicta Purgatio causæ continentis partem aliquam possit educere, cum tamen coctioni roborandæ (à quo tantum abest, ut potius eam debilitet) recenti vulnere naturam subruens ac dejiciens ne hilum conferat, uni tantummodò causæ opponitur, & morbi curationi impares prorsus habet vires.

Ad hæc annotandum est, ab eodem illo spirituum defectu, quo Coctiones in iis vitiantur, qui Podagrâ solent laborare, eorundem Spirituum Animalium *σύστασις* minus firmam vegetamque reddi, unde mox dejicitur & interturbatur à quavis causa, quæ vel animum vel corpus paulò violentius concutit exagitatque; ac proinde jam fugax ac dissipabilis est admodum, prout iis, qui Affectioni vel Hypochondriacæ, vel Hystericæ obnoxii vivunt, persæpè accidit. A qua etiam Spirituum ad *ἀταξίαν* propensione fit, ut Podagra vel levissimam quamlibet evacuationem ferè subsequatur. Dissoluto enim corporis tono, quem Spirituum firmitas, dum in vigore suo persistunt ritè compactum vegetumque servat, materia peccans quasi disruptis repagulis jam sui juris est, atque ab hac plaga corpori inflicta Paroxysmus statim exoritur.

At verò hæc ipsa Methodus utut perniciosa ac nocens, nihilominus Empiricis quibusdam, qui Catharticum quo utebantur medicamentum astutè omnes celarunt, haud mediocrem existimationem conciliavit. Observandum est enim quòd Purgatione currente, æger vel non omnino vel remissè admodum dolet; & si Catharsis ad plures dies produci queat, nullo superveniente Paroxysmo recenti, æger confestim ab eo, quo jam tenetur, convalescet: verum enimverò poenas impofterum pendet dirissimas ab *ἀταξία* in quam dicta humorum exagitatio naturam præcipitem egit.

Denique materiæ peccantis per Sudores evacuatio, licet prædictis evacuationibus minùs officiat, liquidò tamen officere cernitur. Quamvis enim morbi fomitem non retrahat in viscera, sed è contra, in corporis habitum propellat, attamen his saltem nominibus obest. Primò quidem quòd extra Paroxysmum humores adhuc crudos & nondum ita subactos, ut ritè separari debeant, quasi vi quadam protrudit in Artus, atque eò pactò cunctantem paroxysmum ante diem, & vel invitâ naturâ sollicitat. Deindè quòd sudoris provocatio in ipso paroxysmo materiâ morbificam nimis violenter in affectum membrum impingat adigatque, dolorem simul adducens haud tolerandum, & si major sit materiæ peccantis copia, quam ut pars affecta eam queat admittere, illam mox in artus alios deturbat, unde orgasmus interea, atque ingens tam sanguinis quam

quàm cæterorum humorum ebullitio sive exæstuatō; si verò corpus colluvie ferosâ Podagræ generandæ aptâ admodum scateat, metuendum est, ne Apoplexia ingruat. Quamobrem in hoc affectu, perinde ac in cæteris omnibus in quibus sudores Artis ope sollicitantur ad eliminandam materiam morbificam, non verò naturæ ductu profluunt, periculosissimum est eosdem nimis violenter atque ultra eum Coctionis gradum ad quem humores evacuandi suâ sponte pervenerint, elicere. Et celeberrimus iste Hippocratis Aphorismus, *Cocta non Cruda sunt medicanda*, tam in Sudoribus provocandis, quàm in subducendo Alvo locum habet. Quod quidem liquidò constat ex sudore illo quo Paroxysmus Februm Intermittentium claudi solet, qui, si modicus fuerit & materiæ Febrilis à præcedente Paroxysmo concoctæ quantitati aptè respondens, ægrum insigniter juvat levatque; si verò ultra naturæ modum sudatio promoveatur, ex eo quòd æger lectulo jugiter affigatur, jam Febris continua subnascitur, & recens focus succenditur, cùm iste qui prius efflagrabat, fuerat extinguendus. Pari ratione in Podagra etiam lenis ille mador qui ut plurimum manè sua sponte oritur post minorum Paroxysmorum, è quibus majorem Paroxysmum constare docui, singulos, tam dolorem quàm inquietudinem quibuscum æger totâ nocte conflictabatur, mitigat; è contra verò, si quando levis hicce mador & suapte naturâ fugax, diutius & vehementius proritetur quàm fert proportio materiæ peccantis jam ab ultimò Paroxysmò concoctæ, morbus inde exacerbatur. Tam itaque in hoc quàm in aliis morbis quibuscunque, quos mihi videre contigit, dempta sola Peste, sudores prolicere non tam Medici, quàm Naturæ provincia est: cùm nullo modo assequi possimus, quanta materiæ pars ejusmodi separationi obeundæ jamjam est parata, nec per consequens quem in provocando sudore modum tenere debeamus.

Ex jam dictis cùm satis liqueat, non solum podagræ Curationem à Medicamentis evacuantibus in cassum peti, sed & eadem *ποδαγρίωσι* noxam adferre, restat ut exquiramus, ad quem alium scopum Curativæ indicationes sunt dirigendæ. Ego quidem ex accurata *φανομένων* prædictorum omnium pensitatione & diligenti examine colligo, duabus potissimum causis in hujusce morbi curatione obviam iri debere. Prima est causa Antecedens, sive humorum indigestio à caloris & spirituum Naturalium defectu orta. Altera est causa Contingens, sive eorundem humorum calor & exæstuatō, ubi jam tum putredinem, tum etiam acredinem nacti sunt à mora in corpore, quàm oportuerat diuturniore, quæ mora ab inconcoctione suprâ memoratâ pendet. Hæ causæ ita toto cœlo, quod ajunt, à se invicem discrepant, ut, quæ huic profunt remedia, alteri obsint; unde hic Affectus ita curatû perdifficilis est. Et enim dum Medicamentis calefacientibus Indigestionem vincere satagimus, periculum est, ne ex altera parte humorum calor intendatur: atque è diverso, dum sive Diætâ, sive Remediis refrigerantibus calorem & acredinem humorum commitigare volumus, *ἀπὸ ψυχρῆς* accersimus, labefactato scil. calore naturali. At verò hîc Causam Continentem non eam tantum intelligo, quæ jam actu Articulos obsidens Paroxysmum format, sed eam insuper, quæ adhuc in sanguine

guine delitescens separationi hætenus est inepta. Perrarò enim materia mor-
bifica omnis à Paroxysmo quantumlibet diuturno & crudeli, ita plenè egeritur,
ut nullæ prorsus in corpore reliquæ sint, eodem elapso. Ac proindè utrius-
que hujus causæ tam extra Paroxysmum, quàm eo vigente ratio habenda est.
Quandoquidem verò materiæ continentis eliminatio Naturæ omnino opus
est, suâ ipsius methodo peragendum; cumque nihil interea temporis, ad hu-
mores calidos acresque leniendos, absque damno digestionibus illato, possit
tentari, nisi ut exulent ac evitentur victus medicamentaque calidiora, à qui-
bus inflammantur humores: maxima certè & præcipua curandi intentio in
eo verti debet, ut Coctioni, indigestionibus sublatis, consulatur, de quâ jam
agam: ita tamen ut in Dissertationis serie ea etiam attingam Remedia, prout
anfa data fuerit, quæ ad leniendum humorum calorem, & acredinem retun-
dendam facere possint.

Quæcunque igitur naturæ opem ferunt in muneribus suis ritè fungendis,
sive Ventriculum confortando, ut alimenta rectè coquat, sive sanguinem ad
debitam chyli in illum injecti assimilationem, sive partes solidas corroboran-
do, quò melius succos earundem nutritioni atque augmento destinatos in pro-
priam substantiam convertant, quæcunque denique varia excretionis Organa
atque emunctoria corporis in eo statu conservant, ut singularum partium re-
crementa debito tempore atque ordine valeant amandare; hæc & hujusmodi
omnia huic intentioni adimplendæ conferunt, ac propriè *Digestiva* appellan-
tur, sive pharmaca ea fuerint, sive ratio victus, sive exercitatio, sive alia ex
istis quælibet, quæ *sex res non naturales* indigitantur.

Hujusmodi Medicamenta sunt in genere, quæ moderatè excalefaciunt, &
vel amarificant, vel linguam leniter feriunt, utpote quæ ventriculo sunt per-
grata, sanguini medentur, & cæteras partes sovent confortantque, qualia sunt
verbi gratiâ, Radices Angelicæ, Folia Absinthii, Centaurii minoris, Cha-
mædryos, Chamæpityos, &c. Addi possunt etiam Antiscorbutica vulgò dicta,
ut Radices Raphani rustici, Folia Cochleariæ hortensis, Nasturtii aqua-
tici, &c. Cum autem herbæ istæ acres ac pungentes, utut stomacho arri-
deant atque eidem conferant in Coctione juvandâ, morbi tamen fomiti jamdiu
formato aculeos subdant & augeant calorem, parcius usurpandæ veniunt, præ
aliis istis quæ miti calore atque amaritudine & Ventriculum corroborant, &
sanguinis massam vegetiorem reddunt ac magis vitalem.

Eorum species aliquot affabrè permistæ humoribus concoquendis rectius, ut
mihi videtur, quàm simplex quodlibet ex eorum tribu desumptum ministrant.
Quælibet enim quoties specificâ medicamenti cujuslibet virtute opus est nobis,
Regula tenet, *Quo simplicius eo melius*; tamen cum id habemus propositi, ut huic
illive indicationi satisfaciendo ægrum sanemus, singula ingredientia symbolum
pro morbo curando quasi conferunt, atque in hoc casu, quantò major est sim-
plicium numerus, tantò potentiùs medicamentum operabitur. E prædictis ita-
que & reliquâ ejusdem farinae materiâ medicâ, variæ Remediorum formulæ ad
hunc scopum tendentes concinnari possunt. Ego formam Electuarii ad exem-
plum

plum Theriacæ Andromachi cæteris præfero, ceu viribus præstantissimam, eò quod mutua simplicium confermentatio omnium virtutem adaugeat, quasi *aliquid Tertium* progignens, quod in ita conjunctis majorum est virium in pari quantitate quàm in eorum quolibet. Verùm tam delectum ejusmodi ingredientium quàm formulas quibus exhibenda sunt prudenti Medico lubens relinquo; cum nunquam mei officii esse duxerim Receptulas, ut vocant, conscribere, at potius veras indicationes notare, ad quas Curationes sunt dirigendæ: Quod cum minus observetur, exhinc, ut alibi dixi, Empiricis ansa data est, ut se Artis medicæ Principes jactent.

Veruntamen Tyronum gratia, remedium, quo ego uti soleo, in medium proferam, quod ad hunc modum componitur. ℞. Rad. Angelic. Calam. Aroma. Imperator. Enul. Campan. Fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. Chamædr. Chamæpyt. Scord. Calaminth. vulgar. Parthen. Saxifrag. pratens. Hyperic. Virg. aur. Serpil. Mentha, Salvia, Rutæ, Card. Ben. Puleg. Abrotan. Flor. Chamæm. Tanacet. Lil. Conval. Croci Anglican. Sem. Thlasp. Cochlear. hortens. Carvi, Bacc. Junip. singulorum quantitatem sufficientem. Legantur singula Herbae, Flores, & radices quo tempore viribus pollent maximis. Siccentur ac in Papyraceis sacculis asserventur, dum in pulverem tenuissimum redigantur. Singularum Unciæ sex simul probè mistæ excipiantur s. q. mellis opt. despumati, & Vini Canarini, & in Electuarium debitæ consistentiæ conficiantur s. a. Sumat Drachmas duas mane & serò, vel hujus defectu, sequenti utatur. ℞. Cons. Cochlear. hortens. ʒiʒ. Absinth. Roman. & Flaved. Aurantior. an. ʒj. Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. an. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒiiij. Pulv. Ari comp. ʒij. cum s. q. Syrupi Aurantiorum fiat Electuarium. Capiat Drachmas duas bis in die, superbibendo sequent. Aquæ cochlear. v. vel vj. ℞. Rad. Raphan. rust. incis. ʒiiij. Cochlear. hortens. manip. vij. Nasturt. aquatic. Becabung. Salv. Menth. ana manip. iiij. Cortic. Aurantior. no. vj. Nuc. Moschat. contus. no. ij. Cerevisiæ Brunswic. ℥xij. Destillantur organis communibus, donec solummodo libræ sex Aquæ eliciantur pro usu.

E Medicamentis vulgò cognitis Theriaca Andromachi Concoctionibus roborandis præ cæteris confert; Cum tamen plures in species contineat, quæ plus satis calefaciunt, atque insuper Opio abundet, Electuarium supra dictum commodius parari potest è Vegetabilibus præcipuis excalefacientibus & corroborantibus. Curandum est interim ut ea simplicia eligantur, quæ ad ægri gustum magis faciant, cum enim diu admodum, scil. ad omnem ferè ætatem, in ejus usu perseverandum sit, omnino convenit, ut palato minùs sit ingratum. Inter simplicia Cortex Peruvianus primas obtinet, cum sanguinem corroboret vegetumque reddat, ejus grana aliquot mane & serò assumantur.

Et sanè uti in hoc Affectu de quo jam agimus, ita & in aliis Chronicis ple-risque, hæc & huic similia remedia quæ sanguinem corroborant, vegetumque reddunt (si modò eorundem calor, propter causas postea adferendas, in spiritibus vinosis non consistat) præ cæteris juvant; quandoquidem singuli hujus generis morbi ad unam eandemque causam universalem, humorum scilicet Indigestionem, si rectè conjicio, referri debeant. Nihil

Nihil est autem, ex quo hoc certius evinci poterit ac probari, quam si ob oculos ponamus differentiam, quæ inter morbos, *Acutos & Chronicos* intercedit; quam ob causam æquius Lector boni consulet, si paulisper ab eo, quod jam præ manibus est, negotio digrediar. Prout itaque morbi *Acuti* ii ferè habentur, qui citò vel perimunt, vel ad Concoctionem perducuntur: ita *Chronici* appellantur isti, qui vel non omnino, vel tardè admodum & longâ temporis morâ ad eandem Coctionem pertingunt. Atque hoc quidem tam ipsa rei natura, quam verba quibus illa exprimitur, apertè loquuntur; at verò causa hujus differentiæ, quæ inter hæc duo morborum genera deprehenditur, altius latet, haud ita facilè eruenda: cujus indagationi si aliquantisper immoremur, operæ, ut puto, vix nos pœnitebit, cùm harum rerum notitia clara ac distincta, ad inveniendas veras Indicationes horum Morborum Curationi accommodas, magnum momentum adferre queat.

Sive interiora Terræ viscera, si ita loqui fas est, varias subeant mutationes, undè à Vaporum inde exhalantium interventu aer inquinetur, quod mihi maximè probatur: sive inficitur Atmosphæra omnis ab alteratione quam eidem inducitur peculiaris aliqua corporum Cœlestiũ quorumlibet Conjunctio: res ita se habet, ut ad hoc illudve tempus aer particulis referciatur, quæ humani corporis œconomix adversentur; uti etiam alio tempore istiusmodi particulis imprægnatur, quæ cum corporibus speciei alicujus Brutorum minùs conveniunt. His jam temporibus, quoties nos hujusmodi noxia & naturæ inimica *μιάσματα* in nudum sanguinem inspiratione attrahimus, & in illos morbos Epidemicos incidimus, quos illa parere apta nata sunt, Natura *Febrim* accersit, solennem nempe sibi Machinam sanguinem à materiâ aliquâ hostili & contrariâ intus stabulante vindicandum. Et tales morbi *Epidemici* vulgò audiunt, & ideò *Acuti* sunt & *Breves*, quia motum habent ita celerem & violentum. At verò præter hos morbos à causâ externâ excitatos, sunt & alii perinde *Acuti*, ab hac vel illâ peculiari sanguinis inflammatione nati, quæ non à causâ aliqua generaliori ab aere pendente, sed à particulari particularium corporum Anomaliâ vel intemperie producuntur. Quod quidem Febrium genus ego *Intercurrens* & sporadicum idcirco vocito, quod annis ferè quibuslibet occurrant.

At verò morbi *Chronici* genium habent longè ab his diversum: quamvis enim aer minus salubris hujus vel illius generis ad hos morbos generandos multum conferat; non tamen aëri ita immediatè originem debent suam, sed ut plurimũ communi omnium horũ Parenti, Humorũ scilicet *Indigestioni*. Ubi enim quis Naturæ principia jam habuerit infirmata ac protrita, sive à senectâ, sive à magnis & continuis circa *Sex res non naturales* erroribus, præcipue in Cibo Potuque; vel si Organa Secretoria eò usque fuerint debilitata, ut jam functionibus suis ad defæcandum sanguinem & ejus superfluitates eliminandas destitatis, prorsus fuerint imparia: his in casibus uberiori humorum proventu jam coagmentato quàm cui digerendo hominis vires sufficiant, dicti humores morâ diuturniore varias fermentationes ac putrefactiones patiuntur, tandem in *speciem* erumpunt, & varias morborum species edunt pro depravationũ varietate. Et

prout hi succi depravati variam habent indolem, ita variè in hanc illamve partem dilabuntur, quæ eisdem excipiendis aptissima est; atque ibi sensim longam illam symptomatum seriem explicant, quæ partim à talium succorum naturâ, partim ab ἀταξίᾳ istis partibus illatâ, solent exoriri: quæ duo simul juncta istam naturæ ἀνομαλίαν constituunt, quæ morbi alicujus nomine insignitur.

Jam quòd ejusmodi impotentia naturæ ad coquendos humores plerorumque Morborum Chronicorum causa sit præcipua, facile liquebit, si animadvertamus Senes, quorum Coctiones sunt læsæ, & spiritus, earum instrumenta, absumpti à repetitis vitæ longioris functionibus, hisce Affectibus magis esse obnoxios quam sunt Juniores, quorum vitæ flamma magis accensa recrementa ista coacervata dissipat; & quorum Organa Secretoria jugi isto caloris naturalis subsidio instruntur, ut functionibus in totius sanguinis massa depuranda peragendis ne utinam deficient, nisi insuper premantur, & quasi suffocentur à nimia humorum copiâ. Adhæc talem humorum indigestionem plurium Morborum Chronicorum causam esse ex eò constat, quòd Hyems ad istiusmodi morbos gignendos longè magis faciat quam Æstas. Licet nonnulli ex his morbis non actu exerantur, nisi sub Brumæ exitum; attamen iste humorum proventus, à quo illi pendunt, per omnem Hyemis decursum succrescens, auctior factus est ab ejus tempestatis frigore & effœto languore naturam debilitante, quo minus valeat in administrandâ corporis œconomiâ. Unde fit, ut qui in Æstate satis bene habeant, rarò tamen Hyeme eos morbos effugiant, ad quos magis sunt proclives, *Podagram*, verbi gratiâ, *Asthma*, *Tussis*, &c. Atque hinc etiam ratio deducenda est, quare Peregrinatio in Regiones magis Australes ita efficaciter eos morbos expugnet, quorum curatio in frigidioribus incassum tentabatur. Eorum, quæ de generali morborum Chronicorum causâ jam dixi, veritas magis adhuc patebit ab ingenti & quasi stupendo ac incredibili emolumento, quod ii qui morbis Chronicis plerisque, præcipuè verò *Phthisi*, laborant, ab Equitatione percipiunt, quod genus Exercitii Digestiones singulas invigorat firmatque, dum à continuâ corporis successione calor naturalis re-accenditur, & organa secretioni destinata in munere depurandi sanguinis ritè fungendo promoventur: unde necesse est, ut sequatur Digestionum deperditarum quasi renovatio quædam, & è consequenti totius corporis Crasis optima.

Quo circa è rationibus jam allegatis satis elucescit, quòd non in Podagra tantum, sed & in aliis quoque Chronicis morbis, ubi nullum Symptoma manifestum contra-indicat. *Herbas* ejusmodi *excalescentes* magnum omnino commodum adferre, cum sanguini æstatis calorem vel mediâ hyeme concilient: quamvis si æstivo tempore earum usui assuescamus, melius præcavebunt mala ista, quæ adversa tempestas solet apportare. Et profecte si ad hyemis usque appulsum deferantur, quo tempore ingens humorum saburra accumulatur, periculum est ne serò nimis ad hoc Asylum confugiamus, & quod dici solet, Μετὰ πόλεμον σύμμαχία. Quamvis autem, ut supra fusius disserui, Podagra id sibi habeat peculiare, ut non tantum non juvetur, sed & lædatur à Catharticis; tamen in aliis Chronicis plerisque & Venæ-sectio quoties opus fuerit repetita, & Purgatio ante sunt

sunt imperanda, quàm Remediis corroborantibus & Digestivis hîc à me laudatis opera danda est: ubi verò se æger his addixerit, in iis perseverandum est, nullis intercalatis Evacuationibus. Etenim hoc est firmiter retinendum, quod quoties cujuscunque morbi curatio Remediis Corroborantibus innititur, Evacuationes, qualescunque eæ fuerint, officiunt prorsus. Denique non is sum, qui asseram, Medicamenta Digestiva jam memorata cæteris quibuscunque præstare: at verò dico eum, qui Remedium ad hanc intentionem satisfaciendam potentissimum invenire potuerit, longè majora in sanandis Morbis Chronicis præstare posse, quàm ipse se posse existimaverit.

Istud verò iis omnibus quæ de Podagrâ sanandâ dicturus sum, præmittendum est, maximopere præ cæteris observandum, nempe quòd *Digestiva* Remedia quæcunque, sive Medicamentorum apparatu, sive Diætâ, sive Exercitatione ea constant, haud obiter instituenda sint, verùm constanter atque omni adhibitâ diligentia assidue usurpanda. Cùm enim in hoc morbo, uti etiam in Chronicorum quamplurimis, causa ejus in habitum, & novam quasi naturam transiverit, nemo sanus existimaverit leviculam aliquam ac momentaneam alterationem sanguini atque humoribus à quolibet sive remedii sive victus genere superinductam, curationis scopum posse attingere; at verò corporis habitus omnis aliò traducendus est, atque homo integer deinceps quasi novâ incudè refingendus. Neque enim hîc ita se res habet atque in morbo Acuto aliquo, ubi is qui modo athleticè ac pancraticè valebat, derepente Febre correptus, ab optimo sanitatis statu in morbum periculosissimum, quasi rupto ponte, præceps ruit. Podagræ dispar admodum ratio: ubi quis per multos annos continuos Comeffationibus, Compotationibusque intemperantiùs indulgendo, solita exercitia intermittendo, desidria atque pigritia intabescendo, vel etiam nimio studio atque irremissa animi intentione, aliisque vitæ erroribus, id egit tandem quasi deditâ operâ, ut varia corporis fermenta pervertantur, atque opprimantur spiritus Animales (qui Coctionis instrumenta sunt primaria) unde humores præter-naturales coacervati erumpunt tandem, cum jam ad summum gradum exaltati fuerint, ac stragem edunt; Carnibus denique emollitis, & effoeminatis Articulis, unde humores illabentes promptiùs excipiunt. Atque ita demum alia quasi natura sensim superinducitur, pristina & naturali corporis œconomia eversâ funditus & deletâ: Cùm isti Paroxyfmi, qui hominum incautorum ac minus perspicacium oculos animosque soli ferè perstringunt & occupant, nihil prorsus aliud sint quàm series & ordo symptomatum ab illa methodo pendentium, qua uti solet Natura in materia morbum committente foras pellendâ. Quamobrem operam ludit quisquis hoc illove sive medicamento, sive etiam regimine subinde in usum revocato, hunc morbum protelare satagit. Cum verò hic habitus tum in Digestionum omnium labefactione, tum & in amissione firmitudinis naturalis partium singularum præcipuè fundetur ac confet, utrique malo occurrendum est; & tam Coctionum robur, quàm firmitudo partium pedetentim reduci debet ac restaurari; pro modulo scilicet pristinæ ac consuetæ corporis œconomix. Quantumlibet verò istud plenè perfecteque fieri non posse videatur, non eo solùm no-

mine, quòd *Habitus* quicunque non nisi ægerrimè in sibi contrarios transmutantur, sed etiam quòd *ætas* senilis, quæ huic morbo ut plurimùm comes est & *fo-*
cia, vehementer refragatur: tamen quantum vires annique finent, tentanda est
curatio, & prout æger propius ad hanc metam accedet, vel recedet longius,
Podagræ tyrannidem magis minusve effugiet.

Atque porrò animadvertendum est, quòd *Remedia* πεπτικά vel *Digestiva*, sive
 partem *Medicam* ea spectant, sive *Diæticam*, in *Paroxysmorum* præcipuè in-
 tervallis in usum revocanda sunt; idque quàm longissimè fieri potest à *Paroxys-*
mo infecuturo. Neque enim sine magnâ temporis mora & pertinaci *Remedio-*
rum usu *Concoctionum* omnium corroboratio, fermentorum corporis jam im-
 minutorum restauratio, tantaque firmitas, quantum expetunt tum sanguis, tum
 viscera, senio adversante possunt acquiri.

Quantumlibet verò profint hæc aliaque ejusmodi remedia, attamen hisce so-
 lis hæc corroborandi intentio satisfieri nequit; sed & earum etiam rerum habenda
 est ratio, quæ ad artem propriè medicam non spectant. Et certissimè voto
 frustrabitur is, qui in hoc aliove morbo *Chronico* omnem curationem *Medica-*
mentis solis absolvi posse autumat. Primum itaque ea in *Cibo Potuque* mediocri-
 tas est observanda, ut neque plus alimenti ingeratur, quàm ventriculus conco-
 quere valeat, ac proinde morbo fomes subministretur: neque è contra, nimia
 abstinencia partes ea proportionè defraudentur, qua earundè robur & vigor de-
 buerat sustineri, unde etiam magis debilitentur; quorum utrumque ex æquo no-
 cet, prout tam in me ipso, quàm in aliis haud semel expertus sum. Adhæc, cibo-
 rum qualitatem quod spectat, licet *Εύωπτα* per se considerata *δυσώπειτοις* præfe-
 renda sint, attamen ægri palato est consulendum: quandoquidem observandum
 est, quod sæpenumero id quod ventriculus vehementer appetit, licet difficiliùs
 coquatur, citius tamen à natura vincitur quàm quod facilioris concoctionis ha-
 betur, si ventriculo nausæa creet: at verò quæ *δυσώπειτα* habentur, idcirco parcius
 sunt comedenda. Unicâ etiam ciborum specie singulis partibus vescendum arbi-
 tror, cum varia carniû genera simul ingesta plus Ventriculo molestiæ facessunt
 quàm unicum, quod omnia ista quantitate exæquet. De cœteris, dempta carne,
 pro libitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis; quæ
 licet coctionem non lædant, nocent tamen quatenus morbi fomitem exagitant.

Tempora quod attinet, Prandere tantùm expedit; cum enim lectus humo-
 ribus digerendis propriè dicetur, id temporis in cibis concoquendis non est
 infumendum. Non cœnent itaque, qui *Podagræ* sunt obnoxii; haustum
 tamen *Cerevisiæ* alicujus tenuioris liberaliorem sibi indulgeant: quandoqui-
 dem etiam *Renum Calculo* generando proclives fere sint tales; cujus concre-
 tio à liquore ejusmodi hoc tempore hausto multum impeditur, refrigeratis scil.
 ab eo *Renibus* prolutisque.

Γαλακτοποσία, seu *Diæta* è solo lacte sive crudo, sive cocto, exulantibus
 cæteris omnibus, nisi quod panis aliquid semel forte in die adjiciatur, ab
 Annis retrò viginti obtinuit. Profuit hæc quamplurimis præ cæteris hujusce
 morbi præsidiis, quamdiu ne latum unguem ab ea discesserint. Quamprimum
 verò

verò ad sanorum diætâ, utut lenem mitemque, sese receperit, qui huic infueverat, Podagra confestim reuerfa ægrum pejus longè quàm antehac vexavit: labefactatis enim hac methodo naturæ principiis, æger jam morbo pellendo magis impar redditur, unde & periculosius infestat & diuturnius. Qui igitur huic se methodo tradere cogitat, primùm seriò secum perpendat, num valeat per omnem vitam in eâdem persistere: quod tamen fortassis penes eum non erit, utut propositi tenax fuerit: Novi enim Nobilem quendam, qui postquam per annum integrum solo lacte victitaverat, non tantùm sine offensione, sed & cum summa voluptate; (quo tempore quotidie semel aut pluries dejecerat) sistente derepente alvo ac mutatâ corporis temperie, manente verò adhuc animi propensione, & ventriculo tandem ad lac nauseante, abstinere coactus est. Nonnulli verò Hypochondriaci, crasso corporis habitu, vel qui alias liquoribus spirituosus diu multumque assuevere, lactis usum nullatenus ferre possunt. Interea emolumentum illud, perbreve ac fugax quod ex hâc diætâ percipiunt illi, quibus cum lacte convenit, hinc oritur, videlicet quòd non tantùm diætâ sit simplicissima (unde nullus dubito quin jusculum Avenaceum, modo ventriculus illud ferat, idem præstare possit) sed etiam sanguinem dulciorem mitioremque reddat, particulas in eo acriores contemperando: atque insuper, quod ego palmarium judico, cùm lac alimenti genus sit Adultis prorsus impar, istam humorum turgescientiam sive virositatem reprimat, cui Podagra ortum debet, eo nomine paucos istos quibus congruit, tamdiu à Podagra immunes præstat, quamdiu eo solo vescuntur, nec juvat ulterius. Cùm enim Podagræ causæ originali ac primariæ nempe Concoctionum ac Fermentorum debilitati omnino contrarietur, longè magis hâc ratione obest, quàm altera prodest. Quod cùm minus perspectum fuerit, nonnulli incautiores in errores permagnos & planè exitiabiles inciderunt; dum morbi causæ Continenti, humorum sc. caloris & acredini, obviam ire satagentes, Concoctiones pessunderunt, & functiones naturales prostraverunt omnes.

Liquores quod spectat, ii, me iudice, optimi sunt, qui neque ad Vini generositatem ascendunt, nec ad Aquæ debilitatem deprimuntur, cujusmodi sunt Cerevisia tenuis *Londinensis*, sive lupulata, sive non lupulata; cùm extrema ab utraque parte noceant. Primùm de Vino, licet Proverbio jactetur, Vinum potans Podagrâ laborabis, & Vinum non potans laborabis Podagrâ, extra controversiam tamen est, & variis *ποδᾶγριώντων* experimentis confirmatissimum, *Vinum* de facto officere. Licet enim prodesse credatur juvandis Coctionibus, quarum vitia causam Podagræ Antecedentem jamdudum statui; ratione tamen Causæ Continentis omnino obesse censendum est, humores scilicet, fomitem morbi, jam in procinctu stantes accendendo exagitandoque. Sed neque damus Vinum pro potu ordinario usurpatū Coctiones promovere, at potius subvertere dicimus, nisi in diu Vino assuetis. Quamvis enim calorem aliqualem in transitu impertiat, certissimum est tamen, fermenta corporis ab eo subjugari, & avocari, spiritus naturales atque fugari: unde est, si bene conjicio, quod Bibaces atque Nepotes isti malè feriat, *Podagrâ*, *Paralysi*, *Hydrope* aliisque morbis

morbis frigidis ferè perimuntur. Adde, quòd jugis & immodica Vini ingurgitatio corpus ad instar corporum Fœminarum emollit laxatque; cùm liquores temperati partium omnium tonum roborent ac firment: unde qui liquoribus tenuioribus semper assuevere, Podagram ferè nesciunt. Notandum est insuper, quòd huic morbo maximè obnoxii Viri sunt, qui licet imminutam habent concoctionem naturalem, tamen ex quâdam sanguinis luxuriâ plus satis nutriuntur & incrementum sumunt ex materiâ quadam indigesta loco substantiæ sanioris & ritè compactæ. Hanc sanguinis luxuriam *ὀλιγοπρωσία* adauget magis, ac proinde tum novam materiæ saburram accumulatur, tum etiam fomitem jamdiu repositum quasi subditâ face actu in morbum provocat. Huic accedat strui, quòd cùm podagricorum sanguis isti qui è Pleuriticorum, aliorumque morbis inflammatoriis laborantium pertusis extrahitur, persimilis sit, insanorum esset sanguinem jam *ὀπρῶντα* ulterius spirituosius liquoribus, ceu ignem oleo, proritare. Neque tutius ex aduerso liquores nimium refrigerantes in usum revocantur, cùm hi Concoctiones prorsus dejiciendo, & extinguendo calorem naturalem, majorem adhuc noxam inferant; non dolorem scilicet ut Vinum, sed ipsam adeò mortem: prout experientia docet in iis, qui ad senium usque vino liberalius indulgentes, aquam aut tenuiores liquores derepente cum Vino, & non ità diu post vitam cum morte commutârunt.

Hic itaque Podagræ obnoxiiis in potu modus statuatur, ut iis utantur liquoribus, qui neque vel in maxima copia assumpti inebriare possunt, neque frigore suo ventriculum lædere. Hujusmodi est, ut dixi, Cerevisia tenuis nostras, & in aliis regionibus confici poterit ex multa aqua cum paucò vino permixta. Aquam puram crudamque & periculosam existimo, & expertus sum meo damno. Attamen satis commodè ab ineunte ætate potatur Aqua; qua hodieque longè major hominum pars sitim levat: inopia sua feliciores sunt illi, quàm nos nostra copiâ & luxu. Testes appello ingens morborum agmen, quo corpora nostra hoc nomine discruciantur, Podagram sc. Calculum, Apoplexiam, Paralyfin, &c. tum & vim animis illa tam qua à nativa rectitudine transversum aguntur, dum adventitii talium liquorum spiritus, cum spiritibus Animalibus cogitationi formandæ inservientibus complicati, mentem nimium volatilisando perturbant, vana ac futilia loco rerum solidarum atque alicujus momenti subingerentes: atque ita demum ingeniosè Lepidos ac Dicaces, pro Sapientibus nos reddentes; inter quos eadem fermè differentia intercedit, atque est inter Substantiam & prorsus Nihil. Sed de his satis.

Jam verò quamvis sufficiat ei, qui Podagra mitius ac tantum per intervalla laborat, vel Cerevisia tenui uti, vel vino dilutiori, cum is morbi gradus tanti non sit, ut severiori regimini se subjiciat; attamen cum universa corporis substantia in Podagram quasi degeneraverit, minùs quàm exoptet in profligando morbo promovebit, qui non a liquore fermentato quocunque, quantumvis leni & tenui, in totum abstinet, cùm hi omnes spiritus pungentes, & aliquem acredinis gradum in se contineant; & quòd pejus est, quatenus fermento imbuti (perinde ac flores Cerevisiæ liquoribus inditi vim suam fermen-

fermentativam totî massæ communicant) humores fermentationi perpetuæ addicunt. *Potus* itaque *Diæticus* ex ingredientibus vulgò notis & huic usui dicatis pro tali potu ordinario præscribendus est: modò non sit justonfortior, quo haud multo minus periculose accendentur humores quàm ipso vino; nec è contrà aquosior justo, naturales functiones nimîa refrigeratione prosteruens. Hujusmodi Potus si ritè paretur selectis Ingredientibus istis quæ ægro minùs sunt ingrata, licèt ad septimanam unam alteramve non sine aliquali fastidio ita jugiter assumatur, postea tamen perinde gratus & acceptus est, ac sunt alii liquores quibus quis maximè assueverit. Atque ab hoc potus genere non tantùm non imminuetur Appetitus, sed & augebitur: magis insuper naturalis & genuinus evadet, quàm cùm liquoribus fermentatis uti solet. Hoc insuper commodi accedet, quod qui hujusmodi potum Diæticum loco ordinarii hauriunt, liberius in cætero victu sibi possint indulgere, quàm cùm Cerevisiam biberent, aut Vinum: cùm errores in victu, (quos omnes penitus evitare pene supra humanam sortem est) hoc pacto aliquatenus corrigantur compensenturque. Quod verò omnium primum est, æger hoc modo sibi à Calculo præcavebit, qui Podagræ ferè individuus est comes; cùm liquores acres ac attenuantes quilibet, ut ad Calculum jam factum proritandum, ita ad eundem generandum etiam faciunt. Liquor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundo est, mihi maximè arridet. ℞. *Sarsaparil.* ℥vj. *Lign. Saffaphr. Chinæ,* & *ras. c. c. an.* ℥ij. *Glycyrrhiz.* ℥j. *Coq. in Aq. fontan. Cong. duobus per horæ dimidium; deindè stent clausè super cineres calidos per horas 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem. Cùm primùm ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi ℥ss. Post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam, & liquor clarus reponatur in lagenis vitreis probè clausis ad usum.*

Hic liquor tum primùm commodissimè in usum trahetur, ubi quis à Paroxysmo convaluit; atque in eò perseverandum tam in ipsis Paroxysmis, quàm in eorum intervallis per reliquum vitæ cursum. Neque enim satis factum est sæviente adhuc morbo novis rebus studere, cùm in ejusmodi ἀταξία & motu inordinato natura vix ferre queat, ut liquores fermentati, qui vegetiores sunt ac magis spirituosî, cum alio inertî ac spiritibus destituto commutentur. Eodem etiam tempore & *Electuarium* prædictum usurpabitur; quod pariter deinceps tam in Paroxysmorum insultibus quàm extra eos quotidie est devorandum. Hujus calor Potus Diæticî aquositatem quadantenus pensabit, sanguini & visceribus debitum caloris gradum concilians, sine ista agitatione, quæ excitari solet ab æstu liquorum fermentatorum.

Si quis objiciat eam vitam vix vitalem esse, in quâ omnimodatum à Vîno tum ab aliis liquoribus fermentatis abstinentia observatur; respondeo pendendum esse, an non longè miserius sit ac minùs tolerabile diris inveterascentis Podagræ cruciatibus (nam in mitiori morbo non hoc postulo) quotidie excarnificari, quàm huic soli liquori se adstringere, cujus usu continuatò in cæteris esculentis fermè omnibus animo obsequi licet, ut jam non repetam, quòd & hic potus (uti cætera omnia) dulcescet consuetudine. Certè

qui hunc morbum expertus est, modò Homo, non bibes fuerit pecus, nihi ambiget, in quam partem debeat concedere.

Quo non obstante, si æger vel à longo ac nimio usu liquorum inebriantium, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque Vino vel quovis alio liquore fermentato nequeat concoquere, non vacat certè periculo eundem protinus ac derepente à vino depellere, qui quidem error haud paucis lethalis fuit. Prorsus itaque, si me audit, Apozema Diæteticum suprà præscriptum abdicet, vel, si eodem uti statuerit, ei sensim assuescat, haustum vini in partibus ad tempus aliquot sibi indulgens, quasi Remedii loco potius quàm Diætæ, donec Decoctum illud familiarius evaserit. *Vinum* autem *Hispanicum* hîc loci tam Rhenano, quàm Gallico omnino præferendum est, quæ posteriora, licet ventriculo pergrata sint, tamen exacerbandis humoribus & augendo morbi fomiti apta nata sunt. Adde quòd cum æquè ferè cruda sint, & vix magis concocta quàm est nostrum Pomaceum, non perinde cardiaca sunt atque calida, ac res postulat. Atque hæc de Cibo Potuque *ποδαγριάντων* dicta sunt.

Est & aliud, quod tametsi parvi pendatur, magni tamen momenti est, tam in digerendo morbi fomite, Paroxysmo adhuc vigente, quàm ad prohibendam ejusdem materiæ generationem extra Paroxysmum, nempe ut æger, maxime hyemis tempore, maturè lectum petat. Etenim post venæ sectionem & Catharsin nihil æquè naturæ vires subruit ac noctu vigilare: quod quidem valetudinariorum quilibet expertus affirmabit, si seriò animadvertit, quanto alacrior vegetiorque exurgit, quoties se lecto temporius commiserit, quàm verò enervis est ac languidus, quoties ad multam noctem vigilaverit. Et quamvis res eodem recidere videatur, an citius seriusve quis lectum repetat, modò per tot horas eidem indulgeat, verbi gratiâ, an *horâ nonâ* cubitum eat, & *quintâ surgat*, vel *undecimâ* cubitum eat & surgat *septimâ*; multum tamen interest, idque ob hanc, ut existimo, potissimum rationem. Interdiu scil. spiritus dissipantur, sive in corporis exercitio, sive animi, qui in minus rectè valentibus ita sunt infirmi ac debiles, ut vesperi somni subsidio maturiùs opus habeant; & cum noctis appulsus œconomiæ corporis quasi relaxationem quandam adferat, quæ diurno tempore à solis influxu vegeta conservatur, lecti calor, brumâ præsertim, solis vicem ut gerat necesse est. Manè verò spiritibus tam à prægressæ noctis quiete, quàm à lectuli calore refocillatis invigoratisque, præterquam quod dies superveniens firmitatem ac robur corporis tono conciliet, diluculo surgere hoc tempore, licet horam unam alteramve à somno matutino detrahat, non ita altum vulnus Naturæ infligit, ac vigiliæ vespertinæ ad horam unam vel alteram protrahat. Quamobrem istis qui Podagræ sunt obnoxii Author ego sim, hyeme præcipuè, ut lecto maturè admodum se committant, & diluculo exurgant, quantumvis somnus justo brevior suadeat, ut diutius cubantes eundem adhuc venentur. Cum somnus qui ita diluculo capitur secutura noctis somno tantundem detrahat; atque ita tandem naturæ vi illatâ, spretoque sapienti ejus instituto, noctem pro die quis habeat, diem perversus pro nocte.

Quinimo *animi tranquillitas* omni ope stabilienda est: cū perturbationes omnes, si repagula semel effringant, ad solvendam spirituum, qui sunt Digestionum instrumenta, lytasin, ac proinde ad Podagræ incrementum multum faciant. Prudenter itaque secum meditetur æger mortalitatis suæ conditionem, nec se earum, quæ eam sequuntur, molestiarum exortem stultius opinetur: sive enim sui ipsius, sive aliorum culpa hanc animi ægritudinem pariat, non poterit unquam mundo leges dare, qui nemini hætenus, quantumlibet demum potens aut sapiens fuerit, semper morem gessit; neque ita cuiquam semper ex animi voto cedebant res omnes, ac vana mens sponponderat, at derēpente inter rerum apparatus animam agens humanæ fragilitatis specimen tandem edit, immerito se brevi vitæ fructu spolians. Idem etiam incommodi sequitur nimiam animi ad studia & res ferias applicationem: Cū enim huic morbo præ cæteris quibuslibet Melancholia vulgò dicta comes semper adhæreat, qui ei sunt obnoxii, spiritus Animales diu multumque cogitando, etiam non adhibito artificiali librorum adminiculo, fatigare solent atque obruere, hoc ipsum ita valde ac nimio opere agentes, ut corporis œconomia integra amplius conservari nequeat: Quam ob causam ut mihi videtur, hic morbus perpaucos Insipientes (me excipiat qui volet) occupavit unquam.

Cæteris verò omnibus, quæ ad impediendam humorum indigestionem (quam ego primariam Podagræ causam constitui) & ad sanguinem idcirco corroborandum, ac firmitudinem partibus conciliandam faciunt, *Exercitium* corporis facile palmam præripit. Animadvertendum est autem, ubi suprâ monui, quod cum in hoc morbo, etiam magis quàm in Chronicorum quovis, totius corporis *Habitus* immutari debeat, exercitatio corporis nisi quotidiana fuerit, nihil juvabit: hujusmodi enim exercitatio per vices intermissa, uti nihil ferè conferet ad immutandum habitum corporis ab inertia atque indulgentia jam languescentis & effoeminati, ita fortassis & nocere possit, Paroxysmum accerfendo, ubi quis jamdiu ab eâ defueverat. Hoc verò exercitium vehemens non fit oportet, tale verò quale Senibus competit, qui Podagræ subjecta sunt magis usitata. Motus enim corporis justo vehementior nimium dissipat, & è consequenti Concoctiones lædit; quando exercitatio moderata ac perseverans eosdem firmet. Quantumlibet hoc durum videatur homini, qui præter senium & corporis ad motum ineptitudinem, & socordiam huic præsertim malo, quasi contrariam, dolore insuper mactatur, tamen si hoc omittatur, nihil ex hætenus inventis quicquam proficiet. Utque Paroxysmorum intervalla sine jugi corporis exercitio magna esse non possint, ita etiam ad Calculi generationem talis erit proclivior, qui quidem plus habet & periculi & cruciatûs quàm ipsa Podagra.

His adde, (quod magnum pondus habere debet) materiâ *tophaceam* à longa requie admodum auctam iri in Articulis corporis, maximè verò Digitorum, ita ut tandem omni motu priventur. Utut enim sidenter asserant nonnulli, horum tophorum materiam nil aliud esse, quàm sanguinis *Tartarum* ad articulos transmissum, facile tamen constabit cuilibet rem paulò attentius perpendenti, quod dum

magna vis materiæ inconcoctæ Podagram facientis in Articulos quosdam depluit, & partes vicinas diutius tumidas reddit, ut partim harum virtus assimulativa sufflaminetur, partim à suffocante obstructione quam in eis parit iners hic humor, dicta materia generetur, quæ à calore doloreque articuli in huiusmodi substantiam cogitur: atque indies augetur, tum carnem, tum cutim articuli in propriam naturam vertens; quæ jam nuda jacet, acicula, ad instar *Cretæ*, *Ocul. Cancr.* aut similis alicujus rei extrahenda. Jam verò hoc malum ab exercitio quotidiano præcavetur, à quo oritur debita humorum Podagram generantium, qui unam aliquam partem libenter occupant, difflatio per omne corpus. Unde fit, uti ipsemet expertus sum, quòd exercitatio longa & quotidiana non tantum non officit generationi tophorum, sed etiam tophos veteres & induratos solvit, modò non eo usque invaluerint, ut cutim extimam in suam substantiam mutaverint.

Exercitii genus quod spectat, *Equitatio*, quoties nec grandior ætas, nec Calculus intercedunt, reliquis longè præferenda est. Et sanè diu multumque mecum reputavi, quòd si cui innotesceret Medicamentum, quod & celare vellet, æquè efficax in hoc morbo, ut in Chronicis plerisque, ac est *Equitatio* constans & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset. Hac si uti non liceat, vectio frequens in curru ferè eodem redit. Atque in hoc saltem Podagra laborantibus plerisque bene est, quòd opes quæ luxuriæ, unde pullulavit morbus, irritamenta erant, facultates currus habendi subministrant, quo hac saltem exercitationis specie fruantur, cum altera frui nequeant.

Observandum est autem, quòd *Exercitatio* in aëre salubri longè ea præstantior est, quæ in minus salubri peragitur: ruri scilicet potius quam in urbe, ubi aër vaporibus à variorum Artificum officinis exhalantibus est repletus, & ædificiorum densitate constipatus; qualis est in *Londinô* hóc nostrô, urbe, quantum certò scimus, omnium quæ in toto terrarum orbe sunt, spatiosissimâ. Quantum verò intersit, an quis ruri, an in urbe se exerceat, Podagricorum quivis statim persentiscet.

Quod *Venerem* attinet, is qui tam Podagra quam senectû laborat (quandoquidem jam jam ea spirituum copia destitutus est qua Concoctiones promoveri debuerant, & per consequens absque hac clade adventitiâ articulos & reliquas partes adjacentes plus satis laxatas habet & debilitatas) æquè improvidus meo judicio foret si ejus lenociniis indulgeret, atque ille qui cum longum iter emetiendum suscepit, Viaticum omne prius abliguriret quam se viâ committeret. Quin imò præter malum quod sibi accersit, languidiora ævi jam fatiscentis desideria non cohibens, maximo illo Privilegio fruendi Jubilæi, quod speciali atque eximio naturæ munere Senibus conceditur, se abdicat; qui jam in ultimâ vitæ scena ab earum libidinum impetu, quæ, ceu tot rabidæ feræ, eos per juventam omnem diu noctuque quasi laniabant, tandem aliquando sunt emancipati: cum horum appetituum expletio nullo modo longum illud malorum agmen, quod eam vel comitabatur vel insequabatur, pensaret unquam. Atque hæc de Regimine.

Quamvis

Quamvis autem hujusmodi Regulæ tam Diætam quàm cæterum regimen spectantes, si ab homine Podagræ obnoxio religiosè observentur, eum ab enormioribus morbi insultibus præservare queant, atque istam sanguini & partibus solidis firmitatem conciliare, quæ ab illâ malorum Iliade, unde morbus non solum supra humanæ patientiæ vires, sed & funestus tandem redditur, eundem immunem præstare possit; non tamen efficient ut non post quædam intervalla, maximè exeunte hyeme, Podagra quandoque tentetur. Licet enim æstivo tempore dum tonus vigorque sanguinis à Solis calore excitatus fuerit & in statu conservatus, & pariter debita humorum per poros eliminatio pro voto successit, omnino oportet ut coctiones longè melius quàm hyeme celebratæ fuerint; tamen cum appetente bruma & sanguinis robur fuerit imminutum, & perspiratio per cutis poros impeditior, necesse est ut ingens materiæ indigestæ colluvies sit accumulata, quæ tandem diuturna mora in speciem prorumpet, propriis se exerens symptomatis & Paroxysmum inducens, quamprimum vel ab humorum motu ab accessu Solis propiore, vini potatione, exercitio vehementiori, aut alia causa evidenti quacunque ansa detur.

Ex jam dictis liquet eum qui hujusce morbi curationem molitur, id negotii sibi dari debere credere, ut totius corporis habitum immutet, atque illud ad pristinam constitutionem refingat, quantum per ætatem & reliquas circumstantias fieri possit, quod in Paroxysmorum interstitiis, non in ipsis Paroxysmis annitendum est. Cum enim morbi fomes non solum generatus, sed & in articulos jam ablegatus fuerit, serò nimis vel ejusdem mutationem vel eliminationem per alias vias conabimur: cum non alia methodo foràs ejiciendus sit, quàm ea quam natura præmonstrat, cui soli permittendus omnino est. Quod & in Febrium Intermittentium Paroxysmis usu venit, quas ob eandem causam remediis non oppugnamus nisi æstu prius consopito. Nec absurdus quis in extinguendis harum febrium, calore scilicet, siti, inquietudine, aliisque symptomatis, anxie operam locaverit, quàm existimaverit alius se Podagram sanare, cum in Podagræ symptomatis tantum coercendis laboret; quum tantum hoc tempore à curatione morbi abscedat, ut eandem aliquatenus impediat ac remoretur. Quanto enim magis ægri dolores lenit, tanto magis humorum concoctioni adversatur; quantoque claudicationem arcet, tanto materiæ morbificæ expulsionem officit. Adde quod quanto paroxysmi furor ac acies retunditur, non solum tanto diutius affliget, sed & brevius erit spatium interjacens, & minùs etiam liberum ab omni gradu symptomatum, quibus hic morbus funestatur. Quod nemo inficiabitur, qui diligenter trutinaverit, quæ supra in hujusce morbi historia edisserui.

Quamobrem licet nihil magni in *Paroxysmo* tentandum sit, nisi quòd istis symptomatis occurrendum est, quæ falsa medendi methodus quandoque parturit; tamen cum omnes uno ore fateantur morbum huncce ab humorum copiâ & exuberanti plenitudine nasci, ægro fortasse conducet à carnibus per aliquot dies ubi primum à morbo corripitur, abstinere, & harum loco simplici jusculo Avenaceo uti, aut alio pari alimento; cujusmodi diætâ tenuis materiæ morbificæ

imminuendæ multum conferet, & naturæ opportunitatem subministrabit, quâ eandem ocyus digerat. Cùm verò ingens sit corporum aliorū ab aliis discrimen, quibusdam abstinentiam à carne non ferentibus, statim vero ab eâ spirituum animalium ἀταξία, animi deliquio, aliisque symptomatis, qualia foeminis Hysterica Affectione laborantibus accidere solent, correptis; istos non tantum juvabit, sed & lædet, si diutius à carnibus abstineant, quàm ventriculus earum usum aversetur: quot ut plurimum non excedit primum aut secundum diem eorum Paroxysmorum particularium, qui omnes simul juncti integrum Paroxysmum, ut supra innui, constituunt. At verò sive tardius sive ocyus quis carne vescatur, serio cavendum est, ne urgente morbo majore copiâ utatur, quàm quæ ad naturam sustentandam necessaria sit, nec minore cura opus est in assignanda victus qualitate. Namque ut semper in Paroxysmorum intervallis, ita præcipuè Paroxysmo jam præsentē, æger summopere curare debet, ne quid vel in quantitate vel qualitate sive potus, sive ciborum peccetur. Neque in hoc solo, sed in alio omni Regimine, de quo fusiùs egi, in intervallis observando, cautela haud vulgaris adhibenda est. Et licet tam dolor quàm magna ad motum inhabilitas, exercitio, quod ego præ cæteris omnibus laudavi, contra-indicare videantur, tamen & hic labor exantlandus omnino est. Quamlibet enim in Paroxysmi initio ægro impossibile videatur ut lationem in currum, multò minùs ejus motum ferre queat, attamen si id tentaverit, non ità diu post sentiet se minùs à tali motu dolere, quàm cum se in cathedra domi contineret. Id insuper accedit emolumentum, si ad horas aliquot tam manè quàm post meridiem in curru vectus fuerit, quòd cùm domi toto die sederet, noctem ferè insomnem ageret, jam dolorem somno ad multam noctem fugare poterit; cùm exercitatio permodica Podagra laborantem eo usque delasset, ut in somnum dilabatur. Adde quod eadem exercitatio Calculum, quem vita deses ac iners ut plurimum accersit, quadantenus præcavebit. Quod verò maximi momenti est, à jugi ac pertinaci exercitio occurratur totali Artuum ad motum impotentia, quæ haud paucis accidit post Paroxysmum unum alterumve diuturniorem, contractis sive poplitum, sive calcaneorum tendinibus: dum enim in cruciatu longiore quieti indulserint (maximè crura nolentes extendere quoties dolor genu occupaverit) tandem crurum ac pedum motu per reliquum vitæ tempus orbatii sunt, tam in Paroxysmorum interstitiis, quàm in ipsis Paroxysmis, quos non ita tamen effugiunt. Quinimo in iis Senibus quorum Concoctiones admodum vitatæ sunt, & qui à morbo per multos annos affligente ipsam corporis substantiâ quasi in Podagram habent conversam, nihil minùs sperandum est quàm ut morbus sine exercitio ad digestionem perducatur unquam, cùm enim morbus naturam viribus superet, sæpe moriuntur à languore atque ægritudine quæ fomitis morbofi copia concoctionem respuentis apportat, & ab hac materia inconcoctili, quæ nullo modo potest assimilari, tanquam à veneno enecantur.

Attamen non obstantibus iis quæ de exercitii utilitate in Podagræ Paroxysmis dicta sunt, si tamen æger præ nimia Paroxysmi atrocitate primo statim insultu quasi prostratus fuerit, (quo istis ferè usu venit in quibus Podagra jam

jam *ἀκμὴν* ſuam attigit, nec adhuc à multorum annorum decurſu mitigata eſt) hoc in caſu ſi æger cubiculo includendus eſt, è re erit ut etiam lectulo ad primos dies aliquot, donec ſcilicet doloris vehementia remiſerit, idem includatur: etenim lectulus exercitii defectum aliquatenus ſupplebit; cum ejus uſus continuus materiam morbificam potentius digerat paucis diebus quàm excubatio aliquam multis, maximè incipiente morbo, ſi modò æger abſque leiποθυμίᾳ aliſque malis ſymptomatis à carnibus abſtinere queat, ſolo juſculo Avenaceo, Cereviſia tenui & cæteris ejuſmodi contentus. Veruntamen haud omittendum eſt, quod ſi Podagra jam inveterata fuerit, atque æger ad animi deliquia, ventris tormina, diarrhœam, aliaque hiſ ſimilia ſymptomata propendeat, vix Libitinam evitabit ab aliquo Paroxyſmorum jugulatus, ſi non exercitio utatur, idque in aëre liberiore ac perſtabili loco; quod diligenter animadvertendum cenſeo, quando magnus Podagricorum numerus iis ſymptomatis jam perierit, quibus hæc in cubiculo, & præſertim in lecto incarcerationio eoſdem obnoxios fecerat, qui non ita maturè ſato conceſſiſſent ſi moleſtiam veſtationis per majorem diei partem devorare voluiſſent. Licet enim qui unico artuum dolore fatigatur, ſe cubiculo poſſit includere, tamen qui loco doloris acerbiffimi, ægritudine, aliſque ſymptomatis prædictis laborat, talis idem imitando, ſe in vitæ diſcrimen conjiciet. Et quidem bene nobiſcum agitur quòd quoties dolor ita vehemens eſt, ut æger motum tolerare non valeat, neque eo admodum opus habeat; ipſo dolore, quod amariffimum eſt naturæ remedium, ægro de vitâ proſpiciente.

Jam verò quod attinet Podagræ *Symptomata*, iis occurrendum eſt à quibus æger in *Paroxyſmo* de vita periclitatur. Horum maximè familiare eſt ventriculi debilitas ac languor, cum ventris torminibus tanquam à flatu, quod iis accidit qui vel jam à multis annis Podagræ obnoxii vixerunt; vel iis qui licet non ita diu eadem laborantes, hoc tamen mali invitarunt præpropere, liquores ſpirituofos cum tenuioribus & multùm refrigerantibus, derepente commutantes, vel *Emplaſtra repellentia*, aliaque Medicamenta refrigerantia partibus affectis ad leniendum dolorem admoventes, unde morbi cauſa materialiſ, quæ in artus debuerat deponi, in viſcera rejicitur. Multa egomet expertus ſum in poſtremorum annorum Paroxyſmīs ad mitigandum hoc ſymptoma, nihil verò æquè votis reſpondit ac *Vini Canarienſis* hauſtulus ſubinde deglutitus, languore, atque ægritudine urgentibus; neque vel Vinum Gallicum rubrum, vel Theriaca Andromachi, neque aliud quodlibet è Cardiacis mihi hætenus notis pares habet vires. Sed neque vinum hocce, nec Cardiacorum aliud quodlibet ægrum, ſi exercitio non utatur, omnino ſervare poſſe exiſtimandum eſt.

Sin autem gravius aliquod ſymptoma inducias haud ferens, ex retroceſſu materiæ Podagricæ ſubitò ingruat, & mortem ægri minitetur; neque vino neque exercitio ſuprà laudatis fidendum, verùm hoc in caſu, modò non caput, ſed partes vel naturales vel vitales ejuſmodi malum impetat, ad *Laudanum* ſtatim confugiendum; nempe *laudani liquidi gutt. xx. hauſtulo aq. Epidemicæ immiſtæ propinentur*, & in lecto ad quietem æger ſe componat. Quod

Quod si materia Podagram committens, quia non jam in artus fuerit eliminata, *Diarræam* induxerit, modò ea Paroxyfmi singularis Crifis non fuerit, & Laudano jam laudato, & exercitio omnifmodi (hoc enim imprimis ad *Diarrhœæ* curationem obeundum eft) non obftante, alvus nihilominus diutius fluat, ægritudine, torminibus ventris, &c. accedentibus; unicum, quod fcio, remedium eft, ut *Sudor* provocetur methodo & medicamentis huic ufui deftinatis: quod fi fiat ad biduum triduumve mane & vefperi, per duas treſve horas continuas, fiſtetur ut plurimum *Diarrhœa*, & morbi fomes magna vi in artus detonabit. Hac ego methodo aliquot retrò annis meæ vitæ conſului, poſtquam me in hoc malum à potatione aquæ frigidæ pro ordinario potu, imprudens conjeceram; idque poſteaquam Cardiacorum & Adſtringentium varii generis opem fruſtrà imploraveram.

Eſt & aliud ſymptoma non perinde crebrum, quod tamen aliquoties ipſe vidi, *Metaſtaſis* ſcilicet materiæ peccantis in Pulmonum lobos, quoties nempe *Tuffis Brumalis* à frigore tempore Paroxyfmi ſuſcepto, materiam ſenſim in Pulmones allicit, Artubus interim, ob translationem materiæ morbificæ in aliam regionem, vel omnino, vel tantum non, tam à dolore quàm à tumore liberatis. Uno hoc in caſu Intentio Curativa non ad ipſam Podagram dirigenda eſt, at verò hoc ſymptoma pari modo tractandum eſt, quo *Peripneumonia* abſoluta; *Venæſectione* ſcilicet repetitâ, cum diætâ & remediis refrigerantibus ac incrallantibus, cum ſanguis, in hoc ſymptomate præcipuè, extractus *Pleuriticorum* ſanguinem prorfus referat. Purgandus eſt inſuper æger inter venæſectiones *Potionibus* lenientibus, quibus hæc colluvies in Pulmones illapſa poſſit amandari. *Sudoris* autem provocatio, quam vim cunque habeat in morbi fomite ſuper Artus deturbando, hîc tamen non tantum non prodeſt, ſed & obest, materiam, pulmonibus impactam indurando; unde generantur *abſceſſuli*, & tandem ægri mors certiffima ſubſequitur.

Hîc porrò notandum, quòd *Podagrîci* ferè omnes, poſtquam cum hoc morbo diu conflixere, *calculò renum* ſint obnoxii, proindeque vel ſtatu vel declinatione ſæpius, paroxyfmi generalis *Nephritico* dolore laborare ſoleant; idque cum magno ægrorum non tantum cruciatu, ſed & virium diſpendio, cum jam plus ſatis attritæ fractæque eæ fuerint. Hoc in caſu poſthabitis quibuſvis aliis remediis *liquoris poſſetici*, cui *rad. Althææ* ℥j. incoctæ fuerint, *Congium unum* quàm citiffimè devoretur, & ſequens *Enema* injiciatur.

℞. *Rad. Althææ* & *lilior. an.* ℥j. *fol. malvæ, pariëtar. branc. Urfin. & flor. Chamæmel. an.* M. j. *ſem. lin. & ſænug. an.* ℥ß. *Coq. ſ. q. aq. ad* ℥iſſ. *Colaturâ diſſolv. ſacchar. Culinariſ & ſyr. dialthææ an.* ℥ij. *Mſ. f. Enema.* Quam primum per vomitionem æger totum reddiderit quod per os ingeſtum fuerit, ut etiam *Enema* rejecerit, *laudani liquidi* ſatis magna doſis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel *pil. Matthæi.* gr. xv.

Remedia Externa ſi quis quærat ad leniendum *Podagræ* dolorem accommoda; nulla mihi hætenus cognita ſunt (licet plurima tum in me ipſo, tum in aliis expertus fuerim) præter merè Refrigerantia & Repellentia, quorum uſum

usum jam suprâ docui periculo haud vacare. Et fidenter assero, multâ & longâ observatione suffultus, maximam partem eorum qui Podagrâ periisse putantur, non tam ipso morbo quàm subleſtâ atque indebitâ medicatione fuisse peremptos. Si quis autem Remediorum externorum, quæ pro Anodynis indubitatis habentur, virtutem probare velit, non fucum sibi faciat eadem sub declinatione Paroxyſmi particularis (quo tempore dolor jam sponte suâ cessurus est) applicando: quin potiùs sub initio Paroxyſmi ista usurpet: & statim edocebitur quàm ficulneum sit illud auxilium, quàm vana spes; cùm hæc Epithemata nocere quandoque possint: prodesse nunquam. Quâ de causâ egomet jam à multis annis nulla remedia externa adhibui. Pulticula ex pane similagineo cum Croco in lacte cocto, addito postea Oleo Rosaceo in pauca quantitate, mihi olim præ cæteris profuit, quæ tamen in Paroxyſmi initio nihil prorsus juvabat. Si igitur dolor admodum sæviat, æger rectiùs sibi consultet se in lecto continendo donec is aliquantisper remiserit, quàm Anodynis utatur: attamen haud abs re fuerit *Laudani* pauxillum vesperi fumere, si dolor patientiam multum vincat, aliter meliùs omittetur.

At verò cùm in externis hujusmodi Remediis jam sim, omnino aliquid mihi dicendum est de Musco quodam Indico, *Moxam* vocant, nuper magni nominis in Podagræ curatione, si nempe pars affecta eâdem accensâ leviter ustuletur. Quamlibet hoc Remedii genus *Indis Orientalibus* acceptum referatur, atque *Europæis* universim omnibus pro incognito habeatur, attamen constabit antiquioris id esse ævi etiam apud nos, illi qui *Hippocratis* effata jam ante annos bis mille literis tradita voluerit consulere. In præstantissimo illo de *Affectionibus* libro, *Sect. quintâ*, pag. mihi 524. de *Ischiade* agens, hæc habet, *ἐὶ δὲ ἴς ἐν τῇ ὀπίσθῳ*, &c. i. e. *Quod si in uno aliquo loco firmiter constiterit dolor; neque Medicamentis expellatur; quocumque loco dolor fortè extiterit, eum lino crudo inurito.* Et paulo post de Podagrâ verba faciens: *ἔμφερει δὲ καὶ ταύτῃ*, &c. i. e. *Huic eadem quæ Articulari morbo conferunt, & longus quidem hic morbus est & gravis, minimè tamen lethalis. Quòd si in digitis dolor remaneat, venas in digito paulo supra articulum inurito; ustio autem per linum crudum fiat.* Opinor neminem posse existimare, eam esse differentiam Specificam inter flammam vel à lino, vel ab hoc musco Indico excitatam, ut hæc illa in sanatione Podagræ plus valeat, non magis quàm reputaverit ignem è *Roboris* Segmentis accensum majus aliquid præstare posse illo, qui *Fraxini* ligno alitur. Hæc partis affectæ ustulatio aliquid pollicetur (quod & efficere quandoque possit) ad doloris committigationem, evocata scil. fomitis morbifici parte subtilissima ac maximè spirituosâ, in articulum jam deposita. Attamen beneficium ab hoc remedio partum, cùm indigestionem, quæ Podagræ causa est Antecedens, nullo modo attingat, fugax esse oportet ac breve. Neque opus est, ut dicam, illud in Podagris tantum incipientibus locum habere; quando enim sive à morbi diuturnitate, sive ab importuno atque indebito Medicamentorum usu, Podagra, ut subinde fit, ad partes internas fuerit conversa, ac proinde ægritudine, torminibus ventris, atque longo hujusmodi symptomatum agmine, potiùs quàm dolore ægrum multaverit, nemo sanus igne utendum esse arbitrabitur.

En vobis omnia, quæ mihi hæcenus comperta sunt in hujus morbi Curatione. Si quis objiciat multa esse Remedia *Specificæ* ad Podagram; ego me ea nescire lubens fateor: & vereor nè Promissiores isti perinde sint ignari ac sum ego. Et sanè dolendum est, Medicinam (Artem nobilissimam) hujusmodi nugis, quæ, sive ab inscitia, sive à pravitate Scriptorum, credulis objiciuntur, usque adeò deturpari; cum in omni fere morborum genere hujusmodi aliquid à Nugivendulis tanquam *Θεῶν χάρις* decantetur pleno ore. Et, quod est magis mirandum, quòd non tantùm in morbis typo indutis hujusmodi deliramenta obtineant, sed & in minimè formatis qui ab Organorum læsione aliqua, aut *ὑποπόδιον* externa producuntur, Viris etiam cætera cordatis imponant. Atque hoc satis evincunt *Specificæ* in *Contusionibus* vulgò prædicata, qualia sunt *Sperma Ceti*, *Tegula Hybernica*, &c. quæ omnia id tantum præstant, ut Methodum qua tractari debuerat hic Affectus, divertant: prout illi satis constabit qui experiri voluerit, quanto tutius atque ocyus sanabitur is, qui *Venæsectionibus* ac *Purgationibus* utetur *alternatis*, usque dum bene habuerit; neglectis prorsus levidensibus istis, quæ pro more post sanguinem semel eductum sæpe exhibentur, atque etiam ea sudorum sollicitatione quæ pari passu cum eorum usu solet procedere: à qua partium jamdiu ad inflammationem propensarum excalefactione æger sine causa in vitæ periculum adducitur.

Quod si nihil proficientibus his quæ attuli omnibus, adhuc minùs sagax videar, & minùs copiosus in Medicamentis eruendis enumerandisque; Univerſa illa proponam quæ *Lucianus* in *Τραγικοδῶρυπα* jam plenius collegit, è quibustam externa quàm interna qui volet eligat: quæ forsàn haud minùs efficacia sentiet quàm sunt eorum plurima quæ à nonnullis deprædicantur. Apud hunc *Podagra* Persona ita istos alloquitur, qui Secreta quædam Remedia se habere jactabant, quibus is morbus possit expugnari.

Τὶς τῶν ἀνθρώπων, &c. i. e.

Quis invictam me dominam dolorum
 Ignorat Podagram in terrâ mortalium?
 Quam neque *Thuris* vapor placat,
 Neque effusus sanguis aras ad incensas;
 Non templum divitiarum undique suspensis ornatum donariis:
 Quam neque *Apollo* Medicamentis expugnare valet;
 Omnium Medicus in cælo Deorum;
 Non filius *Apollinis* doctissimus *Æsculapius*.
 Postquam enim enatum est primum hominibus genus,
 Conantur omnes meam elidere potentiam,
 Miscentes semper Medicamentorum artificia.
 Alius aliam in me experitur artem.
 Terunt *Plantagines*, & *Apia* mihi;
 Et folia *Lactucarum*; & silvestrem *Portulacam*.
 Alii *Marrubium*; alii *Potamogetonem*;
 Alii *Urticas* terunt; alii *Symphytum*;

Alii-

*Alii Lentescerunt ex palustribus lectas ;
 Alii Pastinacam coctam ; alii folia Persicorum ,
 Hyoscyamum , Papaver , Cepas agrestes , Mali Punici Cortices ,
 Psyllium , Thus , radicem Ellebori , Nitrum ,
 Fœnum græcum cum vino , Gyrinum , Collamphacum ,
 Hyparissimam Gallam , Pollen hordeaceum ,
 Brassicæ decoctæ folia , Gypsum ex Garo ,
 Stercora Montanæ Capræ , humanum oletum ,
 Farinas Fabarum , florem Asii lapidis ;
 Coquunt Rubetas , Mares-araneos , Lacertas , Feles ,
 Ranas , Hyænas , Tragelaphos , Vulpeculas.
 Quale Metallum non exploratum est mortalibus ?
 Quis non succus ? Qualis non arborum lachryma ?
 Animalium quorumvis ossa , nervi , pelles ,
 Adeps , sanguis , medulla , stercus , lac.
 Bibunt alii numero quaterno pharmacum :
 Alii octono : sed septeno plures.
 Alius verò bibens Hieram purgatur :
 Alius incantamentis impostorum deluditur :
 Judæus alius stultum excantat nactus :
 Alius verò remedium petit ab Hirundinis nido.
 Ego autem his omnibus plorare impero ,
 Et facientibus hæc atque irritantibus me
 Soleo occurrere multò iracundior.
 Iis verò qui cogitant nihil adversum mihi ,
 Benignam adhibeo mentem , facilisque fio.*

Nullus dubito prudentissimos quosque eorum qui cum hoc morbo diu con-
 fluxere de omnimodâ Curatione desperantes , Choro qui istius Dramatis Ca-
 tastrophæ facit , sufragaturos.

Ἡσίων ὁ πᾶνδρμς , &c. i. e.

*Lenem , O ubique gentium , celebrata afferas (nobis) dolorem ô Podagra ,
 Levem , facilem , non acutum , brevem , haud sævientem ,
 Tolerabilem , facile desinentem , parum validum , ambulationes non impedientem.*

Multi sunt modi miserorum :

*Sed exercitia dolorum , & consuetudo
 Podagricos soletur.*

*Ideoque æquo animo , ô Complices , obliviscimini
 Dolorum. Si ea quæ placent non fiunt.*

Tamen etiam præter spem accidentibus viam invenire solet Deus.

Quivis sustineat Podagrâ laborantium

Deludi & derideri :

Talis enim hujus morbi natura est.

Ut semel finiam. Methodus quam hîc trado *φανομένων* prædictorum examini innititur; quamque ego secutus tam in ipso me, quam in aliis, morbi levamen percepi. Therapeia *Radicalis* & usque quaque perfecta, qua quis etiam à diathesi ad hunc morbum foret liberatus, adhuc in Democriti puteo latet, atque in naturæ sinu reconditur, nescio quando, aut à quibus in lucem extrahenda. Spero nihilominus me hoc scripto humano generi commodi aliquid contulisse, si istos scopulos fideliter indigitaverim, ad quos tum ipsemet, tum alii plurimi naufragium fecimus; atque insuper optimam quæ hætenus innotescit, methodum præmonstraverim. Non his majora promitto; quamvis à longa cogitationum serie, quas huic rei impendere tantum non sum coactus, inducar credere, ejusmodi Remedium quandoque inventum iri. Quod si unquam acciderit, inscientiam suam Dogmaticis exprobrabit, atque exinde liquebit, quàm insigniter tam in dignoscendis morborum essentiis, quàm in medicamentis quibus eos aggrediuntur, hallucinentur. Cujus rei exemplum satis luculentum habemus in reptione summi illius ad *Febres intermittentes Specifici, Corticis Peruviani*. Per quot jam sæcula homines quique solertissimi ingenia exercuerant in investigandis harum Februm causis, quibus praxin quilibet aptavit Theoriæ à se excogitatae optimè respondentem? Quomodo verò hæ Medicationes Theoremata valebant defendere, ex iis constat, quorum adhuc recens est memoria, in quibus varias Intermittentium species in variis humoribus in corpore redundantibus collocantes, Curationem ad humorum istorum alterationem atque evacuationem dirigere solebant. At quàm inauspicato id egerunt eorum in his conaminum frustratio, præcipuè vero hujus *Corticis* usus felicior, palam faciunt: cujus ope nos nunc temporis tum humores hujusmodi omnes, tum etiam Diætam & regimen quodcunque susque deque habentes, ac nihil nisi methodum pulveri exhibendo debitam observantes, scopum rectè attingimus; vix ab illo aberrantes unquam nisi ægrum, lecto sine ulla necessitate addicimus, dum in ejus usu est: Tanta tamen est hujus remedii vis, ut non obstante eo incommodi, quod scilicet Febris à lecti calore plus quam erat opus intendatur, ægrum nihilominus ad sanitatem ut plurimum reducat. Interea donec hæc Podagræ Curatio *Radicalis* comperta fuerit, quod Medicos omnes, me præ cæteris, optare fas est; hanc meam qualemcunque opellam boni consulite. Quod si minus eveniat, hominum mores ita probè perspectos habeo, ut non multum fallar; & officii mei rationem ita calleo, ut animo neutiquam cadam. Et si sævissimi isti cruciatus, impotentia ad motum, cæteraque corporis mala, quæ ego per maximam vitæ partem sum perpeffus, (unà cum damno rei familiaris quod sustinui, à Medicina facienda toties adversa valetudine avocatus) aliis quietem & *ἀναλγησίαν* possint comparare, erit unde me fructum aliquem miserrimarum hujus generis, quas in hac vita toleravi, in aliam migrans percepisse existimabo.



EX paucis hisce, Clarissimi nostri Auctoris paginis, satis manifestum est, quid de Podagrâ in genere ejusque curâ legitimâ, quæ in solis palliativis posita est, sentiendum veniat. Verùm specialius quid circa hunc morbum, aliasque omnes affectiones de ejusdem naturâ participantēs, reperitur in Clarissimi Musgrave Tractatibus de Arthridite Symptomaticâ, & Anomalâ, quos propterea pro pleniori ejusce ægritudinis cognitione hîc inserere propositum nobis fuit; sed quandoquidem grandior illorum moles, longiorem Autoris nostri textui interruptionem procreâisset, magis è re visum fuit eos in Voluminis secundi finem rejicere, ubi æquè commodè à Docto LECTORE perlegi poterunt, ac si ipsô hîc locô exhiberentur.



THOMÆ SYDENHAM

Med. Doct.

TRACTATUS DE HYDROPE.

OMnis hominum ætas, sexus omnis ab *Hydrope* nonnunquam infestatur. Foeminæ tamen huic morbo magis sunt obnoxia quam Viri: verùm hos ætate præsertim ingravescente adoritur, illas ubi jam parere desierint: Steriles autem quandoque etiam juniores occupat. Fovæ à digitorum impressione in surarum parte inferiore, sub noctem imprimis conspicuæ, manè verò evanescentes, primum hujusce mali indicium dant, quod non perinde certum est Hydropis ingruentis signum in Foeminis atque est in Maribus; cùm & prægnantes, & aliæ quibus Catamenia quavis de causa sistuntur, haud rarò idem patientur. Neque tamen in Viris ejusmodi tumor Hydropem certò indicat: etenim cùm senex quispiam, habitu corporis paulo pleniori præditus, *Asthmate* jam à multis annis laborans, ab eodem derepente, idque Hyemis tempore, fuerit liberatus, mox ingens tumor musculos tibiarum occupabit, Hydropicorum tumores æmulans, qui Hyeme etiam magis quam Æstate, tempestate magis pluvia quam serena, pariter invalescet, & tamen sine quovis incommodo insigniori, eundem ad Libitinam usque comitabitur. Quo non obstante, si generaliter loquamur, suræ & tibiæ intumescentes, etiam in Viris, pro signo supervenientis Hydropis habendæ sunt; maximè si ita affecti spiritum ægrius ducant: qui quidem tumor tam copia quam mole auctior in dies red-

ditur, donec pedibus majorem aquarum vim jam respuentibus, crura tentantur, ac postea abdomen ipsum; quod quidem serò è sanguine jugiter decedente repletum, paulatim ad ultimum capacitatis suæ limen distenditur; adeò ut sæpe multos Aquæ Congios intus contineat, quæ in umbilicum, qua data porta, ruentes, quandoque Exomphalon constituunt.

Tria interim hunc morbum stipant Symptomata, *Dyspnœa*, *Urinæ paucitas*, & *sitis intensa*. Spirandi difficultas oritur ab aqua Diaphragma comprimente, unde naturalis ejus motus sufflaminatur. Urina idcirco parcè redditur, quia sanguinis serum, quod per ductus urinarios ex lege naturæ excerni debuerat, jam in cavitatem abdominis deponitur, & in cæteras partes eidem excipiendo aptas natas. Sitis est à putredine colluviei ferossæ, quæ à morâ in corpore longiore & calorem & acridinem contrahit, unde æger & febre quodantenus semper laborat, & memorata siti.

Pro rata qua æger in partibus quas morbus obsidet, mole augetur, in reliquis magis magisque indies emaciatur, & gracilescit: tandemque cum tanta aquarum vis intra abdominis ambitum coerceri ulterius nequeat, impetu in Viscera nobiliora & vitalem arcem facto, cataclysmo quasi submersus perit.

Causa hujusce morbi in genere sanguinis debilitas est, unde alimento, quod forinfecus importatur, in substantiam suam convertendo non jam par, idem in extremitates & pendulas corporis partes explodere necesse habet, mox in abdomen etiam, in quo, quamdiu in exigua quantitate hinc inde dispergitur, natura eidem continendo Vesiculas quasdam fabricat, donec tandem, modum jam superans, uno Peritonæo simul clauditur.

Sanguini autem debilitando operam ut plurimum commodabant vel nimia ejus per Venæ sectionem aut alio quovis modo evacuatio, vel morbus aliquis diuturnior, vel perditus ille liquores spirituosos ingurgitandimos, unde & naturalia corporis fermenta destruuntur, & dissipantur spiritus. Hinc est quod bibacissimi quique Helluones sæpius cum hoc morbo, frigido licet, quam cæteri conflictentur. Econtra etiam Aquæ potatio in iis qui generosis liquoribus diu assueverant, sanguini eandem noxam infert.

In Foeminis verò, quod notandum est, alia quædam & ab his longè diversa Hydropis causa reperitur, inclusa nempe in testiculorum alterutro saburra seu obstructio, quæ sensim ejusdem crasin subvertit; unde in dicto testiculo repositâ primum morbi minerâ, tunica ejusdem mirum in modum distenditur; quâ jam tantum non crepante, natura humori excipiendo Vesiculas quasdam suggerit, quarum tandem sive una aliqua, sive etiam pluribus disruptis, & in abdominis cavitatem se exonerantibus, eadem occurrunt symptomata, quæ in Hydrope quam supra depinximus. Sed de hoc genere jam olim egi.

Sunt & aliæ duæ Species tumorum abdominis Hydropem mentientes, Foeminis utræque familiares. Prima est carniū in partibus intra abdomen excrescentia præternaturalis, quæ ventrem in molem haud minùs conspicuam attollit, quàm solet, inclusa aqua. Altera species flatibus ortum debet; qui non
tumo-

tumorem tantum, sed & alia in gravidationis signa pariunt. Hæc viduas ut plurimum exercet, vel etiam mulieres, quæ non nisi provectiores ætate nupserant: atque hæc tam suo ipsarum, quàm Obstetricum judicio, quarum Oracula hac ipsa de re consulere, motum Infantis jam à tempore consueto usque ad legitimum tempus pariendi persentiscentis, quin & ad eundem modum quo gravidæ solent, subinde ægrôtantes, sororiantibus insuper mammillis, & lacte extillante, de fasciis haud rarò, cæterisque ad excipiendum infantem necessariis sibi prospexerunt; donec tandem venter pari quò increverat gradu, sensim detumescens, spem vanam eluserit. Neutra verò harum ad eum, de quo agimus, morbum est referenda.

Indicationes Curativæ veræ ac genuinæ, utpote à prædictis Phænomenis naturaliter quasi exortæ, vel ad aquarum in abdomine cæterisque partibus contentarum evacuationem, vel ad instaurandum sanguinis robur, quò novus earundem proventus præcaveri possit, omnino dirigendæ sunt.

Seri evacuationem quod spectat, magni refert, ut diligenter observemus in omnibus Hydropicis ea Cathartica, quæ vel segnius vel minus potenter operantur, officere magis quàm prodesse: cum enim Medicamenta Purgantia ad unum omnia naturæ sint inimica, quo nomine Catharfeos munere funguntur, sanguinem aliquatenus debilitant læduntque; unde nisi corpus celeriter pervadant & citissimè expellantur, Camerinam eam moventia quam secum abducere nequeunt, & sanguinem tumultuosè exagitantia, tumorem magis adaugent: quod plus satis liquet in eorum pedibus, quibus alvus ita leniter ac blandè sollicitatur. Quamobrem ut cum bonis ægri rebus Purgatio instituat, scire oportet, utrum ægri corpus facilè, an verò difficulter atque ægrè Catharticis cedat, cum in hoc cardine Curationis omnis, sive nullo, sive non nisi magno labore peragendæ negotium vertatur.

Quoties itaque *Hydragogis* utendum est, sollicitè ad facilitatem vel difficultatem qua ægri corpus Catharsin ferre solebat, respicere omnino convenit; quod non alia via ulla certius dignosci potest, quàm ex diligenti inquisitione, quomodo alia Purgantia Remedia alio tempore aliquo usurpata, opus destinatum peregerint. Cum enim in corporibus Idiosyncrasia quædam inveniantur, quoad facilem difficilemve Cathartorum operationem, ægrum sæpissimè in vitæ discrimen conjiciet is, qui sensibile corporis temperamentum, modum sibi ac normam statuerit: quando non ita rarò usu veniat, ut qui habitu sunt fermè Athletico mediocribus Catharticis facile pareant; cum qui contrario planè habitu sunt præditi, vel fortissimis ægrè cedant. Et profecto jam dicta cautio de ægri corporis ad Purgantia ferenda ineptitudine non in *Hydragogis* tantum præscribendis, sed in aliis quibuslibet Catharticis locum habere debet. Etenim sæpenumero observavi hypercatharfes à Potionibus etiam Lenientibus adductas, ex eo quòd ægrum Medicus non interrogaverit, prout oportuit, utrumne corpus facilè, an verò difficulter expurgaretur. Attamen cum *Hydrops*, quod superius dixi, præ cæteris morbis quibuslibet Catharsin & validissimam postulet & maximè celerem; cumque in hoc morbo Purgatio per *ἐπιπράσιν*, quæ

quæ in nonnullis aliis prodest, nullatenus admitti debeat, (cùm hujus generis Catharsis non tantum non imminuat tumorem sed & adaugeat:) Hanc, inquam, ob causam, expurgatio paulo fortior & nimia, justo debiliori est præferenda; præcipuè cum *Laudano* non destituatur, certissimo ad *Hypercatharsin* istiusmodi subito domandam fræno.

Ad hæc in *Catharticiis* omnibus *Hydropicorum* sanationi dicatis, id diligenter est observandum, ut aquæ ea maxima celeritate exhauriantur, quam ægri vires ferre queant; utpote qui singulis diebus expurgari debeat: nisi quod sive ob nimiam debilitatem corporis, sive propter *Cathartici* præcedentis operationem plus satis violentam dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Etenim si non nisi post longa intervalla repetatur Purgatio, quantumlibet copiosa Catharsis præcesserit, aquis denuo affatim colligendis ansam præbebitur; atque ex hac induciarum occasione, quasi victoria jam parta uti nescientes, tandem loco pulsi, re infecta turpiter fugabimur. Adde quod periculum est, ne aquarum inter viscera mora diuturnior eadem putredine quadam sua inquinet ac inficiat. Atque insuper, quod parvi ducendum non est, istæ aquæ à prægressis *Catharticiis* ita in motum concitæ ad noxam inferendam jam propensiores sunt quàm ubi quiescerent. Tam ob hanc itaque causam, quàm ob alias supra memoratas, huic *Intentioni*, quæ colluviem ferrosam intus clausam respicit, quam velocissimè satis faciendum est; neque ab ea nisi urgente necessitate est absistendum aut cessandum, donec omnis aquarum moles omnino demum exantlata fuerit.

Hoc porro notandum venit, quod cùm è *Praxi* constet *Hydragoga* fere omnia, genio quodam sibi peculiari, si sola exhibeantur, iis qui ægrè purgantur parum admodum votis respondere, quin & largiorem eorundem dosin, non tam Catharsin quam sanguinis tumultum promovere (unde qui imminui debuerat tumor, jam auctior cernitur:) Hæc itaque non alium obtinent usum, in hujusmodi corporibus, quàm ut lenioribus *Catharticiis* stimulum addant. Quo non obstante in iis, qui purgati sunt faciles, *Hydragoga* ista & celeriter, & cum magno effectu operantur.

Quocirca in istis, qui Catharsi promptè cedunt, *Syrupus de Spinâ Cervina*, etiam solus, Aquas sat copiosè elicit. Quod quidem Remedium in his aquas ferè solas, easque in magnâ quantitate educit, nec sanguinem perturbans, nec urinam reddens coloratiorem pro reliquorum Purgantium more: Id tantum habet incommodi *Syrupus* ille, quòd inter operandum ingentem sitim provocet. Quòd si idem vel in summâ dosi aliis propinetur, qui ægrè expurgantur, neque multæ sequentur dejectiones, neque eæ multâ aquâ, ut debuerant, refertæ.

Equidem probè memini, (cùm tunc primùm ad *Hydropem* curandam invitarer) me annis abhinc 27. aut circiter ad *Matronam* quandam piam & honestam, nomine *Saltmarsh, Westmonasterii* commorantem, fuisse accersitum; cujus abdomen *Hydrops*, quò atrociorem nondum vidi, in molem magnitudinis vix credendæ evexerat: huic ego *Syrupi* prædicti *Unciam* unam ante prandium,

qui

qui tunc mos obtinuit, exhibui: credi vix potest quam magnam aquarum vim per sedem deturbavit, idque nullo excitato tumultu, absque ullâ virium ægræ jactura: Quod mihi animos addidit, ut eundem quotidie repeterem, nisi quòd diem unum alterumve intercalati paterer, si quandò paulò infirmior videretur. Atque ita aquis sensim eductis, venter indies detumuit, ipsaque prorsus convaluit. Ego fiduciâ planè juvenili atque hominis inexperti, credebam me ejusmodi medicamen possidere, quo Hydropes quoscunque possem debellare: verùm hujusmodi erroris intra paucas septimanas admonebar. Cùm enim non ita diu post ad aliam Fœminam eodem morbo laborantem, qui Febri Quartanæ diuturniori supervenerat, medicinam facturum accederem, eundem Syrupum propinavi, quo sæpius repetito, & dosi gradatim aucta, morbum lacescebam; at cùm aquarum evacuationem frustra tentarem, Catharsi non procedente, tumore autem ventris magis aucto, missum me fecit ægra; atque alterius Medici ope, qui remedia efficaciora adhibuit, si bene memini, sanitatem recepit.

Ubi igitur constiterit, ægrum eo esse corporis habitu ut Cathartica Leniora nec celeriter, nec cum bonâ euphoriâ opus suum peragant, Fortiora tentanda. Quo in casu, ut modò innui, notandum est, quòd licet Hydragogorum pauca, si sola exhibeantur, votis respondeant, lenioribus tamen calcaris vice permista, efficacissima omnino sunt. In hujusmodi corporibus, exempli gratiâ, sequentem Potionem cum successu sæpenumero præscripsi. ℞. *Tamarind.* ℥℔. *Fol. Sen.* ℥ij. *Rhei* ℥i℔. *Coq. in q. s. Aq. fontan. ad ℥iiij. in Colatur. dissolv. Mann. & Syr. Rosar. solut. an. ℥j. Syr. de Spin. Cervin. ℥℔. Elect. è succ. Rosar. ℥ij. m. f. Potio.* Quæ tamen potio non nisi Robustioribus exhibenda est, quibus alvum solvit, ubi cætera id præstare nequiverint; quod multiplici experientia ipsius probavi. Vel ℞. *Vini alb. ℥iiij. Zalap. subtiliss. pul. ℥j. Zingib. pul. ℔℔. syr. de spin. cervin. ℥j. m. f. potio, sumenda summo manè, repetendaque singulis, vel alternis diebus pro ratione virium.*

Sequitur alia medicamenti formula, mihi haud infrequens, quo illi satis commodè utentur, qui à repetito aliorum purgantium usu abhorrent; quando ægrum calefaciat inter purgandum, tum etiam corroboret, ex. g. ℞. *Rad. jalap. contrus. Hermodactyl. an. ℥℔. Scammon. crud. ℥iiij. fol. Senn. ℥ij. Glycirrhiz. ras. sem. Anis. Carvi an. ℥℔. Summit. Absinth. Fol. Salv. an. m. j. Infunde frigide in ℥iiij. Aq. vitæ vulgaris, & coletur tantummodo usque tempore. Cap. cochlear. j. hora somni & ij. mane sequenti:* Augendo vel minuendo dosin pro ratione operationis.

Restant verò Medicamenta duo, me judice, *Palmaria*, & in iis qui non nisi ægrè purgantur, cæteris quæ vel suprâ enumeravi, vel adhuc comperta habeo *ἑλατήριον*, *Elaterium* intelligo, & *Infusionem Croci Metallorum*. *Elaterium* sive *Facula Cucumeris agrestis* potenter in permōdica quantitate vires suas exerit in conturbanda alvo, & fæcibus cum serosis & aquosis humoribus copiosè egerendis, adeò ut ejus grana duo plerisque, in genere loquendo, corporibus, dosis aptissima sit. Ego permiscere soleo *Pil. ex Duobus* ℔j. quas in *Pilulas* tres exiguas formandas, ac manè sumendas impero.

Infusionem Croci quod spectat, ejus ℥i℥. (vel purgatu difficillimis ℥ij.) manè exhibita, & quotidie pro ægri viribus reiterata, quamlibet prima facie haud aliud promittat quàm colluviem in ventriculo stabulantem egerere, tandem tamen efficiet, ut abdomen ab aquarum super-incumbentium onere liberetur. Præterquam enim quòd cessante Vomitione, in Catharsin τὴν κάτω solet desinere, necesse est omnino, ut cùm tanta fuerit agitatio concussioque tam Ventriculi quàm viscerum, à tam insigni aquarum corrivatione quasi circumseptorum, earundem evacuatio, per ductus communi naturæ lege haud satis patentes, conatum ita vehementem insequatur. Veruntamen si prædictum Vomitorium inferiorem ventrem haud efficaciter expurgaverit, tam *Electuarium de Succo Rosarum*, quàm *Syrupum de Spinâ cervinâ* soleo post tertiam aut quartam dosim meræ infusionis Croci Metallorum quandoque, licèt rariùs, adjicere. Ex. gr. ℥. Aq. Card. Ben. ℥ij. Infus. Croc. Metallor. ℥i℥. Syr. de Spin. cervin. ℥℥. Elect. de Succ. Rosar. ℥ij. m. f. Potio.

Quòd verò dentur ejusmodi cæci meatus, per quos aquæ ex abdominis cavitate ad intestina transferantur, de facto liquet; cùm quotidie observemus Hydragoga tantam aquarum in abdomine inclusarum vim per secessum educere, perinde ac si primitus in ipsis intestinis continerentur. Cui tam duro nodo cum parem cuneum haud facilè inveniamus, in mentem mihi venit celebre illud dictum Medici omnium sæculorum judicio sapientissimi optimique, Hippocratis scilicet, qui in libro de Priscâ Medicina hæc habet. λέγουσι δὲ τινες καὶ ἰατροὶ, καὶ σοφισταί, ὅς ἐστι ἐνὶ δυνατόν ἰατρικὴν εἰδέναι, ὅς τις μὴ οἶδεν ὅ, τί ἐστὶν ἄνθρωπος, καὶ ὅπως ἐγένετο, καὶ ὅπως συνεπάγῃ. Ἐγὼ δὲ τῶν τέων μὲν ὅσα τίμι εἶρησαι σοφιστῇ, ἢ ἰατρῷ, ἢ γέγραπται περὶ φύσεως, ἥσων νομίζω τῇ ἰατρικῇ τεχνῇ προσεκεῖν, ἢ τῇ γραφικῇ. i.e. Medici quidam & Sophistæ dicunt, quod impossibile est eum medicinam cognoscere, qui non novit quid sit Homo, & quomodo primum factus & compactus sit. Ego verò ea quæ ab aliquo Sophistâ aut Medico de Naturâ dicta, aut scripta sunt, minùs censeo ad Artem Medicam spectare quàm ad Pictoriam.

Attamen (ne vel divinus hic Author erroris ullatenus infimuletur, vel ex hoc loco Empirici ignorantia suæ patrocinium quærant) apertè dicam, me quantum attentissimâ cogitatione, eâque Praxin (quæ Medicinam profitentium Lapis Lydius haberi debet) relatâ assequi valeam, utcunque existimare, quòd necesse omnino sit ut Medicus structuram humani corporis probè calleat, quò rectius veras ideas & naturæ, & causarum quorundam morborum animo concipere ac formare queat. Neque enim fieri potest, ut qui Renum fabricam ignorat, ductuumque exinde ad Vesicam tendentium, conjicere possit, unde oriuntur Symptomata illa, quæ à calculo vel in pelvim, vel in ureteres altius impaeto pendent. Nec minus Chirurgum oportet eandem humani corporis structuram perdiscere, quo melius inter operandum ab iis vasis, sive aliis partibus abstineat, quæ, si violentur, ægro exitium afferant. Sed nec ossa dislocata ad situm naturalem rectè poterit reducere, nisi eam ossium compagem, *Skeleton* dictam, curiosè inspexerit, atque animo comprehenderit.

Hujusmodi

Hujusmodi itaque humani corporis notitia omnino necessaria est; quam qui non habet, cum quibusdam morbis *Andabatarum*, quod ajunt, more pugnabit, aut sine Nauticâ pyxide tentabit mare. Porro hæc scientia & cito & faciliè acquiritur, cum id præ cæteris difficilioribus habeat compendii, quod *αὐτοψία* in cadaveribus vel humanis vel animalium quorumlibet perdiscatur, idque nullo ferè negotio, etiam ab iis qui mente ac judicio minus valent. Veruntamen in Acutis quibuscumque, quod genus plus quam duas tertiis morborum partes comprehendit, atque porro in Chronicis plerisque, omnino fatendum est *τὸ Θεῖον* inesse, sive specificam proprietatem aliquam, quam nulla unquam contemplatio à speculatione corporis humani deducta, queat indagare, atque in lucem protrahere. Quamobrem ne ita homines in cadaverum dissectione, præcipuam locarent operam, tanquam exinde potius quam ex *παρορμήων* naturalium, ut & *Juvantium* & *Lædentium* diligenti observatione, promoveri possit Ars Medica; id opinor, ut maximè caveri in loco prædicto voluit Divinus ille Senex, non autem generalem fabricæ humani corporis notitiam carpere ac fugillare.

Et profectò Virum tantum tamque sapientem nullo modo potuit latere, humanam omnem investigationem ultra generalem ejusmodi notitiam pertinere non posse. Licet enim diligenti in secandis cadaveribus inquisitione ac scrutinio, majora organa, quibus natura in peragendis operationibus suis utitur, in conspectum veniant, vasaque itidem nonnulla per quæ succi ab his ad illas corporis partes transmittuntur; quæ tamen hujus motûs sit origo & causa primaria, oculi docere nequeunt. Neque Microscopium quodvis vel exquisitissimè elaboratum exiles istos meatus per quos Chylus, ex. gr. ex intestinis in vasa Chylifera transcoletur, vel per quos ductus sanguis per Arterias derivatus in Venarum oscula reducendus transmittatur, potest detegere. Quinimò sunt & alii ferè innumeri, iique magis adhuc affabrè concinnati, meatus ac pori in hac mirandâ hominis compage, quos nemo hominum ne per somnium quidem vidit; cum rudis & indocta, (sit verbo venia) Cognitio nostra in rerum cortice omnis fermè versetur, ac ad *τὸ ὅτι* sive quod res hoc modo se habeat, ferè tantum assurgens, *τὸ διότι*, sive rerum causas nullatenus attingat. Ut sit se res habeat, haud difficili investigatione scire possumus, quantum nobis dirigendis (prout fert rei natura) sufficit in eorum Curatione morborum qui hujusmodi peritiam, quod suprà dixi, sibi vendicant: maximè verò quantum nos impellat ad Divinum Artificem summâ animi demissione adorandum, dum stupendum ejus artihcium contemplamur in iis, quorum ratio nobis innotescit, tum illud longè excellentissimum in cæteris ad quæ prorsus cæcutimus.

Et sicuti *Hippocrates* eos reprehendit, qui huic in humanis corporibus speculandis curiositati, & *παραρρηγία*, plus dant quam observationibus practicis, ac proinde quam ipsius naturæ judicio; ita pari jure prudens vir quispiam in hoc nostro seculo eos culpæ possit, qui existimant, Artem Medicam nullâ re aliâ magis promoveri posse quam novis *Chymicorum* inventis. Quanquam enim ingrati prorsus animi esset non libenter agnoscere id emolumenti, quod

Chymixæ acceptum debemus, eo quòd utilia nonnulla medicamenta, & indicationibus satis faciendis perquam accommoda (inter quæ vel hoc ipsum *Emeticum*, de quo jam agimus, haud infimum locum tenet) nobis suppeditaverit; atque eam ob causam, si intra Pharmacopœæ limites contineatur, Ars est satis quidem laudabilis: attamen nec illi culpâ, aut saltem errore vacant, qui cerebrum sibi eoque excalefaciunt ac torquent, ut tandem arbitrentur Artem Medicam in hoc præsertim deficere, quòd Remediis magnis atque efficacibus à solâ *Chymicorum* præparatione atque operâ nobis subministrandis, indigeat. Cum ei qui rem rectè perpenderit, satis liqueat, præcipuum Medicinæ faciendæ defectum non in eo verti, quòd nesciamus quo pacto huic aut illi Intentioni satisfacere debeamus, sed quòd non satis sciamus, quænam sit illa Intentio, cui satisfaciendum est. Cum vel rudissimus quispiam Pharmacopolæ servulus intra dimidium horæ quadrantem certum me faciat, quo medicamento Vomitionem, Purgationem, vel Sudores provocabo, vel refrigerabo æstuantem; at verò in palæstra medica probè exercitatus sit oportet, qui pari certitudine me docere queat, ubi hoc vel illud remediorum genus in usum revocare debeam per omnem morborum ac Curationum circuitum.

Et quidem certissimus sum nihil æquè ad iudicium hac in re ritè formandum conferre atque observationem exactissimam *φαινομένων* naturalium & morborum, & pariter eorum, quæ in Praxi cernuntur à *Juvantibus* & *Lædentibus* derivata, postea sive Remedia usurpata, sive etiam Medendi methodum istam, quibus morbos depellere satagimus. Hæc si diligenter inter se collata fuerint, mihi ostendent & morbi naturam, & insuper undenam Curativæ Indicationes desumendæ sint longè melius certiusque, quàm si ad speculationem naturæ hujus aut illius principii corporis concreti tanquam ad *Cynosuram* cursum dirigam. Etenim vel exquisitissimæ hujus generis Dissertationes nihil aliud sunt quàm Metaphora bellè deducta exornataque: quæ etiam ad eorum instar omnium, quæ in scena imaginationis, non verò in ipsa rerum natura fundamentum habent, dies delebit ac præteret; cum *Naturæ* judicia rerum veritati superstructa, non nisi cum ipsa natura interciderint.

Quamvis autem *Hypotheses* speculationibus Philosophicis innixæ futiles sint prorsus, cum nemo hominum scientia intuitiva præditus sit, qua fretus Principia queat substernere, quibus mox superstruat; attamen si *Hypotheses* ab ipsis rebus factis fluant, ex eis tantum observationibus natæ, quas Phænomena Practica & Naturalia suggerunt, stabiles manent & inconcussæ: ita ut licet Praxis Medica, si scribendi ordinem respicias, ex Hypothesibus orta videatur, nihilominus ipsæ Hypotheses, si modo solidæ fuerint ac genuinæ, Praxi quantenus originem debeant. Exempli gratia, in *Affectione Hysterica* non ideò Chalybeatis utor, cæterisque sanguinem invigorantibus; nec ideò ab evacuantibus me tempero, (nisi scilicet in statibus quibusdam circumstantiis) & Remedia potius Purgativa impero, quia primum pro concessio habui hunc morbum

morbum à debilitatis fractisque spiritibus Animalibus pendere : verum cum *Φαινομένων* Practicorum constans observatio me docuisset Cathartica exhibita morbi symptomata semper auxisse, his verò contraria eadem symptomata conspire solere, ex hac, aliisque *Φαινομένων* naturalium observationibus Hypothesin meam desumpsi, ita ut Philosophus Empirico hic famularetur. Quòd si ab Hypothesi cæpisssem, reâ planè ratione insanirem atque ille, qui tabulata tigna-que domus superiora prius velit erigere quàm fundamentum jecerit : quod quidem istis tantùm convenit, qui in Aere *Castella*, quod aiunt, solent extruere : his enim certo quodam privilegio ab alterutrâ extremitate licet ordiri.

Sed ut ad rem redeam. Quicumque demum sint meatus isti, per quos aqua ex abdominis cavitate in intestina deducitur, certissimus sum Vomitionem à dicto Emetico excitatam eandem potenter evacuare, idque non solum deorsum per sedem, sed & sursum per ipsum Ventriculum atque Os in vomendi actu. Etenim post duas vel tres evomendi vices, aquæ non tam medicamento vi secretoria elici videntur, quàm ruptis quasi repagulis & claustris referatis, pleno alveo effundi : quod satis constat ex earundem eruptione atque impetu sæpe facto inter ipsa vomendi spatia, sive intervalla.

Mense Augusto postremum elapso, Paupercula quædam annos habens 55. aut circiter, opem meam imploravit. Febre intermittente diu laboraverat, dein carcere fuerat inclusa fere per triennium, à frigore multum passa erat, venter denique ad tantam molem increverat, ut ei parem nunquam hæcenus viderim : Ego $\zeta\beta$. *Infusionis Croci Metallorum* singulis diebus ad triduum exhibui, mox alternis diebus pro virium ægræ ratione, usque dum doses omnino sex hauserat. Primis aliquot vomendi vicibus urina penitus supprimebatur, quam postea quandoque per intervalla reddebat, sed rarò admodum : quo frequentius Emeticum repetebat, eo majorem aquæ copiam solebat rejicere, idque sub finem tam per os quàm per sedem. Verum post tertiam dosin tumor subsidere atque imminui cœpit, & post quatuordecim dies filo, quo crassitiem corporis inflati jussu meo fuerat dimensa, judice ac teste, jam tribus pedibus gracilior comparuit, atque aliquot aquæ Congios, supputatione ex iis quæ mihi ipsa narravit factâ, *ἄνω καὶ κάτω* egresserat. Ita ut quæ prius in lecto non nisi erecta dormiebat, ne decumbens ab aquarum pondere suffocaretur, jam capite in pulvinar reclinato secura jaceret, & de latere in latus pro arbitrio se movere potuerit. Cum verò dicta Emetica operandi violentiâ *Vapores*, quos dicunt, ad eum gradum excitarent, ut iisdem diutius morbum laceßere tutum non foret, & tamen tam ex residua adhuc ventris mole quàm aquarum rotatione, quam toties percipiebat, quoties se in alterutrum latus convertibat, & vestigiis insuper rei cujuscumque prementis in tibiis etiam nunc manentibus, plus satis liqueret multum aquæ adhuc in corpore restare : ob causam jam dictam, reliquam Curationem Purgantibus propriè dictis cogebam absolvere. Posthac igitur vel Potionem Purgantem supra dictam, vel aliud quoddam Hydragogum præscripsi ; idque vel rarius vel sæpius prout vires ejus ferrent, aut *Vapores* minus infestarent. Etenim & Catharsis per inferiora

Affectus Hystericos aliquatenus invitabat, licet non ita graves & violentos ac solebant Emetica. Atque in hac methodo persistebam, donec prorsus convaluisse videretur. Quæ dum fierent, hæc mihi præcipuè observanda occurrebant: Primò quòd iis diebus, quibus à Purgatione feriabatur, nonnunquam magnam aquarum vim per sedem excernebat, atque etiam sub finem per meatus urinarios, vel ad Congii mensuram; quamlibet non ultra ℥ss. vel ℥ij. Potus pro singulis diebus concederem; ita ut portæ omnes, atque canales undecunque patere viderentur. Secundò notatu dignum erat, quod curatione ferè absoluta si quando Vapores à Cathartice commoti tumultuarentur, venter maximè versus superiora, intumescerebat, tanquam novo aquarum proventu denuò repletus foret, quod tamen fieri non posse sciebam, cum ita parcè bibisset; ac proinde tumorem illum à flatibus, quos peperit *ἀναξία* ista à Cathartice provocata, tantum oriri: quod meum iudicium eventus comprobavit. Licet enim vel Congium aquæ eo die quo purgabatur ejecisset, mox tamen coepit intumescere, nec remittebat tumor ille, ad guttur usque assurgens, & dyspnœa affligens, donec corpus à Purgantium molestia liberatum, statum naturalem ac quietem reciperet; quo facto & tumor & cætera symptomata derепente evanescebant, donec à succedente Catharsi de novo irritarentur. Denique & hoc animadvertendum erat, quod cùm præfata Fœmina annum agens quinquagesimum quintum, fluxum Menstruum jam ab annis aliquot non fuerat passa, attamen Menses magno quasi flumine erumpebant denuò; qui sanguinis fluxus debilitati & evacuationibus prægressis additus, ingens Affectuum Hystericorum agmen adducebat, dolorem scil. in dorso & circa regionem Splenis vehementem, Cephalalgiam, & Tussim ferinam. Adhæc tametsi post tam insignem Aquæ quantitatem per os, sedem, & urinas eliminatam, omnino credibile esset non multam in corpore restare, attamen venter haud minus protuberabat, quàm nulla adhuc evacuatione tentata solebat. Quamobrem ad hos motus sedandos, qui etiam ad septimanam à postrema purgatione negotium facebant, coactus sum ad quatuor noctes continuas *Diacodii* ℥ij. propinare; quæ etiam Dosis erat repetenda, nisi somnus intra horas tres insequeretur. Quo tandem pacata sunt omnia, & tumor disparuit.

Hoc interim observari velim, quòd si leviculo aliquo ventris tumore tentetur æger, non ita promptè educuntur aquæ per Infusionem Croci Metallorum, ac in Ascite grandiore, ubi ingens aquarum copia aggesta fuerit: etenim vel ipsa aquarum moles dum Emetici operatione agitur, ac concutitur, ad eandem evacuationem mirè confert, atque eam ob causam nisi venter in tumorem insignem attollatur, omnino convenit, ut tota res evacuationibus per inferiora committatur.

Est & aliud Medicamentum satis vulgare ac simplex, quod Hydropem pari ratione qua illud de quo modò egimus, expugnat. Nempe manipuli iij. *Corticis interioris Sambuci* à ligno derasi in ℥ij. aquæ & lactis simul mistorum, ad ℥ij. incoquantur: Decocti hujus altera medietas mane, altera serò quotidie assumatur, donec æger convalescat. Hoc remedium & vomitionem ciet &

& catharsin, pariter ac Crocus Metallorum; ac proinde eodem modo morbum depellit, non vi aliquâ specificâ: quocirca si neutram harum operationum præstet, vel si mediocriter ac parcè, ne hilum prodest quidem: ubi verè alterutram producit efficaciter, maximè verò si utramque, mire ad hunc morbum debellandum confert.

At sanè, quod seriò animadvertendum est, haud rarò accidit, ut aqua non solum in crura ac tibiae deturbetur, sed etiam in ipsam abdominis civitatem depluat, quæ tamen Medicamentis Catharticis sive *αῖμα* sive *νῆρα* ducentibus, omnino elicienda non est. Verbi gratia, quoties huiusmodi tumor vel Phthisis diuturnam excipit, vel à viscerum alicujus labe hac putredine nascitur; vel à sanguinis tono, si ita loqui fas est, non tantum relaxato sed & deperdito, ac spiritibus penitus exhaustis, vel à longa Fistularum in partibus carnosissimis morâ quæ copiosam saniem egresserunt; vel à nimia debilitate atque evacuatione tam humorum quàm spirituum quos advocavit sive salivatio, sive sudatio, sive etiam Purgatio justo intensior, & Diæta tenuis quæ in Luis Venereæ Curatione, etiam magis quàm res postulabat, fuerant adhibitæ. In his atque aliis morbis ad hunc modum factis, æger non tantum non juvabitur à Catharsi, sed imminuto adhuc amplius sanguinis tono, augebitur malum. Quamobrem rebus ita stantibus, omnis Curationis Cardo in sanguine ac visceribus omni ope corroborandis firmandisque omnino vertetur. Inter cætera hujus ordinis, præter Remedia Confortativa infra enumeranda, ego certissimo Experimento edoctus sum, aëris mutationem, & in aëre libero Exercitium, quale quale demum æger ferre potuerit, huic Indicationi apprimè respondiisse; spiritibus scil. quasi nova vita hoc pacto afflatis, atque Organis Excretoriis ad pensum sibi debitum denuò revocatis.

Est etiam ubi absque omni istiusmodi *προφάσει*, Intentioni isti quæ aquas evacuandas respicit, nec Catharticis, nec Emeticis satisfaciendum est: quoties enim vel æger constitutione est infirmiore, vel Foemina Vaporibus atque ataxiis spirituum animalium admodum obnoxia; fieri non potest, ut Catharticis, & multo minus ut Emeticis res geratur. Hic itaque aquarum evacuatio *Diureticis* committenda est. E quorum familiâ, licet quamplurima in Medicorum scriptis magni sint nominis, efficacissima tamen (ne dicam sola) mihi videntur ea quæ à *Salibus Lixivialibus* fiunt: neque quicquam refert, è quorum vegetabilium genere cineres petantur. Quandoquidem verò vix aliud vegetabile *Genista* sit parabilius, & in hoc morbo bene audiat, ego ut plurimum cinerum ejus ℥j. in Vini Rhenani ℔iiij. frigide infundi jubeo, addendo foliorum *Absinthii vulgaris* pugillum unum alterumve. Liquoris per filtrationem colati ℥iiij. manè, horâ quinta promeridiana, & sero, ægro jugiter hauriendas impero, usque dum tumor evanuerit. Quo solo Remedio Hydropes pro deploratis habitos curatos vidi, in iis quorum Crasis debilior Purgantibus ferendis non fuit.

Aquis autem, (ut ad secundam Intentionem properemus) quæ sunt proxima causa morbi, jam penitus evacuatis, non nisi ad dimidiam Curationis partem

ut plurimum perventum est, nisi sanguinis etiam debilitati, quæ prima morbi origo fuit, occurratur longo & assiduo Medicamentorum *Calefacientium* & *Corroborantium* usu, unde novus aquarum proventus præcaveri possit. Quamvis enim in junioribus sæpe contingat, ut aquis ritè expurgatis sine alio quovis præsidio convalescant, cum eorum calor naturalis jam ab aquarum onere ac pressura liberatus, dictorum Remediorum vices supplere valeat; tamen in ætate provectioribus, aut iis, qui alias minus sano corporis habitu sunt præditi, omnino necesse est, ut statim ab aquarum educatione jam absoluta, ad eorum simplicium usum quæ sanguinem excalefaciunt invigorantque, protinus confugiant. Inter quæ ea, quæ ego jam superius in *Podagrâ* curanda laudavi, sive ipsa Remedia spectent, sive *sex Res non naturales*, præter illa quæ jam dicentur, locum habere possint: (nisi quod *Vinum* à quo in Podagra prorsus est abstinendum, non tantum non noceat Hydropicis, sed & profit admodum, si pro potu ordinario usurpetur) cum hi duo morbi id habeant commune, quod eadem Remedia Corroborantia utriusque causæ originali adversentur. Fatendum est interim, quod cum tam ex manifestis Phænomenis, quam à juvantibus & lædentibus edocti simus, tum hos, tum alios plures *morbos Chronicos* sanguinis debilitati atque *indigestioni* ortum debere, nec ulterius progredi valeamus, adhuc in extimo morborum cortice hæremus; nec in essentielles eorundem differentias, & específicas Humorum depravationes ab istiusmodi Indigestionibus prognatas, (quæ quidem ἀπνοσία communis omnium stirps est) quimus penetrare. Uti neque varias illas specificationes, quæ in morbis Acutis ab una eademque causa, sanguinis nempe *inflammatione*, fluunt, ullatenus callemus. Quocirca tam in his, quam in Chronicis morbis, cum *Specificis* careamus, Curationem non ad Essentialem morborum naturam, sed ad causam eorundem magis generalem dirigere cogimur; Curandi methodum subinde variantes, vel pro indicio naturæ spontaneo, quo in morborum eliminatione illa utitur; vel experientiæ, cui potissimum Medicationis generi quilibet morbus facillimè concedat dictantis, filum secuti.

Porro ad hanc, de qua jam agimus, Intentionem implendam, nempe ut sanguis corroboretur, sive aquarum evacuatio per hoc Diureticum, sive per Catharsin, vel etiam Vomitionem procuretur ut supra, omnino necesse est, ut æger, quantum res ferat, *Vinum* potare teneatur, dum in curando est, (modò nè prius incipiat ἀνενόσιον quam meatus quadantenus reclusi fuerint, & porta aquis data) vel saltem loco vini Cerevisiam aliquam è generosioribus; cum liquores tenues ac refrigerantes quilibet, utut ægri palato arrideant, qui ferè semper in hoc morbo siticulosus est, eum magis Phlegmaticum reddant, & aquis obstetricentur: rarò itaque, aut nunquam hi sunt concedendi. Atque è diverso liquores generosi, modò non sint spiritus per distillationem elicit, usque adeò sanitatem promovent, ut vel soli aliquando amissam revocaverint; utique in morbi initio, nondum multâ aquâ distento abdomine; præsertim si Herbis calefacientibus & confortantibus fuerint impræ-

imprægnati. In Pauperibus, verbi gratiâ, quorum res angusta domi, meliora remedia non permittebat, *Cerevisia fortis*, in quâ quantitas sufficiens *Radic. Raphan. Rustic. fol. Absinth. vulgaris, Cochlear. hortens. Salviæ, Centaurii min. Summitatum Genistæ* inclusa fuerit, meo consilio usurpata pro potu ordinario, sola fuit instar omnium: Pro ditioribus Vinum Canarinum eisdem herbis amaris potest similiter imprægnari, cujus haustulus bis terve de die inter Medicamenta suprâ memorata deglutiendus est. Vel si id palato minus allubescat, *Vinum Absinthites* vice ejus substituatur, de quo æger sumere possit cochlearia ix. post *Electuarii Digestivi* (in *Tract. de Podagrâ* descript.) ʒij. horis medicinalibus i. e. manè, quâta pomeridiana, & nocte, devorandas. Electuarium hoc huic intentioni faciendo satis, Corroborantia quælibet Medicamenta longo post se intervallo linquit alia. Hic verò magni momenti est, quòd æger parcè admodum bibat liquores istos, qui minùs generosi sunt; quandoquidem omnes, qualescunque demum sint, aquis nonnihil incrementi dant; adeò ut vel omnimoda abstinentia à potu nonnullos sanaverit: atque ob eam causam si liquoribus istis quandoque indulgendum sit, æger tamen admodum parcè eos bibat. Veruntamen cùm sitis magna huic affectui se comitem adjungere soleat, quam insuper à potu tenuiori abstinentia adaugeat, è re erit, ut æger sæpiusculè aquâ frigidâ *Spiritu Vitrioli* acidulatâ os colluat, aut *Tamarindos* in ore subinde teneat, aut *Limonem* manducet; neutrum verò deglutiens, præ eorum frigiditate quæ morbo minùs convenit.

Verum inter *Corroborantia*, *Chalybs* in Hydropis incipientis curatione haud infimum locum sibi vendicat, sanguinem videlicet invigorando, calefaciendoque. Quam ob causam & *Allium* hic adeò conducit, cùm eo solo, missis evacuantibus, Hydropem ex aliorum præscripto, non meo, depulsum noverim.

Est enim observandum, eum Hydropem qui vel pedes tantùm inflavit, vel etiam ventrem, sed modicè, non statim Curationem per Emetica & Cathartica sibi deposcere; sed hujusmodi liquoribus præfatis calefacientibus & corroborantibus haud rarò cedere. At verò præ cæteris seriò animadvertendum est, quòd quoties hunc morbum solis corroborantibus, vel etiam Lixivialibus aggredimur, æger nullo modo expurgandus est, sive mitiori, sive fortiori quocunque Pharmaco, tantisper dum sanguinis corroborationi navatur opera: evertet enim Catharticum quidquid Corroborans substruxerit; quod vel invitus agnoscat oportet qui observaverit tumorem, qui ab usu Corroborantium jam imminui coeperat, mox à Purgatione augeri. Etenim tametsi cùm intentioni isti aquas educendi satisfacere cupiamus, haud abs re fuerit, etiam Corroborantia subinde exhibere; tamen cùm tota res in isto solùm cardine vertitur, ut sanguis corroboretur, omnino necesse est, ut à Catharticis abstineamus.

Notandum est autem ægrum non semper sanari, quamvis utrique indicationi satisfecerimus, i. e. tum Aquæ in abdomine congestæ omnino educæ fuerint, tum etiam Calefacientia & Corroborantia postea ad præcavendum no-

vum aquarum proventum fuerint exhibita. Etenim non rarò contingit, ut *Ascites* ad multos annos perdurans, diuturna aquarum in viscera incubatione eorum substantiam perverterit, & quasi semi-coxerit; & tam ipsa viscera quàm partes vicinas corruerit penitus, glandulas præternaturales & Vesiculas sanie turgidas generans, & omnia intra abdominis cavitatem contenta in putrilaginem quasi quandam convertens: prout in eorum cadaveribus, qui ab *Ascite* inveterato sunt interempti, Sectio patefecit. Morbus ad hunc gradum jam proventus, Artis subsidia, quantum video, contemnit. Nihilominus Medici est, cum certò scire nequeat, quantum adhuc noxæ visceribus illatum fuerit, curationem omni ope moliri Remediis tam Evacuantibus quàm Corroborantibus: & neque animo ipsius cadere, neque ægro ut cadat autor esse debet. Cui rei ob hanc potissimum causam danda est opera, quoniam in permultis Affectibus, morbi fomite jam penitus exantlato, Natura, quæ noctes atque dies nostris rebus invigilat consulitque, sponte sua mirum in modum machinatur, quo ægrum à pernicioso morbi reliquiis muniat ac tueatur. Quamobrem omnis *Ascites* quantumlibet inveteratus, & quantumlibet funestam cladem visceribus intulerit, haud alio modo tractari potest, quàm si nunc primum coeperit.

Topica sive *Remedia Externa*, quantum ego observare potui, nihil egregium in hoc morbo præstiterunt unquam. Ea minus saltem nocuere, quæ in forma sive Cataplasmati, sive Linimenti abdomini ad tumorem discutiendum fuerint applicata: Neque tamen video, quo pacto aquæ possint discuti. Verùm & alia sunt à nonnullis Remediorum loco præscripta, quæ ita non profunt, ut etiam obsint plurimum: Hujusmodi sunt *Unguenta à Catharticis* fortioribus confecta, atque abdomini adhibita; *Vesicatoria* item cruribus & tibiis superimposita, ubi cutis in magnam molem fuerit protensa, ad aquas scil. hoc pacto educendas. Utrumque hoc genus Medicationis est periculosum; cum à primo vis simplicium Cathartica ita penitus nonnunquam musculis ac membranis impingatur, ut excitetur Hypercatharsis, nulla Remediorum ope unquam sistenda. *Vesicatoria* autem locis prædictis ab Empiricis applicari solita, calorem naturalem jam fermè aquis obrutum, deficientibus item spiritibus Animalibus, omnino extinguunt, & *Gangrænam* plus satis in hoc casu familiarem, sæpenumero invitant. Etenim vulnus vel levissimum in Hydropicorum carnibus, maximè in membro pendente, sanatu difficillimum est: quoniam ipsa carniū substantia his in partibus usque adeo irrigua est & scatens latice, ut data quacunque porta, continuo cursu prorumpat humor, à quo vulneris conglutinatio impeditur. Neque aut feliciori cum eventu, aut minore discrimine administrantur, me judice, sive *Paracentesis*, sive *Acupuncturæ* à nonnullis celebratæ, quàm *Vesicatoria*.

Ut tandem finiam; quamvis hic morbus ubi jam in verum *Ascitem* evaserit, pro deplorato semper habitus fuerit; attamen constabit, quòd si dicto modo tractetur, æquè certò potest subjugari (modò viscera à corruptione sint libera) ac alii permulti qui non ita funesti vulgò æstimantur.

At si quis fortè arguerit hæc Remedia, utpote simplicissima & planè inartificialia,

cialia, ego potiori jure ejus nequitiam arguam & improbos mores; si dum fingatur alios hujusmodi simplicibus Medicamentis juvari, se, uxorem, vel liberos suos, si quando ægrotaverint, vel vilissimis ad sanitatem reduci exoptet. Adde, quod fucum sibi facit Morio, *Equitans in arundine longâ*: etenim Artis Medicæ pompa & dignitas non tam in Formularum concinnitate & elegantia, quam in Morborum Curatione cernitur.

Atque hæc sunt, quæ de his duobus morbis dicenda habui: & nisi fallor alios haud attingam unquam. Verùm ista quod spectat, quæ hætenus in publicum dedi, si quis ea semel tantum perlegere dignetur, est quod doleam me huic eam perdendi temporis ansam præbuisse: Quod si eadem sæpius relegere voluerit, & altâ mente reponere, nullus dubito, quin eum fructum ex iis capiat, qui voto & magnis laboribus quos ego in istis observationibus faciendis componendisque locavi, aliquatenus respondeat. Quæ quidem quàm bonâ fide fuerint traditæ, haud aliter sciet, quàm si in earum Praxi fuerit versatus, ac perinde in observando diligens ac curiosus Explorator atque Ego prius fueram. At si in paucis iis quæ scripsi, Naturam, me quasi manu ducentem, omninò secutus fuerim, nullius unquam Hominis, quantuscunque is demum sit, opinionibus me addicens, pro certo habeo sapientes, quotquot sunt, veniam mihi saltem daturos; quos & latere non potest, duo esse hominum genera, qui profectum omnem in Arte Medicâ ex æquo prohibent, sufflaminantque: Primum ii sunt, qui nullum prorsus symbolum ad eam, quam profitentur, Artem excolendam ipsi conferentes, illis succenset, qui vel minimum conferre videantur; defectus interim suos atque socordiam, Reverentiæ, quam antiquioribus, à quibus ne latum unguem discedere audent, deberi contendunt, specie prætexentes. Quorsum verò reliquas artes omnes, quæ homines minùs tangunt juvantque, magna incrementa sumpsisse fateamur, etiam sine ullâ priscorum hominum injuria, solam autem Medicam undique perfectam existimemus? An non certioris istius quæ nunc obtinet, navigandi Artis Repertores, eum *Pyxidis Nauticæ* usum, qui ita feliciter cessit, tentare potuerint, nisi primos ac rudiores illos, qui non nisi ad stellarum conspectum, & littorum anfractus cursum suum dirigebant, prius contempserint? Aut accuratior illa ac magis perfecta, sive consruendarum navium, sive earundem in pugnâ regendarum, Ars, quâ hodie præ cæteris pollent Europæ magis Occidentales incolæ, istos sugillat Naupegos, qui classes eas fabricabant, quæ olim *Actii* depræliabantur? Aut *Augustum* & *Marcum Antonium*, tanti belli duces & classium Rectores, ignominiâ afficit? Adhæc innumera ferè sunt exempla rerum à nuperis hominibus inventarum, quæ Antiquioris seculi inventis longè antecellunt: quarum omnium Repertores haud potiori jure priscarum memoriæ vim inferre censendi sunt, quàm is filius patris famam lædere putandus est, qui rem familiarem à Parente acceptam, industria ac solertia suâ auctiorem ac cumulationem reddiderit. Est & aliud hominum genus, qui præ animi levitate, ingenii ac sapientiæ haud vulgaris titulum affectantes, *Speculationes* ad morborum Curationem ne

hilum facientes, moleste ingerunt; Medicis non tam viam præmonstrantes, quàm ignibus suis fatuis devios in errorem agentes. His Natura eum ingenii modum largita est, quo de illa doctè nugari queant; at prudentiam non dedit, qua intelligant se eam haud aliter scire posse, nisi experientia Indice, atque ejus peplum revelanti: quando abjectior humanæ naturæ conditio ad scientiam *Intuitivam* nullatenus assurgens, intra angustos cognitionis, quam à quinque sensibus haurire potest, limites coarctetur. Unde nihilominus vir *Prudens*, quantum fert fors humana, quis potest evadere, *Philosophus* verò, saltem pro angustiori hujus Nominis Majestate, nemo Mortalium evadet unquam. Medici autem *Philosophia* omnis in expiscandis Morborum Historiis, iisque Remediis adhibendis, quæ *experientiâ* Indice ac Magistrâ, eisdem valent depellere, tota stat; observatâ tamen, ut alibi dixi, Medendi Methodô, quam recta ratio (non speculationum commentis, sed trito & naturali cogitandi modo innixa) ei dictaverit.


Postscriptum.

LEctor mihi veniam concedat, si unum haud parvi tam in dignoscendis quàm curandis Febribus momenti hic adjiciam, quod nisi memoriæ mihi exciderat, loco magis suo dicendum fuerat. Observavi, quòd singulis annis ab hyeme ingruenti usque ad ver adultum, *Febris* quædam invadit, quæ tam quoad Symptomata quàm curationem à *Stationariâ*, sive Febre Epidemicâ Constitutionis generalis, quæ tum obtinet, planè discrepat, proindeque in febrium, quas *Intercurrentes* appello, classem recensenda est. Frigiditati aëris unâ cum crassitie ac humiditate ejusdem illa originem suam debere videtur. Hinc enim pori cutis occluduntur, & sanguis ob impeditam transpirationem colluvie ferrosâ oneratur, quæ tandem inimica facta, ac diuturniore morâ putrescens, facile à suscepto frigore, vel à levi aliquâ occasione febrem accendit. Si materia morbum committens copiosa admodum fuerit, ea febris emergit, quam sub titulo *Peripneumoniæ nothæ* Libro de morbis *Acutis* Sectione sextâ, Capite quarto descripsi. Sin autem humor iste minus scateat, ea solummodo symptomata producit, quæ jam sum descripturus. Æger per diem unum vel alterum post primum febris insultum nunc incalescit, nunc friget: de dolore capitis atque artuum cum inquietudine quadam totius corporis conqueritur: Lingua alba apparet: pulsus sanorum pulsui non admodum absimilis: urina turbida est & intense rubet: sanguis ei detractus Pleuriticorum sanguinem æmularur: Tussis fermè adest; sed respirationis difficultas, thoracis coarctatio, & dolor capitis inter tussendum quasi idem diffiliret, dictæ tussi, (sicut in *Peripneumoniâ nothâ* solent) se non adjungunt, proindeque cum notis insignioribus peripneumoniacis hæc febris haud stipuletur, licet à dicto morbo non nisi gradu diffideat, *Febrem Hyemalem* indigitare lubet.

Hic morbus, etsi primo ejus insultu symptomata solummodo à frigore suscepto orta, præ se ferat, si tamen malè tractetur, longam ineluctabilem malorum catenam post se trahit, quæ tandem mortem ipsam accersunt. Etenim cum Æger lectulo incarceratus fuerit, & Cardiacis nescio quibus ad sudorem eliciendum, ac proinde ad febrim solvendam (quod tamen rarò perficitur) mulctatus, delirium, Lethargus, pulsus languidus & inordinatus, lingua arida, maculæ rubentes, & quandoque ad livorem aliquantulum accedentes sæpè sæpiùs hanc febrim comitantur. Hæc atque hujusmodi symptomata, etsi nonnullis pro *malignitate*, ut loqui amant, imponant, revera tamen rei malè gestæ sunt adscribenda. Cum enim hæc febris suapte naturâ plus satis inflammatione polleat; sanguis adhuc ulterius Cardiacorum, & jugi lectuli usu incenditur: unde spiritus in confusionem, ac motus inordinatos inconditosque adiunguntur, atque materiâ morbificâ in cerebrum impulsâ in pessum ruunt omnia.

In hac febre pellenda hunc mihi scopum propono: ut exundantem scilicet illam pituitæ colluviem ob hyemis analogiam congestam venæsectione revelam, & repetitâ Catharsi subducam. Hæc ut fiant, ubi primùm accersor, sanguinem è brachio dextro ad ℥ix. vel x. mitti jubeo. Die sequente blandam illam potionem purgativam, mihi in praxi familiarem exhibeo. Ut ℞. *thamarind. ℥ß. fol. sennæ ℥ij. rhabarb. ℥iß. Coq. s. q. aq. ad ℥iij. Colaturâ dissolve manna & syr. rosar. fol. an. ℥j. ms. f. potio, sumenda summo mane.* Hanc potionem per duas alias vices repeto, die uno inter singulas purgationes interposito, modò symptomata omnia citiùs non disparuerint: Et noctibus insequentibus Paregoricum ex syr. de meconio ℥j. propino. Diebus à Purgatione vacuis, modò Tussis adsit, *Decoctum Pectorale*, & *Eclegma ex oleo amygdalarum dulcium*, syr. *Capill. Veneris & violarum* subinde assumenda præcipio. Atque ad nimium sanguinis fervorem reprimendum, si febris magnoperè æstuet, *Emulsionem ex seminibus frigidis* præscribo; ut *Julapium seq. ℞. Aq. Nymph. Portulac. & lactuc. an. ℥iiij. syr. de limonibus ℥iß. syr. viol. ℥j. M. f. Julap. de quo bibat ad libitum.* Interim ut æger à lecto interdiu sibi temperet, injungo, ut & à carnis esu: post primam verò, vel secundam purgationem haustulum jusculi tenuis ex pullo gallinaceo facti subinde assumendum concedo. Verùm hoc notandum, si symptomata-quævis gravia, ut respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, malum hoc ad peripneumoniam notham propiùs accedere indiget, hoc in casu tam venæsectio, quàm Catharsis eo usque debitis intervallis sunt iterandæ, donec symptomata omnia penitus evanuerint, & æger eo modo quem Capite dicto descripsimus, sedulò tractandus. At non nisi perquam rarò febris, de qua jam agimus, ad eam sævitiem assurgit, ut post unicam Phlebotomiam, & tres Purgationes, pluribus evacuationibus indigeat.

Sed de hoc satis, quod tamen mihi neutiquam reticendum videbatur, quominus errante diagnosi febris hæc *hyemalis* pro *Stationariâ*, sive febre *Epidemica generalis* cujusvis Constitutionis habeatur, cum ingentem hominum vim ob hanc rem vel neglectam, vel ignoratam periisse certò sciam.



SCHEDULA MONITORIA

D E

NOVÆ FEBRIS INGRESSU,

P E R

THOMAM SYDENHAM, M. D.

Accedunt ejusdem

De Febre putrida Variolis confluentibus superveniente,

Et

De mictu sanguineo à Calculo renibus impacto,

DISSERTATIONES.

V I R O

Tam Virtute, quàm Eruditione undique consummato,

CAROLO GOODALL, M. D.

Coll. Med. Lond. Socio.



Um ea, quæ de Febre præsentis hujusce Constitutionis nuper observâram, in publicum edere statuerem, Tibi, præ cæteris, Vir Ornatissime, opellam hanc meam dicendam esse censui; idque ob duas potissimum rationes mihi faciendum videbatur. Primum quodd cum amicissimus mihi sis, comes indivulsus lateri semper hæsi, meque tuo juvasti patrocínio contra omnes quotquot se mihi uspiam objecerant. Quod non tam mei ipsius gratiâ præstabas, quàm ex incocto generoso Pectori honesto, hoc est, ex magno proboque Animo, qui tibi Author fuit, ut Veritati à te cognitæ compertæque assentiri haud dubitares, etiam cum omnes fere omniū, qui rem Medicam tractabant linguæ in me unum exacuerentur. Quibus tamen non est quod irascar, (nec irascor sanè) quandoquidem cum tot nequàm Medicastris cerebrosa sua somnia & figmenta venditantes, quo famam sui latiùs spargerent, toties mundo imposuerint; fas omnino erat, ut Viri ingenio & judicio præditi, non statim & sine examine ea admitterent, quæ ego jam recepto Praxeos mori plurimum adversantia in medium protuleram. Quo non obstante

cum

cum nihilo tibi minus debeam, mearum partium esse duxi, gratum animi mei in te affectum omnibus testatum facere: quando vix alia virtus naturam humanam ad profectus ultimas metas evectam, hæc deceat magis. Nam sicuti Reges eos quibus favent, titulis & honorum insignibus illustrare, atque aliis spectabiliores reddere satagunt; ita natura quoties hunc vel illum humili turba de grege hominum eximere voluerit, Gratitude, ceu excelsioris Genii notam ac characterem solet imprimere. Altera Ratio cur hæc tibi potissimum inscribam hæc est: quod sc. pro familiari illa & quasi quotidiana consuetudine, quam jam per multos annos invicem habuimus, Tibi imprimis, plusquam cuiquam mortalium, notum esse oporteat, quanto cum labore Notitias illas, quantulascunque, tam Historiæ quam Curationis Morborum, de quibus palam differui, indeptus fuerim. Quæ omnia non simul & semel evulgavi, sed interposito annorum aliquot intervallo, prout in aliqualem eorundem cognitionem pervenire tandem potuerim. Istas verò Observationes meas ita mancas & imperfectas esse judico, ut me magis earum pudeat, quam ut ullam exinde laudem mihi quæram. Utut se res habeat, illud saltem in mei excusationem potest adferri, quod licet 30. annorum, & quod excurrit, spatium, quibus ego non indiligenter in morborum observatione versabar, sufficere posse videatur ad maiorem, quam in eorum cognitione ego feci, profectum faciendum; attamen haud temerè affirmo, quod licet hoc temporis spatium plus quam sufficiat ad Cerebrum Theorematis & Commentis fictitiis, ex Authorum libris collectis, (quæ omnia non magis ad morborum Curationem faciunt, quam Pingendi Ars ad Artem Navigandi) planè obruendum, attamen ne quadruplicatus quidem horum annorum numerus, etiam in homine occupationibus medicis distractissimo satis erit ad eundem in omni Medicæ Artis, quaquā patet, circuitu rite perficiendum. Ego saltem pro meo modulo omnem quam potui operam istuc contuli, ut Observationes quàm accuratissimas colligerem, quas sine morâ prælo mandandas curavi, ut si quid utile haberent, id statim Publico cederet. Quâ in re cum meo munere, pro virili, defunctus jam mihi videar, acquiescit animus meus, nihil porro sollicitus, quo in loco ab aliis habeantur mea scripta. Hoc tantum addo, quod sicuti si quis ea neglexerit, mihi ne hilum nocuerit; ita qui semel tantum perlegerit, haud multum exinde proficiet. Sed ut hæc missa faciam, obsecro te, Humanissime Vir, ut Tractatulum hunc æqui bonique consulas, quo testatum esse volui, quanto te honore prosequor; quod pariter faciunt etiam ii omnes, quibus longè minus quam mihi perspecta est virtus tua. Neque jure merito existimare quis potest, me qui tui nullatenus indigeo, tibi assentari, cum palam profitear, Quod sicuti in ea quam exerces Arte, nemini secundus sis, (ut modestè loquar) ita morum integritate, honestateque undique absolutissimâ, omnes ferè quorum ego consuetudine unquam usus fuerim, superes. Diu vivas post mea fata, & in Iatricâ palmam feras; non tam ad nummos posterorum usui corradendos, (quæ quidem ratio, si cum sequente conferratur, animam ferè Brutorum redolet) quam ut seculo tandem aliquando detegas, quibus modis istæ in morbis persanandis difficultates, sub quibus Ars Medica hæctenus gemit & succumbit, vinci queant. Quod dum moliris, istis quæ ego primis feci fundamentis, si modò libet, possis superstruere. Ita tamen, ut errata

in quæ ego fortè inciderim, pro more humano, in meis Observationibus, sive Historiam, sive curationem hujus illiusve morbi attinentibus, ubi ab annorsâ & repetitâ Experimentâ melius fueris edoctus, liberè ac palam arguas. Neque hoc pacto defuncti ejus memoriam lædes, in vitâ cum esset, nihil prius habuit quàm ut Ars Medica à quâcunque demum promoveretur, non tam eruditis de Morborum naturâ commentationibus, (quibus ad nauseam & fastidium usque jamdiu explemur) quàm certâ fidâque eorundem curandorum Methodo. Vale, Vir Optime, & amare perge

*Tibi semper Addictissimum,
THO. SYDENHAM.*



Excellenti & in re Medicâ Admirabili Viro

D. THOMÆ SYDENHAM, M. D.

O Qui capacem nobilis artifex
Eludis Orcum; quò tamen ibimus
Cuncti, quot humanæ Parentes
Et decimæ tulit ordo Lunæ;
ræsens fugacem sistere Spiritum,
Præsens maligno tollere de toro
Mortale Corpus, & propinquum
Exequiis remove Morbum:
Quem Nos honorem, quas statuas Tibi
Ponemus, O qui non alium parem
In arte Phæbus, se remoto,
Aut oriens videt aut recumbens?
Quo Febris audax cunque movet pedem,
Te Mater omnis, Te lachrymabilis
Accurrit Uxor, ne caducum
Orba virum puerosque ploret:
Seu Confluentes fortè timet notas
Decora Virgo; Tu faciem eripis
Periclitantem protegisque
Perniciem juvenum futuram.
Atqui odit artes & Tua pocula
Hæres profusus, quem simul extulit
Ad spem implicatus vel Febrili
Igne Pater, vel Hydropis Unda.
Mirè paratam, Te Medico, Senex
Protelat Urnam, non sine gloriâ

*Phæbi Tuâque, qui fugasti
 Pollicitum sibi magna morbum,
 Sic Te scientem non faciunt Libri
 Et Dogma pulchrum; sed Sapiëntia
 Enata rebus, mensque facti
 Experiens, animusque felix.
 Non mille Plantæ & multa domi Vitra,
 Ignesque centum aut Hypothesis placens
 Profunt Medenti vel coercent
 Sæva Luis mala, sæva Febris;
 Ni pectus adsit consilii potens;
 Ni plena rugis Experientia
 Ususque naturam secutus,
 Quid faceret moneant in aurem.
 Hæc Praxis olim grande decus Sacræ
 Adduxit Arti; Sic Veterum stetit
 Secura fama; sic præivit
 Hippocrates, meruitque Cælum.
 At non eandem sorte pari viam
 Pressit Galenus; Non Arabes Virum
 Æquè sequuti; non Falernâ
 Usque madens Paracelsus uvâ.
 Primus relicta Tu genium asseris
 Fidemque normæ: En Diva Tibi Salus
 Applaudit & ridens Juventus,
 Vitaque non metuens Sepulchri,
 Ex quo vagantem scripta manu Tuâ
 Correxist Orbem Pagina nobilis:
 Longum Illa Morbosis, Tibique
 Perpetuum patefecit ævum.
 Jam si quæ restant, Eja frequentibus
 Concede votis; Nos Juvenilium
 Vulgus Medentium, Nos avarâ
 Quælibet excipiemus aure.
 Fortè & futuro tempore quispiam
 Poëta, Musis charior, ætheri
 Te sidus addet, Te salubre
 Sidus, & in Crisibus benignum.
 Me destinantem talia Chymicæ
 Curæ reposcunt: Me Medicus labor
 Et Spes locatæ non vacare
 Pieriis patiuntur undis.*

ED. HANNES.
 Ex Æde Christi, OX.
 SCHE-



SCHEDULA MONITORIA

D E

NOVÆ FEBRIS INGRESSU.

TAmetsi ingravescent jam ætas, & à diuturnis morbis pænè confecta, missionem à cogitandi penso, Meditationeque intensiori vel eo nomine sibi jure postulare videatur; attamen non mihi tempero, quin vel propriæ sanitatis dispendio, alienam curare satagam: populares scilicet meos admonere de subingressu Novæ cujusdam Constitutionis, à qua pendet Febris Nova species, à nuper grassantibus multum abludens.

Memoriâ recolendum est, quòd in Autumno, Anno 1677. Febres Intermittentes se primùm exerebant, quæ quotannis increbrescentes, & *Επιδημι-
κωτέραι* factæ, donec ad suum statum sive *ἀκμὴν* pervenerint, postmodum sensim decrescabant, & postremis hujus Constitutionis annis ita raræ apparebant, ut pro Morbo Epidemico vix, ac ne vix quidem haberi potuerint. Quâ de re pariter adnivadendum est, posteriores duos Constitutionis jam exeuntis annos Hyeme rigidissimâ fuisse infestatos; penultimum maximè, nempe Annum 1683. in quo ita enormi Brumâ intemperies desæviebat, ut nemo quisquam viventium illi parem, vel intensissimo eo frigoris gradu, vel prælongo temporis tractu, viderit unquam. Quippe quo Thamesis, Nobilis fluvius, ita prævalido gelu compaginabatur, ut Curruum circumcursitantium rotas, officinas ad Platearum modum mercibus refertas, ac numerosissimam hominum frequentiam, solidi instar pavimenti, facile sustentaret. Subsequens Annus 1684. licet nec intenso frigoris gradu, nec pervicaci duratione, præcedentem exæquaret, non tamen multum ei utroque cessit. At cum primùm exolveretur gelu Anno 1685. mense Februario, exorta est Febris ista, de qua jam agere institui; quam quidem ego novam Febris speciem esse arbitror, atque Febri, quæ per octennium ultimò prægressum invaluit, esse prorsus dissimilem.

An hujusce Constitutionis mutatio mutationi manifestarum aëris qualitatum, quæ per binas hyemes successit, tribuenda sit, ego non satis scio; quum pro comperto habeam alterationes quoad sensibiles Annorum qualitates, utcunque dispares, morborum Epidemicorum species non protulisse; & certam annorum seriem, quantumlibet annus unus ab alio, externâ facie & temperamento discrepaverit, nihilominus omnes in eadem Febrium Stationariarum specie producendâ convenisse. Quod cum seriò animadverterim, opinari mihi subiit, prout à me aliàs dictum fuit, Constitutionis mutationem à secreta aliqua abditaque alteratione in terræ visceribus Atmosphæram omnem

omnem pervadente, vel à Corporum Cœlestium influxu aliquo maximè pendere. Tametsi hîc est notandum, quòd valedicente nobis olim Febre Depuratoriâ, siccissimum ac vehemens gelu ab initio hyemis 1664. omnia confrinxerat, necquicquam remisit, donec mensis Martius adoleret; quo quidem tempore, quamprimum fatisciente gelu terra solveretur, mox Febris Pestilentialis, postmodum ipsa Pestis grassari cœperunt. Utut verò hoc se habeat, Febris, quam nunc tractamus, jam dicto tempore primùm se ostendit, nempe Februario mense 1684. & tam præcedente anno, quàm eo, qui jam agitur, per omnes Angliæ regiones latius vagata est; longè magis & *Επισημικωτέρως* aliis in locis, quàm hîc Londini desævians.

Ubi primùm ad hanc Febrem vocarer, omninò existimabam, illam non ex eo genere Febrium fuisse, quas ego Stationarias appello; sed potius ex intercurrentium familiâ, quæ singulis ferè annis promiscuè adoriuntur. Non aliud scil. morbi genus esse rebar quàm Peripneumoniam illam Notham, quam Libro de Morbis Acutis olim delineaveram. Unâ hâc intercedente discriminis notâ, quòd in hac Febre subindè non comparebant Symptomata in Peripneumonia magis Pathognomonicâ, qualia sunt Tussis vehementior, Cephalalgia intertussendum sævissima, & quasi Caput diffringens, Vertigo à motu quolibet, & Dyspnœa ingens, quæ omnia Peripneumoniam Notham fere comitabantur. Cum itaque Librarius novam Tractatum meorum Editionem eo tempore sollicitaret, visum est conjecturam tunc meam, in qua me hallucinatum fuisse jam sentio, in formâ Postscripti publico dare, in quem quidem errorem me induxit ingens consensus, quo Febris hæc cum dictâ illâ Peripneumonicâ luculenter conveniebat: quæ nullâ non hyeme subinde occurrit. At cum æstate superveniente, quæ Febres illas Peripneumonicas solebat fugare, hæc nihilominus perseveraret, statim erroris mei commonitus, Febrem hanc ad novam Constitutionem redigendam omnino censui.

Symptomata diligenti quantum potui indagine comprehensa, hæc fere sunt, & olim fuere: Æger per vices calore & frigore tentatur; sæpenumero & caput, & artus dolorem queritur; pulsus sanorum pulsui non absimilis est; Sanguis è venis eductus Pleuriticorum sanguinem haud rarò æmulatur; Æger ut plurimum laborat Tussi, quæ quidem quantò ab hyeme longius invadit morbus, tantò citius, unâ cum aliis Symptomatis Peripneumoniam mitem & boni moris comitantibus, recedit. Dolor collum, & fauces (hic verò levior quàm in Angina) sub primum morbi insultum quandoque occupat. Febris tametsi prorsus continua sit, sæpe tamen Exacerbationes molestissimas ingruente nocte apportat, non aliter ac si duplex foret Tertianæ, sive Quotidianæ. Æger jugem in lecto decubitus quantumlibet levissimè stragulis coopertus sit, non sine magno suo periculo experitur; Febre enim exinde in Cerebrum versâ, vel in Coma, vel in Phrenesin facillè incidit. Et, ut verum fatear, ita proclivis est in hoc morbo ad Phrenesin lapsus, ut per sæpè suâ sponte, nullâ ejusmodi datâ ansâ, illico subrepat. At non eo excandescentiæ & furoris ascendit Phrenitis in hanc Febrem, atque illâ, quâ Variolis atque aliis Febribus

corrupti laborant; quin imò æger potius tranquille delirat, incongrua subinde effutens. Ab intempestivo Cardiacorum usu, & regimine paulò calidior Petechiæ sæpius efflorescunt, & in junioribus calido temperamento præditis, maculæ etiam purpureæ, certissimum summæ Inflammationis indicium, tam in hoc, quam in aliò quovis morborum Acutorum genere. Quandoque eruptiones Miliæres, quas vocant, in superficiem corporis se dispergunt, Morbillis haud multum ab similes, nisi quod rubent magis, & quando recedunt, squamulas istas furfuraceas, quæ in Morbillis cernuntur, haud relinquunt: licet hæc sponte suâ nonnunquam ingruant, sæpius tamen Lecti calore & Cardiacis extorquentur. Lingua ægri pro ratione imperati Regiminis, vel humida est, vel sicca. Ubi inaruerit, fusci est coloris in medio; quam partem undique cingit fimbria inalbescens. Ubi verò humida est Lingua, omni ex parte alba est, pelliculâ item scabrâ & alba vestita. Nam si æger ab adhibito regimine plus justo incalescat, lingua ferè est fusca & arida; sin minus, humida est, & alba. Idem de sudore dicendum est, qui pro ratione diversi regiminis præfati dimanat. Nam si calidius tractetur æger, ferme viscosus effluit, è capitis præsertim regione. Quantumvis autem sudor copiosè, & undequaque erumpat, parum tamen ex eo levaminis sentit æger; unde liquet ejusmodi sudores symptomaticos tantum esse, criticos non esse. Primis morbi diebus sudoris ex arte provocatio, materiam morbificam si non in caput, saltem in artus solebat deponere. At ubi jam caput Febris occupavit, & Phrenesis semel invaluit, nulla restant Febris indicia, nisi quòd pulsus nunc citior est, nunc tardior; tandem verò, cum ex re malè gestâ spiritus in confusionem omnimodam adigantur, pulsus inordinatus cum subsultu membrorum subingreditur, quem non ita diu post mors excipit.

Curationem quod spectat, ista Peripneumoniæ signa quæ hanc Febrem comitabantur *Februario* illo anni postremi, quo primum emergebat, statim ab hyemis exitu fidem, ut dixi, mihi fecere, eam prorsus in Peripneumonicarum familia censendam esse. Ac proinde me statim contuli ad usum Methodi istius, quam olim laudaveram in Curatione Peripneumoniæ Nothæ, & Auctario supra memorato. Quæ quidem Methodus satis feliciter cessit, tum mihi, in paucis illis, quibus medicandis per adversam valetudinem meam vix sufficebam, tum etiam aliis, qui, me Authore, eandem experiri haud aspernabantur. Quicquid verò id demum fuerit, quod hanc mihi Methodum suaderet, jam mihi satis compertum est, quando & morbi Phænomena, & ultimi Anni qui binas rigidissimas hyemes excepit, perpendo temperiem, (Hyeme præsertim, si modo Hyems dici possit quæ nullum frigus notabile secum adduxit) mihi inquam constat, hanc Febrem nihil esse aliud, quam simplicem Sanguinis Inflammationem; ac proinde Indicationes Curativas ad dictam Inflammationem debitis Remediis & methodo reprimendam, omnino dirigendas esse.

Hanc itaque ductum sequens, primò loco sanguinem è brachio dextro
ad

ad ℥x. educi volo. Neque sanè Febris hæc (utut sanguis emissus Pleuriticorum sæpissimè sanguinem æmulatur) reiteratam Phlebotomiam facile tolerat. Sin autem respirationis difficultas, dolor capitis inter tussendum lancinans, &c. malum hoc ad Peripneumoniam notham propiùs accedere indigent; hoc in casu tam venæsectio quàm catharsis eo usque sunt iterandæ, donec symptomata omnia penitus evanuerint; prout Capite de Peripneumonia tradidi. Atque hoc diligenter animadvertendum volo. Vesperi *Epispasticum* seu *Vesicatorium Nuchæ* appono. Sequentè Aurorâ, lenitivam hanc *Potionem* exhibeo.

℥. *Tamarind.* ℥ss.

Fol. *senn.* ℥ij.

Rhabarb. ℥ss.

Coq. s. q. aq. ad ℥iij.

in Colat. dissolv. Mann. & Syr. Rosar. solutiv. an. ℥j. *Mf. F. Potio*, sumenda summo mane.

Quod quidem Catharticum etiam alternis diebus repetendum præscribo, donec tertiam vicem expleverit. Horâ somni post Catharsin toties, quoties Paregoricum hoc vel simile injungo.

℥. *Aq. Paralyseos* ℥ij.

Syr. de Meconio ℥j.

Succi Limon. recenter extracti cochl. ij.

Mf. F. Haustus.

Id scil. cavens, ne fortè ab agitatione & tumultu, quem in Febricitantium sanguine & humoribus Purgantia sæpe excitant, æger ex spirituum Animalium confusione, Comatosus fiat. Quod quidem Symptoma Medicamentum Hypnoticum, quantumlibet contrà facere videatur, procul amolitur. Qua de causa ego in Febre Comatosa Anni 1673. Catharticum propinare non ausus, in Clysterum usu subsistebam, certò sciens Remedia Purgantia eo tempore usurpata, illico Comata adduxisse. Quod forte an aliter evenire potuisset, si Paregoricum usurpatum fuisse post talem Catharsin mihi in mentem venisset. Ubi verò Purgatio celebrata non fuerit, Hypnoticum horâ somni nullatenus est concedendum; nè sc. Cathartici postridie deglutienti operationem ac vim (quod fieri solet quantumvis serò assumatur illud) sufflammet, vel si non in solidum retundat, efficaciam tamen imminuat. In hac aut aliâ quavis Febre Epidemicâ, statutum mihi est alvum non turbare in principio statuve morbi, nisi Venæ-sectione præmissâ. Quæ quidem praxeos Regula susque deque habita, aut violata quamplurimos Orco addixit, infantes maximè, prout alias in cautelam monui.

Observandum est autem, quòd licèt ut plurimum Evacuationes omnes præfatæ in hujus Febris Curatione usurpari debeant; sæpe tamen æger, maximè si juvenis aut Infans fuerit, post eductum sanguinem unâ Catharsi defunctus, statim convalescit, nec pluribus fatigandus est, Febre primò purgantis Remedii impetu expugnata. E contra verò nonnunquam opus est ut alvus

ad plures quam supra diximus vices sollicitetur. Quandoque enim, licet id raro eveniat, Ægro è Febre jam dictâ methodo liberatô, recrudescencia materiæ Febrilis post dies aliquot morbum postliminio reducere videtur, quem tamen purgatio quartâ vice repetita mox eliminat. Tametsi in hac methodo nova hæc Febris raro accidit nisi ab Aphthis quæ sub exitu Febris præcedentis supervenere, & quæ jam ad statum auctæ eam denuò revocant. Quæ quidem Febris Symptomatica tantum est, & Singultum per intervalla redeuntem sæpenumero post se trahit, qui etiam sublatâ Febre per dies aliquot perseverat; at pro ratione redintegratarum Ægri virium sponte tandem evanescit. Quod est diligenter animadvertendum, quandoquidem ex Singultu sub finem hujusce Febris accedente nihil ægro periculi est, nisi officiosè nimis & inutiliter multa ingerantur remedia: quod si fiat, Mors pro Medico est. Veruntamen tam Aphthæ quam Singultus, vel horum utervis, si non sponte facessat, sed in longum tempus decurrat, faciliè fugantur usu *Pul. Corticis Peruviani*, nempè ℥j. *Corticis cum syr. Papaver. Rhæad. q. s.* in forma Electuarii, vel Pilularum redactâ, eaque methodo assumptâ quam olim tradebam Epistolâ ad D. D. Brady, superbibendo haustum lactis deflorati. Quod remedii genus experimento deprehendi certius in hoc casu scopum attingere, quam aliud quodvis etiam è celebratissimis, modò non frustrentur ejus vires (quod fieri assolet) ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à Purgatione liberis sequentia vel his similia nonnunquam præscribo.

℥. *Conserv. Lujulæ & Cynosbati an.* ℥j.

Conserv. Berberum ℥ss.

Cremoris Tartar. ℥j.

Cum s. q. syr. è Limonibus F. Electuarium, de quo capiat ad magnitud.

Nucis Moschat. ter in die superbibendo seq. Julap. cochl. vj.

℥. *Aq. Portulac. Lactuc. Paralyf. an.* ℥iiij.

Syr. de Limon. ℥i ss.

Syr. Violar. ℥j.

Mf. F. Julapium, vel:

℥. *Aq. Font.* ℥j. *Aq. Rosarum, Succ. Limon. Sacchar. albiss. an.* ℥iiij.

Coq. lento igne dum despumaverint, cap. ℥iiij. ad libitum.

Verùm in his omnibus spiritum Vitrioli, etsi summè refrigerantem, semper devito, utpote qui, cum egregiè stypticus sit, minùs convenit morbis omnibus, quorum Curatio purgationi innititur; ut in hoc loco mineralem hujus spiritus naturam haud memorem.

Sæpenumero hinc accidit, maximè Febre jam ad finem vertente, ut æger dum hac Methodo tractatur, nocte subindè sudore sponte prorumpente diffluat: à quo admodum mitigantur universa morbi symptomata. Quo non obstante, cum hujusmodi diaphoresi fidendum non sit, supra dicta Methodus nullo pacto est intermittenda; quandoquidem si æger ad longius temporis spatium istis sudoribus indulgeat, Febris, quam Purgationes præcedentes quadantenus

tenuis subjugaverunt, denuo vires resumet. Si enim diaphoresis ista protrahatur ultra tempus illud quo particulæ Febriles Coctione debitâ præparatæ prorsus diffiantur, qui post insequuntur Sudores non ad aliud faciunt quàm ad inflammationem de novo accendendam. Quamobrem licet Sudores isti qui sponte manabant, Critici fortasse fuerint, quoad materiæ Febrilis ejus quæ expulsiõni jam parata est, eliminationem, alii tamen qui post illos eliciuntur, Symptomatici tantum esse possunt, atque adeo officere magis, quàm prodesse. Verbo dicam: Hujusmodi sudoribus noctu sponte suâ prodeuntibus, opportunè favet lecti per noctem lenis calor; quare stragula nec plura, nec densiora illis quibus sanus assueverat, ægro aggerantur; nec exhibeantur Medicamenta quævis excalefacientia: lectulo tantum indulgeat æger aliquantulum solito diutius manè subsequente; & postea pergat in suprâ descriptâ medendi methodo.

Diæta ex pulculla avenacea est, vel jusculo hordeaceo, cum pomo subinde ad ignem cocto, atque etiam post secundam purgationem jusculo tenui ex Pullo Gallinaceo. Pro potu ordinario Cerevisiam tenuem nullatenus tepescitâ injungo, ut & Decoctum Album (quod appellant) ex ℥j. C. C. in aq. communis ℥iij. cocti, & postea sacchar. albiss. edulcoratum.

Post Catharsin bis celebratam nulla suadet necessitas, ut alio loco adnotavi, Pullorum carnibus aut similibus Eupeptis ægro interdiceret, cum hæc per purgationem medicatio ea indulgeat, quæ non poterant concedi, si alii viæ insisteretur. Atque porro post ultimam purgationem modo Febris aliquantulum deflagraverit, & intermittentis typum nondum prorsus induerit. Vini Canarini cochl. tria vel quatuor manè & serò, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur, quo & vires citius instaurentur, & febriles avertantur accessus.

Cum autem hæc Febris species præ cæteris quas mihi unquam videre contigit, cerebrum petere quasi apta nata sit, nec sine ingenti tum molimine, tum ægri periculo, inde queat deturbari; ægros meos sollicitè moneo ne se nudos lectulo, nisi noctu tantum committant: Quod si usque adeo debilitati à morbo fuerint, ut erecto corpore sedere nequeant, permitto ut vel super lectum ipsum, vel super grabatum, vestiti jaceant, capite paululum elevato; nec sino ut focus sit luculentior in cubiculo, quàm cui æger tunc cum sanus erat, assueverat.

Atque ut hoc Regimen omnino tenendum est ab initio in singulis hæc Febre correptis, (foeminas, in primis Puerperii diebus decumbentes excipias) ita necessario est imperandum, ubi ad ægrum quem ob regimen justo calidius, Phrenesis, Petechiæ, Purpureæ Maculæ obsederunt, aut alia quævis efferatæ inflammationis indicia, accersitur Medicus. Hoc enim in statu, quantumlibet sanguinis detrahatur, quantumvis leviter tegatur corpus, quicumque demum liquores Refrigerantes ingerantur, non prius sedabitur Febris, quàm æger se lectulo interdiu abstinuerit: Cum calor circumambientis aëris inter stragula conclusi, sanguinem plus satis exagitet, & procumbentis cor-

poris situs vehementiori impetu eundem in caput impingat. At hîc ubi Phrenesis ob methodum imperitiorem semel invaluit, nec subito deleri potest, nec tutum est repetita ultra limites præscriptos vel Phlebotomiâ vel Purgatione, ejusdem curationem aggredi, tandem verò suo tempore suâque sponte, ope dicti regiminis recedet. Ad quam tamen amovendam nihil perinde confert, atque ægri caput radi: quod itaque semper præcipio, nullum Emplastrum admovens, sed Pileolum tantum quod ablatum rasurâ Capillitium spissitudine quadantenus compenset, aut saltem Caput à frigore externo muniat. Hâc Methodo Cerebrum refrigeratur admodum, & recreatur, ita ut sensim calidas impressiones Phrenesin excitantes queat vincere.

Et quæ de Phrenitide hîc dicuntur, de Comate etiam huic Febri supervenienti dicta sunt, in quo ut in dictâ Phrenitide materia Febrilis in caput sursum fertur, ac proinde si linguæ albedinem excipias, nulla adsunt febris signa, at æger Apyrexia prorsus frui videtur. In hoc pariter affectu ac in alio, Cathartica, sudorifica, vesicatoria atque id genus alia non tantum nullo cum fructu, sed ne quidem sine maximo periculo usurpantur; istiusmodi enim evacuationes mortem sæpius quàm symptomatis hujus curationem adsciscunt. Quamobrem post evacuationes generales per venæsectionem & purgationem factas, quantumlibet hoc symptoma astantes perterrefaciat, tota res naturæ & tempori committenda est. Licet enim stupore æger diu laborarit, post aliquam multos tamen dies pristinam sanitatem recuperabit, modo lecto non perpetim affigatur, sed de eo eximatur indies, & supra grabatum vel etiam lectum vestitus decumbat. Interim autem abradatur caput & sub affectus finem vini canarini cochl. tria vel quatuor bis in die exhibeantur. Sed de hoc fusius egi in *Sectione quinta & capite secundo, lib. de Morbis Acutis*, ubi de Comate quodam insigni Febrim constitutionis illius comitante, disserui.

Quoad Febrem autem haud deterrendus est Medicus à faciendis prædictis Evacuationibus, si fortè membrorum subsultum, vel motum Convulsivum in ægri corpore persentiscat, dum pulsus tangitur; quandoquidem in quibusdam generis Nervosi affectibus tam Venæsectio quàm Purgatio, etiam sæpius repetitæ non tantum non nocent, sed & necessariò sunt adhibendæ. Cujus rei experimentum à me factum in medium profero, nempe in quadam Convulsionis specie quæ *Chorea Sancti Viti* vulgo appellatur; quo morbo haud pauciores quinque laborantes & vidi, & sanavi ipsemet, & Venæsectionibus & Purgationibus, per intervalla celebratis. De quo morbi genere cum & mihi opportunè occurrat, & eorum quæ jam assero, veritati luculenter assipuletur, pauca dicere non gravabor. *Chorea Sancti Viti* Convulsionis est species, quæ ut plurimum pueros puellasve à decimo ætatis anno, ad pubertatem usque invadit; primò se prodit claudicatione quadam vel potius instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; postea in manu ejusdem lateris cernitur, quam hoc morbo affectus, vel pectori, vel alii alicui parti applicitam, nullo pacto potest continere in eodem situ vel

vel horæ momento, sed in alium situm, aliumque locum convulsione quadam distorquebitur, quicquid æger contrà nitatur. Si vas aliquod potu repletum in manus porrigatur, antequam illud ad os possit adducere, mille gesticulationes, Circulatorum instar exhibebit; cùm enim poculum rectâ lineâ ori admoveere nequeat, deductâ à spasmo manu, huc illud aliquamdiu versat, donec tandem forte fortuna illud labris propiùs apponens, liquorem derepente in os injicit, atque avidè haurit, tanquam misellus id tantum ageret ut deditâ operâ spectantibus risum moveret. Cùm Affectus iste ab humore aliquo in nervos irruente, quorum irritatione istiusmodi motus præternaturales producuntur, pendere mihi videretur; Indicationes Curativas primùm ad humores illos tam venæ-sectione, quam Purgatione minuendos, dein ad corroborandum genus Nervosum omninò dirigendas censebam. Quem in finem hâc utor Methodo. Sanguinem ex ægri brachio ad ℥vij. plus vel minus pro ratione ætatis, educi jubeo. Die sequente vel dimidiam partem, vel quiddam ampliùs (pro ratione vel ætatis, vel etiam majoris minorisve corporis ad subeundam Catharsin aptitudine) Potionis Purgantis Communis suprà descriptæ ex *Tamarind. Fol. Senn. &c.* exhibeo. Vesperis haustulum seq. propino.

℥. *Aq. Cerasor. Nigr.* ℥iij.

Aq. Epilept. Langii ℥j.

Theriac. Androm. ℥j. vel

Laudani liquid. gutt. viij.

F. Haust.

Potionem istam Cathartica ad tres vices alternis diebus repetendam præscribo, & Haustum paregoricum iisdem noctibus. Postea sanguinem rursus extrahi curo, dein ut ad Catharsin, uti priùs, æger revertatur. Atque ita alternatim sanguinem mitto, & subduco alvum donec ægro vena ter quaterve fuerit incisa, & post singulas venæ-sectiones, toties fuerit purgatus, quoties vires ferre posse viderentur: eo tamen temporis spatio inter alternas evacuationes diligenter observando, ut nihil inde periculi ægro immineat. Diebus à Purgatione vacuis, sequentia præscribo.

℞. *Conserv. Absynth. Rom. & flavedinis Aurantiorum an.* ℥j.

Conserv. Anthos ℥ss.

Theriac. Androm. veteris, & Nuc. Moschat. condit. an. ℥iij.

Zingib. condit. ℥j.

Syr. è succ. Citri q. s. f. Elect. de quo cap. ad magnitud. Nucis Moschat. mane & horâ quintâ vespertinâ, superbibendo Vini sequentis cochl. v.

℥. *Rad. Pæoniæ. Enul. Campan. Imperator. & Angelicæ an.* ℥j.

Fol. Rutæ, Salviæ, Betonicæ, Chamædr. Marrubii albi, & summitat.

Centaureæ minor. an. m. i. Baccar. juniper. ℥vj.

Cort. duorum Aurantior. Incidantur & infundantur frigide in Vini Canarini ℥vj. Coletur tantummodo tempore usûs.

℞. Aq. Rutæ ℥iv.

Aq. Epilept. Langii & Bryon. compos. an. ℥j.

Syr. Pæoniæ ℥vj.

Mf. f. Julap. cap. cochl. iv.

Sing. noctibus cubitum iturus, instillando Spir. C. C. gutt. viij.

Applicetur plantis pedum Emplastrum à Caranna.

Quanto magis convalescit æger, tanto minùs pedem ducit; tantò pariter & diutiùs, & constantiùs manum in eodem situ continens, & Scyphum ori magis directâ viâ admovet: quæ certissima sunt indicia quantum profecerit in sanitate redintegrandâ. Ad quam quidem consummatiùs perficiendam, licet author non sim ut plus ter quaterve ut plurimum sanguinem emittat æger: attamen Remedia Cathartica & alterantia eo usque in usum sunt revocanda, donec rectissimè tandem valeat. Et quoniam qui hóc morbo semel laboravit facilè recidivam pati possit, è re fore existimo, ut pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, vel eâ ipsa tempestate anni sequentis, vel paulò antequàm Morbus primò invasit. Sanè haud multum abest quin huic Methodo *Epilepsiam Adultorum* cedere posse autumem, modo Remedia præscripta ætati eorum ritè adæquentur; tametsi, cùm non nisi perquàm rarò hic morbus mihi occurrerit, non adhuc idem sum expertus. Sed de hoc obiter. In foeminis affectionibus Hystericis obnoxiiis quandoque accidit, quod ubi Curatio Evacuationibus dictis commissa fuit, Febris post Venæ-sectionem & purgationes istiusmodi iteratas etiamnum dureret procurratque. In hoc casu Febris, quæ jam urget spiritum commotioni ab evacuationibus excitatæ durationem ejus planè debet, ac proinde jam aliis omnibus posthabitis, Indicationes curativæ, modo signa Peripneumoniæ, & inflammationes circa partes vitales absint, ad quietem spiritibus inducendam & eorum orgasmum sedandum omninò sunt dirigendæ. Quem in finem singulis noctibus Paregoricum, quod vigiliis debellandis par sit exhibeatur, atque etiam medicamenta *Hysterica* propriè dicta bis vel ter in die injungantur, qualia sunt pilulæ ex *Galbano*, *Assa fætida*, *Castoreo* & similibus, & julapia ejusdem indolis in cap. de affect. Hyster. descripta. Insuper ad vires instaurandas, & vapores, quos dicunt, supprimendos, concedatur ægræ talibus victitare, tam quoad cibum, quàm potum, qualia Appetitui maximè conveniunt.

Jam diximus, Febrim hanc tum anno ultimùm elapso, tum maximè hoc ipso qui nunc currit, exacerbationem quandam sub noctem quotidie adducere, Paroxysmo Febris Intermittentis non absimilem. Quamobrem Medici illi qui usu didicerant omnes illas Febres, quæ vel minimùm intermitte-

bant,

bant, (sæpe etiam quæ ne intermittebant quidem) per illam annorum seriem ab *An. 1677.* ad initium *An. 1685.* à Cortice Peruviano certissimè fugari, eodem remedio hanc etiam Febrem adoriebantur. Quod quidem licet iudicio Rationis suffragante tentarent, non tamen æquè feliciter illis cessit, atque prioribus istis annis plerumque cesserat. Mihi enim quantum potui diligenter perquirenti compertum fuit, etiam magnam Corticis quantitatem exhibitam, rarissimè ægrum à morbo liberasse. Idque ita perrarò, ut quoties restitueretur æger pristinæ sanitati, ego id magis fortunato alicui Morbi eventui, quàm Corticis viribus tribuendum arbitrarer: ita penitus Cortex descivit ab illa sanandi vi & certitudine, quâ prædictis illis annis pollebat. Febrim istam intelligo, quâ cum nobis impræsentiarum res est, quæ Quotidianam aliquatenus imitatur. Ubi verò Tertianæ Genuinæ, vel alternis diebus invadentis, Typus reperitur, Cortex Peruvianus perindè hodiè atque olim ægris opitulatur. Unde liquidò constat hanc Febrem ab istis Constitutionis prioris toto cœlo distare; cum ne hilum quidem Corticis usu hîc proficiamus; cumque hæc è Vîno & Cardiacis, aliisque Calidis exasperetur magis; quibus omnibus cum Corticis usu olim satis conveniebat, quin & cum ipsa Febre.

Porro notandum est, quòd grassante hâc Febre, per æstatem omnem, maximè illam anni jam currentis, morbus persæpe non tam Pathognomonicis Febris signis, calore sc. inquietudine, &c. quàm *ventris Torminibus*, nunc siccis, nunc dejectionibus, se ostendebat. Cùm nihilominus sub hac larvâ ipsa hujusce tempestatis Febris delitesceret, in qua exhalationes sanguinis inflammatoriæ, non pro more solito, in externum corporis habitum protrudebantur, sed introrsum per Arterias Mesentericas in viscera inferioris ventris, sive Intestina & nonnunquam etiam per Arteriarum Coeliacarum ramos in Ventriculum deponebantur, quæ quidem exhalationes Vomitionem excitare solent, præcipuè statim ab ingestione sive potûs sive nutrimenti cujusvis solidioris: Quamvis autem hæc Febris sub dictorum Symptomatum specie & formâ delitescat, omnino tamen genuinâ illâ Methodò, quam supra dedimus, expugnanda est, perindè ac si usitata hujus Febris facie compareret, idque tam ratione venæ-sectionis, quàm repetitæ Catharsis. Nisi quod hîc animadvertendum sit, quod quoties Febris eò usque Ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, *Pilulæ Cochis Majores* (quæ ad ðij. exhibitæ nunquam non per viscera sibi exitum parant) loco Potionis leniter Purgantis substitui possint. Devorentur verò Pilulæ horâ quartâ Matutinâ, ita ut æger superdormiat.

Tum etiam Hypnoticum dosi paulò largiore est concedendum *v. g. Laudani solidi Londinensis gr. jß.* cum simili quantitate *Mastiches* in duas Pilulas redacta eadem nocte deglutiantur; vel etiam *Laudani liquidi gutt. 18.* vel *20.* in *3j. Aq. Cinnamom. Hordeat.* aut alio quovis Vehiculo generosiore; quò Ventriculus hujus tum viribus corroboratus, tum minori

quantitate non irritatus, ad medicamenti rejectionem minùs insurgat. At si quovis modo Potio Purgans, & Diacodium in Ventriculo queant retineri, dictis Pilulis, & Laudano omnino præferantur; cum officio suo fungantur, corpore minùs quàm ex Pilulis excalefacto.

Cùm autem de Torminibus Ventris mentionem fecerim, monendi hìc mihi sunt Populares mei, quanto cum periculo, prout frequenti observatione didici, *Aquæ Minerales* in ventris Torminibus quibuscumque, vel Diarrhœâ, vel Vomitione, vel Affectu alio quocumque, quem à Febre oriri vel suspicari possimus, præscribi soleant. Quandoquidem in tam subtili & spirituofo morbi genere ac Febris extat, ejusmodi Medicamenta Mineralia ita omnia conturbant, ut loco eorum Symptomatum quæ Febrem ex more usitato comitantur, accidentia prorsus anomala adducant; nec quicquam interea ad Febris extirpationem conferant, quod me diu sæpèque observasse memini.

Illud interim omnino observandum est, utpote quòd ad quamplurimos ab Orci faucibus liberandos pertineat, quòd non obstantibus iis quæ suprà jam tradidimus, quotiescunque prædicta ventris Tormina ad *Dysenteriam* usque *confirmatam* (in qua præter illa Tormina Materia quædam mucosa unà cum sanguine per sedem excernitur) promoventur; hìc mihi periculosissimum esse constat morbum aggredi protractione illâ Methodò, quæ evacuos primùm, dein contemperandos acres istos humores, esse docet (ut de Remediis Astringentibus, varii generis, & variante formâ intrò assumptis, tum & clysteribus nunc Abstergentibus, nunc consolidantibus subinde injectis nihil dicam,) cùm Experientiâ didicerim *Dysenteriam* & certissimè & celerimè curari, si missis ambagibus, Fluxus Laudano confestim sistatur. Ita enim atrox & vehemens est hicce morbus, ut, si *Dysenteriam* jam confirmatâ adhuc purgare satagas, perquam metuendum sit, ne dysenteria sumptis inde viribus in præceps lata, ægrum præincredibili fermento, quocumque te postea verteris, diutius excruciet, vel etiam vitâ spoliet. Advocatus itaque, guttas circa xxij. Laudani liquidi in Aq. Epidemicâ, vel Aq. Mirabili, vel aliâ simili protinus exhibeo, bis intra horas 24. repetendas; vel etiam hoc sæpius statis intervallis, si nempe Dosis jam præscripta, manè ac serò tantùm usurpata, tam torminibus Ventris, quàm Dejectionibus cruentis, rite compescendis par non fuerit. Dejectionibus paululum incrassatis, vel jam magis consistentibus, (quod primum sanitatis mox recuperandæ indicium est) & fugatis Symptomatis, tutissimum arbitror, ut æger aliquantisper in usu prædicti Remedii manè & serò capiendi perseveret, guttulis aliquot indies demptis, donec eo amplius non fuerit opus. Animadvertendum autem est diligenter, quod ægrum diutius ab usu Paregorici lectulo affigendum, curo, cum situs quilibet paulo erectior cerebrum facillè conturbet, nisi æger somnos post in lecto satis longos captaverit. Diætam quod attinet, si æger vi-no priùs assueverat, Canariense concedo, probè tamen aqua dilutum, in qua panis crustulum fuerat decoctum; & quam frigidam in hunc usum in lagena asser-

asservandam jubeo, ut in promptu sit ubi vinum est contemperandum. Decoctum Album, è Cornu Cervi usto, in Aqua fontana, hîc etiam affatim epotum prodest. Pro victu jusculum Hordeaceum, vel è pullorum carnibus elixis; ovum in testa coctum, vel aliud quodvis ex Eupeptis in primos dies sufficiet. Deinceps verò tum ad liquores magis generosos, tum ad alimentum uberius solidiusque paulatim ascendendum, né scilicet nimia vacuitas sive exinanitio, vel morbum à quo convaluerat, vel alia Symptomata, quæ exinanitio solet parere, denuò reducat. Veruntamen hoc est adnotandum, quòd licet in constitutione jam regnante, Laudanum solitarium suo Marte Dysenterias subjugabat; in istis tamen Annis, in quibus Dysenterix Epidemicæ grassantur, & cæteris prælucent morbis, non abs re fuerit illas primùm Evacuationes quas in Capite de Dysenteria olim descripsi, in usum revocare.

Et sicuti in radicata illa Dysenteria modò dicta, ita etiam in hoc qui sequitur casu, fieri non potest, ut Curatio Methodo illa quæ Feбри unde primitus ortum duxit, debetur, illico possit expediri. Verbi gratiâ. Nonnunquam usu venit, ut qui rigore atque horrore corripitur, calore & frigore per vices alternantibus, quæ sunt haud mendacia Febris jam imminentis indicia. Derepente viscerum torminibus, à materiæ febrilis irruptione ac insultu gravissimè discruciat. Æger cum venam ferire, & alvum repurgare deberet, ad normam supra scriptam, ad Medicamenta nescio quæ Calefacientia, tam intro assumenda, quàm extra applicanda se confert: eo sc. animo ut flatus, quos hujus mali fontem esse auguratur, his mediis discutiat, donec tandem augefcente dolore & visceribus diuturniori morâ quasi impacto, motus Intestinorum Peristalticus, quò ex naturæ ordine omnia deorsum propellere debent, inverti accipit, & inclusa omnia sursum tendunt, unde æger sævissimo cruciatu torquetur, & provocatur ad Vomitionem, malo jam in Iliaca passione desinente. Hîc in Medendi ratione quam Febris quæ hujusce Symptomatis Causa erat Antecedens, sibi postulabat, ulteriùs procedere nequit Medicus, quàm ut sanguinem ex ægri brachio semel extrahendum præcipiat: etenim quot & qualiacunque demum Cathartica propinaveris, ea statim Emetica fieri, atque ita sursum inversum viscerum motum magis promovere solent; cum ut plurimum vix fortissima quidem Medicamenta Purgantia, vel minima eorum pars, intestina permeare valeant, ac sedem petere. Rebus sic stantibus consultissimum esse arbitror brachii venam primùm pertundere; mox interjectâ horâ unâ alterâve, Clysterem aliquem ex iis, qui potentiùs operantur injicere, ego fumum Nicotianæ sive Tabaci, ex Tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, Enema omnium quæ mihi innotescunt hætenus efficacissimum esse ducò. Qui etiam post moram aliquam reiterari potest, nisi prior immissus, solutâ alvo, meatus deorsum versus referaverit. Huic autem Remedio Symptomate haud cedente

Zz 3 omnino

omnino necesse est, ut Catharticum paulò fortius ac *σπασμωδότερον* in usum veniat, utut difficile fuerit exinde viam facere : Ut,

℞. Pil. ex duobus gr. xxv.

Mercurii dulc. ℥j. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. n. iiij. cap. è cochl. uno Syr. violar.

nullum insuper liquorem assumendo, ne minus retineantur. Sin autem æger hoc Remedium per os rejecerit, hâc methodo procedendum.

Laudani liq. gut. xxv.

Aquæ Cinnam. fortis ℥℥.

instillatæ statim propinentur; & interjectis aliquot horis idem Paregoricum repetatur. Cum verò horum usu vomitunitio ac ventris dolores remiserint, tunc Catharticum priùs dictum iterum exhibeatur. Hoc enim tempore idem sub Laudani tutela assumptum retinebitur, ac suo tandem defungetur munere. Verùm si *Anodynorum* virtute ac vi jam penitus infractis, vomitunitio ac dolor iterum redierint, Cathartico interim in corpore resistante; in hoc casu, ex dejectionibus per inferiora spe omni impræsentiarum abjectâ, ad usum Paregorici suprâ descripti revertendum, idemque eo usque repetendum quartâ vel sexta quaque hora, donec intestinâ quies omnimoda inducatur, ac proinde motus eorum naturalis deorsum versus restituitur: quo quidem tempore Catharticum, quod hætenus ob contrarium intestinorum motum in corpore sisteretur, jam operationem suam per se des exeret, quantumlibet ex tam repetito narcoticorum usu planè contrarium effectum iri videatur. Quod & ipse dum hæc scriberem in Generoso quodam Ileô sævissimô laborante expertus sum; cui tamen postea ex nimis longa tam humorum morbum committentium, quàm acrium Catharticorum retentione, *Aphthæ* supervenere, sed quæ satis facillè debellantur usu Corticis Peruviani suprâ descripto; ut & os sæpe colluendo cum sequendo Gargarismate.

℞. Succî Pomorum agrestium ℥℥.

Syr. de Rubo Idæo ℥j.

At cum jam ductus isti pro naturæ lege, denuo pateant, ægro liberum est, ut ad dies aliquot ferietur à Purgatione, donec scilicet tumultus nuper in visceribus excitatus, omnino resederit; quod temporis spatium humorum calori & acrimoniæ diluendis contemperandisque satis commodè impertiri potest. Quo factò Catharsi alternis diebus, ut supra, repetendæ vacare debet, si vel minima adhuc restent Febris vestigia. Sed de hoc satis.

Si infans hâc Febre laboret Gargarisma, tum hirudines duæ utrinque pone aures applicentur.

Dein Emplastrum Epispasticum posteriori cervici admoveatur.

Cum Cerevisia in qua Rhabarbarum fuerit infusum purgetur.

Si post Catharsin Febris intermittere videatur: tum *Julapium cum Cort. Peruv.* (in cap. de Febre Intermittenti; pro infantibus descriptum) exhibeatur.

Hoc in loco insuper est animadvertendum, quòd licet *Infantes* huic Febris generi æquè cum Adultis obnoxii sint, ac proinde pari cum illis Methodo curandi, nisi quod pro ratione ætatis, minor sanguinis quantitas est detrahenda, ac Catharsis tum eorum ætatulæ accommodanda, tum etiam fortè rarius celebranda (sæpe enim & Infantum & Juniorum morbus à primo vel secundo saltem Cathartico perdomabitur (nihilominus seriò advertendum est, an quæ hoc modo tractatur Febris pro certo hujusce Constitutionis fuerit, non verò alterius speciei, quod diligenter perquiri debet in Febris iis, quæ Infantes corripunt, in omnibus quibuscunque annorum Constitutionibus. Vulgo enim notissimum est Infantes à doloribus ex dentitione ortis, sæpiùs in Febres agi, quæ haud ita facillè ab alterius generis Febris internoscuntur. In harum ego Curatione diu multumque angebar, nec nisi nuperis his annis, certò mihi persuadere potui quemlibet ex illis qui meæ curæ concrediti, ad sanitatem restituti fuerunt, tam arte quàm Casu convalescuisse, donec tandem de felici successu Remedii haud ita celebris, imò ob tritum ejus usum planè contempti, frequenter admonitus illud ipse quoque præscriberem; quod etiamnum præ cæteris quæ mihi innotescunt medicamentis optimè votis hîc respondet. Ejusmodi verùm est. Guttæ duæ, tres, vel quatuor spiritus C. C. pro ratione ætatis, in cochleari uno vel altero Aq. Cerasor. nigr. vel Julapii alterius appropriati, exhibeantur quarta quaque hora ad vices quatuor vel sex.

Est & Symptoma aliud Infantibus permolestum longè diversum, & à Febris variorum Annorum Constitutionum, & ab illa proximè memoratâ. Est verò Hecticæ species Infantes diu affligens, quâ infestati sine insigni aliquo calore languent, cum appetitus dejectione; & tam artus quàm corporis truncus ubique emaciantur. Simplicissima quâ hic utor methodô, talis est. Rhei electi taleolatim incisi ℥ij. in lagenam vitream duarum librarum Cerevisiæ tenuis capacem, subere mox probè obturandam, immitti curò, (vel in alio quolibet liquore quo pro potu ordinario uti solet infans) quam Cerevisiam ita medicatam infanti tam noctu quàm interdiu, & cum & sine cibo propinandam injungo. Epoto hoc liquore, duas alias libras Rhabbaro eidem superaffundi jubeo; quibus pariter exhaustis, alias adhuc duas pro tertia vice substituo; quo factò & Rheum vires suas amittit, & Infans morbo ut plurimum liberatur. Ne tamen Cerevisia primùm affusa Rhei vi Cathartica saturatiùs imprægnata, justò vehementius alvum cieat, cautius agimus, si libra una epota alteram statim adjiciamus: post verò, recentem Cerevisiam non affundemus, nisi exhausta ea omni quæ prius fuerat lagenæ inclusa.

Sed ut ad Febrem de qua nunc agimus, Constitutionis scilicet jam currentis, revertamur. Hoc sedulò observandum est, quòd in hoc Febris genere, (perinde ac in Rheumatismo & aliis morbis quamplurimis, quorum curatio solis evacuationibus absolvitur) si dictis evacuationibus pertinaciter insistamus, usque dum Symptomata omnia prorsus ablegaverimus, sæpius ægro

ægro non nisi Morte medebimur. Neque enim ita insolens est, ut Symptomata quædam leviora, & quasi effoetæ Febris Reliquiæ aliquantisper etiam expirante jam morbo perdurent; à quibus tamen nullum ægro recidiæ periculum est, quæque sua sponte pari passu quo sanitas redit, abscedent. Quid quod jam recitata Symptomata haud rarò nihil aliud sunt quam reiteratarum evacuationum, quibus Medicus morbi curationem tentavit, vera progenies: si huic saltem addamus in causæ partem, exinanitionem illam quam ægri à consuetis cibis potuque abstinencia superinduxit: quæ omnia cum in corpora jam à morbis infirmata & penè confecta vim fecerint, Vapores, quos dicunt, haud aliter eleventur quàm in foeminis, atque eandem planè ob rationem, ob debilitatum sc. & quasi disiectum fractumque Spirituum Animalium Systema. Quapropter post factas, quæ tollendo morbo sufficere queant evacuationes, Prudentis Medici est, ab importuna earundem ordinatione sibi temperare, & paulisper attendere quid Tempus, Medicorum sæpè Felicissimus Optimusque ad leviculorum istorum Symptomatum depulsionem conferre possit, quæ quidem sæpenumero, prout multoties repetita observatione comperi, à Paregorico duabus vel tribus noctibus assumpto, sine alio quovis apparatu, sub morbi hujusmodi exitu devincuntur.

Methodus jam laudata cæteris quas expertus sum omnibus, in hujusce Febris curatione facile antecellit. Si quando verò Febrim non prorsus tollat, id saltem agit ut intermittere cogatur; ac proinde Peruviano Cortici, qui hic nunquam non triumphat, conficiendum tradit. Cum autem Catharsi isthic imperata, Curationi hujus Febris obesse nonnullis fore videatur, pro comperto affirmo, nihil ita certo atque ita potenter ægrum refrigerare atque Catharsin, post venæ-sectionem (quæ ubique præmittenda est) celebratam. Tametsi enim Medicamentum Purgans, eò ipsò quò sumitur die, atque adeò inter operandum majorem impræsentiarum & in sanguine & in reliquis humoribus, quàm qui ante fuit, tumultum excitet, & proinde Febrim intendat; id tamen noxæ emolumento mox inde subsecuturo plus satis pensatur. Testatur enim Experientia, Catharsin, modò post eductum sanguinem tentetur, quibuscumque aliis remediis felicius certiusque Febrem perdomare; tum quatenus foedam illam Humorum illuviem è corpore exigat, à quibus ut à causa antecedente Febris accendebatur, vel si non antea peccabant ii, jam saltem concalescenti, & à Febris ardore quasi cocti & consipati, ad ejusdem moram diuturniorem multum faciunt; tum etiam quatenus Anodyno viam sternit, quod tutius longè certiusque officio suo fungitur, quàm si humores peccantes, qui Paregorici vires, aliter potuissent infringere, purgatione non fuerint eliminati.

At è contra sicuti Methodus illa quæ materiam Febrilem per poros cutis eliminare satagit, minus habet certitudinis, ita plus habet & fastidii, & moræ, utpote quàm morbus sæpius ad septimanas aliquot producit. Cum æger hòc modò primùm in ipsò sepulchri margine (si forte Libitinam evitet tandem) constituatur, & per longum illum Febris decursus, denso Remediorum agmi-

ne infestetur, quibus ea expugnantur symptomata quæ imperita Morbi tractatio advexit; dum Regimine & Medicamentis calidissimis tentatur Curationis ejusmodi affectus, qui pro genio suo, utraque horum frigidissima omnino deposcit. Atque ita dum malè sani homines, Artis falsò dictæ, Regulis se mancipant; etiam spreto sensuum illis Reclamantium judicio, morbum ex suâ natura brevem facilemque in diuturnum, & difficilem eruditè convertunt, omnia tumultu & metu conturbantes, & fluctus, quod ajunt, excitantes in simpulo. Quo factò non iis magis opus erat, quàm est Nauclero, ut dum in mari libero navim possit agere, eandem inter cautes & brevia inferat; unde licèt majoris peritæ gubernationis famæ comparandæ opportunitatem nanciscatur, servato in tanta desperatione navigio, viri Prudentis saltem nomen amittet.

Has itaque ob causas, & prudenti, uti spero, fiducia affirmare lubet, quòd dicta Methodus curationis per Venæ-sectionem & Purgationem expediendæ, plus alia quavis præstabit in Febribus quamplurimarum specierum expugnandis. Licèt enim Diaphoresis, propriè loquendo, naturæ ipsius sit Methodus, qua materiam febrilem foras protrudit, & præ cæteris maximè genuina sit, & accommodatissima, quoties natura suo relicta arbitrio dictam materiam primùm digerat, dein ritè coctam per corporis habitum blandè expellat; (quem felicem Naturæ eventum Febres per sudores abigentis cùm Medici Practici sæpe animadvertissent, hinc ansam arripiebant *Δογματικώτεροι* fidenter statuendi, Febres universas hac tantùm Methodo, non verò aliâ quavis, profligari posse ac debere). Quò tamen datò & concessò, Ars nihilominus, quantumcunque Naturæ imitationem præ se ferat, id saltem sibi privilegii arrogare nequit, ut Febribus per sudores certò exigendis par sit. Primò enim nescit Ars quo pacto materia peccans ad expulsionem subeundam ritè præparanda sit; nec si hoc sciat, certa ulla habet indicia, quibus de hujusmodi debita præparatione possit moneri; unde etiam & tempus ciendo sudori opportunissimum ignorari necesse est. Temerariam verò sudoris, nondum peracta Coctione, provocationem longè periculosissimam esse, nemo opinor nisi pertinax negaverit; cùm materiam crudam in Cerebrum impingens, oleum camino addat. Atque, prout aliàs etiam innui, saluberrimum illud Hippocratis Monitum, *Cocta non cruda sunt Medicanda*, non tam Catharsin, quàm Diaphoresin ex Arte sollicitandam spectare videtur. Etenim neminem in ægris tractandis vel mediocriter versatum fugere potest, quàm multi indies malè multentur à Vetulis & imperitis Medicis, præpostero hoc Sudorificorum abusu: his enim more receptum est, ut siquis de rigore, & capitis atque ossium dolore (quæ ut plurimum Febris mox invasuræ præludia sunt) conqueratur, extemplo illum lecto adjudicant, & sudoribus quoquo modo extorquendis toti incumbunt. A quo importuno molimine tantùm abest ut præcaveatur Febris, quæ fortè vel sua sponte, vel eductis aliquot sanguinis Unciis potuerat evanescere; ut è contra magis accensa vehementius exardescat, &

in morbum jam radicatum confirmatumque abeat. Illud insuper (ut Vetulas jam missas faciamus) notissimum est, quod sicut sudores isti qui Febre primam ingruente spontanei erumpunt, Symptomatici omnino sunt, nullatenus vero Critici; ita etiam qui primis Febris diebus Diaphoreticorum vi exprimentur, nihil magis ad morbi Curationem plerumque conferant quam solent alteri illi Symptomatici, ita præmature suâ sponte manantes, hoc est ut plurimum, ne hilum quidem. Deinde verò sicut ignorat Ars opportunitatem illam temporis quâ sudores eliciendi fuerint, ita pariter nescia est quamdiu in eisdem sollicitandis perseverandum sit. Quod si Diaphoresis ultra debitum tempus, quo scilicet materia morbum committens penitus fuerit exacta, protrahatur; humidarum istarum particularum, quibus sanguis diluendus contemperandusque erat, absumptio, febris tum motæ diuturniori, tum incremento ministrabit. Constat itaque quam in lubrico res hic vertatur; cum e contra penes Medicum sit alteram illam methodum quâ materia febrilis per Phlebotomiam & Catharsin eliminatur, pro arbitrio suo moderari. Adde quod hoc etiam nomine hæc illi alteri anteponenda est, quod scilicet si forte Medicus propositum sibi scopum non attigerit in sanando ægro, saltem eundem in nullum discrimen adducit, quod in Diaphoreticorum usu contingit, nisi convalescat. Etenim vel calor lectulo jugiter inclusi, cui præter solitum morem aliquandiu se addixit, (ut Cardiacâ quæ in hac Medendi ratione locum semper obtinent, omittamus) naturæ œconomiam confundit, & convulsivos artuum motus, aliæque Symptomata prorsus Anomala adfert. Quæ sane ideo delineari non possunt, quia sub morbi Historiam non cadunt, (quod in Symptomatis plerisque ad quemlibet morbum spectantibus usu venit) sed a superaddito tumultu & confusione oriuntur, quibus sæpè opprimitur natura, quoties curationem Morbi hac Methodo aggredimur. Quæ quidem omnia vulgo Malignitati nescio cui solent imputari.

Cujus de *Malignitate* (sive Notionem, sive Verbum dixeris) opinionis inventio humano generi longè ipsâ Pyrii Pulveris inventionem lethalior fuit. Cum enim ex Febres præsertim Malignæ dicantur, in quibus intensioris præcæteris Inflammationis gradus conspicitur, hinc Medici se ad uinum Cardiacorum, & Alexipharmacorum nescio quorum contulerunt, quo scilicet per cutis poros expellant quod somniant *Venerum*; (hoc enim est dicendum, nisi malint verbis ludere, quàm illud quod potest intelligi, serio proponere) ex quo factum est ut Regimen calidissimum Methodumque huic parem us morbis adaptaverint, quæ frigidissima tum Remedia, tum Regimen præcæteris sibi postulabant. Quod quidem satis arguitur tum in Variolarum, qui ex calidissimis in rerum natura Affectibus est, tum in Februm aliarum curatione. In quem errorem forte inciderunt ex conspectu Petechiarum, Macularum purpurearum, & cæterorum id genus *Φαιομενων*. Quæ tamen omnia in plerisque subjectis, Inflammationi, ægri sanguini jamdiu plus satis a Febre accenso superinductæ, omnino debentur. Utpote quæ

rarò

raro sponte sua efflorescunt, præter quam sub adventu Pestis ipsius : atque in initio invasionis istarum variolarum Confluentium, quæ summæ inflammationis participes sunt. In hoc enim Morbi genere Maculæ liventes in variis corporis partibus una cum Pustulis primum erumpentibus, comparant ; atque æger eodem tempore sanguinis excretionem, vel per meatus urinarios, vel cum Tussi per Pulmones, fatigabitur ; cum ita valida exagitatione, atque orgasmo ab inflammatione orto, sanguis ferociat, ut diffractis jam repagulis, in cavitates corporis præceps ruat ; Et licet Maculæ istæ purpureæ in hac Febre non a tam intenso sanguinis calore, qualis is est, qui istiusmodi Hæmorrhagias excitat, ortum ducant : ab eadem nihilominus inflammatione sed gradu remissiori producantur : & quoties ista sanguinis excretio (unicum in Variolis Symptoma cui devincendo nondum par est Ars Medica) non accedit, Refrigeranti regimini facile cedunt. Quod si Malignitatis præsentiam non tantum e Maculis Purpureis colligunt, sed ex eo quod observaverint, Febris Symptomata subinde fuisse mitiora quam quæ ejus naturæ competere viderentur, ægrum tamen magis viribus occisum fuisse quam pro ratione temporis à quo cœpit ægrotare ; Respondeo omnia hæc exinde tantum procedere, quod Natura à primo morbi impetu quasi oppressa, devictaque, non satis valida est, ut Symptomata regularia & magnitudini morbi consona exerat, omnia verò phænomena prorsus sunt anomala. Etenim perturbata Oeconomia animali & quasi disjecta, Febris exinde deprimitur, quæ obtinente genuino naturæ ductu, vigere solet. Cujus rei experimentum haud vulgare occurrisse mihi memini multis abhinc annis, in Juvene quodam ad quem accersabar. Quamvis enim ferè animam agere videretur ille, calor tamen in externis corporis partibus ita ad tactum sentiebatur temperatus, ut fidem mihi derogarent adstantes amici, quoties asserebam eum Febre laborare, quæ ob sanguinis oppressionem (cujus mole, exitu negato, quasi strangularetur) se explicare & ostendere palam nequibat : quod si venam inciderent, Febrem illicò satis violentam statim animadverterent. Apertâ venâ, & sanguine paulo copiosius educto emicuit Febris, quâ vehementiorem mihi nondum videre contigit ; quæ non nisi tertiæ quartæve demum Phlebotomiæ cessit. Sed de his satis.

Quod si rationes à me allatæ tanti non sint, ut certò ac necessario evincant, rem ita se habere atque ego statui ; attamen si suffragante experientia deprehendere hancce Febrim evacuationibus per Diaphoresin factis haud libenter cedere, habeo quod quæro. Neque enim cujuslibet demum Ratiocinatio, sed potius Experientia docere poterit, quænam Februm species Diaphoreticis, quænam verò alijsmodi evacuationibus sanari possint ac debeant. Et profecto nemo sapiens cui tam hominum quam rerum natura satis est perspecta, in iis, quæ meræ speculationes sunt, nullo autem certo experimento determinari queunt, in cujusvis Mortalis verba, quantuscunque is demum fuerit, facile juraverit : cum idem animadvertisse debeat,

Momenta Rationis ita prorsus varia, itaque subtilia esse, ut cum aliquis Theoriam quamlibet proposuerit, ita validis rationibus suffultam, ut adstantium, quotquot sunt, omnium assensum extorqueat, hunc mox alius insignioribus fortè naturæ dotibus præditus, excipit, qui sententiam istam, quæ ita pulchrè stabilita videbatur, convellit, & firmiori Argumentorum vi nihil illud esse aliud quam Cerebri Commentum, cujus nulla prorsus in natura vestigia reperiuntur, palam ostendit. Cujus jam loco is novam quandam substituit Hypothesin, majori adhuc verisimilitudinis specie innixam, & magis affabrè concinnatam; quod tamen posterius Frigumentum, pari cum superiori illo fato fungetur, quoties Tertius aliquis se objecerit, qui Secundum istum tantum ingenio vincat, quantum ille sibi præcedentem devicerat. Atque hoc iterabitur toties quoties, donec tandem ad illum proventum fuerit, quem *ultima humani ingenii potentia* consummaverit. Quam verò difficile sit hunc hominem investigare & a cæteris dignoscere, statim sentiet, quisquis non usque adeo desipio, ut hanc sibi laudem delirus arroget. Quinimo, cum jure merito suspicari liceat, esse naturas in Orbibus illustrioribus, per Universi expansum hinc illinc sparsis, pene infinitas, quæ præcellentiori longè intellectus vi pollent, quam nos homunciones; haud satis scimus, annon vel totum hominum genus Cerebrum, cogitationum officinam, habeant à Natura ita efformatum, ut non tam quid sit absolute verum, quam quid maxime conveniens, ac suis Naturis accommodum, excogitare queant. Atque hæc iis qui in Medicina faciendâ potius speculationibus vanis, quam experientiæ solido sensuum testimonio innixæ, fidem adhibent, dicta sunt.

Quod si quis hîc regerat, Annon igitur de facto experimur hanc Febrem Methodo huic quam tradis, prorsus contraria per sæpe fugari? Respondeo toto quod ajunt, Coelo distare Curationem Morbi eâ Methodo cui sola ægri nonnunquam ad sanitatem restitutio adstipulatur; & ejusdem Curationem, istâ Praxeos Methodo; cui & frequentior ægri restitutio, atque etiam Phænomena practica omnia quæ in eodem curando incidunt, pariter astipulantur. Exempli gratiâ, in Variolis. Multi ex iis qui diro calidorum & regiminis & remediorum usu cruciantur, tamen convalescent; ex adverso autem, & iis pariter feliciter cedit, quorum Curatio methodo planè contrariâ tentatur. Jam quo pacto litem hanc finiemus? Quænam Methodus est præferenda? Hoc planè modo certissimè dijudicabimus. Nempe si in illo regimine priori exploratum habuero, me quanto magis ægrum excalefacio, tanto magis Febrem, Inquietudinem, Delirium cæteraque Symptomata intendere ac promovere; è contra verò deprehendero, eundem, ubi moderatè refrigeretur, tanto sedationi temperamento esse, tantòque minùs tam à Febre quam ab aliis Symptomatis vexari. Addo quod servatâ debitâ illâ carnis musculosæ temperie, quæ pustularum tum augmento tum maturationi maxime competit, & grandiores sunt pustulæ & liberalius implentur, quam si æger nimio suffocaretur calore. Posito hoc utroque casu, satis manifestum esse arbitror quàm potius Praxeos Methodum.

Methodum sequi debeamus. Pariter in illâ, de qua nunc agimus, Febre, si comperiar ægrum quò magis calefit, eò magis non tantum Phrenesi, Maculis Purpureis, Petechiis, &c. obnoxium esse: sed & Febrim insuper symptomatis omnium generum irregularibus & Anomalis exinde stipari. E contra verò si alium ægrum eâ quam jam proponimus Methodo tractatum, ab his symptomatis prorsus liberum observaverim, ratio dicat posteriorem hunc Praxeos modum, longè alteri præstare, tametsi uterque æger ita diversimodè curati ad sanitatem revertantur. Quòd si plures hâc viâ quam aliâ istâ mortem effugiant, eò facilius solvitur Controversiæ nodus; quâ de re non est mearum partium iudicium ferre; ne mihi & meis plus æquo fa-
veam.

Atque hæc de hac Febris specie. Quò usque illa durabit non hariolor. Neque satis scio annon sit initium aliquod spirituosius ac subtile; & quasi primordium *Febris* illius *Depuratoriæ* jam antiquatæ, quam insecta est immanissima illa Pestis. Sunt profectò Phænomena quædam, quæ me ut hoc credam, quadantenus inducunt, quandoquidem non tantum Febres Intermittentes propriè dictæ, præsertim *Quartanæ* hîc illic sparsæ adhuc restant; verum etiam nonnullæ ex his Febribus Continuis subinde in Intermittentium castra, maximè Autumno jam pendente, commigrant. Ut jam taceam Exacerbationes in hac Febre supra memoratas: eorum Paroxysmorum qui Febres Intermittentes comitantur, genium aliquo saltem modo referre. Tum etiam quod hoc morbo laborantes ad Vomitionem satis sunt propensi. Quâ de re tamen nihil prorsus pro comperto venditare animus mihi est, quoniam non jam mihi succurrit, qua facie Febris Depuratoria se primum extulit, prout libro de Morbis Acutis, Sect. I. Cap. III. his verbis subindico. *Quanto autem jam tempore prædicta Febris continua inva-*
luerat dicendo non sum, quin mihi hætenus satis fuerat ad generalia Fe-
brium Symptomata attendere; utpote qui nondum vel juxta varias Annorum
crases, aut ejusdem Anni varia tempora easdem distingui posse animadvert-
ram.



THOMÆ SYDENHAM,

M. D.

De Febre Putridâ Variolis Confluentibus Superveniente.



U^M vel ætas jam provectior & in occalum ruens, vel adversa quacum jamdiu conflictor Valetudo, opportunum forte spatium posthac non concesserit, quo nuperas aliquot observationes a me (tametsi nimis serò in vitâ meâ) factas, circa *Febrem Secundariam Variolis Confluentibus* supervenientem, in publicum edam; veniam dabit Lector, opinor, si paucula quædam de hoc Affectu, quantumvis a morbo quem superius tractavimus satis abhorrente, pergâ subnectere.

Jamdiu alias demonstravi quantum interit inter variolas generis *Distincti*, & *Confluentis*: in hoc scilicet quod qui *Distincto* genere laborat, vix opis medicæ indigus, sponte suâ, & naturæ vi convalescet; nisi forte ab initio Diaphoresi in lectulo continuo indulgerit. Namque, uti pridem alibi adnotavi, qui *Discretis Variolis* laborat æger, cum satis promptè sudoribus diffuat, ac sibi omnia bona promittat, si morbi, ut sperat, virus per cutis poros hoc pacto amandaverit; diligenter ideò huic methodo insistit, tum remediis Cardiacis intrò assumptis, tum regimine calidiorè, ut par est, adhibito; (atque hæc eo facit lubentius, quod tum ab hac Methodo in principio sibi melius videatur habere, tum etiam ad malè fundatam Adstantium opinionem propius accedat.) Tandem verò eliminatis per *Diaphoresin* particulis istis, quæ ad pustularum elevationem, atque intumescentiam faciei debuerant facere, die *Octavo* quæ turgescere, & per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat facies, flaccida è contra reperitur, & albescunt interstitia, licet interim rubescant pustulæ atque eleventur, etiam post ægri mortem. Qui ad hunc usque diem nullo negotio manaverat sudor, jam subito suique sponte evanescit, neque remediis ullis Cardiacis, vel etiam calidissimis, revocari potest. Æger inter-

rim Phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine vehementibus; Urinam parcè reddit, ac frequenter; ac tandem paucissimarum horarum spatio amicorum spem fallit, & ad plures migrat. Quando idem ille sine ullo vitæ periculo à morbo convalesceret, si naturæ rem committens, nulli se prorsus regimini subjecisset.

At in *Variolarum Confluentium* genere longè aliter se res habet: Licet enim hæc (nisi sanguinis sive per pulmones, sive per meatus Urinarios excretio primis diebus accedat) nec adstantes admodum perterrefaciant, nec ægrum in discrimen aliquod vitæ adducant ad primos morbi dies; postea tamen istis diebus, sub morbi exitu, quibus ægrum maximè periclitari jam olim monui, ita derepentè ad incitas redigitur æger, ut an Vita, an Mors insequatur, pariter incertum sit. In horum numero *Undecimum* pono (si à primo morbi insultu computes) sc. in minimè crudo, at maximè vulgari Confluentium genere: *Decimum quartum* in crudiore adhuc; *Decimum Septimum* verò in omnium, quæ passim obviæ sunt, genere crudissimo. Tametsi æger nonnunquam, sed rarius, non ante *Diem Vicesimum Primum* fato defungatur, pustulis usque ad id tempus ita incrustatis exsiccatisque, & in carnes quasi impactis, maxime in ipsa facie, ut ad separationem nullâ arte queant perducì. At verò Undecimo die æger, ut plurimum primum periclitari videtur, Febre atrociori, inquietudine, aliisque symptomatis una invadentibus, quæ mortem in propinquo esse denunciant; à qua æger, nisi Ars Medica intercesserit, plerumque opprimitur. Quod si hoc die non succumbat morbo, utrique illi posteriores, quos indicavimus, adhuc metuendi restant. Quin imò per spatium illud omne quod inter Undecimum & Decimum Septimum interjacet, appetente Vespera, molestissimo inquietudinis quasi paroxysmo quotidie vexatur; & Mors quasi vi, & armis protelatur. Porro ostendi hanc causam esse majoris minorisve, in his Variolarum generibus, periculi ægroto impendentis, quod scilicet in genere *Discreto* cum Phlegmonæ sive tumores cum inflammatione (cujusmodi sunt pustulæ omnes ubi primum elevantur) pauciores extiterint, ac proinde non nisi exigua Puris quantitas in sanguinem per Circulationis leges foret regerenda, ubi illæ jam caperint maturescere; nullus ex hac parte metus est ne Febris nimium insurgat, cum Natura impressionibus in sanguinem factis à tantillo Puris, cohibendis faciliè par sit. Cum verò in genere *Confluentium*, ubi corpus fere universum his Phlegmonis protegitur, quæ postmodum in Abscessulos rotidem facessunt, tanta Puris vis, diebus præfatis [in quibus Pustulæ duce Naturâ auxilium suam, vel debitam maturitatem utplurimum obtinent] per venas in sanguinem reducitur, tanta item halituum putridorum copia ab omni corporis jam quasi suppurati undique superficie, in sanguinem subrepat, ut Febris ex hac occasione excitata, naturæ vires penitus prosterneat: atque ita extinguitur tandem æger, partim à Febre, partim à Veneno quod sanguinis massam infecerat, jugulatus. Quapropter quando ægri incolumitas

usque adeò à Variolarum paucitate, periculum verò è contra ab earundem austiori numero pendeat; dictat Ratio, vel etiam sensus omnibus communis, Periti Medici esse ita non materiam Variolosam, sub principio Morbi, Regimine & Cardiacis calidioribus vehementer propellere, (unde nimia fit assimilatio materiæ morbificæ in sanguine contentæ, totâque corporis substantia quasi in fomitem morbi faceffit) ut omnem potius operam in reprimendâ tam enorini & subtili Inflammatione collocare debeat. Nempe educto ante omnia è brachii venis sanguine, si vel levis fuerit suspicio (sive à florente ægri ætate, sive ex eo quòd sanguinem liquoribus generosis accenderit, sive quòd vehementiores dolores in aliqua corporis parte fuerit perpeffus, sive denique ab immani Vomitione,) Variolas jamjam exituras ad Confluentium speciem esse referendas; postea verò propinato *Emetico*, ad eundem scopum collimabit. Cùm verò nihil æquè ægrum percalefaciat, nec proinde nimis copiosam materiæ Variolosæ assimilationem æque promoveat, atque ægri jugis in lecto decubitus: ego illum ab usu lectuli interdum semper arceo; usque ad *Sextum diem* à prima morbi invasione, sive ab eruptione pustularum *Quartam*, quo tempore omne pustularum agmen jam in conspectu est. Posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem: at non pluribus densioribusve stragulis coopertum aut luculentiori in cubiculo foco illum uti sino, quàm quibus sanus cùm esset solebat uti. Interim Cerevisiæ tenuioris aliorumque liquorum Refrigerantium qui ægro sunt acceptissimi, usum liberalem concedo. Quandoquidem verò non obstante vel temperatissimo regimine, æger nihilominus in calores, deliria & molestas inquietudines frequenter incidet; *Hypnoticum* præscribo singulis noctibus, sed paulò temporius quàm pro recepto more, sumendum: quoniam in hoc morbo quasi Paroxysmus quidam, sive exacerbatio caloris & inquietudinis quotidie sub vespèram ferè reperitur. Quæ hic traditur Methodus & ad præcavendum justo uberiores Variolarum proventus, (unde maximum ægro periculum intentatur, ut suprà docui) & ad conciliandum tum incrementum Pustulis, ubi jam omnes exierint, tum debitam postea maturationem, accommodatissima est.

Attamen (quod sanè dolendum est, cùm florentissima hominum ætas hâc ferè strage deleatur) tum his quæ præcipimus, tum aliis omnibus quæ hætenus invenit Ars Medica præsidii nihil proficientibus; sæpènumero æger, licèt usque eò admodum periclitetur, tamen vel *Undecimo*, quod usu venit die, vel alio aliquo istorum quos variis speciebus Variolarum Confluentium ceu *magis fatales* assignavi, vehemente Febre corripitur, unâ cum suffocatione & jactatione inquietissimâ, & de tanta spe decidens subito moritur, attonitis & stupentibus amicis, qui ad hoc usque punctum ægro benè ominabantur. In frangendo improviso hoc morbi impetu, cùm prius is omnia fecerit quibus præcavere potuerat, maximoperè desudabit Medicus. Quem in finem seriò perpendendum

pendendum est, Febrem illam adventitiam, quæ Undecimo die Variolis Confluentibus laborantes adortur, morbum esse tam ab ipsis Variolis, quam ab ista Febre quæ vel earum eruptionem præcedit, vel primis nonnunquam diebus à Phlegmonarum Inflammatione gignitur, prorsus diversum. Nihil enim est aliud quàm *Febris Putrida*, propriè dicta, particulis putrescentibus, & à Pustulis jam adeptis maturitatem suam inquinatis, in sanguinem, uti dixi, resorptis ortum debens, quarum noxiâ & naturæ inimicâ qualitate æger eodem tempore, & pessimâ Febre, & Veneno laceffitur. Quamobrem ea sola in remediis huic malo cedere posse, Prudens quispiam existimaverit, quæ ad retundendam Secundariam hanc Febrem, quam Putridam appello, maxime faciunt. Id verò nihil efficacius præstat quàm copiosa sanguiniseductio, quo pacto vitiatæ illæ particule quæ morbi sunt fomes, confestim à sanguine exulant. Neque huic Praxi, si quid ego judico, Variolæ in quo jam sunt statu, vel minimum intercedunt: Jam enim pustulæ nullo modo introrsum agi possunt; adeò ut si æger morbi tempore Fatis cederet & cadaver in terram frigidam exponeretur, attamen Pustulæ jam in duritiem incrustatæ, nec intra cutim se recipere, nec minimam molis suæ partem amittere poterunt. Nec sanè cum Variolis jam nobis res est, sed cum alio prorsus morbo, nempe *Febre Putridâ*. Has ob causas sequente Methodo, à quo postremas de Variolis observationes in publicum edidi mihi compertâ, feliciter usus sum; quam si omittas nec aliam video, nec conjecturâ assequi possum, quo pacto æger ita certò queat liberari. Cum itaque ad has incitas redactus fuerit æger, & ex inusitata symptomatum immanitate, statim animam acturus videatur, nisi quis *Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς* præsentissimam opem adferat; in hoc inquam casu, sanguinis ℥x. vel xij. ex eo brachio in quo Pustulæ rariores majorem feriendæ venæ commoditatem fecerint, quamprimum sunt mittendæ. Quamvis enim Paregorica, vel lectuli interdiu abdicatio primis morbi diebus etiam omisâ venæ sectione, Orgasmo vel Paroxysmo, cum nocte ut plurimum ingruenti, debellando queant sufficere; attamen per hos dies Febris Secundariæ, nulli alteri adminiculo securè fiditur nisi copiosæ sanguinis detractio, quâ solâ orgasmus per id temporis desæviens tutò sedatur. Vesperis Anodynum, uti prius, largâ dosi exhibendum est (ad quod jam tanquam ad sacram Anchoram confugimus) atque ita deinceps tam manè quàm serò, alicubi etiam & hoc sæpius. Est enim diligenter observandum, quòd in quibusdam Orgasmus ita supra modum efferatur, ut etiam prælargâ Paregorici dosis ejusdem impetum usque ad 12. horarum spatium subjugare vel sistere nequeat, quo in casu omnino necesse est ut dicta dosis octava quaque hora repetatur.

Cum verò sub ultimis morbi diebus haud rarò accadat, ægri alvum, partim à morbi natura, partim à magna Paregoricorum vi, quorum opem planè deposcebat medendi ratio, ita constipatam esse, ut tum ferè suffoce-

tur ille, tum Febris ad eum gradum ascenderit, ut jam de ægro pæne conclamatum videatur; duro huic nodo durus Cuneus aptandus est, & rebus sic stantibus longè minus ægro periculi erit ab assumpto Cathartico Leniente, quàm à Febre eò vehementiâ ab alvinarum fæcum retentione profecta. Hic ego satis feliciter ζιβ. *Electuarii Lenitivi in Aq. stillatitiæ tenuioris*, (ex. gr. *Cichorei*, vel *Aq. Lactis Alexiter.*) ζiv. *solut. propinavi*. Qui quidem Haustus licet tum ob alvi constrictionem huic Affectui solemnem, tum etiam ob diuturniorem Hypnoticorum usum haud ita subito ventrem exsolvat, plerumque tamen si manè deglutiatur, ante noctem dejectiones aliquas parit. Quod si minus præstare valeat, at tamen Paregoricum vesperi assumendum est, imò & citiùs, non obstante Cathartico nuper assumpto, si modo inquietudo ingens aut ægritudo aliqua insignis periculum minitetur, nè æger hoc præsidio destitutus, dum dejectiones nos præstolamur, luce privetur. Nec æger damni vel minimum ex hoc tam leni Cathartico capiet, si nihil prorsus efficiat ad dejectionem provocandam. Si itaque primo die votis non respondeat, iteretur proximè sequenti; quæ secunda dosis priori in suppetias data, rarissimè Medici opem frustrabitur. At si primo die id egerit, ut hujus saburræ quantum satis in præsens est, subduxisse Medico videatur, atque Æger exindè melius se habere coeperit, secunda dosis in aliud tempus potest differri. Atque hæc ratione tam Venæ-sectio quàm Catharsis per intervalla repeti possint, prout Febris mos, atque ægri inquietudo postulare videantur, donec tandem res in vado sit. Veruntamen in Catharfeos negotio illud probè notari velim, ægrum non esse purgandum nisi facessente jam morbo, v. gr. *die decimo tertio*, aut eorum aliquo qui illum sequuntur, nec per istos etiam dies, nisi sanguis à quo secundaria Febris invasit fuerat imminutus.

Sed ut quantum in me est, Praxi in hoc morbo ultimam manum imponam, paucula de *Sputo Sanguinis*, ut & de *Mictu sanguineo* Variolis supervenientibus in medium proferre non gravabor. Utraque hæc Hæmorrhagia, ut olim adnotavi, sub morbi initio contingit pustulis nondum erumpentibus, vel si in quibusdam locis se ostendant, in plerisque tamen aliis adhuc sub cute densæ latent, atque ejus sunt generis, quæ in maximè confluentes adolescerent, nisi jam dictum Symptoma ægri morte morbum finierit, maculæ interim purpureæ hic illic superficiem corporis obsident, tristem eventum interminantes. Verùm tametsi debita sanguinis contemperatione maculæ ejusmodi auferantur, attamen tam mictus sanguinis, quam violenta ejusdem e pulmonibus eruptio indubiè mortem prænunciare solent. Veruntamen tremenda hæc difficultas superari etiam possit, & ægri vita in tuto collocari. Etenim cum hæc Symptomata intensæ sanguinis inflammationi, ac proinde summæ ejusdem tenuitati originem suam debeant; Remedia ista, quæ sanguinem contemperant, ac pariter quæ vi-

quâ pollent, astringendi incrassandique eum minus fluxilem reddunt, Hæ-
morrhagiis hisce apprimè succurrunt. Quamobrem post unicam sanguinis
liberali manu educationem Paregoricum exhibeatur, ut :

℞. Aq. papav. rhæad. ℥ij. Laud. liq. gut. XIV. Aceti distillat. ℥iij. Syr.
de Mecon. ℥ss. Mf. f. Haustus.

Deinde sequentia vel his similia præscribantur, donec Hæmorrhagia pror-
fus evanuerit.

℞. Trochisc. de Terra Lemn. & boli Armenæ ana ℥j. Terræ sigill. Lapid.
hæmatit. sang. Draconis, & Corall. rubri præparati ana ℥ss. Mastich.
& gum. Arab. ana ℥j. M. f. pulv. subtiliss. cujus cap. 36. tertia qua-
que horâ ex Cochl. uno Syr. de Symphyto, superbibendo cochl. IV. vel
V. Julap. sequentis.

℞. Aqu. Plantag. & germin. Quercus ana ℥iij. Aq. Cinnam. hordeat. ℥ij.
Syr. de Ros. siccis ℥j. spirit. Vitrioli q. s. ad levem aciditatem.

Interim singulis noctibus Paregoricum præscriptum propinetur.

Emulsiones item ex 4. sem. frig. maj. cum sem. papav. alb. magnopere
conferunt.

Cessante verò hæmorrhagiâ reliqua per decursum morbi agantur, prout
in *Variolarum Capite* traditur.

Antequam finem faciam, hoc adjiciam; quod quoties guttulas aliquot
Laudani liquidi usurpandas præscribo, *Laudanum* meæ descriptionis intelli-
go; cujus formula in libro nostro *de Morbis Acutis*, capite de *Dysenteria*
habetur. Et quòd *Syrupum de Meconio* illum volo, qui conficitur ex ℥xiv.
Capitum Papaveris albi benè siccatorum, & (post macerationem in Aquæ
font. ℥viij. ad horas 24.) probè coctorum, dein expressorum quàm for-
tissimè; quorum colaturæ adduntur Sacchari ℥xxiv. & in Syrupum coqui-
tur. Has enim duas Præparationes in suo genere efficacissimas esse judi-
co: præsertim *Syrupum de Meconio* cujus ℥j. plus præstat quàm ℥ij. alterius
istius, in quo Papaverum capita humidiora usurpantur, liquor non ita for-
titer exprimitur, & loco *Albi* quandoque *Capita Papaveris Rhæados*, quæ
paululum virtutis habent, partem ita magnam suppeditant. Quoties itaque
non satis mihi constat de alterutrius horum Paregoricorum viribus, utro-
rumvis loco, *Laudani Londinensis solidi* sesquigranum, vel etiam gr. ij.
soleo præscribere in Aqua appropriatâ soluta; quo pacto ab omni errore
& mihi, & ægro meo caveo.

Quandoquidem in totò Clariss. Autoris nostri Opere, de Febribus in genere,
ac de Pestilentialibus, Contagiosis, aliisque Malignis in Specie, abundè actum
est; Omissâ tamen Febre Miliari, quæ inter has ultimas à Clariss. Hamilton
recensetur: Ejus in hóc Argumentò Tractatum jam tradimus, qui hic est.

DAVIDIS HAMILTON,

Equitis Aurati, Regalis Societatis Londinensis
utriusque Socii, nec-non Magnæ Britanniae
Reginæ Medici Ordinarii,

TRACTATUS

FEBRE MILIARI seu VESICULARI.

Accessit FEBRIS MILIARIS Historiarum Fasciculus.

Ad Lectorem PRÆFATIO.

TRACTATUI naturali ordine prodromo, sequentem
addendum censui eâ ratione, ut Praxeos specimen, se-
cundum normam mihi usitatam, & à me jam antè propositam,
Lectori exhiberem. In quam rem utiliùs præstandam, præ
aliis Morbis, Febris Miliaris sive Vesicularis naturam, curan-
dique Methodum describendam elegi; quòd Medicorum ne-
minem, de hâc Febre, tanquam specie diversâ, saltem justo
volumine, hætenus scripsisse viderim: Cùm tamen in quam-
plurimis, vel in Chronicum Morbum immutari, vel brevi exi-
talem fuisse, noverim. Nonnunquam enim id Ægrorum, in
hujus Morbi principio mitiori, de seipsis negligentia, aut diu-
tiùs elongati impatientia, evenit: Nonnunquam etiam Medi-
corum fallacibus ejus Symptomatis cœcatorum ignorantia: Aut
tandem, ubi visitationes necessariò continuandas omittunt, In-
tempestivo metu, ne Lucri gratia Curationem procrastinare
videantur. Quamobrem & existimavi operæ impendendæ pre-
tium, si his meis Observationibus, ab inspectis Ægris diligen-
tissimè

tiffimè collectis, Medicis Junioribus Lumen præberem, & hoc facto Peritos excitarem, suas etiam in lucem proferre. Quo autem ea, quæ in hac Dissertatione dicta sunt, magis adhuc firmentur, clariusque illustrentur; Historiarum huc pertinentium, fufiusque exaratarum, Fasciculum subjiciendum curavi. Et firmè credat Lector, me summâ ubique veracitate usum fuisse.

De Nomine hujus Morbi, Gehere, & Speciebus.

Fbris Miliaris, à Pustulis sive Vesiculis, Seminis Milii speciem quodam modo præ se ferentibus, & præcipue circa Partes superiores apparentibus, Nomen accepit. Mihi tamen videtur potius nominari debere Febris Vesicularis; quia Pustulæ sunt Vesiculæ, primò sero limbo, deinceps subalbo, Perlarum colore non absimili, plenæ.

Non desunt, qui Febres solummodo Pestilenciales, Petechialesque opinantur Malignis adnumerandas. Censeo tamen & alias, Specie diversas, Malignarum Classi debere referri.

Primò, quascunque febres vel contactu, halituve, vel quavis alia Contagione trahantur.

Deinde, & istiusmodi Febres quas statim ab Initio Dolor vehemens, & alicui Parti affixus comitatur; viz. Capiti, aut Intestinorum Regionumve Regioni, aut etiam Artibus. Pariter ac si Ægrotus Cephalalgia, vel Dolor Colico, aut Nephritico, vel Podagrâ, aut Rheumatismo, vel etiam Doloribus Parturientis, tanquam originali Morbo, laborasset. Cum tamen istiusmodi Febris Miliaris Symptomata haud minus cessura sint Remediis, quæ, ubi

Morbi ita nominati primarii sunt, valere solent.

Porro, & in quibus Spiritus Animales subito opprimuntur & deficient; Et ubi prædicta Symptomata à nulla Causâ evidenti, sed à veneno quodam latente, pendere videntur: ab Antiquis Occultæ Qualitatis, à Neotericis vaporum nomine designato.

Vel demum, ubi ex Causâ, ut videtur, non absimili, spem Salutis subitanea Mors excipit. Quæ omnia, ut Malignitatem ostendunt, ita & in Febre Miliari observavi accidisse.

Et notatu dignum est, hanc Febrim eadem Malignitate ac Petechialis apud Indos grassari.

Hæc Febris specie duplex est, Simplex & Composita. Simplicem dico, quoties Pustulæ erumpunt nullæ, præter Miliæ, de quâ hic diserturus sum. Complexam, cum Pustulæ Papillares rubræ, Miliaribus sint interspersæ; quæque ubi solitariae sunt, a Rash, vulgò appellantur.

Et notandum est, Pustulas Miliæres nonnunquam Variolis immisceri, easque, dum intumescunt Variolæ, paulatim exarescere. Verum post exsiccatas Papillares superstites manere.

Febris Miliaris Descriptio.

QUO melius Febris Miliaris Historiam perscribam; Antecedentia, Concomitantia, & Consequentia enumerare placet.

Antecedunt, Constitutio Corporis imbecillis, sive ea Naturalis est, sive ex Evacuationibus supra modum factis, Victuve nimis parco Adventitia: Sanguis serosior: Mens imbecillior & timidiuscula, ac facilius læsa ab externis, ut in Foeminis & effoeminatis Viris. Cogitatio multa & intensa, aut mœstitia. Obstructio, vel Ulcus in aliquâ parte cum Dolo-
re conjunctum. Unde Dolo-
re Colico, aut Calculo, aut Renum ulcere, Podagrae diu affecti, huic Febri magis sunt obnoxii. Calor etiam internus in Mulieribus, cum vel sine Siti, & præcipue sub tempus Puerperii; unde & Partus Dolores minus solito vehementes sunt, & Spiritus sine causâ evidente admodum deprimuntur, cum oppressione Pectoris suspiria cogente. Quibus, ut in aliis Febribus, hâc etiam ferè semper accedit Frigus externum.

Hanc Febrem sæpe comitatur Dolor, Colici, Nephritici, Pleuritici, Rheumatismatici, vel Parturientis æmulus. Nec non oppressio Pectoris, cum Depressione Spirituum. Dolo-
re prædicto post biduum triduumve recedente, totius Corporis horror, deindeque Frigus Calorque alternatim oriuntur. Lenior tamen hâc Calor est, quàm in Febre vulgari continuâ, & naturali propius accedit: Dum vola manus Calore

magis intenso afficitur, pars convexa mitiori. Pulsus etiam frequens est, sed debilis. Spiritus sæpe maximè deficient, & quasi ex magno pondere Pectus oppressum edit suspiria. Somnus obrepens subito est interruptus; omnium penè Symptomatum maximè inseparabile. Sæpe enim plures dies noctesque sine Delirio, aut Capitis Dolo-
re, insomnes sunt: ferè multò diutius quàm in aliis Febribus. Cujus rei Exemplum vidi, præ aliis singulare, in Foeminâ quadam Illustri, quæ sub cura Doct. Francisci Bernard, in hâc Febre, sine Delirio, Dolo-
re Capitis, per Mensem passa est vigilias. Lingua nunc Aphthâ albâ obducta est, nunc sanorum similis. Urina, nonnunquam, ferè ut Aqua communis, pallida, aliàs, naturalem præ se fert colorem. Quo Symptomate decepti Juniores Medici, frequenter ad Vapores, uti vulgò loquuntur, referunt. Hâc Febre correpti aliquando Ventriculi ægritudinem, præcipue post somnum, patiuntur, & nonnunquam Diarrhoeam, vel ex suâ negligentia, vel ex malâ Praxi, scilicet, dum Calefacientia, in Paroxysmis Hystericis usitiora, sine Diaphoreticis, præscripta sunt. Unde, loco placidi naturæ progressus, Materiam Morbificam per Diaphoresin expellentis, rapida Fermentatio eandem in Intestina deturbat. Alvus nunc astricta, nunc cum Ventriculi ægritudine, & Intestinorum Doloribus, soluta est. Modò multum sitiunt, modò parum. Aliquando manus & lingua, Medico porrectæ, tremunt; & Ægri quasi cum Tremore loquuntur. Motibus etiam

Con-

Convulsivis, Delirio, ac difficili Respiratione haud rarò premuntur. Quorum Symptomatum exacerbationes, Febris Intermittentis Paroxysmorum instar, recurrunt. Pectoris cum suspiriis oppressio, vel sine causa evidente spirituum major defectus, Vigiliæ, & Spirituum commotio, a *Hirry in the Head* vulgò dicta, quoties Ægri ad somnum se componunt, nec non Pulsus frequens & debilis, quibuscunque aliis Symptomatis conjuncta, Pustulas Miliare eruptiones semper prænunciant. Quæque omnia persistere solent, donec Pustulæ Miliare emineant; deinde à plerisque Ægroti liberantur.

Hæ Pustulæ, plerumque in Pectore, Collo, & Digitorum interstitiis, interdum etiam in toto Corpore sunt perspicuæ; &, paulatim indies auctæ, tandem evanescent; Cuticulâ Pustularum sedibus subscabrâ manente. Nonnunquam pruriunt, præcipuè in Febre Miliari complexa; ubi scilicet Pustulæ Papillares rubræ permixtæ sunt Miliaribus. Et observare est, hanc Febrem, quò simplicior est, Symptomata habere eo leviora; Quæque hîc ratione, tam incautis Medicis, quam Ægris, incuriam frequenter creat. Unde Febris hæc vel magis fit periculosa, vel Morbus alius sæpe oritur. Ex minori enim cautelâ, quam primo loco adhiberi oportuit, gravioribus Symptomatis, scil. Ventriculi ægritudine, Appetitu diminuto, Calore interno, oppressione Pectoris, Spirituum depressione & suspiriis, Caloris & Frigoris irregulari recursum, vigiliis, & similibus, aliquando incipit.

In hujus Febris declinatione sudore frigido sæpe madent manuum superiora.

An Pustulæ Miliare certo die apparere soleant, difficillimum est observare: Cùm prima hujus Morbi facies, & de eodem Patientis narratio, adeò sint incertæ. Quantum autem assequi possum, eas opinor decimo vel undecimo die, à principio, plerumque pullulare; si modò Febris regularem habeat progressum: & circa decimum & octavum, vel ubi Materia morbifica abundat, circa primum vel secundum & vicefimum desiccari.

Tempus Eruptionis observare, tentavi primò in iis Fœminis, quas tertio à partu die advocatus, de Horrore vel Frigore, & Calore subsequente querentes audivi. Cùm enim Pustulas Miliare in illarum Pectore & Collo inspectis viderim, eas judicavi à multis diebus Febre Miliari correptas fuisse. Et scrutinio factò ab usque Morbi initio, vel Calorem præternaturalem, vel partis alicujus Dolorem, cum vel sine siti, & cum maximâ Pectoris oppressione ac suspiriis, Spirituumque defectu, ante partum sensisse comperi. Quæ Symptomata, cùm ab appropinquante Partu pendere putarentur, à Partu se bene habituras sperabant. Deinde, partus Dolores, etiam si solito sint mitiores, eos tamen, maxima Pectoris oppressio cum suspiriis, spirituumque defectus, (ab Obstetricibus Timor & Vapores dictus) pulsusque frequens ac debilis subsequuntur, Pustulasque Miliare prænuntiare solent. Quarum Eruptioni in Puerperis, ad sudorem

rem in Lecto compositis, via sternitur. A primo itaque Calore interno, vel Dolore ante Partum, ad Eruptionem à Partu, dies undecim frequenter numero. Verùm Ægrotæ sui status ignorantia & præpostera narratio, Medici prognosin ut plurimum adeò confundit, ut ipsissimum diem vel curiosissimus haud indigitare noverit.

Febris Miliaris consequentia, quatenus meæ observationi occurrunt,

sunt Tumor Femorum, Tibiarum, Pedumque, non semper indolens, extumescencia & abscessus Mammarum; depravatâ Memoria, Fluxus Lochiorum nimius, & Urinæ; affectus, Hypochondriaci aut Hysterici æmulus; Calor internus, cum debilitate, languore, & diminuto Appetitu conjunctus. Horum, inquam, nunc hæc nunc illa contingunt, quoties Febris, vel ex suo malo more, vel Medici malâ Praxi, infelicem habet exitum.

De Febris Miliaris Causis Internis.

QUOD ad Causas Febris Miliaris internas attinet, partim à Sanguinis, & succi nervosi serositate nimia, & quâdam Acidâ Acrimoniâ; partim etiam à Succo Nervosi nimia commotione, pendere videtur. Quæ mea conjectura ex hujus Morbi præcedente Historiâ, ex Medicamentorum huc pertinentium effectû, & ex Cadaveribus hâc Febre mortuorum dissectis, probabilis videtur.

Sanguinis Acrimoniam seu Aciditatem arguunt secretiones huic Febrî peculiare. Urina enim hic magis decolor est, sanorumque similior; emittiturque majori copiâ, quàm in Febre Ardente, ubi Sanguis & Succus Nervosus Particulis Sulphureo-salinis imprægnantur. Et experimur Urinam decolorem copiosè effluere, ex usu Oxymellitis Scillitici in Hydrope incipiente. Ptyalismus etiam in hâc Febre plerumque copiosior est, quàm in Ardente. Ideoque hic sitis ut plurimum minor est, & Lingua viscoso humore

minùs obducta. Porro, & Pustulæ Miliare, quæ sero plenæ sunt Vesiculæ, ab Aciditate prædictâ secerni videntur: Non secus ac à quovis Acido affuso, fit Lactis serum.

Idem patet à Medicamentis juvantibus, Testaceis scilicet, ut Oculis Cancrorum & similibus, quæ Acida absorbent.

Nec minus ex Lædentibus. Omnia enim Sapore Acida, ut succus Limonum, &c. in hâc Febre nocent.

Serositas Sanguinis probatur à Calore, qui hic mitior, quàm in Febre Ardente, sentitur. Et quo simplicior est hæc Febris, eo mitior est Calor. Nam ubi Pustulæ rubræ, a Rash vulgò dictæ, Miliaribus sunt interspersæ, omnia Symptomata Febrem magis ardentem ostendunt. Et Anasarcâ laborantes, ubi Sanguis sero abundat, licet Febre aliquando Miliari, & Symptomatis Nervosis, vix tamen unquam ardente afficiuntur.

Idem probat tempus, quo Pustulæ Miliar-

Miliares erumpunt. Quæ ob Sanguinis serositatem, indeque Calorem & Motum mitiorem, non tam citò ac Papillares & Variolæ, ubi Sanguis sulphure magis abundat, expelluntur. Quemadmodum simplex Aqua, tardius quàm Vinum aut spiritus vini ebullit. Quam etiam ob Causam Spiritus Animales in hac Febre primò commoventur.

Remedia hujus Febris Curationi adhibita idem ostendunt: nimirum, continuata Diaphoresis, & Vesicatoria successivè apposita. Quæ serositatem Sanguinis, & Succum Nervosi diminuunt, eodem tempore quo eorundem Aciditatem edulcorant. Adde, & Curatio hujus Febris à Natura perficitur, Sanguinis serum, ex aliquâ parte, in generatione Puscularum Miliarium, eliminando. Neque liquores diluentes & aquosiores, hîc adeò multum, ac in Febre ardente, profunt; ubi potius Pulli Gallinacei Jusculum copiosè bibendum est. Porro, & quæcunque feri diminutionem per Diaphoresin impediunt, Lædentibus adnumeranda sunt; ut Frigus externum, & Medicamenta Calefacientia sine vi Diaphoretica.

Tam aciditatem Sanguinis, quàm Serositatem, Cadavera eorum qui hâc Febre moriuntur, satis perspicuè demonstrant. In quibusdam enim Partibus Sanguis coagulatur, & non secus ac Oleum ex affusione spiritus Vitrioli nigrescit. Idem tamen Sanguis extravasatus Linteum valde pallido colore imbuunt. In aliis Partibus, adeò serosus est, ut & ipsa Vasa Sanguinea verè palleant. Cujus rei instantiam profero, in sequen-

tium Historiarum ultima. Et nuperimè vidi non absimilem, in Juvene quodam Illustri, annos circiter unum & viginti natos, hac Febre mortuo, ex omisâ Morbi Curatione tempestivâ. In cujus Abdomine, Thorace, & Cranio apertis, Vasa, quibusdam in Partibus, Sanguine nigricante & coagulato distenta erant. Sanguis tamen è Vasis discissis elapsus pallido colore Linteum infecit. Et non infrequenter experimur, è Venâ sectâ Sanguinem rutilantem fluere; à Vino nempe generoso copiosè ingesto: Colore tamen pallido linteum imbuti suam Serositatem ostendere. In aliis hujus Cadaveris Partibus, Sanguis serosus videbatur, & Pallido Colore tinctus; ut & Cor ipsum. Plexus etiam Choroides, ob copiam Sanguineorum Vasorum ipsum formantium, semper ferè rubicundus, maximè pallebat: tum Acidi tum Serosi Sanguinis argumentum. Neque dubitandum est, Succum Nervosum, à Sanguine ortum, similem Naturam adeptum fuisse.

Intemperiem Febrilem in Liquore nervoso sive spiritibus Animalibus primitus accendi, Symptomata Nervosa primò occurrentia, nempe Dolor, Spirituum depressio, Vigiliæ, & similia supra enumerata, probant. Cum interim Symptomata, quæ Sanguinis fervorem Febrilem indicant, uti Calor vehemens, pulsus fortis, Capitis Dolor, Sitis, Linguae siccitas, Urina rubicunda & parca, &c. omnino defunt. Demum in hac Febre Juvantia, nempe Mens spiritusque ab omni tumultuario motu immunes, idem ostendunt. Hîc

itaque Commotio Febrilis, à Seri Sanguinis metastasi in Succum Nervosum originari videtur, indeque in Sanguinem transferri.

De Symptomatum Causis.

Febbris Acuta continua, non Maligna, scil. ex obstructione Glandularum, Cutanearum præcipuè, indeque Sanguineorum Vasorum Plethora pendere, plerique autumant. Et in Febre simplice Miliari Succo Nervoso idem accidere, verisimile est. Nam ut Nervi ex Obstructione tenduntur, ita ex Tensione Dolor oritur, hujusce Febris Symptoma omnium ferè primum. Ideoque Medicamentis Diaphoreticis, Plethoram & Obstructionem Nervorum Capillarium minuentibus, potius quàm Laudano conso-pitur. Uti & ex Petechiarum aut Variolarum eruptione, Ægri à Dolo-re, Symptomate eorum primario, magis liberantur, quàm ab usu Lau-dani.

Succus Nervosus, Nervorum Capillarium obstructione auctus, & in suo motu repulsus, Motum irregu-larem imprimit Spiritibus Animalibus, & Horrore Ægrotum afficit.

Calor autem succedit Frigori, ex Succo Nervoso in Sanguinem (tan-dem obstructione referatâ) copiosius transfuso, motumque Sanguinis citatiorem generante. Neque tamen hîc, ubi Sanguis scatet partibus seroso-acidis, quæ motum ejus inhi-bent, Pulsus adeò magnus est, ac in aliis Febribus; quæ primò in ipso Sanguine, salinis sulphureisque par-ticulis luxuriante, excitantur.

Calor & Frigus se mutuò exci-piunt, sed irregulariter. Nimirum à serositate Sanguinis, Succique Nervosi ab eo secreti: qui exinde citiùs à Medicamentis, motu Corpo-ris, multiloquio, vel Animi Pathe-matis, affecti sunt. Ideòque nihil magis conducit ad Caloris Frigo-risque irregularem recursum cohi-bendum, quàm mora in Lecto & Quietudo.

Pectoris oppressio & suspiria, à Liquore Nervoso, in Nervis Pecto-ris Capillaribus stagnante oriun-tur. Vesiculis enim seu Pustulis Miliaribus emissis, Ægri ab oppres-sione liberantur. Certè à Sero in Asperæ Arteriæ extremis Ramulis minimè pendet. Ita enim produce-retur Asthma, & Pharmacis Pecto-ralibus oppressio allevaretur: quæ ta-men hîc sunt inutilia, & quæcunque Pustularum Miliarium eruptioni in-commoda.

Oppressionem hanc comitatur Spi-rituum defectus. Nempe ob San-guinis serositatem, indeque parcio-rem in Succum Nervosum Spi-rituum secretionem. Oritur etiam à Succo Nervosi serositatem, Spi-ritus Animales onerante. Serositatem enim per Diaphoresin diminutâ, li-berantur Spiritus Animales, vires-que Æger recuperare videtur. Non secus ac Bajulator, qui deposito one-re Spiritus statim resumit. Quod non accidit in Spirituum defectu, ex Hypercatharsi orto. Et notatu di-gnum est hâc Febre Miliari labo-rantium, non secus ac oneribus de-fessorum, Pulsum eundem mane-re, dum Spirituum defectum passi-sint, & ab eodem liberentur. Ve-rum

rùm ex Evacuatione nimia, Pulsus debilitas, Spirituum depreffioni respondet.

A motu Spirituum Animalium magis celeri infomes sunt, sæpeque delirant, & quoties ad somnum se componunt, de quadam Sensus Interni Confusione queruntur.

Quando in Vigiliis Caput indolens est, à minori Impetu Sanguinis versus Cerebrum pendet. Licet enim motu paulò vegetiore circuit, quam in Sanis: remissius tamen quam in aliis Febribus, sive Intermittentibus sive Continuis, movetur. Quamobrem & Sitis hîc longe mitior est, quam in Febre Ardente. Et eandem ob Causam Urina est magis decolor, Sanorumque similior: Et majori copiâ emissâ, ex Aciditate Sanguinis ferum separante. Quâ de causâ frequentius etiam expuere solent.

A Serositate Spirituum Animalium Musculi antagonistæ non semper æqualiter contracti retinentur; unde fiunt Motus Convulsivi. Sin autem à serositate prædicta Contractio Musculorum fuerit debilior, Linguae Manuumque solummodò fit Tremor.

In hujus Febris principio, si Ægri, Similitudine Vaporum decepti, è Lecto surgant, calidave Medicamenta usurpent, Sanguinis Spirituumque motus exinde augetur: Et loco Pustularum Miliarium Natura ad Materiæ morbificæ intempestivam ac deviam Secretionem stimulat. Unde producuntur Symptomata, secundum varias Partes in quibus deponitur, variata; Febrisque Miliaris sub alterius Morbi

formâ delitescit. Si in Ventriculo, Nauseam & Vomitum parit; in Intestinis, Dolorem & Diarrhoeam. In quo casu, Dolores & Diarrhoea, citius leni & continua Diaphoresi, quam Laudano vel Astringentibus recedunt. Et si contingerint solummodo duæ tresve Sedes, absque Ventrîs Torminibus, Spirituumque Defectu; quæcunque Astringentia & Opiata censeo amovenda. Quippe sæpenumero satis est Materiæ, tam in Sedes, quam in Pustulas Miliaries distribuendæ. Quapropter & de earum Eruptione à Sedibus nihil metuendum est, Idemque experimur, ubicunque Materia abundat secernenda: Exempli gratiâ, in Variolis ubi nec Enema, nec Venæsectio, Pustularum Eruptionem impedit. Nec quicquam mali accidit à Catameniiis, toto Variolarum cursu lentè effluentibus.

Pulsus denique fit debilis, à Serositate Sanguinis Succique Nervosi; & proinde Spirituum Animalium paucitate, Cordisque laxiore Systole.

De Signis in hac Febre Prognosticis.

DE hac Febre Prognosis ita instituenda est. Sic Ægrotus sui Regimen in principio omiserit, Medicusve Pharmaca calida Diaphoresin minimè excitantia præscripserit; licet Symptomata ab initio fuerint mitiora, Morbus tamen sæpe in pejus ruit, & vel mortem, vel ægritudinis diuturnitatem minitatur.

Si ab initio Pars aliqua doleret;

vel Æger indolenter calefceret, aut ei Ventriculus ægrotaret, deindeque Calor & Frigus alternis vicibus, intervallis tamen inæqualibus recurrerent, Spirituumque defectus, & Pectoris Oppressio cum Suspiriis, facili Respirationi conjuncta sint, tandemque Pustulæ cum leni & perpetua Diaphoresi sese ostenderent, res plerumque in vado est.

Delirium, Motus Convulsivi, Convulsio, vel Apoplexia, si ex Signis hujus Febris Pathognomonicis, nempe summâ Pectoris Oppressione, cum Suspiriis, Spirituumque Defectu, Symptomata comitantia viderentur, & in principio acciderent; facilius Medici diligentia Praxique regulari cedunt. In progressu verò, & declinatione, ubi Æger imbecillior est, & Pustulæ Miliæres, aut ex impresso Frigore, aut forsan à malâ Praxi delitescunt, in Cerebrum, Nervosque lethalis fit metastasis, & brevi Mors sequitur.

In hac Febre, suppressio Diarrhœæ subitanea, sive sponte, sive Astringentium, sive Opiatorum abusu fit, Apoplexiam cavere jubet. Præcipuè, si iste Morbus, ex Plethora & Partium structura, staret in procinctu.

Citrinus Urinæ Color, qui subito in pallorem transit, de metuenda Metastasi Medicum monet.

In Puerperis hac Febre correptis, Diarrhœa, Symptoma periculosum est. Non modò enim Pustularum Eruptionem, sed & Fluxum Lochiorum impedit.

Respiratio difficilis, Vox faucibus hærens, & linguæ Tremor, inter periculosa Symptomata collocan-

da sunt. Præcipuè, Dyspnœa Nervosa.

Ægri, quò magis somnolenti, eò felicius convalescunt.

Qui mitioris sunt Indolis, facilius quàm qui Feroces & Iracundi, liberantur.

Si Natura & Medicus, quasi junctis manibus procedant, statim à desiccatis Pustulis, Ægri vires recuperant. Nisi, ex abundantia Materiæ Morbificæ, Reliquiæ super Partem aliquam separentur.

In Febre Scarlatina, si Pustulæ Miliæres Colori rubro extincto superveniant, salutem promittunt.

De Febris Miliaris Simplicis Curatione.

EX hujus Febris Miliaris Simplicis Natura descripta enatæ indicationes curativæ sunt hujusmodi. Nimirum, Sanguinis & Succi Nervosi Aciditatem dulcificare, eorumque Serositatem diminui, nec non Spiritus Animales liberare & restaurare: Et hac Methodo obviam eundo periculosis Symptomatis, Spirituum Animalium Sanguinisque Motum ad æquilibrium restituere. Quo facto, Pustulas Miliæres à Materiâ ritè præparatâ genitas, solito tempore expectare licet.

Ad sanguinis Succique Nervosi Aciditatem (unde Coagulationes sanguinis, & feri secretiones proveniunt) edulcorandam, Medicamenta, vulgò Alcalina dicta, & præcipuè Testacea, sunt eligenda: E quibus sunt Oculi Cancrorum, Margaritæ præparatæ, & similia. Et ad eorum serositatem simul mi-

nuendam, quæ etiam lenem & continuam Diaphoresin promovent, maximè omnium profunt: in quorum numero Pulvis è Chelis Cancrorum compositus, Lapis Goenſis, & Bezoar Orientalis, præcipuum locum obtinent. Horum enim usu, dies aliquot repetito, Sanguinis & succi Nervosi vitia corriguntur; Pulsusque ad fortiorem motum reſtitutus, magisque æquabilem, Puſtularum Miliarium eruptionem accelerat. Equidem, si nulla ratio Diaphoreſeos habenda eſſet, neque alicujus Indicationis niſi ut Sanguis Spiritusque Animales exaltentur; calidiora Cardiaca, uti Radicem Serpentiariæ Virginianæ, aut ſimilia, vel etiam Vinum ipſum tutò & copioſè ſumere licuerit. Hæc autem & huiusmodi, in hæc Febre, viz ad Puſtulas Miliareſ expellendas, rarò locum habent. Nam Sanguinis Fermentatio vehementior, & Materiæ morbificæ contemporanea ſecretio, non bene conveniunt. Et sæpe calidorum usu, Delirium, Motus Convulſivi, & ſimilia produciuntur. Omnes itaque Secretiones, ſive Naturâ, ſive Arte effectæ, faciliùs lentè procedunt. Id quod à Medicamentis Teſtaceis obtinetur; quæ dum Calorem ſovent medio-crem, ſimul & edulcorant, & Diaphoresin promovent.

Ad Serofitatem minuendam optimè etiam reſpondent Veſicatoria: Nec non ad Coagulationes ſale ſuo Volatili impediendas. Nullum itaque aliud Remedium Spirituum Animalium Commotionem magis ſedat, Somnumque conciliat, aut Spiritus depreſſos levare ſolet. Materiâ enim

morbificâ ex aliqua parte eorum ope diminutâ, Natura reliquam, viâ ſibi conſuetâ, facilius amandare po-teſt: tantum abeſt ut Puſtularum Eruptionem impedian. Neque tamen plura unâ vice Veſicatoria, ſed alia poſt alia, applicanda ſunt, niſi grande aliquod Symptoma exigat. Notandum autem eſt, poſtquam ulcus prioris Veſicæ ſiccatum fuerit, quamprimum aliam debere excitari. Cùm sæpe obſervaverim, omnia Symptomata ſtatim à ſiccatis priorum Veſicarum Ulceribus ingreſcere, iterumque ab aliis Veſicis excitatis fieri leviora.

Anno 1697. quidam hæc Febre correpti non modò Capitis Dolo- re, ſed & Tumore affecti ſunt: Attamen ex Veſicatoriis ſucceſſivè appoſitis, dietim imminutis. Ex appoſitis pone Aures diſparuit Frontis Tumor; Temporum & Oculorum, ex tertio inter ſcapulas; & Genarum ſimiliter, Labiorum, Fau- ciumque, ex aliis ſuper Brachiis, Femoribus, Tibiisque, ut in ſequentium Hiſtoriarum primâ fuſius oſtenditur. Et notetur quòd ex mi- nimo temporis intervallo, à prioris Veſicæ exſiccatione ad generationem alterius, & Dolor & Tumor aucti fuere.

Anno 1704. quorundam in hæc Febre Fauces occupavit Dolor, il- lius qui in Anginâ æmulus. Quo- percepto Symptomate, licèt multi ſubitò mortui ſint; eò tamen leni & continuâ Perſpiratione domitò, om- nes ſub meâ Curatione evaſerunt.

In hæc Febre, Cathartica rarò ſunt admittenda; niſi grande ali- quod Symptoma indicaverit. Emol- lienti verò Enemati, ad primas Vias

mundificandas, sæpe locus est.

Rarò etiam Sanguinis emissio permittenda, nisi ex urgente aliquo Symptomate, viz. Asthmate, Pleuritide, vel simili indicaretur.

Animi Pathemata in hâc Febre vitanda sunt. Et quæcunque commovent Spiritus Animales, sive grata sive ingrata fuerint, noxia sunt. Quietudo etiam in lecto imperanda est. Contrario autem in hac Febre incipiente regimine, Pustularum miliarium materia versùs cutem motura, aliò repulsa, Symptomata periculosa producit. Quibus Symptomatis si talia adhibeantur medicamenta, qualia ad primum Morbum inepta sint, vel mors, vel Morbus Chronicus, sine ullâ postea Pustularum eruptione, sequitur. Unde discimus qui sit, ut Puerperæ ex hâc Febre felicius emergant. Ob id nempe, quòd in lecto tranquillo animo se continentes, lenem & perpetuam Diaphoresin sibi concilient; cibisque potulentis, calefacientium Pharmacorum loco, refocillentur. Sæpe enim observare est, eas, quæ in lecto bene se habere visæ sunt, si inde surgant, tanto spirituum defectu correptas fuisse, ut moribundæ videantur, & ex iis nonnullæ subito obierint. Quæ etiam nimis properè lectum renuunt, se tantum hysterice affectas æstimantes, statim in pejus ruunt.

Hujus rei instantiam jam præ oculis habeo in Domina *Shepherd*, in Vico vulgò vocato *Bartholomew-lane*, habitante, & cui D. *Lancashire* fuit Pharmacopœus. Illa Pectoris Oppressionem cum Suspiriis, nec non Confusionem interni Sensus,

Cordisque palpitationem passa est: quæ Symptomata, & Ægra, & astantes, Vapores æstimârunt. Ideoque necessarium esse putabant, ut è Lecto resurgat. Simul ac verò induerat Vestimenta, Tremores & Motus Convulsivi, prædictis Symptomatis sunt adjuncti. Ego jam ad Illam vocatus, ex opprèssione Pectoris, cum Suspiriis, Spirituumque defectu, Febre Miliari laborare censui, & in periculo stare, nec sine leni & continua Diaphoresi servari posse. Præscripsi itaque in lecto quietudinem, seclusâ Visitantium turbâ; Vesicatorium inter scapulas applicandum; Bolumque sequentem sextâ quâque horâ cum Julapio sumendum.

℞. *Pulv. è Chel. Cancr. comp. Spermat. Ceti, ãa. ʒj. Croci gr. vj. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus.*

Qua methodo adeò latè res cessit, ut intra biduum Motus Convulsivi penè penitus aboliti fuerint. Pustulæque Miliæres, jam tandem enatæ, altius indies emicuere, serumque in iis, usque ad earum exsiccationem, videbatur magis incrassari, & albescere.

Puerperæ hac Febre laborantes, & nimis citò lectum renuentes, nonnunquam ex improvise moriuntur. Uti accidit Dominae *Barklei*; ad quam licet vocatus essem, tamen ante adventum meum mortua est. Amici Illam, nullo Morbo, præter Vapores vulgò dictos, affici putarunt. Et proinde exurgere, immiscere se Colloquiis, & similia, sanæ instar, agere voluerunt. Ego verò, ex dolore Femoris, opprèssione Pectoris, suspiriis, spirituumque defectu, mihi

hi narratis, ipsam Febre Miliari periisse ratus sum. Et allata Candela, Pustulas Miliares quamplurimas super Pectore adhuc eminentes vidi. Et nullus dubito, quin ex frigore, materiam Pustularum in Nervos repellente, hæc Mulier morte subitaneâ oppressa fuerit. Id quod etiam quibusdam Parturientibus in simili casu accidisse memini. Ideoque, ubi ad Parturientes vocatus, Febris Miliaris signa viderim Pathognomonica, moram in lecto, & ut Ægra ad partum se componat, impero.

In prædictæ Dominæ dissecto Cadavere, nil morbosum conspexi præter Polypum. Qui ab eâdem causâ ac ipsa Febris, viz. ferocitate acidâ proveniens, minimè mortis causa existimanda est.

Sæpe etiam observare est, eos qui in lecto benè se habere visi sunt, si exurgerent, tantum spirituum defectum sensisse, ut moribundi viderentur: cujus rei in Historia casus D. *Smith*, in *Aræâ Bartholomæi Close* vocatâ, exemplum dabimus. Ideoque Cautela, tum à Parturientibus, tum Puerperis observanda est, ut si Pectore oppresso & languore, sine causâ evidente affectæ fuerint; statim Obstetricis ope partum avellere, & spiritus mulierum argutiunculis in contrarium, ad elicendam diutinam Diaphoresin sese lecto affigant.

De Curatione Febris Miliaris Symptomatum.

Singulis Symptomatis iisdem Remediis occurrendum censeo, quibus uti maluimus, si solitariè appa-

ruerint: nisi aliquod Symptoma contra indicet; quod à perito Medico perspiciendum est.

Capitis vel partis alterius cujuscunque Dolor, longè certius leni & continua Diaphoresi, quam Opia-
tis consopitur. Quemadmodum in Febribus petechialibus Variolisque, nullo modo Dolores sedari vidimus, donec expellenda materia super cutem emineat. Cùm itaque vel parturienti, vel dolore quovis laboranti advocatus sim, & spirituum defectum pulsūque frequentem ac paulò debiliorem viderim; omissis Hypnoticis, Naturæ morem gero, & statim Diaphoresin excitare soleo. Sin autem Doloris vehementia Opia-
torum usum indicaverit, Diaphoretica admiscenda impero. Alias aut non sedant Dolorem, aut ejus loco aliquid mali afferunt. Et si pleuriticus sit dolor, vel alicubi Inflammationem ostendat, Venæsectio rarò est omittenda.

Quoties Calor & Frigus alternis vicibus & irregularibus recurrunt, ut plerumque solent; lenis Diaphoresis, ex *Pulv. è Chel. Cancr. comp.* usu, valdè prodest; si modo sine Calefacientibus sumptus fuerit. Quod, etiamsi à nonnullis parvipendatur Remedium, multoties tamen ejus virtutem expertus sum. Hæcque, ex multis aliis, uno Exemplo in D. *Bolton*, D. *Shaler* pharmacopœi Filia, satis patebit. Illi, secundo die à partu, doluit Abdomen prope Coxam. Quâ in parte lenito dolore, calore deinde & frigore alternis, nec non Vigiliis & oppressione pectoris cum Suspiriis, & Languore, afflicta fuit: tandem-

que

que post dies aliquot pustulæ Mili-
res exfudarunt. Solo itaque pulve-
ris è Chelis Cancrorum compositi
usu sexta quaque hora, ad continuan-
dam Diaphoresin, omniaque Pa-
themata prohibendo, Ægramque Ci-
bis fovendo Potulentis, Vinoque
paucò Canarino, illamque dies qua-
tuordecim post emissas pustulas lecto
alligando; æquè feliciter convaluit,
ac si non ægrotasset. Etiam si ante
partum calor Hecticus, Tussis, dif-
ficilisque Respiratio, Tabem mi-
nitarint. Constat itaque multis hac
Febre correptis, sanitatem redinte-
grari longè difficilius; aut ex debi-
ta Cura in principio omiſſa, quasi
Ægra tantum hysterice laboret: aut
valde Calefacientium abusu, mate-
riam scilicet Morbificam, non cri-
ticè, sed symptomaticè expellentium.
Et observatu non indignum est, quod
hac currente Febre, ut prædictum
pulverem, experimenti gratia, omit-
tendo, non solum cessavit Diapho-
resis, sed Symptomata omnia pe-
jora videbantur: ita, & illius usum
repetendo, quæcunque laudabiliora
renovari.

A Vigiliis levantur, Vesicatoriis,
& quietudine in lecto, remotis
omni strepitu Animique pathema-
tis.

Ad Delirium maximè prodest An-
timonium Diaphoreticum, per se
sumptum. Quod licet à quibusdam
Medicis, ut effoeta Calx æstimetur;
sæpe tamen, & semper per se, op-
tato successu, non modò in Vigiliis,
sed & in Delirio præscripti.

Sæpe etiam pacantur Vigiliæ,
leni & continua diaphoresi. Ad
quam efficiendam, si pulveris præ-

dicti usus sit irritus, Spiritus Cornu
Cervi, aliis Medicamentis præferen-
dus est, & in posseto Salviato potius
bibendus, quàm Salviæ infuso. Ideò
scilicet, quòd plus nutrimenti in hac
Febre magis necessarij, suppeditet.

Opiata, si unquam in hac Febre,
post Vesicatoria adhibenda sunt. Et
urgente Diarrhoeâ, vel pustularum
eruptione remorata, Conf. Fraca-
storii, aut Theriaca Androm. locum
præcipuum tenet.

Nihil à me expertum est, quod
feliciter motus convulsivos in hac Fe-
bre, compescit, quàm omnes illinire
Artus Succini Essentiâ; illiusque quasi
viginti guttas è quovis conveniente
liquore sæpe exhibere.

In oppressione Pectoris cum su-
spiriis, præcipuè Asthmate Convul-
sivo conjunctis, eadem fere, nempe
lenis & continua Diaphoresis, Spi-
ritus Cornu Cervi, & Vesicatoria,
summè sunt utilia.

In spirituum defectu, nihil magis
valere expertus sum, quàm Aquam
Theriacalem, vel per se, vel in ve-
hiculo cum Salis Vol. oleosi guttis
aliquot, & Croci Pulvere; præci-
puè si Cordis Palpitatio eundem co-
mitetur.

In Tremoribus, Spiritus Anima-
les aptis sunt reficiendi Medicamen-
tis; è quibus Crocus maximè pro-
dest. Nec non cibis potulentis ma-
gisque nutritiis, uti Pullorum jure,
& similibus.

In convulsione universali, præ-
cipuè à materiæ morbificæ versus
interiora Metastasi ortâ, Cucur-
bitulis cum emissionè sanguinis
usus sum feliciter. Deinde calefa-
cientes spiritusque volatiles Ægroto-
rum

rum ori ingerendos, nec non Ene-
mata, imperare soléo. Quæ qui-
dem in convulsionibus, præcipuè
puerorum, sunt proficua.

Ægritudo cum nausæâ, pectoris-
que calor signa sunt Aphtharum im-
minentium. Quæ mitigantur Sym-
ptomata Diaphoresi continuatâ, do-
nec lingua Aphthis obtecta fuerit.
Et observare est, eodem tempore au-
geri Aphthas, Pustulasque Miliare
exarescere. E contra simul ac lingua
Aphthis nudata fuerit, Pustulas Mi-
liares elevari. Et nonnunquam Fe-
bris reliquias, post desiccationem
Pustularum, in Aphthas nutriendas
derivari.

Vomitioni occurro, addendo pul-
veris è Chelis Cancror. comp. scru-
pulo, salis Absinthii gr. X. Præci-
puè si calor Febrilis æqualibus inter-
vallis fuerit repetitus. Nisi aliquod
Symptoma (uti Tonsillarum inflam-
matio, quæ salis lixivialis usu au-
getur) contraindicet.

In Diarrhoeâ, quam sæpe astrin-
gentibus augeri expertus sum, vel
eidem suppressæ aliud Symptoma
pejus succescere, Vesicatorium utili-
ter præscribo, ut hujus & Diaphoresis
conjuncta ope materia serosa ab in-
testinorum glandulis revellatur. Mar-
garitas etiam, vel per se vel cum ali-
quo conveniente Diaphoretico, scru-
puli pondere, sumendas vicibusque
aliquot repetendas jubeo.

Vesicatorii efficaciam ad Chroni-
cam Diarrhoeam frequentissimè ex-
pertus sum. Cujus rei jam præ ma-
nibus habeo instantiam in Domina
Washta puerpera, Mercatoris His-
panici in *Gloak-lane* habitantis uxore;
cui Dom. *Shervvood* est Phar-

macopœus. Horrore primò correpta
fuit, deinde frigore & calore,
incertis spatiis recurrentibus: Nec
non oppressione Pectoris cum suspi-
riis, spirituumque defectu. Pulsus
etiam ei debilis ac frequentissimus.
Et passa est Vigiliis, ferè usque ad
enatas in lingua Aphthas. Sub earum
autem eruptionem, erat admodum
somnia; uti & Aphtharum tem-
porè infantes sunt. Ægritudine etiam
ventriculi premebatur, & Diarrhoeâ,
cujus vi improba Lochia ei suppressa
sunt. Hanc mulierem sequente me-
thodo multos dies continuatâ ad sa-
nitatem restitui.

℞. *Sper. Ceti*, *Pulv. è Chel. Can-*
cr. comp. an. ʒj. Croci gr. v. Syr.
Paralys. q. s. Ms. f. Bolus sumen-
dus sexta quaque hora è Cochleari
Julapii communis. Et applicetur
Vesicatorium inter scapulas. Horum
usu emicuere Pustulæ Miliare, &
paulatim minuebatur Diarrhoea.

Et cum Aphthis postea enatis cre-
verunt Pustulæ Miliare, sine astrin-
gentium usu. Hujusmodi quidem
medicamenta Ægrota in promptu
habuit, sed neque sumpsit, neque
iis opus fuit.

Si Theriaca, aliave Opiata usur-
panda viderentur, opportunè id fit,
post apposita Vesicatoria; quæ pra-
vos Opiatorum effectus inhihent.

Hoc etiam potenter efficiunt su-
dorifica opiatis admixta. E multis
hujus rei exemplis, unum dabo in
quadam Domina *Roberts*. Illa secun-
do à partu die, Dolore colico, sine
vomitione aut Diarrhoeâ, sed admo-
dum vehemente & abdomini affixo,
correpta fuit. Quapropter coactus
sum, Laudani liquidi guttas centum,

sesquihoræ spatio sumendas, impere. Attamen paulò postea pulveris è Chelis Cancr. compositi salisque volatilis oleosi Dosis majorem offerendo, multas sudavit horas, dolorque sine ullâ superstitie querelâ evanuit. Contrâ ac in eâdem muliere, & in eodem casu, sub cura alterius doctiss. Medici acciderat. Ille enim, dando Laudanum sine sudoriferis, dolorem equidem sedavit, diu tamen ægra de quadam inquietudine subsequente querebatur. Et liquidò mihi constat ex Laudano per se sumpto, omnes evacuationes plerumque supprimi. Quod si aliter contingat, forsan non Laudano, sed aliò referendum est. Similiter ac si ex sumpto Cortice Peruviano, aut vino Clareto, ob materiæ morbificæ congeriem, Fibrarumve intestinorum imbecillitatem, vel quandam Antipathiam, sequeretur Diarrhoea. Neque post sumptum Laudanum sudor nonnunquam profluens, & Variolarum extumescencia, quicquam redarguunt. Quorum neuter à Laudani naturâ, sed potius à Morbi conditione immediate pendet. Nam ut in Febris, durante fermentatione, sanguis velocius movetur, naturaque secretionibus minimè vacat; ideoque urinam tenuem Ægri meiunt, desinente verò, crassam cum Hypostasi turbidamque: pari modo, ubi motus sanguinis ex sumpto Laudano citatior compescitur, Nervi relaxantur, Porique aperti fuerint, in Febris sudor, in Variolis pus eliminatur facilius. Natura itaque medicamenti non ex aliquo remoto & incerto, sed ex proximo illius

effectu definienda est. Laudanum enim in quibusdam alvum movit. Quam observando regulam, Medici de Laudani, aliorumque Pharmacorum usu vel abusu, rariùs disceptantes, magis amicè honorificèque convenirent.

Hoc mihi in memoriam revocat effectum Laudani memorabilem in Foeminâ quâdam, ad Insigne Solis in vico *Chancery-lane* vulgò dicto habitante. Illa, cum post abortum dolore Colico vehementissimo laboraret, Laudani magnas sumpsit doses, & per se repetitas. Unde Urinæ, sedum, Lochiorumque orta suppressio, maximusque tumor ventris brevi expectandam mortem pronuntiârunt. Postquam autem inquisitione facta à morbi usque initio, inspectisque præcedentis Medici præscriptis, jam memorata Symptomata, à Laudani abusu, ut dictum est, provenire cognoverim; Enema injiciendum imperavi. A cujus operatione peracta, omnia, non sine astantium stupore, disparuere Symptomata; quippe, non à morbo, sed abusu Laudani, oriunda.

De Febri Miliari composita.

Febbris Miliaris composita est, ubi Pustulæ Miliæres, Papillis rubris, (à *Rash* vulgò dictis) Petechiis, Variolis, aut Morbillis sunt intermixtæ.

Symptomata eadem ferè sunt, ac in Febre Syncho dicta. Spirituum tamen defectu & suspiriis Ægroti magis opprimuntur. In vigilas etiam

etiam proniores sunt; & eorum Urina sanorum est similior.

In Febre cum Pustulis rubris aliquando Pustulæ Miliare non tantum illis intermixtæ sunt, verum etiam penitus desiccatis supersunt. In Variolis & Morbillis pustulæ Miliare plerumque præcedunt, & in principio eas comitantur.

In Febre Miliari composita Symptomata sanguinis potius quam nervosi generis vitia præ se ferunt. Ubi nempe Pulsus frequens est & fortis, calor intensus, lingua sicca, sitisque haud mediocri. In Febre Miliari simplice, è contra. Verum defectus Spirituum, & oppressione circa Pectus coacta suspiria, Symptomata sunt utrique communia.

Quod ad curationem attinet, ubi Pustulæ Miliare Variolas & Morbillos comitantur, Diaphoretica medicamenta paulò calidiora tutiora sunt, quam in Variolis per se existentibus.

Frigus externum, aut regimen quocunque modo frigidum, periculosum est, & mortis causa non nunquam subitanæ: tum etiam, cum pleraque Symptomata optatum Morbi eventum promittunt.

Quamobrem & opiata calida, ut Diascordium, & similia, felicius cedunt, quam Diacodium vel Laudanum, quoties Variolis Pustulæ Miliare conjunctæ sunt.

De Morbis quibusdam Febri Miliari supervenientibus.

PRæter Febri Miliari consequentia, de quibus ante mentionem feci, & in sequentibus Historiis fa-

cturus sum, duo sunt, quæ paulò frequentius eidem superveniunt; nempe Artuum inferiorum Tumor, & calor Hecticus.

Tumor Pedum & Tibiarum, nec non Femorum Inguinisque fit, aliquando sine, verum sæpius cum dolore haud mediocri, tumori præeunte. Iste autem Tumor, ex materiæ morbificæ congestis reliquiis, in his Febribus non ritè curatis, contingit. Cujus rei etiamsi plura exempla proferre possim: Methodum tamen, quæ morbum profligare soleo, hîc annexere sufficiat.

Ea autem est: Pilularum Catharticarum, cum Opio vel aliquo Opiato, singulis noctibus sumendarum præscriptio. Opiatum mihi usitatum, est Pilula de Cynoglossa ad ʒj. Catharticum verò eligo, secundum Coindicantia. Verbi gratia in Appetitu & Digestione diminutis, Pilulas Stomachicas ad ʒʒ. In Lochiis aut Mensibus suppressis, Pilulam Aloephanginam, aut Fœtidam. Aliquando etiam Resinæ Jalap. gr. iv. vel v. jubeo addenda. Et nonnunquam decocti amari sine senna haustum bis in die propino. Si Cathartica paulò fortiora usurpanda sunt, alternis noctibus adhibeo; & decoctum aliquod Stomachicum diebus interpositis sumendum præscribo. Et post plura alia Medicamenta frustra sumpta, haud rarò feliciter usus sum hac methodo.

Sin autem adsit Tumor indolens, Catharticis utor sine Opiatis. Et si Febrem Miliarem comitetur tanquam Symptoma, solâ continuatâ Diaphoresi dissipatur.

Spiritus etiam Cochleariæ, tam

Simplicis quàm Cathartici, usus, in hoc casu maximè prodest. Simplicis efficaciam expertus sum in Domino *Bellasis*, circa ætatis annum octogesimum, Febre vehementi correpto, meæque curæ à Regiâ Majestate commendato. In quo jam extinctæ Febri tumor ab inguine usque ad Pedum Digtos supervenit, Qui, post Vesicatoria frustra adhibita, tandem Spiritus Cochleariæ simplicis usui cessit.

Spiritus autem tam Simplicis quàm Carthartici, scilicet cum Jalapio præparati, usum conjunctum, expertus sum felicissimum in D. *Lane*, quæ aliquot ante annos puerperio cubabat. Hæc dolore vehementemente, cum tumore ab inguine ad Pedum usque Digtos, affecta, duorum Medicorum celebrium curæ submissa fuit; sed id incassum. Eandem itaque Foeminam, spiritu Cochleariæ simplice, ad 20. vel 30. guttas, è conveniente vehiculo ter in die sumpto, & spiritu Cochleariæ cathartico, tertio quoque die deglutito ad guttas 100. nec non Pilulâ *Martiiæ* die purgationis hora somni, penitus curavi.

Calor Hæcticus, Appetitus diminutio, Spiritusque vitalis defectus, locum habent inter ea, quæ Febri Miliari superveniunt. Præcipuè, si Patientes nimis citò de lecto resur-

gant. Cujus rei vidi quamplurima exempla.

Methodus, quâ hîc bonis avibus utor, est hujusmodi. Sumantur manè dies aliquot, Salis Absinth. gr. 10. aut 15. ex Aq. Spadanæ haustulo; & deinde paulatim ejusdem Aquæ ℥ij. nempe, si Spiritus maximè defecerint. Aliàs ex haustu Aq. Batthoniensis, superbibendo ejusdem ℥ij. similiter. Ut hoc modo aciditatis, ubicunque in hâc Febre peccantis, reliquiæ, unâ cum prædictis Aquâ & sale, excernantur. Quod si salis Absinthii usu caput doleret, præscribo Medicamentum aliquod lenitivum, 3. vel 4. quoque die hora somni sumendum. Salsa & Acida à cibis amovenda, nimiusque corporis Animique motus cohibendus. Nam ex alterutro Recidivam sæpe fieri expertus sum. Nec quicquam Febris intermittens, è præproprio Corticis Peruviani usu, Recidivæ, certius occurrit. Cujus rei instantiam, in Dom. *Warrand* in *Milk-street* habitante, & jam fere moribundâ, vidi insignem: postquam duo alii Medici non incelebres, pro eâdem, re infectâ præscripserant. Et nonnunquam Lac Asininum, cum Testaceis Pulveribus, & præcipuè margaritis, prodesse solet.

Historia Febris Miliaris cum Apoplexiâ.

Julii 16. 1697. ad Digniff. Virum Dom. *Muschamp*, Vicecomitis de *Lansborough* Maritum, in Plateâ vulgò dictâ *Pallmall* habitan-

tem, evocatus sum. Cui Dom. *Malthas* erat Pharmacopœus; idem qui jam Regius. Annum agebat Ægrotus sextum & quinquagesimum. Consti-

Constitutione erat pituitoso - sanguineus, & obesus: Appetitu gaudebat optimo: deditus negotiis & cogitabundus. Ab aliquo retroacto tempore cum Asthmate ac Nephritico dolore laborasset, Calculos nonnullos, usu Olei Lini ad Cochlearia tria singulis noctibus à me præscripto, cum Urina emisit. Proximè præcedentibus aliquot hebdomadis, calore interno, deinde & languore, sive spirituum defectu, sine ulla causa evidente, affectus est.

Suprà dicto die subito correptus est Apoplexia. Ut ex Antecedentibus jam memoratis, Respiratione cum stertore somni profundi æmulò, sensibusque læsis externis omnibus, certò comperi. Illamque à seroso potius quàm grumoso sanguine stagnante oriri, facies ejus minùs rubicunda monstrabat: ut clariùs patebit ex meis observationibus, quas de Apoplexia alterà à stagnante & extravasato sanguine grumoso, altera à seroso, si vitam DEUS atque otium dederit, posthac in lucem emissurus sum.

Ad serosi sanguinis stagnantis excitandum motum, ac Ventriculi & Intestinorum onus amovendum, à quo sæpè tentatur Caput, sequentem Pulverem Emeticum præscripsi.

℞. Salis Vitriol. ʒiij. f. Pulvis in doses sex dividendus. Sumat singulas ex Aq. Juglandis comp. Cochl. j. superbib. haustum posseti foliis Card. bened. alterati.

Spiritum etiam salis Armoniaci naribus offerendum jussi. Et ut Ægrotum, tam à saburræ in Ventriculo, quàm Pulveris Emetici reliquiis, nauseam sæpe sequente die

creantibus, liberarem, Pilulas sequentes præscripsi.

℥. Pil. Tart. Querc. ʒj. Resina Jalapii gr. iv. Syr. è Spin. Cerv. q. s. Ms. f. Pilulæ, finitâ Emetici operatione sumendæ.

Ad serosum laticem minuendum, sanguinisque adhuc magis accelerandum motum, Emplastra præscripsi Vesicatoria, & mixturam spirituosam sequentem.

℞. Salis vol. oleos. ʒiij. Spir. Lavend. comp. ʒij. Ms. Sumat gutt. xx. ex haustu decocti Hordei Syrupi Violaceo edulcorati: Hoc jussi vehiculum, ut & lentè augeam vim Pilularum, & Dysuriæ Dolorique Renum à Vesicatoriis, præveniam. Demum Emplastra subpedalia, ex Empl. Cephal. cum Euphorbio & Picis Burgundicæ ana æ. p. curavi applicanda.

Die prædicti mensis 17mo Ægroti affidentes mihi narrabant, illum statim à peractâ vi vomitorii è somnolentia & stertore expergefactum, sensus omnes recuperasse.

Symptomata jam tum apparentia, hujusmodi fuere, viz. Tumor faciei, & totius capitis: quod eo Anno in Febre Miliari commune erat. Calor etiam Febrilis, Pulsus frequens, sed debilis; cum defectu Spirituum, maximaque Pectoris oppressione cum suspiriis, scilicet, à malignitate Morbi, non nimis evacuationibus. Quippe Pulsus, post eas finitas, nihilo quàm ante, debilior fuit. Neque subit alterationem, quoties de Spirituum defectu Ægrotus querebatur. Urina tenuitate aquea & satis copiosa; Lingua humore albo & viscoso cooperta;

Sitis immunis, etiam si & infomnis fuit. E quibus omnibus Symptomatis & præcipuè ex oppensione Pectoris cum suspiriis, spirituum defectu, (signis mihi Pathognomonicis) Febrem hanc esse Miliarem, Pustulasque suo tempore expectandas præmonui. Nec quidem Apoplexia, si hinc non fuisset Symptoma, sed primarius Morbus, tam citò & perfectè evanesceret.

Ut itaque secundum meam methodum in hoc Morbo consuetam, lenem & continuam foverem Diaphoresin, irregularibus Caloris Frigorisque paroxysmis occurrerem, tandemque lentam Pustularem eruptionem efficerem, sequentia præscripsi.

Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒʒ. Sumatur 6ta quaque hora è Julapii sequentis Cochl. i. superbib. Cochl. iv. vel v.

Rx. Aq. Lact. alex. ʒvj. fl. Tiliæ ʒiv. Pæon. comp. ʒvj. Margar. pp. ʒj. Sacchari albiss. q. s. Mj. f. Julapium.

Iussi etiam persistat in usu Decocti Hord. cum Syr. violaceo: Ut & diluendo à dolore Nephritico præcaverem, & satis materiæ fovendæ Diaphoresi suppeditarem. Verùm ne frigido nimis regimine Spiritus Ægroti deficerent; singulis Decocti haustibus mixturæ spirituosæ antea præscriptæ gutt. xx. addendas curavi. Ne omiserim indicationum, etiam si contrariarum, alicui satisfecisse. In quâ re Ars Medicinalis præcipua consistit.

Ad viscidam materiam linguæ obductam præscripsi Mucilaginem ex Sem. Cydon, & Psyllii, syr. è Ru-

bo Idæo edulcoratam; cujus Cochl. j. sæpe fumeret sensim deglutendo.

Die 18vo, Caput vi Vesicatorii detumuit superius. Urina coloratione aliquanto magis, & paucior. Spiritus, sudoris mediocris & mixturæ prædictæ cordialis beneficio, non tam multum defecerunt. Adhuc tamen depressi cogeant suspiria, cum querimoniis de pondere Pectori incumbente. Quibus pensitatis, in omnium hætenus sumptorum repetitione persistere decrevi.

Die 19no, eadem apparuere Symptomata, quæ antea. Si modò id excipias, quòd Caput leviter gravari incepit, & Alvus, non obstante Decocti Hordei cum Syrupò Violarum usu, astricta fuit. Quibus ut prospicerem Symptomatis, Renumque dolorem adhuc præcaverem, Clysterem sequentem præscripsi.

℞. Decoct. commun. pro Clyst. ʒviij. Mell. Mercur. ʒiij. Sacch. rubr. q. s. Mj. f. Enema.

Die 20mo, ex Enematis usu liber erat à Capitis gravedine. Ulcere autem è Vesicatorio citius quàm debuit exsiccato, prædictus Tumor, spirituum defectus, pectoris oppressio, nonnihil renovari videbantur; sed sine quovis alio suboriente Symptomate. Vesicatoria itaque ponere aures applicanda iussi, decocti prædicti duabus Libris, Aq. Pæon. comp. ʒiiij. addendas, & cum singulis illius haustibus Spir. Lavend. comp. gutt. xv. fumendas imperavi. Hisque non satis prævalentibus, Aq. Theriacal. Cochl. j. vel ij. adhibenda, & circa quintam vespertinam Enema repetendum.

Diebus 21mo, & 22do, omnia symptomata cum sint mitiora, antea praescripta continuanda, & solummodo Emplastra suppedalia addenda curavi.

Die 23tio, Vesicarum ultimò excitatarum Ulcera jam ferè exsiccata sunt. Caput de novo extumuit, spiritusque magis defecerunt. Quamobrem mandavi, Emplastra Vesicatoria Carpis apponenda, pulveris, Julapii, & Decocti usum continuandum, repetendumque Enema praescriptum.

Die 24to, omnia symptomata laudabilia. Excepto Urinae pallore, Capitisque gravedine cum quâdam somnolentiâ. Quare cum Metastasin metuerim, à prædictâ methodo recedens, sequentes Pilulas praescripsi.

℞. *Pil. Tart. Querc. ʒj. Resina Jalap. gr. iiij. Syr. è Rhab. q. s. Ms. f. Pilula statim sumendæ.* Et cum continuato usu decocti Hordei, ut ultimò parati, Vesicatoria ampla Femoribus internis applicanda jussi.

Die 25to. Urina tingitur aliquanto magis; Caput sanatum optimè; Spiritus redivivi, Pustulaeque Miliare super pectore emicuerunt.

Si quis hîc Catharsin suprâ memoratam, quasi Pustularum eruptioni contrariam, reprehenderet; effectus ipse objicienti respondet. Venum etiam reminisci debet, hujus Egroti habitum fuisse adiposum: Neque ex Vomitu & Catharsi primò praescriptis, elevatio Tumoris in Capite impedita fuit, sed materiae morbosae copiam minuendo potius accelerabatur.

Cum jam Pustulas Miliare pululare viderim, Pulverem è Chel. Cancr. comp. 4ta quaque hora è Cochleari Julap. sequentis sumendum jussi.

℞. *Aq. Card. Bened. Melissæ, Cinnamom. Hord. an. ʒiij. Epidem. ʒiʒ. Margar. pp. ʒj. Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Julap.*

Praescripsi etiam, ut cum Decocto Hordei Apozematis sequentis haustulum sumat.

℞. *Rad. Scorzon. ʒj. Cort. Aurant. cond. ʒvj. fol. Melissæ, Galegæ, an. Mj. flor. Cord. an. p. jʒ. Sem. Card. bened. ʒʒ. coq. in Aq. font. q. s. ad ʒij. Colaturæ adde Aq. Epid. ʒij. Ms. f. Apozema.*

Et ut per vices sumat Aq. Theriacal. Coch. ij. Ideò nempe, quod in hac Febre, præcipuè declinante, dum calent Volæ manuum superiora frigescent.

Die 26to, cum omnia viderim Symptomata adhuc leviora, ultimò praescriptorum usum sensi continuandum.

Die 27mo, Pustulae Miliare numero & magnitudine auctæ sunt. Ideoque Julapio ultimo praescripto hoc substitui.

℞. *Aq. Melissæ, Cinnamom. Hord. an. ʒv. Scord. Comp. ʒiʒ. Epidem. ʒj. Syr. è Cort. Citr. q. s. Ms. f. Julap. de quo sumat haustulum in languoribus.*

Die 28vo, Pustulae visæ sunt adhuc magis elevari, spiritusque nullo modo defecere. Cum tamen dorsa manuum frigerent, ideò novissimè praescripta continuari velim.

Die 29no, Febris declinare coepit. Quare Julapium continuandum,

dum, & Enema injiciendum jussi.

Die 30mo, Symptomata omnia evanuerunt. Quoniam tamen de acuitate quâdam in Ventriculo questus est; præscripsi Margarit. pp. ʒj. è Julap. seq. Coch. j. fumendum aliquoties in die.

℞. Aq. Lact. alex. Meliss. Cinnamon. Hord. an. ʒiij. Epid. ʒj. Sac-

ch. perlat. q. s. Ms. f. Julap.

Deinde ut per biduum triduumve Decocto Hordei, cum spiritus Lavend. comp. guttis aliquot, & Julapio, uti persisteret. Demumque aquas Strethamenses à ʒiv. ad ʒij. coctas fumeret, ter iterando. Quibus remediis ab Apoplexia, Febre, Renumque affectu perfectè liberabatur.

Historia Febris Miliaris cum Artuum infernorum Paralyfi.

CIRCA Decemb. finem, 1705. Vir Humanissimus D. D. Garth atque Ego vocati fuimus ad D. Throgmorton Viduam, Ducissæ Northumbriæ Filiam, dies aliquot antequam parturiret; cuique D. Birch ut Pharmacopola ministravit. Fatigarunt illam Vomitus ferè perpetuus & ægrotudo. His etiam astrictio Alvi, & inappetentia, Tussis, & Dyspnœa spirituumque defectus accessere. Quæ omnia ex mœrore ob nuperam mariti mortem contigisse æstimabantur.

Primo loco Emplastrum stomacho applicandum, & aquam Strethamensem cum sale Absinthii fumendam præscripsimus: nempe ut Ventriculi & Intestinorum motum rectificarem. Hinc equidem rarius Vomitus; at nonnihil nutabant Spiritus. Qui tamen, cum ægra postea puerperio, cubaret, continuatâ Diaphoresi quodammodo restituti sunt.

Verum circa tertium puerperii diem Artus inferni, Paralyfi correpti, suam movendi vim amiserunt. Et nocte proximè sequente adeò defecere Spiritus, ut penè in Syncopen incideret. Quare & præ-

dictus Collega meus nocte vocatus, Emplast. Vesicat. Femoribus quamprimum applicanda, Bolumque frequentem fumendum præscripsit.

℞. Salis Volat. Succini gr. viij. Croci gr. iv. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Conf. Alchem. sine odor. q. s. ut f. Bolus cum Julapio appropriato deglutendus.

Die proximo manè Ægrotæ Spiritus haud parum elevati sunt. Verum Paralyfin nullâ ex parte recessisse vidimus. Sed & mediocre Tumorem, & dolorificum eidem accessisse. Dixi, non infrequenter in Febre Miliari, Paralyticos affectus, ex materiâ morbificâ in Artus descendente, suboriri. Deindeque statim ad Ægrotam accedentes in denudato Pectore Pustulas conspeximus Miliare, Febremque Miliarem, Morbum originalem agnovimus. Unde concordi animo Medicamenta Diaphoretica, aliorum omnium maxime necessaria decrevimus; & Januarii die quinto à nobis sequentia præscripta sunt.

℥. Pulveris è Chel. Cancr. comp. ʒj. Croci ʒss. Conf. sine odor. q. s. Ms. f. Bolus sextâ quâque hora su-

sumendus è Coch. I. Julap. sequent.
superbib. Coch. iv. vel v.

℥. Aq. Ceras. nig. ℥x. Bryon.
comp. ℥ij. Sacch. albiss. q. s. Ms. f.
Julapium.

Januar. die 6to, Ægrotā paulò erat
vivacior, Pectusque illi minus op-
pressum: Dyspnœam autem ex Tus-
si adhuc passā est, cum vigiliis. Qua-
re & Bolo, die præcedente præ-
scripto, addidimus Haustum sequen-
tem.

℥. Aq. Puleg. Rutæ Theriacal.
Syr. de Mecon. an. ℥j. Tinct. Castor.
gutt. X. Ms. f. Haustus.

Die 7mo, Spiritus mediocriter re-
fecti, expectoratio facilior, Pustula-
rumque Miliarium eruptio magis
conspicua. Colum itaque jussimus
cum Julapio repetendum, & haustum
vesperi.

Die 8vo, omnia Symptomata
facta sunt mitiora. Exceptā Para-
lysi, & Musculorum Laryngis Hy-
stericā quādam Convulsione leviori.
Ideòque præter antea præscripta,
Pilulas, è Castor. gr. vj. & Assæ fœ-
tidæ gr. xij. sex parandas singulis-
que noctibus duas sumendas impe-
ravimus.

Die 9no, Respiratio longè ma-
gis quàm antea difficilis, & dolori
Lateris Pleuritico ac vehementiori
conjuncta. Metuimus à Venæ se-
ctione malum eventum: nempe, ne
exinde Pustulæ Miliare retrocessis-
sent. Urgentia autem Symptoma-
ta prævalebant; & emissi Sanguinis
sperato fructu, tum Ægrotā, tum
nosmet freti sumus. Hoc tamen, non
sine Decocto Pectorali, Boloque
antea in usu, & Spermat. Ceti 3℔.
sumptis. Quibus & addidimus Em-

plastrum laterale è Pice Burgundicā,
Haustumque vesperi Paregoricum,
& Oleum Lini in promptu haben-
dum, sumendumque urgente Dis-
pnœā.

Die 10mo, respirabat paulò li-
berius, mitiusque Latus doluit. Spi-
ritus tamen defecere maximè. Inte-
rim Miliarium Pustularum moles
conspicua & multitudo præbebant
salutis spem haud mediocrem. Quas
Diaphoreticis adhuc fovendas pro-
penso habuimus imprimis accurando.
Et ad Dyspnœam, etiamnum præ-
valentem, jussimus Olei Lini Co-
chl. ij. secundā quāque horā sumen-
da. Et si Alvus indè laxa fuerit,
mixturæ sequentis Coch. aliquot bi-
benda.

℥. Diascordii ℥iij. Aq. Pulegii
℥vj. Epidem. ℥j. Ms.

Die 11mo, Pustulæ Miliare erant
laudabiles, spiritus quodammodo
refecti, Dolorque aliquanto mitior.
Respiratio tamen adhuc difficilis, se-
desque paulò molliores. Bolo itaque
& Apozemati Pectorali jam in usu
adjecimus Decoctum album alternis
vicibus sumendum, Emplastra Vesi-
catoria Brachiis applicanda, & horā
somnia haustum sequentem.

℥. Aq. Puleg. ℥ij. Tinct. Martis
gutt. xx. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Syr. de
Mecon. 3vj. Ms.

Die 12mo, Pustulæ Miliare satis
conspicuæ; at difficilior Respiratio,
& Diarrhœa, adhuc persistere. Bo-
lum etiam cum Julapio, Oleum
Lini, mixturam cum Diascordio,
& Haustum pacificum iterari volui-
mus.

Die 13io, subistere sedes, Pustu-
læque Miliare adhuc optimæ. Dyf-
pnœa

pnoea tamen, Laterisque dolor, paulò pertinaciores. Bolum itaque præscripsimus continuandum. Et quòd ab Oleo Lini maximè abhorruerit Ægrota Ol. Amygdal. dulc. Cochl. j. tertia quaque hora bibendum. Nec non Hyssopi folia cum Radicibus Helenii Decocto Pectorali addenda.

Die 14to, cum intermittente Diaphoresi, febrilem calorem accendi, continuari Dyspnoeam, & Vesicarum Ulcera penè exsiccata vidimus. Quare præter antea præscripta repetenda, Vesicatorium inter scapulas applicari volumus.

Die 15to, Spiritus ei longè magis, quàm ab aliquot diebus retro actis, fuere depressi. Loco itaque Boli hætenus in usu, sequent. substituímus.

℥. Confect. Rauleens 3ß. Croci, salis Vol. salis Armon. an. gr. vj. Syr. Caryophil. q. s. f. Bolus. Reliquaque ut antea sumenda.

Die 16to, Spiritus aliquantò vivaciores, leviorque Dyspnoea; Dolor tamen lateralis paulò asperior. Ideòque Bolum præscripsimus priorem, Haustumque pacificum cum Decocto pectorali repetendum.

Die 17mo, Eadem quæ die præcedente iussimus sumenda. Jam enim, & hinc in dies, omnia meliora videbantur. Tandemque membra, hætenus Paralytica, vim suam motivam aliquatenus recuperavêre. Postquam itaque Mannæ ʒij. in decoct. Pectorali dissolutas sumpsisset, fotum præscripsimus Tibiis applicandum, Vini Chalybeati usum, & ut Bathoniam adiret.

Historia Febris Miliaris cum Delirio Motibusque Convulsivis.

AUGUSTI 8vo, 1700. vocatus sum ad D. Bullock apud Insigne calcei Equini, in Vico *Cheapside* vulgò vocato. Cui Pharmacopœus erat D. Wyer in Vico vocato *Woodstreet*. Vicesimum quartum annum agebat, constitutione pituitoso-melancholicus, & adhuc Cælebs.

Post itinera quædam rure peracta sensit ægritudinem, cum diminuto appetitu, depressosque spiritus, atque oppressionem Pectoris cum suspiriis, per intervalla. Pro remedio Vinum nonnunquam, & Aquæ cujusdam cordialis aliquantulum bibere solebat. Appetitus tandem omnino aboletur. Et pridie quàm il-

lum visitavi, Vomitu, Diarrhoeâ, & Hæmorrhagiâ Narium correptus est. Sumpto autem Medicamento quodam interno, & Nuchæ appposito Vesicatorio ex Pharmacopœi præscripto, ista disparuere Symptomata.

Cùm ego primùm Ægrotum adiverim, horrore quodam laborabat, cum frigore & calore, se mutuò insequentibus, sed temporibus incertis. Maximam etiam pectoris oppressionem cum suspiriis & languorem spirituum passus est: Nec non Animi perturbationem, per intervalla ad Delirium usque, recurrentem. Item Manuum & Linguae Tremorem, cum Motibus Convulsivis & Vigiliis.

liis. Pulsus etiam frequens & debilis; lingua viscofitate alba obducta, sed sine siti; & urina sanorum similis.

Ex oppreffione pectoris & languore, hanc Febrem in Miliarem, eamque ex inæquali calore ac leni simplicem terminaturam prænovi. Ideòque Carpis Emp. Vesicatoria, & Plantis pedum alia ex Cephāl. cum Euphorbio & Pice Burgundica applicanda jussi, & sequentia sumenda ad lenem Diaphoresin excitandam.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Lapid. Goensis an. ℥ss. Mf. f. Pulvis sextâ quaque horâ è Coch. j. Julap. seq. sumendus, superbib. Cochlearia vj.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥viij. Cinnam. hord. ℥iv. Epidem. ℥j. Sacchar. perlati q. s. Mf. f. Julap.

Et ut Sudor lenis continuò, & facilius emanaret, seq. Apozema addendum curavi.

℞. Rad. Fragar. Chelidoniæ major. an. ℥j. Fol. Fragar. Mij. flor. Paralyseos p. ij. sem. Cardui benedict. ℥j. Bulliant in Aq. font. q. s. ad ℥ij. Colaturæ adde Syr. Croci, ℥j. Mf. f. Apozema, de quo sumat. Coch. x. sæpe in die.

Die 9no, Calor, sine subsequente Frigore, regularis fuit & Cutis humida; spiritusque non multum defecere. Æger tamen de quadam oppreffione pectoris cum suspiriis valde querebatur; & Deliria, Tremores, Motusque Convulsivi adhuc persistere. Ideòque Pulveris, Julapii, & Apozematis usum suasi continuandum. Et ad viscidam materiam, linguæ & palato obductam, mucilagine, ex Sem. Cydoniorum & Psyllii cum Hordeo coctis, os coluendum præscripsi.

Die 10mo, Calor similiter ac die præcedente regularis sine renovato Frigore, Cutisque humida. Sed Motum Tendinum Convulsivi adhuc majores. Quapropter Vesicatoria Tibiis internis applicanda jussi: ℞. Lapid. Goens. ℥j. cum Pulv. de gutt. ℥ss. ex Aq. Lact. alex. Coch. j. sexta quaque hora sumendum superbib. Coch. X. Et quoniam erat Æger nauseabundus, regioni ventriculi apponendum Emplastrum sequens.

℞. Empl. Stomach. Magistr. part. ij. Carannæ, Taccamah. an. p. vj. Ol. Cinnam. gutt. vj. Mf. f. Empl. Et ut vicibus interpositis bibat haustum Julapii cum gutt. XV. mixturæ ex Sp. C. C. ℥ss. Tinct. Cast. ℥ij. Et in quantum præscripta Mucilago vix quicquam in viscidam materiam linguæ adhærentem prævalebat, Gargarismatis sequentis usum imperavi.

℞. Aq. Meliss. ℥vj. Epidem. ℥j. Syr. de Althæa, Jujubin. & Mellis Mercur. an. ℥j. Mf. f. Gargarism. Aquam addidi Epidem. ne quid mali, etiamsi parum deglutiret accideret.

Vesperis pleraque conspexi ut antea. Motus quidem Convulsivi rariùs iterabantur; verum spiritus valdè defecerunt, manuumque superiora frigebant, volis interim calore affectis. Idcirco, omisso Pulvere de gutteta, Bolum sequentem præscripsi.

℞. Conf. Lujulæ ℥j. Bezoar Orient. ℥ss. Croci gr. vj. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus sextâ quaque horâ sumendus cum Julapio antea præscripto.

Die 11mo mala Symptomata ferè disparuerunt. Ideòque ultima præscripta jussi continuanda. Sed quia Apozematis patientem tædebat, in ejus locum substitui Aq. Lactis & Decoct. Pectoral. an. ℥j. pro potu ordinario, ut eo melius gustui gratificarem. Nec quicquam jam de Diarrhœa, quasi ex Decocto accidere possit, metum offerebat.

Vesperī omnia ut antea. Proindèque in usu omnium ultimò præscriptorum persistendum decrevi.

Die 12mo similiter: exceptā quādam corporis inquietudine. Ad quam Vesicatoria pone Aures applicanda jussi, & sequentem Haustum statim sumendum.

℞. Aq. Paralys. ℥iij. Croci ʒβ. Syr. Paral. ʒβ. Ms. f. Haustus.

Die 13io Inquietudini prædictæ jam abolitæ supervenit Hæmorrhagia narium. Quare suasi Ægro, ut assatim bibendo potum ultimò præscriptum sanguinem dilueret: Sed & persisteret in usu Boli, Julapii, & Mucilaginis. Et si de novo accideret Hæmorrhagia, sequens sumeretur Haustus.

℞. Aq. Spermat. Ranar. ℥iij. Syr. Plantag. ʒiβ. Ms. f. Haustus.

Sub vesperam Hæmorrhagia substitit. Reliqua Symptomata, viz. Delirium, Tremores, Motus Convulsivi, Languores, Pectorisque oppressio, in statu eodem ferè ac antea fuere. Ideòque & ultimò præscripta continuavi. Hoc solùm addendo, ut Apozematis, ex Decocti Hordei ℥j. Syr. Viol. ʒij. sumeret Coch. X. ter in die, tepidè.

Die 14to, Ægroti conditio pene eadem: nisi quòd aliquantò magis

delirabat. Immiscui itaque singulis Bolis Camphoræ grana aliquot, & cætera continuanda jussi.

Die 15to Pustulæ Miliare tandem emissæ Spiritus Animales elevarunt. Attamen Tremores Motusque Convulsivi iidem manebant; & Delirium potius videbatur exacerbari. Cum autem id fieri ex eruptione Pustularum nimis tardâ ac rarâ existimarem; Antimonium Diaphoreticum (cujus efficaciam, tum ad Pustulas expellendas, tum ad sedanda Deliria, expertus sum) sequenti modo præscripsi.

℞. Antimonii Diaphoret. ʒj. Conservæ Lujulæ ʒβ. Syr. Paralys. q. s. Ms. f. Bolus sumendus è Cochleari Potus pectoralis, superbibendo Haustum ejusdem. Post horas quinque Bolum cum Castoreo & Croco sumendum jussi, atque ut alternis vicibus repetantur. Et ut injiciatur Gargarismus ope Syringæ sæpe in die: quia lingua, Antimonii Diaphoretici usu, frequenter viscido humore inficitur.

Vesperī uberius altiusque exstant Pustulæ; aliaque Symptomata mitiora sunt, Delirio solo excepto. Quare & prohibui Volatilia, Antimonium autem Diaphoreticum quīnta quaque hora, cum Decocto pectorali, repetendum mandavi; & Gargarismatis Julapiique usum continuandum.

Die 16to Pustulæ erant adhuc crebriores, eæque majores quàm quæ primò pullulabant. Longè etiā levius Delirium per intervalla. Ideòque censui optimum fore, ut Ægrotus persistat in ultimo præscriptorum usu. Quoniam tamen Tremores,

Motusque Convulsivi, non obstante Pustularum eruptione, ex aliquâ parte manebant; Vesicatoria Brachiis internis applicanda jussi.

Vesperis omnia penè ut tempore matutino. Excepto Delirio, quod fit adhuc mitius. Ex causæ nempe metastasi, à Cerebro in Brachia. Nam motus Convulsivi intensiores fuere. Quare & ultimò præscripta judicavi continuanda.

Die 17mo Pustulæ numerosiores auctioresque erant. Motus tamen Convulsivi reliquaue Symptomata prope eadem. Tussis autem ac languor aliquantò graviores. Quare & antea præscriptis addidi Aq. Theriacal. Cochl. j. in Spirituum deliquis; & usum seq. Apozematis.

R. Decoct. Pectoral. ℞ij. Syr. Croci ℥j. Mf. sumat Haustum frequenter.

Vesperis Tussis Spirituumque defectus fuere leviores; Ideoque ultimò præscripta continuanda imperavi.

Die 18vo omnia ut die præcedente vidi, eademque remedia curavi repetenda.

Post horas autem aliquot elapsas à meo discessu iterum accerfor. Motus enim Convulsivi aucti fuerunt ex improvise, Spiritusque magis defecerunt. Exinde verò nil metuebam; Pustulæ enim copiosissimæ enatæ; Motusque aucti Convulsivi, Delirium mitigarunt. Præscripti tamen Pulv. de gutt. cum Sem. Pæoniæ, & haustum ex Aq. Card. bened. ℥ij. Croci ℞. Syr. Caryoph. ℥j.

Eodem die, paucas post horas,

nunciis ad me occurrit, qui aiebat Ægrotum brevi moriturum. Quem cum revisi, laborantem inspexi Motibus Convulsivis, iisque gravioribus. Sed exinde Delirium fuit mitius. Et prædixi illius matri, similes Motus repetitos iri donec à Delirio perfectè liberaretur. Et ut prædixi, à proximè sequente Paroxysmo omnino evanuit; & tam Animi quam membrorum quies restituta fuit. Cavendo tamen ne prædicta Symptomata novarentur, sequens Apozema (sæpiissime in Adultis, præcipue autem infantibus expertum) præscripsi.

℞. Ungulæ Alcis rasæ ℥j. Sem. Pæon. Visc. Querc. an. ℥ij. Ras. Cran. Human. ℥℞. Coqu. leniter in Aq. font. q. s. ad M℞. Colaturæ adde Syr. Pæon. comp. ℥ij. Mf. f. Apozema. Sumat. Cochl. x. frequenter. Jussi etiam manuum volas pedumque plantas Oleo succini illinendas; succum Rad. Paralyf. tempore Paroxysmi Naribus attrahendum; sumendumque Bolum sequentem.

℞. Conf. Anthos, Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ℥j. Castorei gr. vj. Syr. Pæon. comp. q. s. Mf. f. Bolus sumendus è Julapio antea præscripto. Et ne prædicta, si forsitan repeterentur, symptomata, tandem in Apoplexiam vel Convulsionem generalem terminarent, addidi Antimonium Diaphoreticum, ad Pustulas Miliare adhuc numerosius altiusque expellendas. Et ad feri sanguinis morbifici extrahendas reliquias, Vesicatoria Femoribus applicanda jussi.

Die 19no Pustulæ copiosissimæ

ad tantam crevere molem, ut latæ unguis medietatem æquarent, ut Ægroti verbis utar. Delirio deinde Motibusque Convulsivis profligatis, manuum duntaxat Tremor, corporis debilitas, spirituumque aliqualis languor superstites fuere. Boli itaque & Antimonii Diaphoretici loco jussi Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. cum Julapio antea præscripto sexta quaque hora fumendum, ad leniter continuandam Diaphoresin. Ut languoribus Aqua Theriacalis usurpetur: in potum ordinarium Apozema Antepilepticum: Et ad linguam, adhuc quodammodo affectam, Gargarisma.

Die 20mo omnia in eodem loco ac in die præcedente stabant. Excipe id tantum, quòd Pustulæ videbantur paulò minùs turgescere. Mandavi itaque ut Antimonium Diaphoreticum, Pulvisque è Chel. Cancr. compositus alternis vicibus fumerentur. Et Gargarismatis, Julapii, & Apozematis ultimò præscripti in usu persisteret.

Die 21mo Pustulæ versus siccitatem declinabant. Apozema tamen, cum Pulv. de Lap. Goensl. & Pulv. de gutt. censui continuandum. Nec non Gargarisma cum Mucilagine, ad

linguam nondum ab immunditie omnino liberam.

Vespere calorem linguæ fensit, & internum, sine sudore. Præscripsi itaque Margaritarum pp. ℥j. singulis dosibus Pulveris jam in usu addendum. Et ex haustu potùs ordinarii Spir. C. C. gutt. xx. secundâ vel tertiâ quâque horâ fumerentur, donec lenem Diaphoresin excitaverint.

Diebus 22do & 23io, cum omnia optata viderim, novissimè præscripta decrevi repetenda.

Die 24to, cum internus calor usque persisterit, Pulverem jam in usu suasi continuandum. Et in languoribus Sal. Vol. Oleos. cum Spir. C. C. ex haustu potùs ordinarii fumendum.

Diebus 25to & 26to, reliqua omittendo, solummodo Sal. Vol. Oleos. ex potu ordinario fumend. jussi. Et Julapium sequens ad languores, si fortè acciderint, in promptu habendum.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥viii. Scordii compos. Saxon. frigid. an. ℥ij. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. an. ℥j. Ms. Et sic tandem Æger perfectè convaluit.

Historia Febris Miliaris ex Opii usu desinentis in Apoplexiam.

Augusti 4to, 1697. evocatus sum ad D. Thom. Western, in Vico Thames street dicto cui D. Lancashire erat Pharmacopœus.

Vir ille habitu obeso gravabatur, & Plethora: Magno Capite, buccinata facie, brevique Col-

lo præditus. Unde & quocunque morbo antea laboraverat, Caput ei semper doluit, & delirabat. Ante dies aliquot lavavit Pedes, & cum amicis liberè comedit. Postea verò de Nauseâ & Ægritudine, cum Calore & Frigore irregulariter recur-

ren-

rentibus, Spirituumque languore & oppressione pectoris cum suspiriis querebatur. Nec Aqua quædam Cordialis, quam sponte sumpsit, Ægritudinem levavit.

Cum prædicto die illum visiterim, Pulsus erat frequens & debilis; Nausea & Ægritudo, nihilo mitiores. Cum Calore & Frigore, vicibus alternis, sed duratione incertis, Spirituum defectus, Pectorisque maxima oppressio cum suspiriis. Nec sine quâdam perturbatione, quoties somnus irrepere incepit. Quibus omnibus ritè perpensis, imprimis Haustulum sequentem præscripsi.

℞. *Salis Vitriol. Vomit.* ʒiβ. *Ex Aq. Jugland. comp. sumatur.* Et in languoribus bibat Julapii sequentis haustum. ℞. *Aq. Menth.* ʒx. *Epid.* ʒiβ. *Sir. de Menth.* ʒj. *Mf. f. Julapium.*

Die 5to Nausea & Ægritudo minores sunt. Idem verò languor, eadem Pectoris oppressio, & Ægroti dormituri perturbatio. Pulsus adhuc frequens & debilis. Manuum caluere volæ, minimè superiora. Urina sanorum similis; Calorque internus sentitur absque siti. Ex quibus Symptomatis novi Febrem adesse Miliarem. Ut itaque lenem excitarem Diaphoresin, proprioque potu illam fovendo Symptomatis prædictis obsisterem, sequentia præscripsi.

℥. *Pulv. e Chel. Cancr. comp. gr.* xxv. *Syr. Caryoph. q. f. Mf. f.* Bolus è Julapio antea præscripto sumendus sexta quaque hora.

℞. *Decoct. Hord.* ℥jβ. addendo inter coquendum Cochinellæ ʒj. Co-

laturæ adde *Syr. Caryoph. & Viol. an.* ʒj. *Mf. f. Apozema.* Sumat haustum per intervalla.

Vespere omnia vidi emendatiora. Ideòque Bolum ad ʒβ. augendum & continuandum præscripsi. Ut persisteret in usu Apozematis, & in languoribus, cum Salis Volat. Oleos. si gutt. xx. vel Aq. Theriacal. Coch. ij. At si remissior fuerit Diaphoresis, loco Salis Vol. Oleos. Spir. C. C. gutt. xx. fumeret. Et quoniam Patientis amici eundem narrabant in nullo Morbo tamdiu à Delirio fuisse liberum, hoc itaque præcavendo, Vesicatorium Nuchæ, & Emplastra suppedalia applicanda præscripsi.

Die 6to, manè, cum omnia eadem ac die præcedente viderim, jussi antea præscripta continuanda.

Vespere quædam in pejorem partem inclinabant. Paucula enim verba locutus est ineptè; & cum Nauseâ singultiebat. Præscripsi itaque Empl. Stomachic. Magistral. cum Carranna, Taccamahacca, & Ol. Cinnamonomi, regioni ventriculi applicandum; & Possetum Salviæ & semine Anethi alteratum: utpote in singultu à me probatum & expertum, pro potu ordinario.

Die 7mo, minus singultiebat; post duas trefve sedes, à Delirio omnino liberabatur; Pustulæque Miliæres super Pectore emicuerunt.

Hodie Ægrôti Amici alium Medicum mihi addiderunt Collegam. Is sedes, ne Pustularum eruptioni obstarent, cohiberi voluit; ideòque Adstringentia ex Diascordio & similibus quamprimum adhiberi. Ego verò, sumendo argumentum à ma-

à matière morbificæ Colluvie, nempe tum ad pustulas replendas, tum ad sedes sufficiente, suasi contrarium. Allegavi etiam, exempli loco, foeminam quandam generosam, quæ à Diarrhœâ, errore quodam suppressâ, indeque morbosa materiâ ex partibus inferioribus in Cerebrum irruente, paucas post horas obiit. Et in nostro Patientè, scilicet obeso habitu, brevique cervice, & eâ ratione ad Apoplexiam proclivi, multò magis humorum Metastasin nos cavere instabam debuisse. Attamen, ut in hac re mediam ineamus viam, assensum haud difficilem præbui. Præscripsimus itaque Bolum ex Margaritar. & Corallior. pp. an. gr. xv. Salis Absinth. gr. vij. Syr. Caryoph. q. s. Et ut bibat Decoctum album, Cochinellâ concoctâ, & Aq. Cinnamom. Hord. alteratum, instar potûs ordinarii. Ut Emplastrum ex Galbano Umbilico applicetur, ut & mucilagine, Aq. Rosarum extracta, os madesiat.

Vespere Diarrhœa multo mitior fuit. Sed aliquanto plus delirabat Æger, fortè à sedibus rarioribus. Neque à singultu omnino abstinuit. His animadversis, addidimus antea præscriptis Emplastra Vesicatoria Brachiis internis applicanda. Emplastra etiam subpedalia, & Possellum alteratum, ut à me antea præscriptum.

Die 8yo, tertius Medicus ad consultandum vocatus suam opinionem, de sedibus necessariò suppressendis, statim proposuit. Dixitque aliàs impossibile fore (ut ipsius verbi utar) Pustulas emitti. E contra Medicorum prior, atque egomet obje-

cimus materiæ morbificæ abundantiam, & Delirium, aliaque periculoso Symptomata, ex illius Metastasi metuenda: Sed frustra. Ille itaque sequentia præscripsit.

℞. Theriac. Androm. 3℔. Pulv. è Chel. Cancror. comp. Spec. Confect. de Hyacinth. an. gr. xij. Syr. Cydon. q. s. Mf. f. Bolus sumendus è Julapii seq. Cochl. j. superbibendo Julapii dimidium quàm primum, reliquum post horam vel primam sedem.

℞. Aq. Cynam. Hord. Menth. an. 3ij. Epidem. 3j. Syr. è Mecon. 3℔. Diascordii 3j. Mf. Et Emplastra Vesicatoria tibiis applicanda.

Collega primò vocatus illi assensit de Bolo sumendo; sed Julapium constanter reprobavit. Nihilominus ambo Medicamenta [circa nonam matutinam præscripta] sumpta sunt.

Circa tertiam vel quartam pomeridianam iterum convenimus, intelleximusque patientem statim à suppressis sedibus in Apoplexiam incidisse. Quem etiam, Pustulis Miliaribus in universum deletis, sensibus orbem vidimus. Quare & Vesicatoria Capiti & Carpis quamprimum applicanda jussimus; Sternutatorium è Flor. Lili conv. insufflandum, & sequentia sumenda.

℞. Salis Vol. Oleos. Tinct. Castorei, sp. Lavend. comp. an. 3j. Mf. Sumat frequenter gutt. xxx. circiter, ex haustulo Julapii seq.

℞. Aq. Meliss. Rutæ an. 3iiij. Pæon. comp. 3℔. Spir. Lavend. comp. 3iiij. Tinct. Castor. 3j. Syr. Pæon. comp. 3j. Mf. f. Julapium ut supra sumendum. Sed incassum omnia, nam paucas post horas mortuus est.

Historia Febris Miliaris ex Aere frigido admissio Lethalis.

SEPT. 25. 1700. Evocatus sum ad D. *Arnold*, Cerevisiarii *Westmonasteriensis* uxorem. Cui obstetricis officium præstitit D. *Watson*: Et Pharmacopœi, D. *Broughton*, in Vico vocato *Tuttlestreet*.

Illa, antequam parturiret, dolore Colico, ventriculo, ut aiebat, quasi onusto, & spirituum defectu ingemuit.

Cum die supra dicto primum adiverim, Aquæ serosæ, ex membranis Foetum in Utero includentibus, sed jam disruptis, effluerunt; & Infantis caput extra orificium Uteri internum hærebat. Nempe ex viæ angustia, capitis mole majori, spirituum defectu, doloreque mitiori, quam qui ad partum sufficeret.

De eodem spirituum defectu, etiam post partum exemptum, adeò querebatur, ut astantes omnes illam putarent brevi morituram. Cum autem hoc Symptoma jam idem videretur ac ante partum, idemque Pulsus; imminentis periculi nil metuens, Febrem adesse Miliarem palam indicavi, Pustulasque prædixi Miliare, tandem aliquando exituras. Ut itaque lenem Diaphoresin consuetam meam methodo excitarem, seq. præscripsi.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Castorei gr. iv. Syr. Paralys. q. s. Ms. f. Bolus quamprimum sumendus è *Cochl. j. Julapii communis.*

Die 26to Medicus alter magni

nominis de Patientis salute consultatur: Quam adhuc de Spirituum defectu & oppresso Pectore querentem audivimus. Ex quo præcipue Symptomate prædixi etiam alteri Medico, Pustulas Miliare suo tempore erupturas.

Ægrotæ Pulsus frequens adhuc & debilis; Calor universus, & sine alterno Frigore; Urina sanorum similis; verum à Colico dolore (forsan Alvi bis solutæ beneficio) libera evasit. Ne tamen Lochia minuerentur ex Diarrhoeâ, Pilulas imperavimus sequentes sumendas.

℞. Castorei gr. vj. Assæ Fætid. gr. xij. Laud. Lond. gr. j. Syr. Atriplic. q. s. Ms. f. Pilul. num. vj. Sumat ij. urgente Alvo, & deinceps quartâ quaque horâ. Sumantur autem è Cochyl. j. sequentis Julapii superbib. haustulum ejusdem.

℞. Aq. Ceras. nigr. ʒviij. Cinnam. Hord. ʒiv. Epidem. ʒx. Margar. pp. ʒj. Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julap. sumendum, ut supra præscriptum est, & in languoribus.

Die 27mo Ægrotam in eodem statu, quo die præcedente, vidimus: exceptâ leviori quadam cordis palpitatione. Jussimus itaque ut persistat in usu Pilularum cum Julapio, sumatque gutt. xx. Salis Volat. Oleos. in haustu potûs ordinarii, & in languoribus prædictum Julapium.

Die 28. Pustulis Miliaribus jam in conspectum eminentibus, Spiritus minus defecerunt, mitiora suspiria, minor oppressio. Recte etiam effluebant

Lochia, & Alvus mediocriter soluta fuit. Consulimus itaque Pilulas sine Laudano sextâ quaque horâ sumendas. Mater verò puerperæ, mortem ex Diarrhœa pertimescens, obnixè rogabat sisteretur. Et ut videamur ex aliquâ parte ad ejus mentem accedere, mandavimus sequentis Julapii usum.

℞. Aq. Menth. ℥ij. Epid. ℥i℔. Confection. Fracast. ʒj. Syr. de Mecon. ℥ de Menth. an. ʒ℔. Ms. f. Julap. de quo sumat Coch. iv. urgente Diarrhœa. Et ut persistat in usu salis Vol. Oleos. & Julapii perlati.

Die 29no, Ægrotam visitantes, intelleximus admodum timuisse matrem ob Diarrhœam & illi multò largius, quàm à nobis concessum est, de Julapio præbuisse: Sedesque exindè primò inspissatas fuisse, postea omnino suppressas. Unde & palpitatio, pectorisque oppressio majores subsecutæ sunt. Quapropter & sequentia censuimus sumenda.

℞. Croci ʒ℔. Sumatur e Coch. j. Aq. Lactis superbib. Coch. V. Sumat. etiam Tinct. Croci gutt. xx. ex haustulo Aq. Lactis sæpè. Usu etiam Croci, ad cordis palpitationem, fluxum Lochiorum, Spirituum defectum, Pustulasque Miliare alius emittendas, respectum habuimus: Demumque persistat in usu Pilularum sine Laudano, & Julapii

in languoribus. Et matris importunitati cedentes, præscripsimus etiam Julap. cum Diascordio in promptu habendum: dicebat enim mater, se id velle. Ægrotæ etiam percontanti, an semet in lecto erigere, & ventilabro uti liceat, necne? assensus est alter Medicus. Atque etiam, ut in se collectis cortinis pateat lectus; ignisque extrueretur, vel nullus, vel duntaxat parvulus. Interim mihi ab illa quærenti, an ex Aëre frigido, Collo vel Pectori admissio, quicquam mali sentiret? respondet, semet exinde Spirituum defectum Pectorisque oppressionem sensisse. Quamobrem illam obnixè rogavi, ut toto illo die calido utatur regimine; eoque potius, quòd ille esset dies Febris Lactæ: Ne cessante Diaphoresi Pustulæ Miliare retrocederent. Sed à nostro discessu sibi Aërem admisit, Pustulæque Miliare subito occultabantur. Unde materiæ morbificæ in cerebrum facta est Metastasis, statimque ægra sensibus orbata est.

Cùm eventus meæ responderet prognosi, seorsum vocatus sum: sed jam nullum vidi præscribendi locum.

Ex hisce duabus Historiis clarè constat, Febrem Miliarem, cum Symptomatis mitioribus incipientem, ex minimo errore fatalem sæpe exitum habere.

Historia Febris Miliaris, ubi quoddam Animi Deliquium maximè mirabile, supra biduum erat continuatum.

SEPT. 12. 1697. advocatus sum ad D. Hall, ad insigne Leopardi in Blackman-street, propè Divi

Georgii Templum habitantem, nono post partum die. Cui Pharmacopœus D. Bynn, & obstetrix D. Cretier,

ier, in Vico *Abchurch-lane* vulgo dicto.

Hæc puerpera annum agebat trigessimum octavum, & sextum jam partum enixa est. Constitutione debilis; tam ex partu semper difficili, quam dolore Colico sæpe recurrente. Quemque nuper passa est, cum Calore & Frigore alternis, & cum oppressione Pectoris, Spirituumque languore. Quæ Symptomata ab amicis tantummodo vapores, ut vulgò vocant, usque ad diem quo infans baptizatus est, communi errore, æstimabatur. Quo die visitantium multitudo adeò fuit obstrepera, ut exinde Spiritus ejus, antea debiles intensè perturbarentur, & Tremore ac Motibus Convulsivis correpta fuerit: Tantaque corporis inquietudine laboraverit, ut maritus vix potis esset eam in lecto retinere. Donec tandem, die scilicet illum quo advocatus sum præcedente, in Convulsionem universalem incidit, & summo languore jacuit quasi penè mortua.

Die supra dicto, cum circa nonam matutinam Patientem visitaturus sim, mihi Domestici narrabant, maritum ejus meum adventum per nuncium inhibuisse: jussisseque, si forte adsim, ne me in cubiculum admittant: putabat enim illam reverà animam reddidisse. Et cum, nolentibus illis, ægrotam adiverim, illam equidem absque pulsu, absque respiratione (ut per speculum ori & naribus appositum probavi) facieque mortis pallidissimâ, in lecto immotam & extensam Ego & astantes conspeximus.

Nihilominus è facto scrupulosiori

de antecedentibus scrutinio, conjecturam feci, mortis similitudinem illam à materiæ morbificæ in totum genus nervosum Metastasi provenisse. Nam mihi hîc in mentem id venit, quod notatu dignum est in Pisciculis Tubulo vitreo inclusis & per Microscopium inspectis: in quibus, scilicet, conspicua est Sanguinis Circulatio, etiam si mortui videantur. Prohibui itaque ne per dies aliquot hanc ægrotam stragulis denudarent, & non ante septimanam sepeliendam. Et multâ contentione obtinui Cucurbitulas cum Scarificatione, inter Scapulas, & Femoribus internis applicari permittant; Emplastra Vesicatoria pone Aures & super Carpis apponi; tempora & manuum volas pedumque plantas Oleo succini illiniri, succum Paralyseos, & ex Helleboro, Salviâ, & Floribus Betonicæ Sternutatorium Pulverem, naribus alternis vicibus insufflari; & Haustum ex Aq. Lact. ℥iij. Castor. gr. vj. Syr. Artem. 3vj. nec non Apozema pro D. *Bullock* præscriptum, si fieri possit, vi in os injici.

Post penè biduum, die scilicet 13tio, circa quartam pomeridianam, missi ad me Domestici narrabant, Chirurgum, simul ac hanc puerperam inspexerat, admiratione perculsum interrogasse, an Cucurbitulas mortuæ applicari vellent. Utcunque tamen eis morem gerens Cucurbitulas Femoribus apposuit; at non inter scapulas, adeò multum rigebat. Vesicatoria etiam Carpis applicarunt. Cæterum die supra dicto, nempe 13tio vesperi, licet ne

minimum respiraret, visa est tamen parum calefcere. Jussi itaque Cranii humani ℥j. cum Aq. Rutæ & Syr. Artemisiæ, si fieri possit, in os immitti.

Die tandem 14to, circa quartam matutinam, mollissimè respirare, atque etiam deglutire incepit. Ideoque Emplastra Vesicatoria inter Scapulas applicanda iterum præscripsi. Et ut gutt. xx. Salis Volat. Oleos. sumat sine vehiculo. Quo facto, Pustulæ Miliare demum in conspectum venere. Et in earum incrementum sequentia sumenda consului.

℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ʒß. Sumatur quarta quaque hora, e Cochl. j. Julapii sequentis superbibendo Cochl. iiij.

℥. Aq. Cinnam. Hord. ʒjv. Rutæ ʒiij. Pæon. comp. ʒjß. Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. julapium. Et ut bibat de Apozemate ex Ung. Alcis pro potu ordinario.

Die 15to loqui, seseque movere valuit; & de dolore ex Vesicatoriis edidit querimoniam. Pustulæque Miliare super Pectus pullularunt copiosissimè. Ideoque antea præscripta censui continuanda.

Die 16to Pustulæ molem acceperunt adhuc multò majorem, mensque illi redintegrata est. Nec am-

plius oppressione Pectoris, aut languore, sed solâ corporis imbecillitate, laboravit. Quapropter & sequentia præscripsi.

℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. gr. xxv. Aq. Lact. alex. ʒiijß. Epidem. ʒij. Ms. f. Haustus sextâ quâque horâ sumendus.

℥. Rad. Scorzon. Hisp. ʒj. Cort. Aurant. cond. ʒvj. fol. Galegæ, Meliss. an. M. j. flor. Cord. an. pj. Sem. Card. bened. ʒß. Coqu. in Aq. font. q. s. ad ʒjß. Addendo Colaturæ Syr. Limon. ʒj. Ms. f. Apozema, de quo sumat Haustum ad libitum; & in languoribus Aq. Theriacalem.

Ægrotam adeò bene se habentem abhinc usque ad diem 19um omisi visitare. Jamque solum Stomachica quædam amara præscripsi, ad acendum appetitum: Sumeretque post quartam noctem Sacram Tincturam, aquasque Strethamenses die sequente. Quo facto, in omnium admirationem perfectè convaluit. Tamen si, ut audiui, in Nare, durante Febre, nimis compressa passa est Sphacelationem. Quâ Chirurgi operantâ, alios quinque vixit annos; tandemque, ut mihi ejus maritus retulit, ex dolore Colico & Convulsione eidem superinductâ è vitâ discessit.

Historia Febris Miliaris in Chronicum Morbum terminantis.

In. 14to, 1699. evocatus sum ad D. Berenberg, puerperam, tunc in plateâ Walbrook vulgò vocata habitantem. Cui ut Pharmacopœus inserviebat D. Basket,

Obstetricis autem officium præstabat D. Taylor, in plateâ Pater-noster-Pon.

Querebatur, dum parturiret, de virium maxima imbecillitate. Et post

post partum, ut assistentes mihi narrabant, tantâ oppressione Pectoris, cum Spirituum defectu, laboravit, ut ad trahenda suspiria cogeretur. Ex illis tamen Symptomatis nihil præter Hystericos vapores, ut vulgò vocant, suspicatae sunt. Prædie autem ejus diei, quo me advocarunt, cum mammas ad lactandum infantem denudasset, & ad relaxandam alvum super aquæ calefactæ vaporem sedisset, frigoriq; multò semet exposuisset; exinde tandem spirituum angustiam, respiratione difficili, Asthmatis convulsivi æmulatione, Tussique sicca, adeò depressa fuit, ut illi mortem esse in propinquo existimaverint.

Cum primum illam adiverim, de prædictis affectibus, atque etiam de vigiliis querelas edidit. Pulsus illi erat frequens & debilis, & febrilis calor. Urina tamen pallida, & Lochia omnino suppressa.

Ex antecedentibus supra memoratis illam Febre Miliari laborare censui: attamen in principio mitiori. Quamdiu, scilicet, consueto puerperarum regimine gubernaretur. Postquam autem, eo ipso tempore, ut verisimile est, quo Miliarium Pustularum eruptio instabat, se irruenti frigori denudaverat; materiam morbificam, retrogrado motu Pectori interiori impactam, supra dictum Asthma creasse, conjectare licet. Nam ut in Pectore à me inspecto Pustulas tunc primò pullulantes, ita & duntaxat paucissimas cernere potueram.

Statui itaque, mihi consuetâ methodo, lenem sudorem & continuum excitare. Et ut alia Medi-

camenta, convulsivo Asthmatis, reliquisque Symptomatis, puerperisque commoda adjungerentur. Quamobrem & sequentia præscripsi.

℞. *Spermatis Ceti* ℥j. *Bezoar. Orient. Croci an* ℥ss. *Syr. Heder. terrestr.* q. s. *Mf. f.* Bolus sumendus e *Cochl.* j. *Aq. Lactis alex. superbibendo* *Cochl.* x. His enim, Lochiis promovendis, Asthmatis levando, excitandis spiritibus, & sudoribus magis liberis consului. Et ut Patienti illiusque amicis placerem, qui hanc Febrem Hystericum affectum æstimârunt, atque etiam Lochia foeliciùs continuarent, Pilulas sequentes præscripsi.

℞. *Castorei* gr. vj. *Assæ fœtid.* gr. xij. *Syr. Pæon. comp.* q. s. *Mf. f.* *Pil. no.* vj.

Die 15to optimè se habebat. Nam ex quo Bolum sumserat, spiritus fuere elevationes, facilior respiratio, renovatur effluxus Lochiorum, urina coloratior, Pustulæque Miliæres super Pectus magis conspicuæ. Bolum itaque die præcedente præscriptum censui repetendum. Addendo *Pulv. de gutt.* grana aliquot, ne Asthma convulsivum recurreret. Umbilico etiam Emplastrum ex *Tacamahacca*, & Emplastra subpedalia applicanda jussi. Et in languoribus sumeret Haustum Julapii perlati: Nec non *Aq. Theriacalis Cochl.* ij. alternis vicibus.

Vesperi, ex leni persistente sudore, respiratio adhuc facilis, Pustulæ Miliæres densiores, Spiritusque minus defecere. Ideoque ut in usu Bolorum antea præscriptorum persisteret, duxi optimum fore; Summeretque, pro re natâ, succi fimi

Equini in *Aq. Card. Bened.* & *Puleg.* infusi & expressi. Nimirum, ut Lochiorum effluxus, volatilibus fimi particulis, excitaretur.

Die 16to. noctem intellexi præcedentem sine ullo Symptomate Ægrotam transiisse. Antequam verò ab illâ discessi, respiratione convulsivâ iteratâ, vires subito diminutas sentit. Præscripsi itaque Haustum sequentem.

℞. Aq. Lact. alex. ℥iij. Epidem. Syr. Carioph. an. ℥ij. Lapid. Goens. Pulv. de gutt. an. ℥ss. Mf. f. Haustus. Et post horas sex sumat etiam Bolum antea præscriptum, Pilularumque duas tempore intermedio.

Vesperis sudorem, ex sumpto Haustu, universalem dimanasse narrabant. Unde & magis extumuerunt Pustulæ Miliæres, & Asthma diminutum est. Ideoque jussi persisteret in usu ultimò præscriptorum omnium. Et ad flatum, qui multum attulerunt molestiæ, Saccharo instillarentur Olei Cort. Aurant. gutt. iij. & fumerentur ad libitum.

Die 17mo, Cum prædicta Symptomata debellari viderentur, antea præscripta continuari consului.

Die 18vo, ex sudore intermisso, renovantur Symptomata, cum Ventriculi ægritudine, & quâdam confusione, quasi Delirii prodromo, conjuncta. Quamobrem, ad restituendum sudorem, jussi ut in usu Haustus persistat: Addendo singulis Haustibus Bezoar. Orient. grana aliquot. Ut cum posseto salviato aquam Theriacalem largè fumeret, & Emplastra subpedalia reputerentur.

Vesperis ex sudore copiosè renovato iterum evanescere Symptomata. Neque exinde quicquam infirmatæ vires, sed potius auctæ fuere. Etiam si maculæ quædam rubræ, & prurientes, miliaribus interspersæ, vi sudoris excreverint. Jussi itaque ut in usu Haustus & Infusi persisteret.

Die 19no. Pustulæ Miliæres coeperunt exsiccari; & omnia visa sunt versus sanitatem perfectam progredi: Solummodo spirituum diminutione exceptâ. Quapropter & præscripsi usum Haustus cordialis continuari.

20mo vocatus sum circa quintam matutinam. Quippe quòd ægrotâ in difficilem respirationem denuò incidisset: Non à Pustulis Miliaribus recessis; cum hæ jam antea penitus exsiccatae fuerint: Sed forsan à materiæ morbificæ quibusdam reliquiis, viam quasi quærentibus qua excernerentur. Nam ex tribus sedibus, spontè ac subito supervenientibus, Dyspnœa omnino evanuit, atque Ægra quàm optimè convaluit.

Nihilominus ex illius amicis aliquis alium Medicum advocari voluit. Qui cum adveniret, & Pustulas Miliæres, jam antea, ut dictum est, exsiccatas, nusquam vidit, sed tantummodo maculas rubras; me, quod hanc Febrem vocaverim Miliarem, irrisit: Dixitque rubras Pustulas à solo sudore posse oriri. Proindeque juxta indicationes quas sumpserat claudicantes aliquot dies præscripsit, sed re infecta. Deinde alius Medicus, & post illum tertius, atque quartus vocatus est. Qui omnes ignoti morbi curationem incautè susceperunt, donec in Chronicum tandem transiit. Quod si noverint hanc

Febrem reverâ fuisse Miliarem, & post exsiccatas Pustulas Miliare Cris-
sin perficiendam naturæ commisissent;
nullus dubito, quin Morbi lætus fuisset
exitus. Nam ab illo momento, quo Pustulæ
Miliare etiam salubriter exarescere solent,
non infrequen-

ter observavi, materiæ morbosæ reliquias,
vel per Intestina, ut in hoc casu; vel per
vias Urinarias, ut in sequenti; vel cum
Lochiis per Uterum, ut in quadam D. King,
in Vico Fleet-stret dicto, spontè & foeliciter
exterminari.

Historia Febris Miliaris in Morbum Chronicum, tandemque Mortem desinentis.

SEPT. 17mo, 1709. vocatus sum ad D. Bateman, D. Bateman, equitis aurati uxorem. Hæc ante viginti septimanas, in principio puerperii, dolore colico, oppressione pectoris, cum suspiriis spirituumque defectu, nec non pulsu frequente ac debili laboravit. Ex quibus Symptomatis morbum Febrem esse Miliarem palam prædixi. Et ex usu Diaphoreticorum optimè se habere sibi suæque Matri visa est. Prædicta enim symptomata parvi pendèrunt. Ægrotam itaque diutius visitare nolui. Consului tamen, ut seipsam per mensem lecto affigeret, in eorum quæ præscriperam usu persisteret, & ab infantis lactatione abstineret.

Meo autem consilio obtemperare noluit. Proindeque post quinque septimanas à partu passa est recidivam, cum dolore colico & laterali calore & Frigore alternatim recurrentibus, oppressione pectoris, cum suspiriis, spirituumque defectu. Ad Lateris dolorem Sanguis fuit emissus; unde & auctus Languor: Et quædam suffocatio, Hyſterici affectus similis, cum suspiriis illam premebat. Quæ symptomata Vapo-

res, ut vulgò loquuntur, tam Ægra quàm ejus mater æstimârunt. Cum revera à Venæ-sectione, catameniorum tempore, orta sint. Nam Lochia, quæ à partu ad sextam septimanam usque duraverant, exinde subito suppressa fuere, & deinceps ad illius vitæ exitum.

Jamque, quod ante exacerbationem Symptomatum magis frigeret, Morbum putârunt Febrem esse intermittentem: Etiamſi Pustulæ Miliare hoc tempore fuere conspicuæ. Nihilominus sumpsit corticem Peruvianum ex præscriptione Pharmacopœi. Ex quo motum materiæ, Pustulis adhuc magis augendis aptæ, in cutis superficiem impositum, eandemque aliò transmissam fuisse, minime dubitandum est. Primò super Femur, Tibiam, pedemque, quem Chirurgus scarificabat: Deinde & super intestina, ubi genuit Diarrhœam: Nec non super Nervos pulmonum, ramosque asperæ Arteriæ capillares; ubi Asthma, cum Tussi sputatoriâ & fætidâ produxit. Verum ex emissio è pede sero minimè remissior fuit Dyspnœa.

A Junii 23io, ad 25um, Medicus præscripsit Bolum ex Pulv. Chet. Cancr.

Cancr. composito, Rad. Serpent. Virg. & Castoreo; Decoctum album, Suppositorium, Empl. Vesicat. Nuchæ, & pedibus Cephalicum.

Junii 25to, Corticis Peruviani Decoctum. Die 26. Corticis Peruv. Pulverem. 28vo, Julapium ex Aq. Lact. 3jv. Menthæ, Cinnamomi hord. an. 3j. Laud. lib. 3j. Conf. Fracast. 3iij. ad Diarrhæam.

Julii 8vo, Lac Asininum cum Pulvere Margaritarum, e Chelis Cancror. simplice, & Saccharo perlato. Nec non Infusum amarum ex Absinthio Romano & Sem. Coriandri; addendo Colaturæ, Gummi Ammoniaci Aq. Pæon. comp. & mirabil. an. q. s. dissoluti 3j. & Aq. Ceras. nigr. 3vj.

Die 9no, Corticem Peruvianum. 26to, Bolum ex Pulvere e Chel. Cancr. comp. & Theriacâ Andromac. Et Decoctum album cum Rad. Tormentillæ. 29no, Infusum amarum, & Pilulas ex Pulvere Millepedum.

Aug. 3io, Pilulas ex Pulv. Ari comp. Myrrhæ & Syr. Balsamico. Et Decoctum ex Cortice Sassafras, Sem. Dauci, Baccis Juniperi, Rad. Eryngii condit. & Aq. Calcis q. s. addendo Colaturæ Aq. Nephriticæ.

Die 17mo, In consultatione cum alio Medico, Pilulam Mattheusianam. 19no, Vesicatoria Nuchæ & Brachiis applicanda. Pilulas ex Galbano, Gum. Ammoniaco, Croco, & Opobalsamo. Et Julapium perlatum.

Sept. 6to, Enema ex Decocto albo, Theriacâ Androm. & Diascordio. Infusum amarum ex Radicib.

Gentianæ, Helenii, Absint. & marubii foliis, Sem. Dauci & Baccar. Junip. in Aq. font. infusis, addendo Colaturæ Vinum Chalybeatum. Et Bolum ex Diascordio, Terrâ Japonicâ, & Ol. Cinnamomi.

Die 13io, Vesicatorium parvum, cum Epispastico Unguento, ad diu continuandum Ulcus. Pilulas ex speciebus. Diambra, Castoreo, Sale Volat. C. C. & Galbano. Et Julapium Hystericum.

Hactenus tres Medici magni nominis, duoque Chirurgi non incelebres Ægrotam visitarunt. Et hanc Morbi methodique præscribendi Historiam, majori ex parte, ab Illâ illiusque Matre, iterum advocatus accepi.

Jam tum difficili respiratione, Diarrhœâ, & manuum artuumque inferiorum Tumore gravata est: Adeo vertiginosa & languida, ut bis uno die ne Syncope moreretur metuerint. Pulsus ei valde frequens ac debilis. Et circa meridiem, Calore, Rubore, & Dyspnœâ, quotidie affectam fuisse narrabant.

Horum omnium, ferè à Morbi principio, Symptomatum, tres quatuorve Causas fuisse arbitror. Quotidianum scilicet è lecto egressum, Lactationem, Venæsectionem, è sumptis Medicamentis imprimis corticem Peruvianum. Hæc enim omnia pustularum miliarium incremento & durationi certum est obstitisse, & materiam morbificam in pulmones, Intestina, Artusque inferiores transfulisse.

De hoc Morbo, quòd sit immedicabilis, feci prognosin. Præcipuè ob summam Ægrotæ imbecillitatem, &

& quod Dyspnœa & Diarrhœa contraria indicarent.

Tristè confessâ est, multùm poenituisse se, me postèrius vocatis Medicis non associatum fuisse: Præcipuè, quod suam Sororem in simili casu à me sanatam meminèrit. Jam tamen à me proposita Vesicatoria nullibi apponi voluit, etiâsi Respiratio difficilis & Vertigo exigèrent. Fontanellas itaque inter scapulas aperiendas fuâsi. Et in ventris Tormina, Diarrhœam comitantia, Spiritum Millepedum, cujus efficaciam sæpe expertus sum, ex haustu potius ordinarii, ad gutt. xx. bis in die sumendum præscripsi. Et ut sextâ qua-

que horâ Bolum ex Spermate Ceti, Pulv. e Chel. Cancr. comp. & Croco, ad Menses movendos, lenem Diaphoresin excitandam, Respirationemque allevandam, deglutiret.

Die 20mo, in reditu meo à Regio apud *Windsoriam* Castello visitavi ægrotam, eamque à Vertigine omnino liberam conspexi, ejus spiritus haud mediocriter refectos, ventris Tormina consopita, & suppressam Diarrhœam, ut postea mixturâ opiatâ non opus fuerit. Persistentibus autem Dyspnœâ, ac inferiorum Arteriarum Tumore, & universâ imbecillitate in dies auctâ, post unam atque alteram septimanam obiit.

Historia Febris Miliaris cum largissimo Urinæ effluxu circa finem.

Julii 29no, 1705. D. Loyd Lin-tearius, apud Cynaræ Insigne in plateâ *Cheapside* dictâ, cuique D. *Basket* erat Pharmacopœus, me ad suam Filiolam septem annos natam evocavit.

Habitudine erat tenuior, Temperie calidior. Spiritus illi vivaces, sed facilè dissolubiles. Diebus aliquot præcedentibus, ex Calore interno cutis aridior fuit. Pridie hujus diei, cancrum comedit. Ex quo noctu ægrotabat, & calore vehementi siti-que correpta est. Quibus etiam Spirituum defectus, Vomitus, Pulsus frequens ac debilis, & Urina sanorum similis accessere.

Ex morbi Antecedentibus & Symptomatis prænovi hanc Febrem fore Miliarem. Ideoque lacteo Enemate, ad primas abluendas vias in-

jecto, pro meo more decrevi lenem ac continuam Diaphoresin excitare, calidæque interim & siccæ temperiei diluentibus favere. Præscripsi autem sequentem in modum.

℞. Pulv. è chel. cancr. comp. gr. viij. sumantur è cochl. j. Julapii sequentis, superbibendo cochl. ij. vel iij.

℞. Aq. ceras. nigr. ℥viij. Epidem. ℥j. Sacchari albiss. q. s. Ms. f. Julapium.

His addidi Emplastra, ex Cephalico cum Euphorbio, & pice Burgundica subpedalia.

Die 30mo visitanti mihi narrant; Ægrotam ex Enemate Alvum satis dejecisse: Noctemque magis placidam, quàm præcedentem, illi contigisse. Non adeò multum ardebat; calore tamen & frigore alternis mitius

affecta fuit, vomitioque omnino suppressa. Et jam primum super Pectus Pustulæ Miliæ in conspectum venere. Præscripsi itaque ut persisteret in usu Pulveris, & ad diluendam materiam febrilem, sudoremque favendum, Possetum Salviarum affatim potaret.

Die 3^{mo}, Spiritus minus oppressi sunt, & mediocriter refectioni. Sed ex usu Posseti intermisso paulò plus caluit; Pulsus frequentior, sed debilis; Pustulæ tamen miliares aliquanto magis fuere conspicuæ. Præscripsi itaque Pulveris e Chel. Cancr. comp. gr. viij. totidemque Margaritarum præparat. alternis vicibus sumenda.

Augusti 1^{mo} Pustulæ Miliæ sunt tumidiusculæ, Calorque internus minor. Externè verò paulò plus caluit, cutisque leni Diaphoresi humectabatur. Jussi itaque post subductam Alvum ex injecto Enemate antea præscripta repetenda.

Aug. 2^{do} Spiritus fuere vivaciores, Calorque adhuc minor internè. Consului itaque persisteret in usu Margarit. pp. cum Julapio quarta quaque horâ: Et ad tuendum caput Emplastrum Vesicatoria pone aures applicanda.

Aug. 3^{tio} non adeò equidem externè calebat: Verùm pustulæ Miliæ aspectum habebant minus laudabilem. Censui itaque pulverem e chelis cancr. compositum in usum revocandum. Quoniam verò puellæ mater ægrè ferebat Medicamenta adeò frequenter sumenda, sequentia præscripsi.

℞. Aq. ceras. nigr. ℥xij. Epidem. ℥iij. pulv. e chel. cancr. comp.

℥j. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julapium, de quo sumat Haustum sexta quaque horâ, agitata phialâ tempore usus. Et sumeret Margar. præp. Dosis in omnibus intervallis. Uteretur etiam Mucilagine ex sem. Cydon. & Psyll. Syr. e Rubo Idæo edulcorata. Et Empl. subpedalia repetentur.

Aug. 4^{to} Calor erat multò intensior, nec sine quibusdam motibus convulsivis. Puella enim, cuius calida erat naturalis temperies, largius de Julapio potaverat, quam debuit. Præscripsi itaque, Julapii loco, Margarit. pp. ℥ss, sexta quaque horâ sumendum, e Julapii sequentis Cochli. j. superbib. Cochli. iij.

℞. Aq. Lact. alex. ℥viiij. Epidem. ℥j. Syr. e Cort. Citr. q. s. Mf. f. Julap. Et ad feri Sanguinis partem acriorem diluendam, ut lactis aquam alexit. sumeret edulcoratam, instar potus ordinarii. Si diaphoresis suppressa fuerit, singulis aquæ prædictæ haustulis Spiritus C. C. gutt. iv. adderentur: Et Julapio immisceretur Pulveris de gutt. ℥j.

Die 5^{to} motus quievit Convulsivi, Calor fit mitior, Spiritus animales vires sumunt, Pustulæque Miliæ jam in principio declinationis sunt. Quæ clarè indicant, mala antea memorata Symptomata non tam à Morbo, quam à Julapio, nimia quantitate sumpto, provenisse. Jussi itaque ut in novissimè præscriptorum usu persisteret. Naturæ enim non imperandum, ut bene monebat Baglivus, sed illius monitis parendum est.

Die 6^{to} Febris adeò declinavit

ut Pustulæ Miliæres desiccare inceperint. Præscripsi tamen, ad Febrilem Calorem superfluum extinguendum, ut lactis aquam cum Margarit. præparatis Puella affatim bibat, & cortex Peruvianus in promptu esset, pro re natâ sumendus.

Die 7mo summo manè advocor. Tanta enim copia, tamque subito minxit Puella, ut de illâ, antequam matula afferri potuit, effluerit Urina. Unde pertimuit mater, ne Diabetes, & deinde mors sequerentur; ut suo nepoti accidisse aiebat. Cum reverâ partim ex Aq. Lactis, die præcedente liberalius potatâ, partim è Pustulis Miliaribus, tum exsiccatis, eveniret. Quemadmodum in antea descripto casu, & in eodem Morbi tempore, materiæ morbificæ reliquæ, ad Crisin perficiendam, per Alvum abierunt. Quod & hîc forsan accidisset, si Patientis temperies minus calida, Alvus natura laxior, ususque Margaritarum parcius fuisset. Et in simili casu hujusmodi Morbi reliquæ per Lochia non nunquam expelluntur: ut D. King, ad Trium Regum Insigne in *Ludgate-hill*, cui Pharmacopœus erat D. Alen, accidisse memini. Illi enim, statim à Pustulis Miliaribus penitus exsiccatis, Lochia, instar Sanguinis super Carbones adusti, nigricantia, sine ulla causâ evidenti, aut subsequente periculo, per horam integram emanârunt. Et quoties evacuatio neutrius prædicti generis post exsiccatas Pustulas contingit, sæpe vel Calorem internis partibus hærentem, cum

pressurâ Spirituum, deprehendô; vel quavis levi de causa recidivam patiuntur Ægri, & non nunquam mortem subitanæ: Vel ex materiâ in Artus rejectâ, aut Erysipelas, aut Hydropicus dolensque Tumor generatur.

Hæc omnia puellæ matri sigillatim monstravi, quò meliùs eam à timore liberarem. Nihilque amplius agendum, præter virium instaurationem; vel Corticis Peruv. usum, vel Pulveris Tellacei cum Lacte Asinino; cujus usus ei antea bene cessit. Alium tamen Medicum associari voluit. Eodem verò tempore ipse evocor ad Nobiliss. D. *Clarendonia* Comitem, ut de ejus nepote, Honorabil. D. *Obrian*, consulere. Ideo & alter Medicus sequentia solus præscripsit.

℞. Pulv. de gutt. Lapid. Contray. an. gr. vj. Castor. Salis Vol. C. C. an. gr. ij. Conf. Alchem. sine Mosch. ʒj. Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. bolus statim sumendus, & sexta quaque horâ, solutus in Cochl. j. Julapii.

℞. Decoct. albi ʒj. Aq. Cinnamon. hord. ʒj. Sacch. albiss. q. s. Ms. f. Apozema pro potu ordinario.

℞. Salis vol. Oleos. ʒij. sumat. gutt. vj. frequenter in potu quovis ordinario.

Et applicentur Emplastra Vesicatoria Brachiis internis & inter Scapulas.

Hujus præscripti Chartulam D. *Basket* Pharmacopœus ad me misit. Quâ perlectâ stupore quodam percussus sum; dixique, cum minime retrocesserint Pustulæ Miliæres,

sed regulariter & sine quovis pravo Symptomate exsiccarentur, me, ex Medicamentis calorificis, & à puella calidi temperamenti ac debilitatâ sumptis, nil melius quàm Febrem de novo accensam, mortemque minitantes sperare.

Nec me mea fefellit conjectura. Cum enim circa nonam vespertinam puellam visitaverim, ut omnia, secundum præscriptum ultimo memoratum, intellexi facta fuisse: ita & puellam ardore vehementissimo, cum siti ingente, linguaque arida, & respiratione difficili, laborantem vidi. Attamen, absente altero Medico, nihil præscribere mihi visum est.

Die proximo manè nobis, unâ Puellam visitaatibus, narratum est, illam pessimè transiisse noctem, & jam ardebat maximè, sitique valde urgente & Dyspnœâ afflicta fuit. Et mihi interroganti alterum Medicum, qualibus indicationibus satisfecisse proposuerat? Respondet, se me absente, qui solus Morbi Historiam enarrare potui, Pustulas Miliare retrogradas æstimavisse. At cum id fieri non posse monstraverim, habitâ consultatione, & concessit Medicus dosin diminuerè, & sequentia præscribere.

℞. *Lapid. contray. Pulv. de gutt. an. gr. iv. Croci, Castor. an. gr. j. Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. Bolus sumendus e Coch. j. Julapii.* Sumeretque ad diluendos humores Decoctum

album pro potu ordinario. Et ne ex Alvo adstricta usuque Boli Calor excitaretur, suppositorium præscripsimus ex Melle & Sale Gemmeo.

Die 9no Calor fuit remissior, liberiusque respiravit. Præscripsimus itaque Enema ex Lacte Saccharato, Bolumque unum.

Die 10mo in statu longè meliori Puellam vidimus; Symptomatis, à calidis Medicamentis ortis, consopitis omnibus. Attamen ad recuperandas vires, Calorisque interni recursum præveniendum, Pulverem præscripsimus sequentem, è Coch. j. Lactis Asinini sumendum, superbibendo $\frac{1}{2}$ ss. tepidè.

℥. *Pulv. è Chel. Cancr. comp. Margar. pp. an. gr. vj. Ms. f. Pulvis.*

Die 11mo ut adhuc tutius præmuniamus puellam, ne illi febrilis Calor novaretur, consulimus, *Cort. Peruv. Pulv. ʒss. e Coch. j. Julapii* quarta quaque hora sumendum; & pro re nata, Aq. Lactis haustulum. Et ad perficiendam valetudinem Rus adiret, ubi saniori statu semper gaudebat.

Haud multo post audiivi, illam iterum malè valere, aliosque advocari Medicos. Id autem minimè mihi displicebat: nam sub eorum cura obiit; cum antea, me illam curante solo, Deoque favente, tam bene illi res cesserit, ut è Febre mediocris tempore evaserit.

Historia Febris Miliaris in Mammæ Apostema terminantis.

Junii 2dò 1699. ad Viri admodum Honorab. D. Trevor Commun. Placitor. Justitiarum Capitalis Uxorem, jam defunctam, circa sui Puerperii principium, evocatus sum. Cui Pharmacopœus erat D. Gelfthorp; obstetrix, D. Dodson.

Cum gracili corpore animum possedit tranquillum, Spiritus tamen nativos debiliores. Ante partum in Calorem internum sæpe incidit. Postea dolere Dorsum & Femora, ut in Puerperis solent: Et, doloribus remissis, horrore correpta est; quem Febrem esse Lacteam putarunt Mulieres: tertio enim à partu die contigit.

Quoniam tamen Spiritus deficere sensit, die prædicto vocatus sum. Cum observaverim Symptomata, quadam oppressione Pectoris suspiria cogente, summè dejectis Spiritibus, Capitis dolore, Pulsuque frequenti ac debili, illam laborare vidi. Urina sanorum similis, Palmæ erant calidæ, Lochia effluebant, Alvusque potius accessit ad Laxitatem. Denu- dato autem Pectore, inibi numeravi Pustulas tres Miliare. E quibus, etiamsi paucissimis, satis apertè constabat, hanc Febrem esse Miliarem. Mihi autem id affirmanti Digniss. D. Hamden, aliæque astantes, vix assentiri voluerunt.

Attamen ex numero Pustularum adeò parvo materiam ad eas fovendas aptam aliò tendere suspicatus sum. Ut itaque earum eruptionem leni &

continua Diaphoresi promoverem, sequentem Haustum sexta quaque hora sumendum præscripsi.

℞. Aq. Lact. ℥iij. Pæon. comp. ℥ss. Pul. è Chel. Cancr. comp. gr. xv. Pulv. de gutt. ℥ss. Syr. Meliss. q. s. Ms. f. Haustus.

Pulverem è Chel. Cancrorum paulò minori quantitate præscripsi, ne motum Sanguinis magis acce- lerem, quàm Diaphoresi jam excita- tæ continuandæ par esset. Ad tuen- dos nervos, si Pustulæ fortè retro- cessissent, addidi Pulv. de gutteta cum Aquæ Lactis majori Dosi di- luente.

Præscripsi etiam ad Capitis dolo- rem Emplastrum Vesicatorium inter Scapulas applicandum, & Empl. sub- pedalia. Ei pro alimento ut Pullo- rum jus sorberet. Quod, ut magis nutritium, in hac Febre potius quàm in quavis alia, præcipuè in natura debilibus, præbere soleo. Quibus & adjunxi seq. Julapium ad libitum sumendum.

℞. Aq. Meliss. ℥viiij. Cinnamom. hord. ℥iv. Epidem. ℥j. Sacch. perlati ℥ij. Ms. f. Julapium.

Die 3tio melius se habuit, ex omni parte. Attamen, ne remitteretur Diaphoresis, præscripsi Bolum sequentem.

℞. Conf. Anth. ℥ss. Pulv. è Chel. Cancr. comp. 3. Syr. Me- liss. q. s. Ms. f. Bolus sumendus cum Julapio.

Vesperis Febris exacerbata est pri-

mo contingentibus Symptomatis. Quibus etiam accessit Respiratio difficilis: Nec non levior Diarrhoea, è Lochiis diminutis. Nam excrementitia materia, tentabat transitum ab Utero ad Intestina. Sequentem itaque Bolum cum Julapio sumendum præscripsi.

R. Conf. Anth. ʒʒ. Theriacæ Andr. ʒj. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Croci, an. ʒʒ. Syr. Melissæ q. s. Mf. f. Bolus.

Theriacam prætuli Diascordio, quòd non solum moderetur Alvum; sed & plerumque magis faveat sudoribus. Et, omissis aliis Astringentibus, Crocum addidi, ut uberiorem Fluxum Lochiorum, sine astrictione Glandularum Intestinalium, restituerem. Quæcunque enim Intestina astringunt, suum etiam Utero affectum imprimunt. Quod imprimis advertendum est, ne ex uno sanato Symptomate aliud generetur.

Veruntamen, ne Bolus suprà dictus minus sit efficax, seq. Julapium præscripsi in promptu habendum.

R. Aq. Ceras. nigr. ʒviii. Cinnam. hord. ʒiv. Epidem. ʒj. Conf. Fracast. ʒj. Conf. de Hyacinth. sine od. ʒʒ. Syr. de Menth. ʒj. Mf. f. Julap. de quo sumat Cochl. iv. post sedes singulas. Et ne quid mali accideret ex Opiatis, præscripsi Vesicatoria Carpis applicanda. Quæ etiam in Diarrhoea non nunquam profunt, dum materiam morbificam ad exteriora revellunt.

Die 4to à sumpto Bolo Theriacali somnum sudoremque secutos fuisse intellexi. Unde & omnia Sym-

ptomata in meliorem partem inclinarunt. Neque astringentis Julapii opus erat. Præscripsi itaque Bolum cum Julapio perlato repetendum. At sine Theriaca; quòd hic minus calida ad continuandam Diaphoresin viderentur sufficere. Et inefficacis Medicamenti, majore quantitate quàm par est adhibiti, exemplum habemus in Salivatione. Hanc enim sæpe, & præcipuè in debilibus, Mercurii dulcis gr. v. vel x. singulis noctibus sumpta, foelicius producant, quàm ejusdem Medicamenti tripla dosis. Cujus etiam rei Testis est D. Tindal Pharmacopœus. Qui, cum hanc methodum cuidam Patienti præscripsissem, multa admiratione dixit, se nil inde expectare: nuperrimè enim Doses multò majores prædictæ Patientis Filiæ, à magni nominis Chirurgo dari, & vel undecim hebdomadas frustra continuari, viderat. Verùm Mercurius dulcis nimiam quantitate sumptus Sanguinis motum adeò accelerat, ut materiam, quæ ex mediocri Dosi per Glandulas Salivales secerni solet, Vomitione aut Sedibus expellat. Et notum est, in Melancholicis Alvum facilius subduci Medicamenti Lenitivis, quàm Catharticis plerisque fortioribus. Et pari modo sudor jam profluens, Diaphoreticorum Dosis augendo vel nimis frequenter repetendo, sæpe in ardorem desinit.

Attamen ne ad continuandum sudorem deesset materia, Apozem. seq. præscripsi.

℞. Rad. Fragar. Chelid. major. an. ʒ. fol. Meliss. Fragar. Chelid. an. p. ij. Sem. Card. bened. ʒij. flor.

*flor. Cordial. an. p. β. Coquantur in Aq. font. q. f. Colaturæ ℥ijβ. adde Aq. Epidem. ℥ij. Ms. f. Apoze-
ma.*

Vesperi rediit exacerbatio, sed multò levius. Bolum itaque Theriacalem repetendum præscripsi. Deinde, post horas sex, Bolum sine Theriaca; & emplastra subpedalia applicanda.

Die 5to Symptomata quæque vidi benigniora, Pusculasque Miliare ad maturitatem properantes. Præscripsi itaque ut in usu Boli sine Theriaca, Apozematis, & Julap. persisteret.

Quoniam tamen Dyspnoeam renovari posse suspicatus sum, si exacerbationes prædictæ iterentur, donec Pusculæ exsiccatae fuerint, aliud Medicum in consultationem vocandum monui, quem Patientis Amici nominarunt. Vespere itaque convenientes Symptomata totum illum diem fuisse leviora intelleximus. Jam verò vidimus omnia, nempe Diarrhoeam, Dyspnoeam, Spirituumque defectum exacerbari. Præscripsimus itaque sequentia.

℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. Conf. Fracastor. an. 3β. Syr. Caryoph. q. f. Ms. f. Bolus fumendus in Cochl. j. Julapii sequentis, superbibendo Cochl. v.

℥. Aq. Ceras. nigr. ℥x. Puleg. Bryon. comp. an. ℥ij. Margar. pp. ℥ij. Sacch. albiss. q. f. M. f. Julapium.

Die 6to manè, non obstante Bolo, Patiens sexies sedem petiverat, noxque ei inquiete transiit. Nec jam Exacerbatio omnino finita fuit. Jussumus itaque Bolum continuandum,

& Vesicatoria Brachiis internis applicanda. Quibus addidimus Gargarismum ex Decocto Plantaginis cum toto, & seq. Enema.

℥. Seri Lact. Vino Hisp. separati ℥x. Elect. e Baccis Laur. ℥j. Sacch. rubr. ℥ij. Ms. f. Enema.

Attamen interrogatus seorsum à D. Hedges, Ægrotæ matre; Quid ad magnum illum Spirituum defectum sit faciendum? Suasi, ut in Aq. Lact. haustulo Croci fumeret 3β. & post aliquot horas repeteret.

Vesperi nobis narratum est, Patientem omisisse Bolum cum Diascordio. Sed Croci, ut à me præscripti, usu repetito, levioribus Symptomatis diem transegisse. Nam ex leni sudore Pusculæ Miliare laudabili modo se extulerunt. A juvenibus itaque indicationem fumentes præscripsimus Pulverem sequentem.

℥. Pulv. e Chel. Cancr. comp. 3β. Croci Pulv. gr. vj. Ms. f. Pulvis sexta quaque hora fumendus cum Julapio.

Die 7mo visa est optimè se habere. Alvus ei mediocriter soluta fuit; nempe longioribus intervallis, & sine virium jactura. Neque inde Pusculæ Miliare disparuere. Quamobrem, ut in usu alterno Boli sine Diascordio, & Pulveris ultimo præscripti cum Julapio, persisteret decrevimus.

Vesperi Symptomata, cum difficili Respiratione & Diarrhoea, exacerbata sunt. Quare & præscripsimus Bolum cum Diascordio, & reliqua ut antea.

Die 8vo etiamsi Bolum sump-
sisset

fisset cum Diaſcordio, haud tamen ita bene ſuſſe aut dormiſſe ac poſt Bolum Theriacalem à me præſcriptum Aſtantes aiebant. Magis enim inquieta fuit & calida, difficiliuſque adhuc reſpirabat. Præſcripſimus itaque, ut in uſu Pulveris perſiſteret.

Vespere videbatur novam pati exacerbationem. Ego verò ultimam nondum penitus finitam eſſe cenſui. Loco itaque Boli Diaſcordialis Theriacalem præſcripſimus repetendum.

Die 9no intelleximus, noctem præcedentem fuiſſe facillimam. Et jam quæque Symptomata benigna, Puſtulaſque Miliareſ, & numero & mole auctaſ vidimus. Præſcripſimus itaque in Exacerbationis intervalliſ Bolum ſine Diaſcordio aut Theriaca ſumendum. Opiata enim tempore Exacerbationis ſumpta melius operari, expertum habeo: præcipuè ſi Veſicatoria ſimul applicarentur.

Die 10mo, poſt noctem valde pacatam, Ægrotam ſpirituum ſummo defectu, madore frigido & univerſali, præcipuè in manibuſ, fractam mirati ſumus. Præſcripſimus itaque Croci \mathfrak{ss} , ex hauſtulo Aq. Lact. bibendum; & ſuppoſitorium ex Melle cum Spec. Hier. cocto intrudendum. Ut Lap. Goenſ. \mathfrak{vj} . cum Croci gr. \mathfrak{vj} . ſumeret ſexta quaque hora: Hauſtumque cum Croco in languoribuſ & madore frigido. Nec non Apozema pectorale, cum Linctu oleoſo,

ad moderandam Tuſſiculam jam primo ortam. Ne puſtuliſ ad ſiccitatem tendentibuſ materiæ morbificæ reſiduum in Pulmoneſ irrueret.

Diebuſ ſequentibuſ nihil præter Julapium perlatum & Crocum, in languoribuſ ſumendum, & Diætam Nutritiam; præſcriptum eſt. Quibuſ adeo vires Patientiſ auctæ ſunt, ut poſtea materiæ morbificæ reliquiæ in Mammarium Glandulaſ tuto ſecernerentur. Verùm ad ejus imbecillitatem habita ratione, Pilulâ Tart. Quercet. aliquot vicibuſ ſumptâ, materiæ prædictæ maturationem tardare volui. Quo facto, ita bene reſ ceſſit ſub cura D. Bernard Chirurgi Regii, ut paulatim, & pene ſine dolore, Pus generaretur, & paucis poſt diebuſ optimè convaleſceret.

Verumtamen paulo ante proximum Puerperium narravit Medico magni nominis ſe ſub præcedente, Febre correptam fuiſſe; & ex Calore, quem ſenſit interno timere ne ſimiliter recurreret. Quare ille Medicus Sanguiniſ \mathfrak{ss} . Venæ ſeſſione emittendaſ conſuluit. Qua facta, ut Foetum in Utero languidiuſ moveri ſtatim ſenſerit; itaque cum ad partum ventum eſſet, adeo debilitata fuit, ut antequam illam adire potuerim, in ipſo Conatu, ad excludendum Foetum (etiam hic ritè poſitum) neceſſario, ſupremum diem obierit.

Historia Febris Miliaris ex Frigore propè Mortalis.

Sub finem mensis Julii, 1706. Vocatus sum ad Filiam D. Smith in Areâ, Bartholomew close vulgo vocata, statim post partum. Cui obstetricis officium præstitit D. Summers, & D. Springet Pharmacopœi.

Post partum passa est Fluxum Lochiorum nimium; cum Pectoris oppressione maxima, spirituumque defectu: nec non frequenti Pulsu ac debili, manibusque superius pene frigidis. Quorum symptomatum, cum nulla causa, sive ad Infantem, sive placentam, habita ratione, apparuerit: à quodam Febrili Calore, ejus spiritus exhalante, & simul frangente Vasorum vim retinendi, pendere videbantur, Febremque Miliarem, latentem monstrare. Sequentia itaque præscripsi.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus in Cochl. j. Julapii perlati communis sumendus, superbib. Cochl. iv. vel v. Id scilicet mihi met ipsi proposui, ut, facta per Diaphoresin secretionem mediocri, moderarer Uterinam. Nam ut Sanguinis Fermentatio aut Motus violentior secretionem minuit: ita & altera Evacuatio alteram. Quem duplicem Aphorismum, ex multiplici mea observatione enatum, habeo. Neque adeo tuto vel Astringentia præscripsissem, vel Opiata. Dum ex nimio Lochiorum fluxu, hoc modo diminuto, forsan & fluxus naturalis defectus sequere-

tur. Cujus rei effectus quantum metuendi sunt, tam Medici quàm Obstetrices bene norunt.

Meæque in hac re conjecturæ, sumpti Medicamenti operatio dedit Suffragium. Nam Boli usum, ut spirituum antea depressorum elevatio, ita & Lochiorum diminutio secuta est.

Dehinc, etiamsi prænoverim, Febrem suam naturam brevi patefacturam: ne tamen Patientis Amici studere me lucro putarent, de illa tacens, consului, ut in usu Boli manere & vesperi persisteret, in Lecto maneret, seque ab omnium consortio averteret. Ut tranquilli esset Animi, pro Cibo sorberet Pulli Gallinacei Brodium, nec non Decoctum Avenarum excorticatarum Vinosum; & pro potu ordinario, possetum Salviatum; addendo singulis haustibus spiritus cornu Cervi guttas aliquot, si Diaphoresis remissio contingerit; & in languoribus Salis Vol. Oleosi similiter. Hoc facto, Patienti in aliquot dies valedixi.

Deinde redeunti mihi narratum est ab adstantibus, mea mandata diligenter illam observasse, & mediocri usam fuisse valetudine; Vaporibus solis (ut locuti sunt) exceptis. Spirituum enim defectum, Pectusque oppressum passa est, cum Vigiliis & Animi perturbatione ex obrepente somno. Calore enim & Frigore alternis vicibus, sed inæqualibus in-

H h h

tervallis

tervallis & præcipuè in sudoris intermissione recurrentibus, affecta est. E quibus Symptomatis adhuc certius prævidi, Pustulas Miliarese tandem exhibituras.

Hujusmodi fere statum Febris retinuit usque ad diem Augusti undecimum. Ubi à prandio vocatus sum ad illam, Syncope ex improvise correptam: quamque brevi morituram Amici æstimarunt. Cum illi adsum, è Lecto surrexisse intellexi, & deinde statim in Syncopen incidisse: Nec ab eâ evasisse, donec in Lectum redierit. Ego verò Pustulas Miliarese editas fuisse subolens, & ab irruente frigore retrocessisse; eas equidem in denudato pectore deprehendi, sed inter surgendum depressas.

In hoc casu non ad vehementer calida censui confugiendum. Ne, nimis Sanguinis accelerando motum, Pustularum uberiores proventus, magisque aspectabilem impedirem. Verum istiusmodi potius elegi Medicamenta, quæ, cum mitiora sint, foelicius excitarent Diaphoresin, & emittendo Pustulas, depressos Spiritus elevarent. Sequentem itaque in modum præscripsi.

℞. Conf. Acetos. ℥j. Bezoar. Orient. Croci an. ℥ss. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus sumendus è Coch. j. Julapii sequentis superbib. haustum ejusdem.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥x. Angel. comp. ℥i℥. Sacch. perlatis q. s. Mf. f. Julap. de quo sumat haustulum ut supra, & in languoribus. Repetatque Bolus sexta quaque hora.

℞. Salis Vol. Oleos. ℥ss. sumat

gutt. xx. cum potus ordinarii haustulo aliquoties in die. Et subpedalia Emplastra applicentur.

Die 12mo multo melius se habuit. Spiritus enim nec adeo depressi sunt, neque perturbati; Pustulæque magis confertæ, & expansæ, magisque extumescere. Unde eas ex frigore retrocessisse patet. Alias enim tantum progressum, tamque subitaneum fecisse, minimè existimandum est. Jussi itaque ut in usu Boli & Julapii persisteret, fumeretque in languoribus Aq. Theriacal. tenuioris Coch. ij.

Die 13tio cum quæque viderim laudabilia, ne sæpe visitando tædium Patienti afferrem, crearemque fumentorum odium, sequentia, usque ad diem decimum septimum, continuanda jussi.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus sexta quaque hora sumendus cum julapii perlatis haustulo.

℞. Castor. gr. vj. Assæ fætid. gr. xij. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. pilulæ num. vj. sumat ij. in Intervallis, ad fluxum Lochiorum continuandum.

Die 17mo pustulis jam exsiccatis, patiens usquequaque rectè se habuit. Excepto quodammodo frigido madore, per intervalla, recurrente. Cui ut occurrerem, prævideremque ne quid mali à pustulis jam deletis accideret: jussi, ut in usu Boli dies decem persisteret. Et si è lecto surgendo defici Spiritus sentiret, statim in eundem rediret, Bolusque præscriptum fumeret. Quibus obtemperando præceptis, perfectè convaleuit.

Historia Febris Miliaris, cum Delirio maximè furioso.

M Aii 24to 1699. evocatus sum ad D. Powell, in platea Ba-singhall-street vulgo dicta, Ancillam; cui D. Dalton erat pharmacopœus.

Hæc primò Capitis Dolore, & Frigore Caloreque alternis, sed mitioribus, Rure affecta fuit: Una cum magno Spirituum defectu, & pectoris oppressione suspiria cogente. Quæ Symptomata, à mensibus obstructis & exinde Vaporibus (ut vulgò loquuntur) provenire, Domestici putarunt.

Cum autem indies ingravescerent, primo meæ visitationis prædicto die, illam pulsu frequenti ac debili maximoque languore vidi laborantem, adeoque vehementer delirabat, ut penitus nesciverit responsa dare; vociferabaturque, etiam in Vicinorum Molestiam. Unde & judicavi, hanc Febrem fore Miliarem. Sed ex omisso hætenus debito regimine, materiam pustulis generandis aptam, partim inhærere Sanguini, & ex parte Nervis impelli.

Præscripsi itaque Enema, ex Decoct. communis pro Clyst. ℥viii. Mellis Mercur. ℥iii. Sacchar. rubr. q. s. injiciendum quamprimum. Vesicatoria etiam Carpis applicanda, & ab Enematis finita operatione, Bolum sequentem sexta quaque hora sumendum.

℞. Conf. Acetos. ʒß. Pulv. e Chel. Cancror. comp. ℥j. Croci gr. iv. Sem. pæon. gr. vj. Syr. Atrip. q. s. Ms. f.

Bolus in Cochl. j. julap. sequentis sumendus superbib. Cochl. iv.

℥. Aq. Ceras. nigr. ℥viii. Aq. pæon. comp. Syr. Atrip. an. ℥j. Ms. f. julapium.

Ad deobstruendos Menses pilulas sequentes præscripsi.

℥. Assæ fetid. gr. x. Castor. gr. v. Syr. Atrip. q. s. Ms. f. pilul. vj. capiat ij. sexta quaque hora Bolorum usui interposita.

Et in Furorem, si insomnis fuerit, ut addatur Bolo circa horam quartam matutinam sumendo, Laud. Lond. gr. j.

Die 25to pulsus ei, ut antea, frequens ac debilis, perstititque vociferari. Non autem continuò deliravit. Bolum itaque cum Laudano Amici omiserunt. Proinde & ipse Bolum sine Laudano, cum Julapio & pilulis, continuandum præscripsi.

Vespere paulo melior erat Morbi facies ac matutino tempore. Cœperunt enim sudores jam effluere, pauculæque in pectore pustulæ Miliæres pullulare. Alvus tamen, Enematis antea præscripti vim eludens, adhuc valde stricta fuit. Quamobrem & aliud jussi injiciendum.

℥. Decoct. commun. pro Clyst. ℥viii. Elect. Lenit. ℥j. Conf. Hammech. ʒß. Sacch. rubri q. s. Ms. f. Enema.

Et ab Enematis operatione finita, ut sumeretur Bolus sequens.

℥. Conf. Acetos. ʒß. pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Syr. Melissæ q. s. Ms. f.

J. Ms. f. Bolus quinta quaque hora sumendus.

His addidi Mucilaginem ex Semin. Cydon. & Psyllii, Decocto Hordei extractam, & Syr. è Rubo Idæo edulcoratam; sumendam cochleatim, sensimque deglutiendam.

Die 26to ab astantibus intellexi, somni paululum obrepisse patienti post Enema rejectum, totamque noctem continuasse Diaphoresin. Plures etiam jam extitere Pustulæ, & suspiria fuerunt rariora. Præscripsi itaque Bolum repetendum.

Vesperis mihi narratum est, Ægrötam omnia Symptomata de novo passam fuisse: Et in vehemente suo Furore se adeo in lecto jactasse, ut inde sudores subsisterent. Quos ut restituerem, Spirituumque turbulentiam pacificarem, Camphoræ usum, (in simili casu sæpe à me expertum) cum Emulsione sequente consului.

℞. Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. excort. n. xv. Contund. cum decoct. Hord. q. s. affundendo deinde ejusdem Decocti ℥ij. Edulcoretur Colatura Saccharo albo pro potu ordinario.

Jussi etiam ut Julapium repeteret, & Bolum cum laudano die sequente mane.

Die 27mo dictum est, Patientem à sumpto Laudano vix quicquam dormire potuisse. Ex usu autem Camphoræ totam noctem perstitit Diaphoresis, Pustulæque plures extitere. Jussi itaque Bolum sine Laudano continuandum.

Die 28vo eadem Pustulæ Miliæres visæ sunt incredibili constipari numero. Quæ attamen haud usque adeo profecerunt, quin Delirium, vociferansque Furor recurrerent. Cum itaque Antimon. Diaphoretici vim, tam ad Pustulas expellendas, quam ad compescendum Delirium, sæpe expertus sim, sequentia præscripsi.

℞. Antimon. Diaphor. Pulv. e Chel. Cancr. comp. an. ʒss. Ms. sumantur ter de die e Cochl. j. Julap. sequentis, superbib. Cochl. v.

℞. Aq. Ceras. nigr. ʒvj. Meliss. ʒjv. Epidem. ʒij. Syr. Melissæ ʒj. Ms. f. Julap.

Et ad calorem internum ac sitim, linguamque fordidam ac siccam, præscripsi Decocti Hord. ℥ij. Syr. Viol. ℥ij. edulcoratas pro potu ordinario.

Die 29no post noctem multo quietiorem quam antea, Pustulæ fiunt adhuc ampliöres. Unde & Vociferatio & Delirium accepere temperamentum. Lingua tamen manusque arefactæ sunt. Præscripsi itaque ut Bolo addatur Lap. Prun. ʒss. ut bibat singulis Diebus Apozematis ℥ij. & ut Empl. Vesicat. Tibiis applicarentur.

Die 30mo omnia Symptomata optabilia sunt. Quare ut persisteret in novissimè præscriptorum usu ad Junii 12. consului. Tandem, circa Junii 16. præscripsi Pil. Tart. Q. ʒj. secunda vel tertia quaque nocte sumend. ad sextam vicem. Quibus sumptis, perfectè, & præter omnium Domesticorum & Visitantium expectationem, convaluit.

Historia Febris Miliaris cum læsa memoria.

A Prilis 4to 1701. vocatus sum ad D. Buller in Newington-Butts, cui ut Pharmacopœus infer-
viebat D. Hunter.

Ille, dum iter ad Londinum con-
fecit, maximo Dorſi dolore, cum
Ventriculi ægritudine, Vomitione
& Dysuria, correptus est. Quæ
Symptomata ſibi viſa ſunt ſimpliciter
Nephritica. Et Medicamenta quæ-
dam huc referentia fruſtra ſumpſit.
Prædicto die ad eum acceſſi. Et
quoniam Antecedentia narrando, ſpi-
rituum defectum & ſuſpiria tacuiſſet,
ſequentem præſcripſi Hauſtum Eme-
ticum.

℞. Salis Vitrioli Vomitivi ℥iij. Di-
vide in Doſes ſex. Sumantur ſin-
gulæ ex Aq. Jugland. comp. Cochl.
j. ſuperbibendo hauſtum poſſeti ſol.
Card. bened. alterati. Et Vomitione
ſinita, ut ſumeret Pil. Stomach. cum
Gum. ℥j. ad Humorū & Vomito-
rii eliminandas reliquias, & ad mun-
dificandas vias Urinarias, ut die ſe-
quente mane bibat Aquæ Stretha-
menſ. ℔ij.

Die 5to ceſſabant Vomitio & Æ-
gritudo, libereque tam per Urinam,
quàm per ſedem, aqua Cathartica
effluxit. Dorſi tamen perſiſtit Do-
lor; etiãſi mitiori gradu. Calore-
que ac Frigore, vicibus alternis, ſed
inæqualibus, captus eſt. Pulſus etiã
illi erat frequens ac debilis. Spi-
rituumque penuria, & Peſtoris op-
preſſione ſuſpiria provocante, vexa-
batur. Unde conjecturam feci, hanc

Febrem Miliarem eſſe futuram, &
ſequentia præſcripſi.

℞. Lapid. Goenſ. Pulv. de gutt.
an. ℥ſ. Mſ. f. Pulvis è Julapii per-
lati hauſtulo ſexta quaque hora ſu-
mendus.

Die 6to Languor & ſuſpiria le-
viora ſunt. Cum verò Dorſi dolor
potius ingraveſceret: præter Pulve-
rem antea præſcriptum, monui E-
nema ex Decocto communi & Melle
Mercuriali injiciendum. Eoque re-
jecto, ut Pulv. è Chel. Cancr. comp.
℥j. ex Hauſtu ſequenti ſumeret.

℞. Aq. Lact. alex. ℥iij. Epidem.
Syr. de Meconio, Ol. Amygd. dulc.
an. ℥ſ. Mſ. f. Hauſtus. Demumque,
ut paretur Muſilago ad emolliendam
linguam.

Die 7mo Dolor fit mitior; ſpiri-
tus autem perturbati ſunt & depreſſi:
forſan ex ſumpto Syrupo è Meconio
nocte præcedente. Præſcripſi itaque
Emplaſtra Veſicatoria quamprimum
Brachiis internis applicanda. Et ad
continuandum Sudorem Hauſtum ſe-
quentem.

℞. Aq. Lact. alex. ℥iij. Epidem. ℥ſ.
Lap. Goenſ. Pulv. de gutt. an. ℥j. Mſ.

Et ſpirituum defectu urgente, ut
Hauſtum Julapii perlati, & Aq. The-
riacal. Cochl. j. aut ij. vicibus alternis
ſumeret. Et ad linguam manuſque
jam pauliſper trementes, ut cum Hau-
ſtu potus ordinarii ſpiritus Lavend.
comp. gutt. xx. capiat aliquoties in die.

Die 8vo Puſtulæ Miliareſ in
conſpectum venere. Iedoque multo

lenior factus est Dorsi dolor ; spiritusque minus defecerunt , neque adeo sunt perturbati. Jussi itaque ut fumeret alternis vicibus Haustum ultimo præscriptum , & Bolum sequentem.

℞. Bezoar. Orient. Croci an. ʒʒ. Syr. Paralyf. q. s. Mf. f. Bolus.

His addidi Apozema ex Aq. Hordeatæ ℥ij. & Syr. Viol. ʒij. Ut & Medicamentis & Pustularum materiæ expellendæ sit vehiculum. Nec non ad Renes Viasque Urinarias abluendas : Alvumque plerumque strictiorem , leviter relaxandam. Et Apozematis haustui Aq. Theriacalis aliquot Cochlearia minuscule suasi addenda.

Die 9no auctus erat Tremor , nec sine quibusdam indiciis levioris Delirii. In quantum tamen Pustulæ , adhuc plures majoresque extiterunt , spiritusque fuerunt minus depressi , jussi , ut in omnium antea præscriptorum usu persisteret.

Die 10mo symptomata , die præeunte mala , emendantur. Verum jam orta Tussis levicula molestiam patienti attulit. Ideoque ne materiæ morbificæ reliquiæ pulmonibus post pustulas desiccatas irruerent , sequentem Linctum præscripsi.

℞. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Syr. Heder. terr. Capill. Vener. an. ʒj. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Linctus.

Et ut loco Apozematis antea præscripti bibat sequentem Ptisanam instar potus ordinarii.

℞. Decoct. pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an. ℥ij. Mf.

Et utumat sequentis mixturæ

gutt. xx. cum haustu Ptisanæ in languoribus.

℞. Tinct. Castor. ʒij. Salis Vol. Oleos. ʒʒ. Mf. Demumque ut in usu Haustus & Bolorum persisteret.

Die 11mo cum omnia penè eadem ac in die præcedente viderim , jussi ultimo præscripta continuanda.

Die 12mo ex noctis præcedentis vigiliis quodammodo perturbabantur spiritus : sed minimè defecerunt. Quoad reliqua , mediocriter etiam se Æger habuit ; Pustulæque in desiccationem inclinarunt. Ne tamen Morbi reliquiæ , in sanguinem Nervosque transferrentur , Vesicatorium inter Scapulas præscripsi applicandum , usumque Bolorum & Julapii perlati repetendum.

Die 15to à Febre liberatur : excepta quadam spirituum perturbatione levicula. Ad quam Enema repetendum jussi ; Bolumque cum Julapio mane & vespere , & in languoribus sumendum. Ne Medicamentorum usui nimis subito desuesceret.

Die 18vo ex Pilularum quarundam Catharticarum usu sensit se Capite multum levari. Deinceps , etiam si pulmones præcautione antea memorata evasere salvi , ex Morbi tamen reliquiis versus exteriora propulsis , Apostema fuit genitum : quod sub cura D. Hunter brevi sanatum est.

Ex hac Febre licet Ægroti Memoria læsa fuit maximè , exquisitæ tamen Diætæ usu , post bimestre spatium , perfectè redintegrata est.

N. B. Symptoma in Febre Miliari primo sensibile partem antea affectam fere semper occupare ; ut in casu jam supra descripto contigit.

Historia Febris Miliaris ex sumpta Emulsione Lethalis.

DIE 10mo Sept. 1700. vocatus sum ad Viri admodum Hōnorab. D. Trevor Aurigæ uxorem, in Candelariorum Societatis Ædibus habitantem, & jam puerperam; cuique pharmacopœus erat D. Hunter.

Tertio à partu die, febrili Horrore, Caloreque succedente, Febri Lactæ simili, correpta est. In maximum etiam languorem, pectorisque oppressionem cum suspiriis incidit, & insomnis diem noctemque transegit. Quæ Symptomata, cum mere Hyſterica vulgo putarentur; Ægrota hæc Hyſterica etiam Medicamenta, sed frustra sumſit. Quamobrem à Digniff. viro D. Thoma Lane Equite Aurato, cui Patientis maritus olim infervierat, visitare illam exoratus sum. Quam cum primo adiverim, Pulsu frequenti ac debili, perturbatis spiritibus, oppresso Pectore, suspiriis Caloreque interno, laborantem vidi. Et licet Urina ejus esset sanorum similis; Palmæ tamen caluere. Quæ omnia ut Febris Miliaris mihi visa sunt indicia; ita & quædam Pustulæ, in illius deinde denudato pectore conspicuæ, hanc meam conjecturam comprobarunt. Præscripsi itaque secundum meam usitatam Methodum Pulverem frequentem, sexta quaque hora sumendum.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ℥j. Croci ʒss. Mf. f. Pulvis.

Die 11mo Pustulæ Miliæres mi-

rum in modum constipabantur. Unde & nox patienti transiit placidissimè; Spirituumque perturbatio, & suspiria fuere mediocria. Præscripsi itaque ut in pulveris & Julapii usu triduum persisteret; fuineretque in languoribus Spir. C. C. guttas aliquot in potu ordinario.

Die 14to pustularum Eruptio fuit adhuc magis conspicua; languore & oppressionem pectoris jam devictis. Nam præter calorem internum vix quicquam mali sensit. Forſan autem perſtitit iste Calor, quod Ægra diluentia, vel nondum, vel non satis potavisset. Ideoque Lactis Aquam alexiteriam instar potus ordinarii bibendam præscripsi. Et ut sumat Aquæ Theriacalis aliquot Cochlearia in haustu ejusdem: ad servandum inter potum & medicamenta æquilibrium. Præcipuè, si vel languor & oppressio recurrerent, vel remitteretur Diaphoresis. Demum, ut Veficatoria Brachiis internis applicarentur. Tam ad pustulas foelicius ampliandas, quam ad mala quæcunque Accidentia avertenda.

Diebus 15to & 16to cum eadem esset Morbi facies, ultimo præscripta censui repetenda.

Die 17mo ex usu Aq. Lactis intermisso incidit Ægrota in levem Dyfuriam. Statim itaque D. Hunter pharmacopœus, eoque absente alter, accersitus est. Qui dum solummodo Dyfuriam præ oculis haberet,

haberet, Emulsionis libram bibendam misit. A cuius usu statim substitit Diaphoresis, maximaque oppressione & Dyspnœa prehensa fuit. Tandem & me vocarunt. Sed antequam illam adiverim de ea concla-

matum est, & brevi obiit.

Ex Historia jam supra descripta patet, quam maximum periculum in hac Febre ab errore, etiam minimo, pendere potest.

Historia Febris Miliaris cum

Febr. 27mo 1707. vocatus sum ad D. Coutts, in Vico Mark lane vulgo dicto, jam puerperam; cui D. Hunter ut pharmacopœus ministravit.

Annos aliquot sinistri Lateris dolorem sustinuerat. Quem a Splene genitum plerique ob id æstimarunt, quod prope partem Lienis anticam latus occupare videretur. Cum sinistri Renis antica pars esset revera affecta.

Ex Morbo Nephritico totum Ægroræ genus Nervosum imbecillitatem aliæque vitia contraxerat. In ptyalismum frequenter incidere solebat. Et per bimestre spatium antepartum passa est internum Calorem. Qui, (ut antea monui) sæpe & præcipue in Gravidis paulo antepartum Febrem Miliarem præcedit. Tandem, sine obstetricis ope, foetum enixa est.

Post dies aliquot dolorem primò sensit in sinistro Latere, deinde in dextro cum horrore. Postea calore & frigore alternis, sed inæqualibus intervallis, vexabatur.

Die quo illam primò visitavi, Pulsus ei erat frequens ac debilis; lingua subalba & humida, ferè sanorum similis; quemadmodum &

Ulcere, Calculoque Renum.

Urina, sed sine sedimento. Calor & Frigus irregulares habuere vices. In dorso manus calor erat mediocris, cum palmæ ferverent. Ut ab illa dormitura avolavit somnus; ita & Spiritus ejus tumultuaria quadam perturbatione commoti sunt. His etiam sonitus Aurium, palpitatio cordis, Dyspnœa irregulariter repetita, maximaque oppressio cum suspiriis, accessere. Nonnunquam item tremuere manus: Et a ptyalismo omnino suppresso, Lochiisque parce effluentibus, tum deliravit, tum motibus convulsivis levioribus correpta fuit. A quibus Symptomatis, Febrem hanc esse censui Miliarem. Et præcipue a Spirituum defectu, & pectoris oppressione cum suspiriis; mihi hujus Febris signis Pathognomonicis. Et a Dyspnœa, Tremore, & Debilitate, Febrem præcedentibus, periculolam esse intellexi.

Duplicem itaque præ oculis habui indicationem. Scilicet, excitare Diaphoresin, & ad Symptomata sigillatim respicere.

Ut priori satisfacerem, & ad Lochia restituenda, Dyspnœamque levandam, Bolum sequentem præscripsi.

℞. Pulv.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti an. ℥j. Castor. gr. iv. Syr. e Mecon. q. s. Mf. f. Bolus cum Julapii sequentis haustu sexta quaque hora sumendus.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥x. Bryon. comp. ℥i℥. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julapium, de quo sumat haustum ut supra & in languoribus.

Porro ad Dyspnœam materiamque morbificam minuendam, & caput defendendum, Vesicatorium Nuchæ applicandum jussi.

Ad renovandum autem ptyalissimum, Sanguinemque diluendum, eoque modo pustularum egressum promovendum, & ne Dysuria ex Empl. Vesicatorio contingeret, sequens Apozema præscripsi.

℞. Decocti Pector. ℥i℥. Aq. Pæon. comp. ℥j℥. Syr. de Alth. Jubin. an. ℥j. Mf. f. Apozema, de quo sumat haustum frequenter.

Et ad promovendam Diaphoresin, ut Sp. corn. C. gutt. xx. haustui Apozematis adderentur.

Deinde ad Lateris dolorem leniendum, Haustum sequentem, cum pulv. è chel. cancror. comp. ℥j. sumendum præscripsi.

℞. Aq. Meliss. ℥ij. Bryon. comp. Syr. de Mecon. Ol. Amygd. dulc. an. ℥℥. Mf. f. Haustus.

Et quo melius restitueretur ptyalissimus, quoddam Gargarisma, à patiente antea probatum permisi usurpandum.

Ad hæc omni loquacitate & Visitantium turba Ægrotæ interdixi. Ut si insomnis fuerit, saltem tranquillitate frueretur. Suasi etiam, ut possetum salviatum & calidulum

affatim bibat, ad calorem internum minuendum, meliusque producendam diaphoresin.

Die 28vo dolor Lateris multò fuit remissior, & jam quietè jacuit, etiamsi nox sine somno præterisset. Caput etiam pacatius, & Respiratio facilior. Pulsus tamen frequens adhuc & debilis; at cum motu magis æquabili. Quin & palpitatio cordis, Tremorque perstitere, & convulsivorum Motuum quædam specimina. Lenis tamen jam orta fuit & universalis Diaphoresis. Calor item externus magis regularis, & in manu ubique sui similis. Lingua & Urina eadem ac die præcedente. Et quamvis pectus adhuc fuerit oppressum, spiritusque defecerint; rariora tamen trahebat suspiria. Quibus omnibus perpensis sequentia præscripsi.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Croci, Pulv. de gutt. an. ℥℥. Syr. Pæon. comp. q. s. Mf. f. Bolus circa tertiam pomeridianam sumendus, & deinceps sexta quaque hora, cum Julapii sequentis haustulo.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥x. Pæon. comp. ℥j℥. Sacch. albiss. q. s. Mf. f. Julap.

Et ut Apozema antea præscriptum continuaretur.

Cum verò cubicularia me jam discessuro submissiori voce fuisset allocuta: contigit ut Ægrotæ putaret illam dixisse, se brevi fore maniacam. Quod ei adeo perturbavit animum ut paulo post in delirium (à quo ex primo meo præscripto huc usque immunis fuerat) de novo incidit. Pharmacopœus itaque mis-

fus est indicare mihi, quod Domino Couts gratum foret, si Medicum, jam a multis annis sibi suique ordinarium, meis associarem consiliis: ut si forsan alio fuerim avocatus, ille in promptu esset.

Vesperis convenimus. Et statim à consultatione inita, iste Medicus, primariam Indicationem pro continuanda Diaphoresi flocci faciens, Medicamentis valde calorificis opus esse urget. Quibus à me rejectis, sequentia præscripsimus.

℞. Lapid. Goens. ℥ss. Oculor. Cancr. pp. ℥j. Croci, gr. v. Castor. gr. iv. Syr. Pæon. comp. q. s. Ms. f. Bolus hora nona sumendus in Cochl. j. Julapii sequentis superbib. Cochl. v.

℞. Aq. Meliss. ℥vj. Puleg. Bryon. comp. an. ℥i. Ocul. Cancr. pp. Marg. pp. an. ℥ij. Sacchar. albiss. q. s. Ms. f. Julapium.

Et ut applicentur Emplastra Epispastica super carpis.

Martii Imo nobis narratum est, patientem, nocte præcedente insomnem fuisse; & jam inquietudine, calore, & delirio laborare vidimus: Medicamentum enim Sudorificum, Diluensque omissa fuere. Proposui itaque Antimonii Diaphoretici usum; Medicamenti, scilicet ad pustulas Miliarese emittendas, nec non ad levandum delirium, à me sæpissime probati. Ille verò, postquam diu renixus est, tandem mihi assensit; convenitque inter nos sequentia præscribere.

℞. Antimon. Diaphor. ℥j. Lap. Goens. gr. xij. Castorei grana aliquot, Syr. Caryophil. q. s. Ms. f. Bolus sexta quaque hora sumend.

cum Julapio antea præscripto.

Et ut Emplastra subpedanea applicarentur.

Die 2do involuntariè quidem Urina extillaverat; sed id à Vesicatoriis, ut videbatur. Domini enim delirii loco sana mens rediit. Respiratio etiam erat facilior; Motusque Convulsivi vix quicquam sensibiles. Vidimusque pustulam quandam rubram super inspecto collo. Quod alter Medicus, hanc Febrem haud esse Miliarem, arguere contendit. Quem errorem postquam illi ex aliis Symptomatis patefecissem; concordi animo eadem quæ ultimo præscripta sunt continuari iussimus.

Die 3io in denudato pectore Pustulas miliares absque ullis alterius generis conspeximus. Unde & quæque lenita sunt Symptomata. Quamvis enim per noctem pene insomnis fuisset, ex leni tamen Diaphoresi, quietudine, animique tranquillitate, & respiratione facili fruebatur.

Nihilominus ille idem Medicus, eorum loco, quorum usum finem desideratum obtinimus, calida Medicamenta, ad Spiritus, ut aiebat, exaltandos, usurpari voluit. Ego verò, post longam disceptationem, cum assentire minimè ausus sim, ipsum, ut per se faceret experimentum, permisi. Interim Pharmacopœum Cubiculariamque monui, ut horum Calidorum effectum accuratissime notarent. Ille verò sequentia præscripsit.

℞. Conf. Alcherm. sine odor. ℥ss. Pulv. è chel. cancr. comp. Lapid. contray. an. gr. xij. Salis Succin. gr. v. castor. g. iij. Syr. è cort. citr. q. s. Ms. f. Bolus sumendus quinta

quinta quaque hora, superbib. Julap.
sequ. cochl. iv.

℞. Aq. Meliss. Lact. alex. an. ℥iv.
Scordii comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥iſs.
Margar. pp. ℥iv. Sacch. albiss. q.
s. Mj. f. Julapium, sumendum ut
suprà præscriptum est & pro libitu in
languoribus.

Die 4to nobis narratum est, Æ-
grota noctem valde inquietè transi-
ſſe. Ita ut præ anxia quadam ægri-
tudine sudores calidi per totum cor-
pus ei effusi sint, & (ut asseveravit
pedissequa) linthea mordere cogere-
tur. Ad hæc, maxima oppressione
& Dyspnœa, motibusque convul-
sivis magnis & frequenter repetitis
afflicta fuit. Quæ omnia Pulsus fre-
quentissimus & Vermicularis comita-
batur.

Forſan prædicta dos, quoad
quantitatem, non adeo calorifica vi-
debatur. Cum tamen brevioribus In-
tervallis, & ab Ægrota, jam & an-
te hac ad febrilem effervescentiam
proclivi, fumeretur; & ubi Ren
suo proprio Morbo fuit affectus,
minor dos, instar majoris valere
potuit.

Cæterum ille alter Medicus, cum
ad consultandum seceſſerimus, à me
quæſivit, quid eſſet tandem facien-
dum? Ego verò respondere haud du-
bitavi, locum consultandi dari nul-
lum, nec quidem sperandi. Ille ve-
rò à sudoribus salutem promiſit. E
contra, eos ex Agonia & Morbi
Veneno eſſe merè colliquativos, ad-
monui. Demum, poſt quædam alia
hic illic objecta, ſequentia præſcrip-
ta ſunt.

Applicentur Empl. Vesicat. am-

pla & acria Femoribus internis. Et
repetantur ſubpedalia.

℞. Bezoar. Orient. ℥j. Antimon.
Diaphoret. gr. xij. Conf. Alcherm.
ſine odor. ℥j. Syr. Caryoph. q. s. Mj.
f. Bolus quamprimum ſumendus, ſu-
perbib. Julapii ultimo præſcripti Co-
chl. iv.

℞. Tinct. Caſtor. ℥ij. Capiat gutt.
xvj. in haſtu potus ordinarii.

℞. Decoct. albi tſſ. Aq. Cinnam-
hord. ℥iv. Sacchar. albi q. s. Mj. pro
potu ordinario. Sed, antequam pa-
rata erant Medicamenta, Ægrota
hæc mortua eſt.

In diſſecto Cadavere Intestina,
ut sæpe ſolent, flatibus valde di-
ſtenta vidimus, & illorum vaſa ca-
pillaria Sanguine referta. Majora
verò, & præcipuè in peritonæi in-
terna ſuperficie, ſtagnante Sanguine
quaſi nigricantia, Gangrænæ ſimili-
tudinem præ ſe ferebant: ſcilicet,
circa dextrum Latus, ubi nuper Æ-
gra de dolore maximè quærebat.
Nam antea Latus præcipuè ſiniſtrum
ei doluit. Ideoque ſiniſtri Renis
Parenchyma conſpeximus abſump-
tum, Tunicaſque pure plenas, &
Calculo magno, cum quibuſdam par-
vulis infima & antica parte poſi-
tis. Ren dexter videbatur fere ſa-
nus; & ſimiliter Hepar, atque Ute-
rus. Veſica verò Fellea Bile flavif-
ſima, & ſubflavis Lapillis diſtenta
erat.

Ex his patet, dolorem diutur-
num, in recenſione Symptomatum
memoratum, à ſiniſtri Renis Cal-
culo; Hecticam autem Intempe-
riem, ab Ulcere, & forſan à Ve-
ſicæ Felleæ Lapillis, Bilis exitum

præcludentibus, pendere: Dolor-
remque recentem in Regione dex-
tra à stagnante Sanguine. Qualem
Dolorem, hoc est Recentem, in

aliis etiam Cadaveribus Sanguinis
Stagnationi conjunctum semper com-
peri.

Historia Variolarum cum Pustulis Miliaribus.

Julii 15. 1705. vocatus sum ad
Dominam Bek; D. Bek Mercatoris
celebris Uxorem; quæ tum
temporis, apud *Hampstedium* com-
morata est; cuique D. Shervood
erat Pharmacopœus. Hæc, cum an-
tea perfecta valetudine usa fuisset;
13io die Julii, dolore dorsi vehemen-
ti, cum oppressione pectoris, atque
altis suspiriis, Spirituumque defectu,
correpta est. Ex quibus Symptoma-
tis, Febris Miliaris signis Patho-
gnomonicis, novi hanc esse hujus
generis; Pustulasque Miliaries se bre-
vi exhibituras prædixi. Et de expe-
ctandis Variolis feci etiam conjectu-
ram: Eo magis probabilem, quod
tum temporis longe lateque grassa-
bantur. Consului itaque illam ad Vi-
sitationes facilitandas, in *Londinum*
deferri. Et ut tutius suum iter per-
ficeret, *Pulverem ex Bezoar. Orient.*
& *Pulv. è Chel. Cancr. comp. an. 3j.*
sumendum præscripsi.

Die 16to Variolæ cum Pustulis
Miliaribus interjectis emicuerunt. Præ-
scripsi itaque *Pulv. è Chel. Cancr.*
comp. 3j. cum Julapii perlati com-
munis haustulo, sexta quaque hora
sumendam. Ad præveniendam Diar-
rhœam Dyspnœamque, tum deco-
ctum album, tum pectorale, alter-
nis vicibus bibenda. Quibus etiam
provisum est, ne Pustularum Mi-

liarium Variolarumque materiæ emit-
tendæ desit vehiculum: & ut me-
lius linguæ viscositas inhiberi possit.
Præscripsi etiam Astringens Garga-
risma, ut ejus usu Variolas de Fau-
cibus repellerem.

Die 17. Pustulæ Miliaries & Va-
riolæ numerosius extabant. Capite,
Guttore, Thorace, Ventriculo, Æ-
gra bene se habebat. Oppressio etiam,
& defectus Spirituum fuere mitiores.
Tantum insomnis erat, ut Febre Mi-
liari correpti solent. Suasi Vitæque ut
in omnium die præcedente præscrip-
torum usu persisteret.

Vespere paulum delirabat. Non
à Pustularum Miliarium aut Vario-
larum paucitate, satis enim erant nu-
merosæ; sed ex perpetuis vigiliis.
Ad quæ Confectionem Fracastorii,
in hac Febre vel Laudano vel Dia-
codio potiozem, in sequente Haustu
præscripsi.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥iij. Epid. 3iij.
Conf. Fracast. 3j. Mf. f. Haustus per-
sistente Delirio sumendus.

Die 18vo à nocturno somno
delirium pacatum fuit. Ægrota au-
tem Embryonis recenter concepti
Abortum, verum absque ullo ma-
lo Symptomate, passa est. Jussi ita-
que ut in usu antea præscriptorum
persisteret. Addendo *Pulv. è Chel.*
Cancr. comp. singulis scrupulis Mar-
garit.

garit. pp. gr. vij. quo certius & à Diarrhoea & à nimio Lochiorum fluxu præcaverem.

Vespere Variolæ satis erant conspicuæ. Ægrotâ tamen summa Pectoris oppressione, Spirituumque defectu laborabat cum suspiriis. Quæ Symptomata, cum lenem & continuam Diaphoresin indicaverint, præscripsi Pulv. è Chel. Cancr. comp. usum sine Margaritis, & cum Julapio seq.

℞. Aq. Meliss. ℥viij. Pæon. comp. ℥ij. Syr. Caryophil. ℥j. Mf. f. Julap.

Suasi etiam ut persisteret in usu Apozematis Pectoralis; addendo singulis Haustibus Spir. C. Congutt. xx. Tum ad levanda ex oppressione suspiria, tum ad continuandam uberiorem Diaphoresin. Ubi enim perse extant Variolæ, Spiritusque elevari possunt sine Diaphoresi; sale Volatili Oleoso potius quam Spiritu C. Cervi utor.

Die 19no Faciès atque Artus paulisper tumuere. Variolæ autem plenæque exsiccæ, & colore quasi corneæ videbantur. Oppressio etiam magna erat & suspiriis conjuncta; sed sine Spirituum defectu. Habita itaque ratione ad Partium & Variolarum Tumorem, & Pustularum Miliarium eruptionem, Julapium seq. præscripsi.

℞. Aq. Ceras. nigr. ℥x. Pæon. comp. ℥iβ. Confect. Fracast. ℥j. Spec. Conf. de Hyacinth. sine Odo. rat. ℥ij. Syr. è Mecon. & è Cort. Citr. an. ℥β. Mf. f. Julap. de quo sumat Cochl. iv. tertia quaque hora. Eo fine, ut ex dosibus, brevioribus intervallis sumptis, Ægra

perpetua quietudine in lecto jaceret. Eoque modo à Frigore externo, etsi non semper Variolarum, Vesicularum tamen Miliarium eruptioni inimico, præcaveretur. Præscripsi etiam ut, ad Tussim Dyspnœamque saltem minuendas, in usu Apozematis pectoralis persisteret. Et cum Variolæ jam & in Collo & in toto Corpore plenè expulsæ fuerint, loco Astringentis Gargarismatis lenientem substitui.

Vespere quietè, sed pene insomnis, jacuerat. In vola Manuum, ubi Cutis valde crassa, Variolæ videbantur Vesiculæ sero limpidò plenæ; in aliis partibus quasi exsiccæ. Præscripsit itaque ut in Apozematis pectoralis frequentius usu persisteret; scilicet, ad Materiam & Variolis & Salivationi præbendam. Et ad majorem cautelam, ne aut Variolæ aut Pustulæ Miliare versus interiora remearent; haustui Apozematis, Aquæ Theriacal. Cochl. j. sæpe addendum monui. Et ut Tumorem partium promoverem, hora somni Haustum sequentem bibendum.

℞. Aq. Paralys. ℥ij. Theriacal. ℥iij. Confectionis Fracastorii ℥j. Syr. de Mecon. ℥β. Mf. f. Haustus.

Die 20mo omnia in eodem statu perdurarunt Symptomata. Jussi itaque ut in usu mixturæ pacificæ antea præscriptæ quarta quaque hora persisteret: Et in usu Apozematis, Julapii, & Gargarismatis.

Vespere, cum eadem videretur Morbi facies, eadem quæ prius præscripsi continuanda. Et ut Julapii sequentis haustum sumeret in languoribus.

Rx. *Aq. Meliss.* ℥x. *Pæon. comp.*
Epidem. an. ℥ij. *Syr. Pæon. comp.* q.
J. Mf. f. Julapium.

Die 21mo Ægra fere eadem ac antea. In tantum jam querebatur, totum Corpus vehementer prurire. Præscripsi itaque ut in usu omnium peristeret: Præcipuè, mixturæ pacificæ, ne inquietudine ex pruritu pateret frigori, eoque pustulæ Miliæres recederent.

Vespere, cum in eodem statu fuisset ac matutino tempore, visum est omnia jubere continuari. Eo potius, quod ex usu Apozematis pectoralis Gargarismatisque frequente omisso, Salivationem (ut in Variolis siccioribus & Corneis solet) fisti viderim. Hincque patet, cur multi, circa diem à Morbi principio undecimum moriuntur. Nimirum, quod nimis parcè ad diluendum attenuandumque sanguinem, & materiam in salivationem præparandam biberent. Unde & oneri succumbit Natura, faucium subfidit Tumor, cum gravissima Dyspnœa, quæcunque expectorantia eludente; demumque ex Alvo semel aut bis soluta, vel mensium effluxu, subito mortem obeunt. Calida quoque Medicamenta, à multis præscripta, Dyspnœam siccitatemque Gutturis & Linguae inferendo, simili Epilogo præludunt. Semper itaque usque ab initio, & per totum progressum Morbi, diluentia præscribo. Nec Cerevisiam tenuem pane tosto alteratam prohibui; nisi Ægritudo, vel nausea, Vomitus, vel Diarrhœa contraindicaverint.

In difficili Respiratione, & ubi Salivatione maximè opus est, Indicationes pro Medicamentis valde

calidis nullas agnosco. Cæterum, si forsan, non obstante eorum usu, Patientes evadant, viribus Naturæ referendum est. Partium extumescientiam Opiata satis bene promovent; & Salivationem diluentia. Calida autem Medicamenta, sanguinis accelerando motum, utrumque inhibent. Etenim Fermentatio & Secretio contemporaneæ, nullo modo consistunt. Cujus rei exemplum nuperrimè vidi singulare in Domino *Hatsell*, cui pharmacopœus erat D. *Lancashire*. Is enim, cum mali moris variolis laboraret, & ex sumpta Tincturæ Croci, vel Confect. Alchermes tantum pusilla dosi, Febris vehementius accenderetur, coactus sum oculos Cancrorum, Margaritas, & similia, cum diluentibus præscribere. Quorum benigna vi Ægrotum ex orci faucibus ereptum sanavi. Sed ad historiam præ manibus jam redeo.

Die 22do intellexi generosam Mulierem, cujus hîc casum narro, nocte præcedente vix dormiisse. Multum de Calore interno querebatur, paluitque Urina. Unde & Metastasin materiæ, aut Pustularum Miliarium, aut Variolarum metui. Præscripsi itaque sequentia.

℥. *Decoct. Pectoral. depurat. Aq. Lact. alex. an.* ℔j. *Theriaca.* ℥ij.
Mf. sumat haustum aliquoties in die.

Et quo melius, non solum Variolas, diluendo, sed & Pustulas Miliæres, Spiritus roborando foverem, Julapium cum Diascordio antea præscriptum, & alterum Cordiale, una cum diluente Julapio, vicissim sumenda præscripsi.

Vespere in eodem statu persistit. Ideoque eadem Medicamenta jussi continuanda.

Die 23tio nempe à Morbi principio undecimo, Ægrotà incidit in aliquanto gravius quàm hactenus periculum. Nam totam fere noctem insomnis fuerat, potius, ut mihi videbatur, à Pustulàrum Miliarium vitio, quàm variolarum. Præscripsi itaque *Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. cum Julap. perlato sumendum octava quaque hora.*

Vespere ter Alvus descenderat. Jussi itaque Paregoricum antea præscriptum quamprimum repetendum. Et post singulas sedes, mixturæ cum *Conf. Fracast. Coch. iv.* bibenda; addendumque Decoctum album. Et ad alia Symptomata, ut sint in promptu Mucilago & Gargarisma; nec non Apozema pectorale spiritu sulphuris leviter acidulatum.

Die 24. narratum est, Febrem totam noctem intensiorem fuisse. Facies Manusque, sed hæ minus, detumescere. Ad hæc persistit Diarrhœa, defecere spiritus, respiravit difficillimè, & Salivatio decinavit. Quibus Symptomatis ultimo præscripta methodo occurrendum censui. Addendo *Oxymelitis scillit. Coch. j. Aq. Cinnam. hord. dilutum.* Et ut *Pulv. e Chelis Cancror. comp. Apozematisque pectoralis* in usu persisteret; cum spiritu *Corn. C. gutt. xvj.* in singulis haustibus Apozematis. Et in Diarrhœam, mixturam cum *Confect. Fracast. statim & post singulas sedes* sumendam jussi.

Vespere facilius respirabat. Verùm ex sumpto Oxymelite scillitico aliquoties vomuerat. Julapii itaque

sequentis haustum urgente vomitu bibendum præscripsi.

Rz. Aq. Menth. ʒx. Pæon. comp. ʒjss. Spir. Menthæ gutt. xj. Syr. Menth. ʒj. Mj. f. Julapium.

Die 25to narratum est Patientem nocte præcedente calore febrili valde accenso gravatam fuisse; nec non delirio, Respiratione difficili, & Diarrhœa: Minimè autem modò Paroxysmi regularis. Variolas etiam ubique nigricantes, quasi Gangræna tactas, apparuisse. At cum mane accederem, Symptomata hæc vidi maximè diminuta, & Vomitus penitus suppressa. Ad Trachææ autem, quam nunc passa est, strangulationem, Pilulas sequentes sumendas curavi.

ʒ. Castor. gr. vj. Assæ fetid. gr. xij. Syr. Paralys. q. s. Mj. f. Pil. n. vj. Et ut persisteret in usu ultimo præscriptorum.

Vespere Exacerbatio febrilis, cum Vigiliis, delirio, dyspnœa, Sedibus, Motibusque Convulsivis; fuit repetita. Emplastra itaque subpedalia, Vesicatorium inter Scapulas, Bolumque cum Julapio sequentem præscripsi.

Rz. Spermat. Ceti, & Pulv. Cancr. comp. an. ʒj. Laud. Lond. gr. j. Syr. Paralys. q. s. Mj. f. Bolus sumendus statim, superbibendo Julap. seq. Coch. iv. & deinceps per intervalla.

Rz. Aq. Rutæ, ʒx. Pæon. comp. ʒijss. Sacchar. albi q. s. Mj. f. Julapium. Ut persistat in usu Apozematis pectoralis, & mixtura cum *confect. Fracast. pro re nata.*

Die 26to intellexi noctu Ægram perturbatam fuisse inquietudine & delirio, nec non sedibus, spirituum defe-

defectu ; sed sine suffocatione. Imperavi itaque ut in usu ultimo præscriptorum persisteret.

Vespere caloris exacerbatio renovatur. Mitius autem deliravit, sedesque paulo restrictæ sunt. Præscripsi itaque omnia continuanda ; & urgente delirio, Vesicatoria Brachiis applicanda.

Die 27mo relatum est, noctem Ægrotam pessimè sustinuisse. Nam ex reaccesa Febre deliravit cum vociferatione. Quamobrem & Curatrix præscripta Vesicatoria apposuit : Et ex vesicis apertis tam Febris quam Delirium multum levabantur. Jussi itaque, ut Tinctura Corticis Peruviani in promptu esset. Interim ad sitim sedandam, ut Lactis Aquam alexit. Saccharo edulcoratam biberet, & persisteret in usu reliquorum præscriptorum pro re nata.

Observandum est, post apertas Vesicas Emplastris excitatas, Salivationem fuisse redintegratam, & ad diem hinc usque quartum persistisse. Unde constat, in Variolis, durante Salivatione, medicamenta calida minimè ad rem esse ; nisi magnum aliquod Symptoma indicaverit ; & jam tum multum ea debere esse diluentia.

Eodem die circa Meridiem ad Patientem accedens, vidi illam, Inquietudine, Delirio, Dyspnœa, Suffocatione, Sedibusque immunem. Calorem solummodo sensit internum, illius, qui Febri Miliari, vel Corticis Peruviani in Febre intermittente præproprio usui succedit, non absimilem. Ad quem præscripsi Margar. pp. ʒj. quinta quaque hora sumendum, cujus efficaciam, ad hujus-

modi calorem extinguendum, frequenter expertus sum.

Vespere Febrilis caloris erat expers, nondum tamen Alvus substitit. Volui itaque ut sumeret perlarum pulverem in forma Boli, quo in Ventriculo & Intestinis diutius maneret, transfiretque melius in venas. Et ut decoctum album Mixturamque ex Conf. Fracast. &c. in promptu haberet.

Die 28vo minus caluit, sedesque pauciores sunt. Nec recurrere reliqua mala symptomata. Præscripsi itaque ut in usu Decocti albi, Boli-que cum Julapio sexta quaque hora persisteret.

Vespere in eodem statu erat laudabili quo manè. Ne tamen à Vesicarum Ulceribus, nimis cito desiccatis, morbificæ materiæ pars superesset, jussi Vesicatoria pone Aures applicanda. Scilicet ut Cathartici vicem explerent, donec Purgatio per Alvum foret tempestiva. Et ut Julapii & decocti albi usus continuaretur.

Die 29no similiter ut pridie se habuit. Quemadmodum & diebus 30mo & 31mo. Quapropter & jussi, ut in usu Pilularum ex Assa foetida &c. & Julapii persisteret. Et hoc die 31mo præscripsi Pilulæ Stomachicæ cum Gum. ʒss. hora somni sumendam, & manè seq. Syr. Rosacei solutivi ʒj.

August. Imo ter quaterve Alvus laxa fuit bonis avibus.

2do Usa est Julapio & Pilulis de Assa foetida, &c.

3tio & 4to & deinde 5to & 6to Pilulas Catharticas & Syrupum repetendo, à Morbo periculosissimo omnino convaleuit.

Historia Febris Exitialis, ubi Æger statim à principio sua voce fuit privatus.

Circa quintam diem Octobris 1709. digniss. Viri D. *Gulielmi Morisoni* Armigeri Filius, sedecim annos natus, Temperie biliosus, & in iracundiam aliaque Animi Pathemata facile accensus, Febre correptus est. In qua Tempestate, ab aliquot antea hebdomadis, Febris maligna Londini grassata fuerat.

Cum primum illum visitaverim, nulla pars ei doluit. Neque ulla Vomitione, aut Ventriculi Ægitudine, Emetici usum indicante, tentabatur. Pulsus erat frequens ac debilis. Et usque à Morbi principio magna loquendi difficultate, cum stupore, affectus est. Quibus accessere Tumores subfultusque Tendinum; lingua arida & subnigra; Urina coloratior & clara, & ut plurimum involuntariè emissa, cutisque calida & sicca.

Hæc pessimorum Symptomatum apparente Syndrome, accitus est D. D. *Grew*. Præscripsimus Alexipharmaca, ex *Serpentariæ Radice*, *Bezoar*, &c. & paucos post dies maculis rubris & purpureis Ægroti cuticula, imprimis super Pectus, Crura, Tibiasque, foedata fuit. Hæc Symptomata, aliquando paulo mitiora, dies quatuordecim prævalebant. Postea evanuerunt maculæ, creveruntque adeo Motus Convulsivi, ut Æger plures dies moribundus videretur.

Fere in Morbi principio Emplastrum Vesicatorium capiti applicandum jussimus; ex quo colligere mentem, & quodam modò balbutire cœpit. Deinde & in Morbi progressu artubus universis alia apponenda; imò & aliquibus renovanda. Semper enim exsiccatis Vesicarum Ulceribus ferocius ingruiebant Symptomata.

Deinceps, cum dies aliquot eadem Vesperi exacerbari videremus, Corticis Peruviani tum pulverem tum Infusum, minore Dosi visum est præscribere. Unde motus Convulsivi suppressi sunt. Ægrotus tamen, cujus vires & ipsa caro absumptæ fuere (ita ut in coxa, in quam cubabat, Sphacelismus generaretur) tandem fato cessit.

Notatu non indignum est, quod Morbi decem aut duodecim ultimis diebus, adeo foetide spiraret perspiraretque Ægrotus, ut cubiculum odoratis fumigare necessum esset. Et ego ipse, dum paulo propius illi, in os meum respiranti inclinarem, subito Ægitudine & Languore correptus, horas aliquot in patulis agris vehi coactus sum; & inde rediens Vinum Hispanicum Montanum affatim inter prandium bibere.

Dissectum est cadaver perita manu D. D. *Douglas*. Super Pectus fusci coloris macularum congeries adhuc erat conspicua. In Arteriis Venisque in Abdomine magis conspicuis, nil contentum erat, præter spumæ nigricantis Sanguinis, mediis spatiis serò omnino vacuis. Haud equidem vulgare spectaculum. Vel quod rariùs contingeret, vel ex Febribus mortuorum rariùs disseccaremus cadavera. Etiam si hinc constet ejusmodi cadaverum, æquè ac aliorum, Anatomen, haud mediocri ex usu fore. Proindeque hanc Febris, licet alterius generis, Historiam apposui; tum ut exhiberem exemplum, ad Tractatus prioris Appendicem referendum; tum ut alios alia hujusmodi Exempla, in communem Medicorum usum suaderem proferre.

THOMÆ SYDENHAM,

De Mictu Sanguineo à Calculo Renibus impacto.

Quamvis hominis minis cauti & prudentis esse videatur, observatio-
nem in vulgus spargere, cuius in se ipso tantum experimentum cepe-
rit, nemo tamen, opinor, æquus rerum arbiter ægrè feret me, qui tam
diu tantaque à *Mictu Sanguineo*, à *Calculo renibus impacto* orto, fuerim
perpeffus, humanitate & miseratione erga Sodales in hoc malo meos com-
motum, iis qui eodem morbo excruciami quandoque potuerint, ista reme-
dia indicare quæ mihi aliquali levamini fuerunt, quantumlibet vulgaria, &
nihili facienda fortè videantur.

Anno 1660. *Podagra* me invasit, Paroxyfmo tum immaniore tum diu-
turniore, quàm prius unquam, miserum affligens, cum ex hac causa
æftivo tempore, vel intra, vel supra lectum submollem jugiter ad duos
menses decumberem, finem Paroxyfmi, dolorem hebetem & obtusum
maximè in sinistro Rene non nunquam, licet rarius, & in dextro coepi
perſentifcere. A *Podagra* convaleſcenti hærebat utcunq; Renum dolor,
qui per intervalla quædam, nullatenus acutus, fed ſatis tolerabilis, me
ſubmonebat; nondum enim Paroxyfmo Nephritico (cuius ſunt comites
dolor ingens per Ureterum ductus veſicam verſus tendens, tum Vomitus
enormis) vel ſemel laboraveram. Quamvis verò nondum aderant iſta
Calculi Renum indicia, cum ratione tamen iudicabam, me Calculum,
mole inſigniore in Renum Pelvi geſtare; qui cum major eſſet quàm ut
ex Pelvi dictâ in Ureterum ductus elabi poſſet, prædicta ſymptomata
non intulit. Quâ in re, poſt annos multos elapſos me hallucinatum
non fuiſſe certò comperi. Etenim cum Brumâ Anni 1676. ſtatim à
ſoluto rigidiffimo gelu, diu multumque obambulaviſſem, urinam mox red-
didi ſanguine permiſtam; idque toties mihi uſu venit, quoties vel mul-
tum itineris pedibus conficerem, vel in curru per platearum pavimenta
veherer, quantumlibet lento equorum grefſu; quod mihi tamen non ac-
cidebat, quoties per viam Regiam lapidibus non ſtratam, licet quàm
longiſſimè, curru vectarer. Urina quam tunc excernebam, tametſi ter-
ribili ſanguinis tantum non ſinceri ſpecie prodiret, non ita diu poſt ſan-
guine in fundo ſeorſim grumeſcente, in ſummitate limpidâ & ſui ſimilis
conſpiciebatur. In huiusce mali remedium ſanguinem ſatis copioſum è
brachio mitti curabam, & poſt Purgationes univerſales, medicamenta
Refrigerantia & Incraſſantia, varii generis in uſum revocabam; Diætâ
interea his conſentaneam adhibens, liquores acidos, acres, & attenu-
antes

antes sollicitè devitans. Cùm autem neque ista, neque alia permulta, quæ numerare longum esset, quicquam prodesse; & metuens calculum, quem grandiore esse suspicabar quàm ut expelli posset, Aquis Chalybeatis ad exitum sollicitare, tandem spem, rei benè gerendæ prorsus amisi; idque eo potissimum nomine, quod observâram senes aliquot mihi notos, sibi mortem accersisse, dum hujusmodi remediis incassum morbi curationem molirentur. Stetit itaque sententia non amplius tentare, at vitato tantum quàm potui maximè corporis motu, ab hoc effectui mihi cavere. Tandem verò animo fortè reCOLens, quàm mirè nonnulli deprædicent seminis *Fraxini* vim Lithontripticam, subiit cogitare quòd si semen ejusmodi virtute polleret, omnino verisimile esset *Mannam* *Fraxini* adhuc plus posse. Cùm Manna quam habemus, docente Botanographo τῷ πάλῳ Dno. *Joh. Ray* post alios Scriptores, neque Mel Aëreum est, nec Ros aliquis Coelestis; sed liquor potius, tam è foliis, quàm è trunco & ramis *Fraxinorum* in *Calabriâ* nascentium, exudans; de cujus rei veritate idem dum in *Italia* peregrinaretur certior factus est ab eruditissimo Medico, qui ex ramulis & foliis linteo à se curiosè contectis Mannam (qui est succus ut dixi) sæpius collegit. Vid. *Joh. Ray Catalogum plantarum Angliæ*. Experimentum itaque facturum, Mannæ ʒijss. in feri lactis ʒiij. solutæ hausi, pauxillum succi limonum subinde, dum purgarer, deglutiens; quo & Catharticum acuerem, quod segniùs operari solet, & ventriculo minùs ingratum redderem. Ab hujusce remedii usu vix dice queat, quantum ego levaminis circa Renum regionem perceperim; licet enim antea non semper dolerent Renes, tamen pondere quodam gravativo & molesto sensu afficiebantur. Quod cum ita feliciter mihi cessit, idem Catharticum singulis Hebdomadis statò quodam die ad menses aliquot continuos in usum revocabam; & post singulas Catharseos vices meliùs me habuisse planè sum expertus, donec tandem etiam rudiorum Curâs conquassationem ferre potuerim; ab hoc symptomate prorsus liberatus usque ad Veris tempus jam proximè elapsum. Quo appetente, cum per prægressam hyemem ferè omnem Podagrâ laborâssem, & quæ nimia corporis ad motum inhabilitate, quieti & ἀκίνησία magis quàm alias solebam, indulgissem, rediit denuo sanguinis mictus. Hic ego an ad Catharsin me iterum reciperem, hærebam dubius; quoniam nuperis hisce annis omni corporis substantiâ in Podagræ sedem & fomitem quasi perversâ, Catharticum, quantumlibet lene, diutinum Podagræ Paroxysmum certo certius accersebat. Tandem animo succurrebat, quòd si Paregoricum singulis noctibus post purgationem adhiberem, quo tumultus à Cathartico excitatus sedaretur, posse me pristinam methodum Mannæ semel in hebdomade capiendæ tutò resumere. Uncias itaque duas cum semisse in feri lactis ʒiij. dissolutas manè hausi, & serò guttas xvj. *Laudani liquidi* in Cerevisia tenui dormiturus adjeci. Et Mannam & Laudanum dictò modo repetens bis in Septimana ad sex vices. Postea verò Mannâ semel in septimana

tantum uterer, humorum illuvie jam ita copiosè à Cathartico subductâ, ut à Podagra minùs metuendum erat. Cum tamen mea mihi ratio planè dictaverit, quòd si facultate aliqua, sive dissolvente, sive alio quovis modo Lithontripticâ, fuerit insignita Manna, omnino est necesse ut Medicamentum, quale est Laudanum, validè adstringens, remedii, in quò spem collocaveram, efficaciam ac vim quandantenus infringat; satius esse duxi Hypnoticum missum facere, cum jam semel tantum in septimana alvum solverem. In quâ Methodô jam ad menses aliquot perstitero, eundem septimanæ diem ubique Catharsi dicans; nec me ab hoc meo more, ex quâcunque datâ ansâ dimoveri paterer. Licet à prima remedii hujus dosi dolor qui in dorso erat, remittebat, uti priùs, tamen non ita diu post repetita Catharsis Podagræ signum dedit; quod nunc Artubus, nunc Visceribus, bellum cœpit indicare, at hæc morbi tentamina Laudanum fortiter repressit. Cum hæc mihi Medendi Ratio hætenus bene verterit, in eadem perseverandum mihi esse judicabam, tam ad præcavendum mictûs sanguinis recursum, quàm ad imminuendum aliquantulum calculi fomitem. Quod tandem votis respondit, Hæmorrhagia ista ex quo Tractatulum hunc primum edidi prorsus evanescente, proindeque Mannâ in totum abjecta. Purgationem itaque quod attinet (modo sanguinis mictus urgeat, & solum Cathartico hoc lenitivo, Mannâ scilicet, & secundum Methodum suprâ à me traditam subducatur alvus) jam retractanda mihi est sententia illa mea quam in Scripto de Podagra olim evulgaveram; nempe Podagra affectis minimè conducere, ut vel initio, vel in declinatione, vel per Paroxysmorum intervalla purgentur.

Nec si miserum fortunâ Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba finget.

Nondum enim in mentem mihi venerat, paroxysmum quem à tumultuante Cathartico excitandum metuebam, exhibito sub noctem Hypnotico prohiberi potuisse. Nihilominus si Podagram solum respiciamus, Evacuationes qualescunque plurimum nocent, ac proinde nequaquam sunt admittendæ, nisi Symptoma dictum earundem usum omnino postulaverit.

De Regimine & victûs ratione, quæ utrovis horum Affectuum laborantibus competere mihi videntur, (quando nihil eorum præterire velim quæ istis usui esse poterunt qui iisdem, quibuscum Ego, morbis conflictantur) hæc addo. Manè lecto exsurgens, Decoctionis foliorum Theæ cyatum unum alterumve exsicco; dein curru ad meridiem usque gestatus, & domum reversus, quovis ciborum genere mihi grato & eupepto modicè (id enim ante omnia semper, & diligenti cum cura tenendum est) me reficio; statim à prandio per singulos dies vini Canarini plus aliquid quartâ parte Libræ (seu Pintæ) vulgaris ad promovendum ciborum in ventriculo Concoctionem, & ad Arthritidem è visceribus procul arcendam, haurire soleo. Pransus iterum Rheda vector, & quoties

quoties per occupationes meas non detineor, Rus peto, aëris salubrioris inspirandi gratia, ad milliaria duo vel tria. Cerevisiæ tenuioris haustus mihi pro cœna est; sed & hunc repeto etiam in lectulo, me jam ad somnum compositurus, idque eo fine ut hoc Julapio succos acres calidosque in renibus stabulantes, e quibus fit calculus, refrigerem ac diluam. Ego verò & hic & inter prandendum Cerevisiam tenuem lupulatam, Cerevisiæ non Lupulatæ, quantumlibet tenui ac miti, præferendam censeo. Licet enim non Lupulata, mollitie ac lubricitate quâ pollet, ad subducendum calculum jam in Renibus concretum magis faciat; attamen Lupulata, ob levem illam stipticitatem quam impertiunt Lupuli, minus facit ad sabuli vel materiæ calculosæ generationem, quam facit non Lupulata, cujus & viscidior est substantia, & lutulentior. Quo die Catharsi defungor, ex Pulli carnibus prandium mihi est; vinum tamen Canarinum pro more meo superbibo. Mihi curæ est, præsertim hyeme, ut lectum temporis petam: quo nihil magis confert ad Concoctiones rectè perficiendas, & conservandum pariter tenorem illum atque ordinem, qui naturæ jure debetur. Sicuti ex adverso, nocturnæ lucubrationes, Senum cum Morbo Chronico qualicumque confluantium, tum Concoctiones omnes imminuunt ac depravant, tum eorundem principio Vitali vulnus haud facile Medicabile infligunt. Illud etiam sedulo observo, ad præcavendum à Calculo mictum sanguineum, ut quoties per Plateas ad longius aliquod intervallum curru vehendus sim (Gestatio enim, vel ad maximam quamlibet distantiam, per vias lapidibus non stratas minimè officit mihi) non prius rhedam ingredior quam haustum Cerevisiæ tenuis paulo liberaliorem ingessero, quem pariter iterum ante regressum domum versus, si fortè alicubi diutius fuerim commoratus; quo pacto semper mihi à mictu sanguineo satis est præcautum. At quoad Podagram hoc unum adjiciam. Nuperis hisce annis ex errore aliquo circa sex res non naturales commisso, mihi retrocessio subinde materiæ Podagricæ accidit; cujus signa sunt ægritudo ingens, cum vomituritione, & aliquali ventris dolore. Artus interim ex improvise doloris sunt expertes, ac ad motum plus solito habiles. In hoc casu congium unum Liquoris possetici, vel cerevisiæ tenuis devoro, & quamprimum totum per Vomitionem rejecerim, vini Canarini haustulum, cui instillatæ fuerint Laudani liquidi gutt. XVIII. ebibo, in lecto ad quietem me componens. Atque hæc methodo meipsum ab imminente morte aliquoties liberavi.

Et si verò haud quenquam fortasse deceat (eum maxime quem sive salvum sive mortuum esse Hominem vix intersit) ita crebram sui mentionem injicere; hæc tamen eo animo dicta volui, ut aliis quorum vita salusque majoris fortasse ponderis & momenti sunt, queant prodesse.

Hic postremò subindicandum est ingens discrimen, in quod nonnulli se

conjiciunt, tam Calculo, quam Podagrâ laborantes, quoties Mannam in *Aquis Mineralibus* Catharticis solutam inconsultò capiunt. Quamvis enim hoc modo assumpta, & celerius vim Catharticam edat, & minori nausæ Ventriculum irriter; tamen minora ista commoda injuriam alias ab aquis illatam pensare non valent. Etenim si calculus Renibus inclusus ita magnæ molis sit, ut per Ureterum ductus in Vesicam propelli nequeat, istæ Aquæ Paroxysmum ut plurimum excitant, qui eo usque perdurabit, cum magno vitæ ægri periculo, donec tandem calculus in pelvim redierit. Quin imo nec *chalybeatis Aquis* æger se tutò committet, nisi prius certò sciat calculum majorem non esse quam ut per Ureteres viam possit sive invenire, sive facere, quod hoc tantum modo, quantum ego conjicio, certò dignoscere potest, si nempe jam antea Paroxysmum aliquem Nephriticum fuerit perpeffus, (cum dolore scilicet sævissimo in Renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & Vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quam lapillorum exiguorum congeriem; quorum unus subinde in Ureterem illabitur, atque ita Paroxysmum hunc invitat, qui fere non desinit calculo in Vesicam detruso. Cum res ita se habeat, nullum est magis efficax Remedium, sive ad præcavendum minorum Calculorum incrementum, sive ad eosdem e Renibus deturbandos, quam *Aquarum Chalybeatarum* Potatio liberalior, per singulas æstates jugiter repetenda.


Cum verò sæpe accidat, ut *Paroxysmo Nephritico*, quis corripiatur quando hujusmodi Minerales Aquæ haud præsto sint, vel etiam tempestas Anni adsit, quæ earundem potationi minus faveat; hæc itaque compendiosâ Methodo, sine ulteriore Remediorum apparatû, insistendum. Si æger temperamento sanguineo præditus fuerit, & ætatem provectiorem haud adhuc attigerit, sanguis ex brachio Reni affecto respondentem, ad 3x. extrahatur; deinde *Liquoris Possetici* cui *Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint, Congium unum* quàm citissimè devoretur, & sequens *Enema* injiciatur. *℞. Rad. Althææ & Lilior. an. ʒj. Fol. Malvæ, Parietar. Branc. Ursin. & Flor. Chamæmel. an. M. j. Sem. Lin. & Fænugr. ana ʒß. Coq. s. q. Aq. ad lbiss. Colaturâ dissolve Sacchari culinaris & Syr. Dialthææ, an. ʒij. M. f. Enema.* Quamprimum per vomitionem æger totum reddiderit, quod per os ingestum fuerit, ut etiam *Enema* rejecerit, *Laudani Liquidum* satis magna dosis propinetur, viz. ad gutt. xxv. vel *Pil. Matthæi* xv. vel xvj.

In Senibus verò, morbo aliquo diuturno fractis, ut & in Vetulis, *Vaporibus*, vulgò dictis, obnoxiiis, (præcipuè si sub initium Paroxysmi Urinam eæ reddant nigram ac sabulosam) Venæsectio omittatur: At quoad reliqua, eadem, quæ jam dicta fuit, viâ omnino procedendum.

Sed ut ad Calculum, qui hujus loci est, grandiore revertamur. Quod si

si Calculosus nullo unquam paroxysmo Nephritico fuerit tentatus, cum jam major sit calculus quam ut ex Pelvi possit elabi: non solum nihil proderunt *Ferreae Aquae*, sed etiam ob jam dictas rationes, non sine praesenti periculo fumentur. Neque minus malè quandoque *Podagricis* cedit *Aquarum Mineralium* usus, modò senes fuerint, (ut sunt plerumque) & pariter corporis habitu phlegmatico imbecilloque. In his enim non nunquam naturæ vires eo usque sunt imminutæ ac succisæ, ut omnino metuendum sit, ne tantâ copiâ aquarum penitus obruantur, ac succumbant. Sive verò hoc in causâ sit noxæ quam exinde capiunt homines tali habitu ac temperamento præditi, sive non sit; illud mihi compertissimum est, haud paucos quorum corpora hoc morbo fracta admodum, & quasi confecta fuerant, hisce Aquis interemptos diem suum obiisse.

Atque hæc eorum ferè summa est, quæ mihi in Morborum curatione hætenus innotescunt, ad diem quo hæc scribo, *Septembris sc. Vicesimum & nonum, Anno Domini 1686.*



DE Calculo renibus impacto, ac inde enato mictu sanguineo, verba fecit in specie Clariss. noster Autor, propriâ in hoc morbo describendò, eâque sanè durissimâ usus experientia. At verò de aliis calculis, tum vesicæ, tum variarum etiam corporis cavitarum, aut solidarum partium, alium omnino siluit. Non itaque ingratum Doctissimo Lectori fuerit, si quæ de ejus naturâ, origine, progressibus, varietatibus, diversisque sedibus ac cura, magnâ diligentia scriptis consignarunt Præclarissimi Viri Carolus Drelincurtius, & Martinus Listerus, hîc legendum exhibeamus, eòque magis, quòd ea quæ ex illius Autoris primò locò nominati, Discipulis, Magni sui Præceptoris ductu scribentibus & disputantibus, habemus, ejusdem variis observationibus, raris prorsus & curiosis, nobis jam dudum à Celeberrimò hîc Virò communicatis abundè illustrare valeamus. Sit itaque primò



DISPUTATIO MEDICA

D E

CALCULO VESICÆ,

Quam, sub Præsidio Praclarissimi Viri,

CAROLI DRELINCURTII, Lugduni in Batavis Professoris Medici
Senioris, habuit doctissimus Philippus Rose, Gallo-Cadomæus.

CUM Microcosmum inter & Macrocosmum, collationem instituo, & summas utriusque dignitates, rationis bilance exploro, summam illius cum hoc necessitudinem, satis demirari non possum. Quanquam etenim meliore principeque sui parte, Microcosmus omnes Macrocosmi potiores excellentioresque videatur dotes excedere, posteriore tamen, ut pote materiali, tanta illi cum hoc datur affinitas, ut ab iisdem principiis, ab iisdem elementis, iisdem prorsus, variorum impetuum, à sapientissimo Creatore, editis legibus omnino pendeant. Hinc sanè ter beatum prædicabimus, qui indefatigatâ, exactaque Orbis Machinæ *κατασκευῆς*, indagatione, accuratissimam, perfectissimamque eorum notionem erit adeptus. Enimvero hic præviæ scientiæ memor, consciusque, facti attentionis suæ translatione, omnes corporis humani tam salubres quam insalubres, anomalasque constitutiones maximo cum emolumento, scrutari potis est. Ast

quantquam tam diviti scientiæ thesaurorum mentis nostræ arcam, locupletatam non sentiamus, nihil tamen est, quod nos à speciminis consilio deterreat, vel impediatur quominus omnes contendamus nervos, ut Calculi, affectum quibus adeo misere conflictatur Adami Posteritas, mercurulè non infirmi, Naturâ, Differentiis, & Symptomatis ritè explanatis, ejusdem medelæ delineationem absolvamus, eamque rationi consentaneam Adsit infirmo Tyroni Saluberrimus Humanæ Prosapie Medicus.

Quia animi Mercurius, loquela est, atque mentis nostræ sensa, aliter quam sermone, scripturâ, vel nutibus, unicuique significare penes nos non est: hâc moti ratione quædam in Calculi *ἵκτυρον* prælibare, ab instituto haud alienum ducimus. Calculus Latinis vulgò sic appellatur, eos verò, qui aliquam in vesicâ foveant rupem, Calculosos nominant. Istud autem concretum à calce suam traxisse denominationem (alicujus, nempe, *ἀναλογίας* ergò) cum foecum-

diffimo *Ger. Johan. Voss. in Etymol. Ling. Lat.* existimamus. Medicorum Princeps nomine λίθῶν calculum plerumque intelligit, uti videre est libro iv. de morbis. Calculosos verò λιθιῶντας, libro de vuln. cap. ut & affectum λιθίασιν, aphorism. 26. sect. 3. nuncupat. Helmontio post Paracelsum, calculus in tractatu de Lithiasi, vocabulo *Duelech* indigitatur.

Calculi nomine explicato, rem ipsam aggrediamur. Ejus autem naturæ certam, distinctamque notionem assecuti videbimur, si diligenti, rectoque examine, causas ejus tam efficientem quam materialem, quantum in nobis est, in medium protulerimus. De calculi materia, ipsiusque concrescendi modo, non parum apud Artis Procères hactenus fuit dimicatum: quod quidem nemini admirationem pariat, si quot de cæteris affectibus & morbis, inter ipsos variæ promulgentur sententiæ, paulisper apud se perpenderit. Sed ne curiosius quæsitâ harum dissensionum occasione, extra operis cancellos vagari conspiciamur, Γατεικῆς Primariorum, hæc de re sensus huc referre, atque ex iisdem quid potius, quid verosimilius habeant ad majorem hujus lemmatis dilucidationem, depromere sat nobis fore judicamus.

Venerandus Ἀρχιατρὸς libro 4. de morbis, quid sit calculus quæque generetur ratione trutinans, sic scribit: Ἐν τῇ κύσει γίνεται λίθῶν τὸ πῶς τοιοῦτε ὥστερ ἐφ' ὕδατι μὴ καθαρῶν χαραχθέντι ἐν κύλικι, ἢ ἐν χαλκῶ, καὶ καταστάντι, ὑπέρταθ μὴ αἷλις γίνεται ἐν τῷ μεσῶ. Οὕτω & ἐν τῇ

κύσει ἀπὸ τῆς ἕξης, μὴ καθαρῶν ὕδατων, &c. In vesicâ generatur lapis hoc modo: quemadmodum in aqua non purâ turbatâ in calice, aut in vase æneo, & denuo quiescente, fæx simul fit in medio, sic & in vesicâ, ab urinâ non purâ existente. Quæ quidem explicatio propter tanti Viri Auctoritatem nobis plurimum arrideret, nisi fæcis in calicis fundo coacervatæ exemplum, quadamtenus impar, mancumque animadverteremus. Quamvis enim fæcis in calicis fundo coacervatio, & calculi in vesicâ formatio utcunque convenire videantur, quòd utrobique fiat quædam particularum mixti liquidi, ab aliis secretio, seu coagulatio, procul tamen à sese invicem eas non parum distare, neminem negaturum arbitror, qui vel minimum ad speciem formamque utriusque concreti attendit. Nec dubio locum fore spero, si αὐτοψία discrimen quòd intendo, unicuique palam fecerit.

Opticè nimirum dignoscitur, fæcis in fundo calicis congestionem eam esse, quæ vel minimo ipsius vasis motu, vel aquæ in eodem vase coërcitæ, factâ bacillo agitatione, omnino solvatur, atque aqua impuris istis quiescentibus modò purgata, ipsis iterum inquinetur, summeque saturetur. Quod anè à calculi concretionem longè abesse, nullus refragabitur, qui matulam introspicere non dedignatur: nam ibi non secus ac in vesicâ calculum formari, cum Paracelsô Helmontioque, mens nobis est: quod postea solidis confirmabimus argumentis.

tis. Si ergo calculi materia siue calculus ipse parietibus & fundo matulæ adhærens examinetur, magnam certè ejus esse duritiem, nec non arctam vasis concavo adhæSIONem, sensus organis innotescet, adeo ut vel matulâ concussâ, vel lotio aliâ ratione commoto, prædictus calculus à matulæ muris non secedat. Præterea silentio non possum prætermittere, calculi coagulationem absolute in fundo matulæ, instar fœcis prædictæ nequaquam fieri: inspicientibus enim patet, matulæ fundi crustam, ab ejusdem parietum loricâ non multum differre, & æqualem ferè cum eâ crassitudinem habere. Unde meritò concludimus pace Hippocratis, fœcis in fundo vasis aquâ plenis, cumulatæ exemplum, calculi *διαμορφωσιν*, minus perfectè exponere.

At fortè aliquis integer Hippocratis sensuum assertor, nostram in improbando culpabit audaciam, atque ad paulò post sequentia ejusdem Authoris verba nos ablegabit. *Πηγυλά τε ὑπὸ τῆ φλέγματος ὡμῆ ἐόντος, κόλλα γὰρ γίνεται τῇ ὑποστάσει το φλέγμα μεμιγμένον.* Induraturque à phlegmate crudo, gluten enim sit, phlegmate cum fæce mixto. Sed hæc prædictam nostram sententiam nullatenus debilitant, quin nihil aliud probant quàm calculi concretionem à fœcis coactione, ut jam innuimus, maximè discrepare: *κόλλα* enim quam ex phlegmate & fœcis commistione statuit Hippocrates, coagulationem calculosam alio penitus modo ac fœculentam perfici, certò arguit. Nec etiam tale phlegma siue materiam pituitosam, ad cal-

culi compactionem, & indurationem, maximè necessariam nobis fingimus: cùm in matula tale gluten ut plurimum non reperiatur, nec ideo ibidem desinat constipari calculus. Sed donemus adesse in matulâ aliquam glutinis speciem, ac inde consequi liceat, eam calculi formationis causam esse genuinam, nec non eandem istam materiam esse meram pituitam? Quoad prius stare nequit, adsit enim tale gluten, vel desit, calculus in matula perinde nascitur. Quoad posterius, meritò in dubium revocemus, utrùm ista materia, pura puta sit pituita, an potius internum vesicæ adversus urinæ acumina propugnaculum, ab ipsâ vesicâ intrò exsudans, atque ex ea in matulam emictum. Et licet talis mucago, calculi compositionem forsan ingrediatur, immeritò tamen ejus concretionis atque indurationis causam, ad phlegma idque *ὡμῆ*, referamus.

Verùm reclamavit alius, calculum suam coagmentationem duritiemque, glutini prædicto non absolute quidem debere, sed vesicæ calore atque siccitate, instar laterum fictilium, condensari atque lapidescere. Sed quàm futilia & absurda sint illa vesicæ calor & siccitas, aut frigus ipsum, ad calculi *γένεσιν*, nemo non videt. Nec etenim matula, siue vesica, intensis clibani ardoribus retorrentur, aut quid ex gravi, Borealis Poli frigore participant, quò calculus instar lateris coquatur, aut instar glaciei congeletur, atque ad debitam, quam solet exhibere soliditatem deducatur. Quis etenim nescit, vesicam per-

petuo serosi laticis stillicidio irrorari, matulamque dum in ipsa calculus perficitur lotio madere. Nonne etiam notum est matulæ calorem, si quis adsit, igni admoto, vesicæ autem calculo, benignam ejus mucaginem abstergenti, fibras asperitatibus vellicanti, atque atterenti, acceptum referri debere. At hæc non magis in renum, quàm vesicæ calculi generatione, prædictarum causarum ullam agnoscimus. Utrumque enim ab eadem causa esse oriundum, posthac propalabimus.

Sed in tantis rerum angustiis, tamque obscuro opinionum penè infinitarum chaos, veritatis partus maxime languescit: cui plures obstetricandi avidi, renum vel vesicæ vim lapidificam alta voce implorabunt. Ast talis Lucinæ auxilium frustra invocetur. Quem etenim fugit ita philosophantes, obscurum per obscurius explicare niti, & ad patens celeberrimumque crassioris ignorantia Sacellum citatis equis confugere. Apage apage infusas, causas ignotas, superbamque qualitatem Quadrigam, quâ velocissimè abrepti omnia naturæ ænigmata solvere, universasque difficultates superare, ac veluti calcare, nimis gloriöse contendunt. Hos itaque missos facimus, ut quid hæc de re sentiat Fernelius curiosè expendamus.

Prædictus Autor lib. VI. de part. morb. & sympt. cap. XIII. asserit: omnem calculum in vesicâ conclusum, rudimentum quoddam è renibus traxisse, è quibus per nephriticum dolorem excidens, si grandiusculus est, in vesicâ aliquandiu hæret, ac plerumque per-

sistit, illicque allatarum sordium adhæsu coagmentatur, dum vetus confirmatusque lapis fiat. Quæ Fernelii mens sua non orbatur verosimilitudine, eamque ob rem ab eâ non omnino dissentiimus: cum enim ipse eodem libro notaverit, se neminem in vesica calculum habentem offendisse, qui nephriticis doloribus ante non fuisset divexatus; inde sanè liquet plerosque vesicæ lapides, calculo à renibus per ureteres in vesicam delapso, principium suum debere. Quod suum iudicium sequente paulo post observatione confirmare conatur Autor, ajens, Quoscunque exemptos vesicæ calculos, obtrivi autem experiundi gratiâ permultos, in eorum medio quasi nucleum reperi, verum rudimentum è renibus deturbatum, & diversè quàm reliquum integumentum, ac involucrium, & coloris, & substantiæ. Luculentissima hæc Fernelii animadversio, ad ejus opinionem fulciendam non parum confert, adeo ut ipsius vestigiis incedentes, calculos vesicæ, maximam partem, prima à renibus accepisse voluminis sui stamina, non dubitemus affirmare: nec tamen ipsi penitus subscribimus; vesicam enim non secus ac renes saxeæ foetu, quanquam rarius, imprægnari, à ratione alienum minime censemus.

Enimverò quamvis à Fernelii parte contra Hippocratem stemus, fæcem subsidentem, sanguinis grumos, pus, mucosam pituitam aliaque id genus crassiora, facile ex vesicâ profluere cum urinâ, ac proinde calculum ex his non formari: ipsi

tamen talium è vesicâ excretionem posita, calculi ibidem generationem, eamque primariam, tolli constanter negamus; neque etenim ex ejus ratiocinio, inductionem imperfectam referente, quid generale deduci potest. Nam univertique, primo intuitu elucescit, prædicta omnia, à Fernelio enumerata, siquidem valeant semper è vesicâ foras amandari, calculi formationi, nonentiquam prodesse, ac proinde ex istis calculum progigni, negare, ipsi fastesse: sed inde omnem calculum in vesicâ concretionem, primariamque, sicut jam scriptum est, omnino explodi, inficiamus: nam peculiarem calculi materiam, & à facie subsidens, grumis sanguineis, pure, & mucosâ pituitâ, maximè diversam, postea assignabimus: & singulis modis.

Quæcumque hactenus Autorum placita ponderavimus, quò obscuram calculi cognitionem, à Democriti puteo nobis fortunatè contingeret eruere, parùm utilitatis nostræ tribuerunt indagini: aliorum sergo proram convertamus, ut ad optatum veritatis portum, tutòque valeamus appellere. Jamque mihi faustum iter polliceor, in modò hâc in densâ tenebrarum caligine, ad ignem protinus apparentem, portusque optati mihi monstrantem ostia, recta contendam. *Emporion Spagyrici* siquidem portus hic est, benè est; nec etenim sibi temerè persuadeant, abstrusam calculi indolem, aliter quam industriâ Vulcani resolutione, posse unquam referari. Hæcce investiganti, ratio, omnium tutissima nobis est, sed cum curis, & laboribus, nec non impensis, ardua sit,

incerti de prospero cœpti eventu, forsitan pro foribus hæreremus, nisi bonis avibus res in promptu nobis occurreret. Vigili quippe & indefesso, *Præstantissimi, & Experimentissimi, D. D. Caroli Drelincurtii, Apollinis mei, æternum suspicientib, reverendique, scrutinio, perfectam calculi manciscor analysim.* Hic enim in *Epistola* sua Gallicè exarata, cui nomen est, *La Légende du Gascon* &c. calculum in singula principia subtilissimè diremptum, famulo offert Viro. Quanta autem maximè possum fidelitate verba quæ paginâ 35. habentur hic Latine referamus. Sed quod tuâ longè dignius est experientia, & quod evidentissimum argumentorum augmentum mihi est, scilicet corporis humani calculi per ignem mihi suppeditant, longè potiori ratione quam per aquam, & tertiam salis volatilis, & spiritus urinosi penetrantissimi, & circiter quadragesimam partem olei fetidi, aut sulphuris, adeo ut inde mihi supersint ferè duæ tertie partium terrenarum, quæ trigesimam partem continent salis adeo fixi, ut ignem violentissimum sustineat. Quibus verbis cernere est hanc calculi resolutionem igne fuisse peractam, post aliâ beneficio aquæ expeditam; quæ in superiori paginâ est reperiunda: ea tamen quæ igne fuit absoluta frequentius usuri, quandoquidem ut placet clarissimo Autori, *per ignem mihi suppeditatio longè potiori ratione, quam per aquam.* Tam certâ tamque negregiâ calculi potitus anatomie, hic pedem figere segniter, instituti conditione prohibet. Pergo

igitur insitas unicuique principio *ἀνά-
μνησις* sedulo investigaturus.

Scenam recludit *spiritus urinosus*,
iisque penetrantissimus, potentissi-
mus, mehercule, naturæ coagu-
lum ac forsan pari non gaudens. Ta-
lem enim præ se fert *ἐν ἑσπέρειαν*, ut
spiritum vini, seu aquam vitæ de-
phlegmatam in offam coagulet. Te-
stem appello *Helmontium de Li-
thiasi* cap. 3. §. 5. Rara hæc mira-
bilisque simul spiritus urinosi virium
experientia, nil obseprens calculi *σπομ-
πῆξις*, nebulas non parum diluit
& dissipat. Validissimum quippe af-
sequimur *ἐν τὰ λήγησι*, in quo præcepta à
peripheriâ in centrum motus pera-
gatur. Hic per transfennam homi-
num sortem dolere mihi incumbit,
quod ipsis ferè solis inter animalia,
talem spiritum gignere contigerit.
Helmonti etenim operâ destillata best
urina equina, verum dissimilis pro-
fus inde emanavit spiritus, quod
apud ipsum legere vest, *Tract. de
Lith. cap. 3. §. 9.* Hujus phænome-
ni, humani generis pro dolor!
nimium familiaris, rationem hanc
esse arbitror. Homo scilicet gulæ
satiandæ avidior, viscera condit in
visceribus, sæpèque intempestivâ edu-
liorum, spiritibus tam sulphureis,
quàm salinis, præsertimque terrestri-
bus abundantium, farragine ventri-
culum ingurgitat, quæ ipsius fer-
mento, forte non imbelli edomita
atque elaborata, per ductus mesente-
ricos in lebetem cardiacum promo-
ventur, ubi ulteriore donata co-
ctione, majoreque exaltatione, nu-
merosos spiritus, à sese invicem,
volumine, figurâ, motuque sæpif-
simè non parum diversos acquirunt.

Quemadmodum autem plurium Reg-
norum Imperia, dominationis suæ
imminutionem pertimescere non so-
lent, cum libratæ singulorum viri-
bus, ex nullâ parte in aliam, cum
successu, fieri potest invasio: pari-
ter si spiritus varii massam sangui-
neam exagitant, eamque uno ten-
ore compellentes, temperatâ quadam
proportione, æquisque legibus, mo-
tus suos exerant, nihil sanè, tunc,
humano corpori, damni impendere
potest. Sin autem res aliter se ha-
beat, adeo ut v. g. *Spiritus uri-
nosus* aliis dominetur, ipse, pro-
cul dubio, in subtilissimas adjacen-
tes particulas perpetim incurrens,
eas non solum variâ impellet ratio-
ne, sed etiam cum ipsis in mutuos
ruens complexus, siquidem idoneâ,
ad coëundum figurâ præditæ fuerint,
pro superficie rum magis vel minus,
immediato contactu, magis vel mi-
nus solidum lapidem, seu calculum
exhibebit. Felicior hæc in parte
Equus suo Domino, ut & multæ
aliæ obrutæ animantes. Nam her-
baceis parumque spirituosius vesce-
ntes pabulis, succum particulis acti-
vis minimè, vel saltem parum tur-
gentem obtinent: adeoque fermento
generosiori, seu agente efficaciori,
quale est *spiritus urinae*, destituti,
calculosis concretionibus vacare, vel
saltem rarò infestari, debent. Quod
rationi, nec non experientiæ conso-
num reperimus.

Canere palinodiam, molestum
est: valeant ergo quæ scripsimus,
fitque *spiritus urinae* summus coa-
gulator, seu genuina calculi efficiens
causa laudari. Nunc in subjectam
ipsis materiam diligenter inquiramus.

mus. At certè ipsa, *φλίγμα ὠκὸν* nequaquam erit. In matula enim materiam, seu calculum ipsum concavo adnatum vidimus, sed antea nullum urinæ phlegma aderat; neque etiam terra, sicuti videtur in concreto calculo: quoniam potius urina recens emicta, ubique & æqualiter citrino erat colore perfusa. Præterea notante Helmontio tractatu de *lith. cap. 3. §. 36.* concretio calculosa in vitreo recipiente è spiritibus, liquoribus nempe stillatis & clavis, facta est: unde infero calculosam crustam in matula contentam, pariter è spiritibus in urinâ meâ delitescens fuisse confectam. Nec nobis obtrudant urinam nostram non fuisse destillatam; certissimum enim est, Helmontii urinam ab ipso destillatam aliud duelech non produxisse, quàm quod non destillata fuisset editura.

Satis commodè satisque evidenter *Spiritus urinosi* notitiam videmur adepti, nec aliorum cognitionem majus nobis negotium facessituram confidimus, si methodo jam inceptâ progrediamur: Ideo *quadragesimam partem olei fætidæ, aut sulphuris* considerare subest. Non solum autem ad prædicti olei *qualitatem*, sed & *quantitatem*, fortiter attendere, non parvi momenti est. Primo quoad ejus *qualitatem*, aliorum oleorum naturam sapit: quatenus ex particulis longiusculis, ramosis, sibi invicem intricatis, ac proinde ductilibus constat. Foetidum etiam est, quatenus nimirum in destillatione, & præcipue in sanguineâ fermentatione, ac dein, vel in naturali, vel in artificiali matulâ maximam passum est

fui dissolutionem, unde corpuscula ab ipso jugiter emanantia, nimioque fermentationis attritu figuras valde irregulares nata, cum ad nervos olfactorios allidunt, irregularem etiam, seu ingratum sensum in nobis debent excitare. Secundò quod ad *quantitatem* attinet, valde exilis est: *quadragesimam* enim tantum exhibet. Unde jure consequimur, parùm olei seu *Spiritus urinosi* ad concretionem duelech concurrere. Præterea hoc sulphure eruto, *materiam* habemus in quam spiritus urinosus, dum in urinâ adhuc resideret suam potuerit *ἀπορροίαν* exercere; eadem ferè ratione quâ in Helmontii experimento citato.

Supereft tandem, ut *duas tertias partium terrenarum*, ut par est, contemplemur; ex liquidem etsi crassiores & graviores sentiantur, quàm quæ ullo possent motu cieri, sicque vix eò inducamur, ut eas naturam spirituum potuisse unquam asciscere, credamus, ex præcognitis tamen liquidò apparet, istam quam rudem & penè informem cernimus molem, motui tamen non planè fuisse ineptam, atque alias, ante scilicet ipsius coagulationem, volatilisationis legibus paruisse. Rasuræ enim matulæ quæ duelech in pulverem redactum repræsentant, ante ipsarum otium & captivitatem, per campum lotii liberè exspatiabantur, atque in omnem loci differentiam abreptæ, spirituum indolem necessario æmulabantur, eoque magis, quòd nullam peculiarem nobis præberent sui visionem.

Integrum non esset *partium terrenarum*

renarum examen, nisi quædam in *salem* intra earum viscera conclusum quædam mitteremus. Nam etsi *terrenas* calculi partes *spirituosas* olim extitisse, in propatulo sit, dubio tamen aliquo posset quis nos laceffere; eò præsertim fretus, quod perpetuo laudandus Clarissimus *D. Drelincurtius*, designet illum *salem* adeo fixum, ut ignem violentissimum sustineret. Sed objectionis huius facilis est enodatio, si mature consideraverimus, istius salis, dum ignis viribus subjicitur, eam fuisse constitutionem, ut ipsius minutissimæ particulæ arctissimam inter se iniissent unionem, convenientique præterea caruisse juvamine, seu vehiculo, quò veluti mechanice potuissent attolli. In matula, vel in vesicâ non item, singula etenim corpuscula salina, tum serosolatrice, tum aliis particulis ibidem occurrentibus a sese invicem distincta, & divisa, communi liquoris motu, ultro citroque provehebantur. Ad hanc sententiam ulterius corroborandam multa possemus afferre, rationi & experientiæ cognata, sed cum præscriptæ nobis angustiae seu limites id non patiantur, iter maturabimus.

Cum res ita se habeant, causas calculosæ concretionis, tam *efficientem*, quam *materialem*, nos jam fuisse consequutos arbitramur. Pensandum nunc est quoniam pacto ab istis duelech in matulâ oriatur. Quod sanè non fuerit nobis cognitum difficile; si *spiritus urinosi*, spiritum vitæ coagulantis, virium meminerimus: is etenim *penetrantissimus*, id est particulis valde activis donatus, stipatusque, vinosas,

seu sulphureas impetens, easque ad mutuum cogens accessum, intermedias, tum terrestres, tum salinas, in summas redigit angustias, adeo ut velut irretitæ, motumque suum idcirco amplius edere nesciæ, immediatum ferè cum vicinis acquirant superficierum contactum, ac proinde cum ipsis firmissima fruantur connexionem. Hoc prorsus modo in matula, æquè ac in vesicâ, calculum fieri, persuasum habemus. Cum nimirum ægri urina in vesicâ, vel sani in matula, talem sui textus assequuta est dissolutionem, seu corruptionem, ut *spiritus urinæ, penetrantissimi* titulum adeptus, talem valeat effectum producere. Si quis autem cum *Paracelso, Crollio*, aliisque causam calculi *materialem, tartari* nomine velit intelligere, de verbo non litigabimus.

Calculi *naturâ* abundè satis explanatâ, præcipuas ipsius differentias enumerare, ordo postulat. Primo, alius est magnus, alius parvus. Secundo alius mollis, alius durus. Tertio, alius gravis, alius levis. Quarto, alius lævis, alius asper. Quinto alius albus, alius subfuscus &c. Sexto alius in centro nucleum habet, alius caret. Septimo denique alius adhærens, alius vagus, quorum discriminum causas, has esse opinor. Primo, quò diutius vel brevius in vesicâ calculus hospitatus est, eò maiorem vel minorem materiæ appositionem passus est, ideòque grandior vel exilior est. Secundo quò abundantior internæ vesicæ mucaginis copia in calculi compositionem contrahitur, eò mollius; quò autem parcior, eò durius duelech compingitur. Tertio alius gravis,

vis, alius levis: Quod quidem secun-
dum ampliorem tantum & minorem
molem non est intelligendum, sed
etiam respectu ejusdem calculi volu-
minis: uti perbellè *Mecænas* meus,
in Epistolâ suâ à nobis citatâ, *scil.*
pag. 32. animadvertit. Quartò alius
lævis, alius asper; prout nimirum
æqualis vel inæqualis facta est ma-
teriæ accessio: indeque sequitur
Quinta differentia, quæ colorem
spectat: nam à varia corpusculo-
rum ordinatione variæ parantur su-
perficies, quæ solares, vel cande-
lares radios diversimodè reflectentes
modificantesque, diversos necessa-
riò, τὸ πρῶτον αἰσθητικῶς suggerant
colorum sensus: de quibus in *physica*.
Sextò si nucleus, ut sæpiissimè acci-
dit, è renibus per ureteres in vesicam
devolvatur, ibique ulterius accipiat
molis suæ incrementum, haud la-
boriosum cogitatu est, in calculi
inde orti centro, nucleum debere
occurrere: non solum enim nucleus
ille superstratis corticibus longè du-
rior & firmior est: ut præclarè mo-
net æternum colendus *Mecænas*,
prædictæ Epistolæ *pag. 34.* Sed insu-
per tam congrua, tamque homo-
genea, particularum, uno verbo
artarearum, fieri non potuit ad-
jectio, quin earum stratificationum
ordines, à genuinis nuclei corpuscu-
lorum seriebus maximè differrent.

Ista omnia contra *Fernelii* senten-
tiam à nobis superius oppugnatam
nihil facerent, nisi ex doctissimi
Salmasii ad eruditissimum *Bevero-*
vicius responsione *pag. 141.* scire-
mus calculos dari nucleo caren-
tes, qui proinde in ipsâ vesicâ pri-
mariam, ut antè à nobis scriptum
est, sortiti fuerint generationem.
Septimò tandem, alius vesicæ adhæ-
rens, alius vagus: hujus ratio nulli
non perspicua: illius verò hanc esse
reor. Quemadmodum matulæ, seu
figulinæ, seu stanneæ, interior super-
ficies tam continua ubique, & po-
lita non est, quin innumeris sca-
teat poris & asperitatibus, quibus
proximè adjacens calculi materia
contrescendo impingatur, atque affi-
gatur: similiter in vesica eoque po-
tiori jure, cum ea sit membranacea,
accidere putamus. His subnectimus
expertissimi Barthol. observationem
pag. 200. anatomix recens editæ;
ubi (inquit de intimâ vesicæ mem-
branâ) *rugæ quàm plurimæ in cal-*
culosis, & veluti cuniculi exsculpti
cernuntur, calculos servantes ex di-
latactionis desuetudine contracti. Un-
de haurio calculos non solum præ-
dicto modo, interiori vesicæ mem-
branæ, summâ adhæsione adnasci, sed
etiam intra ejusdem membranæ rugas
intime coacervari, atque ibidem ca-
vos cuniculos agere. (a)

(a) *Hæc omnia quàm maximè illustrabuntur per ea quæ nobis olim amicissi-
mè communicavit Vir omni sanè laude major, ipse scilicet Carolus Drelin-
curtius: cujus hæc ipsa sunt verba.*

„ Calculos instar corallii ramosos,
„ & expansos ab ambitu pedis anseri-
„ ni in pelvim, ubi coeunt molem in

„ unam, aliàs compactam & unicam;
„ aliàs verò multiplicem atque divul-
„ sam, nec non articulis veluti dif-
„ tinctam

» tinctam, & *ginglymi ritu*, ad lum-
 » bos inflexos & erectos, mobilem :
 » aliquando eduxi & inter musei mei
 » cimelia anatomica curiosis oculis
 » objicio. Et isti porro calculi ca-
 » put ureteris obturant quidem & ex-
 » pandunt, sed quia raro sphaerici sunt,
 » urinam vulgo e pelvi in vesicam in-
 » fluere sinunt.

» Calculos præterea in *extremô ure-*
 » *tere* ita constrictos vidi, ut in ve-
 » sicam devolvi nequeant, sed inibi
 » hærentes, dum urinæ tenuissimum
 » per rimulas transmittunt, crassamen-
 » retinent, cuius accellu mole fiunt
 » auctiores, & ureteris insimul atque
 » vesicæ tunicas ita distendunt, ut al-
 » terius ideâ vesicæ rudiores deludant,
 » quasi reapse foret *vesica duplex*; &
 » in illum crassum atque supinum er-
 » rorem Medicos Casauboni incidisse
 » putem, dum viri tanti *vesicam uri-*
 » *nariam* nobis geminam obtrudunt.
 » Hic porro, ubi ad extrema deven-
 » tum est, & calculi in *infimo uretere*
 » taliter impacti atque cuneati viam
 » urinæ præcludunt omnino, tunc il-
 » la in uretere itagnat, & illum enor-
 » miter expandit, una cum pelvi suâ.
 » Inde est ut in cadaveribus aliquot
 » distentam urinâ pelvim, illaque oli-
 » dissimâ detexerim. Imò totum ure-
 » terem eadem illa turgidulum & ex-
 » passum. Sed à calculis divelli ne-
 » queo citra hist. *unam & alteram*.
 » Prima est de molli uno & farina-
 » ceo, qui solius in vesicam cathe-
 » teris impulsu ita comminutus est &
 » attritus, ut per frustilla minutiora
 » totus fuerit abreptus urinæ fluento:
 » atque sic qui cystotomus erat in
 » procinctu ad carnificinam, ab eâ
 » fuerit longè semotus. At è diversô

» calculos conservo filiceos omnino,
 » quique de marmore resiliunt, uti
 » *Brassavolus* narrat Comm. in Aph.
 » 79. Sect. IV. Altera hist. *puerilis*
 » quidem est, sed *Pæoniô stylô* no-
 » tanda. Puer calculi doloribus ex-
 » carnificatus, & ambulationi impar,
 » lectô detinetur, ubi post aliquot
 » dies furunculus in peritonæo sub-
 » ortus est, cuius pus per medios
 » acceleratores tam profundè serpsit,
 » ut vesicam arrosarit, quæ validius
 » contracta non *urinam* modo, sed &
 » *calculum* per ulcus emisit, atque
 » ita prædam quidem eripuit cysto-
 » tomo, sed fistulam ingeneravit, quæ
 » perennat, & qua jugiter & unice
 » effluit *urina*, abolito prorsus usu
 » ductus nativi.

» Coronidis vice *femineos* calcu-
 » los subnectam per urethram (*virili*
 » *breviorem*, *latiorem* atque *rectio-*
 » *rem*) longe optatius excerni, quam
 » in nobis, atque ita raras esse foe-
 » minas quibus calculus extrahatur.
 » Imò quasdam vidi *vesicæ* doloribus
 » *ceu labore partus*, excruciatas, sed
 » quæ post tormenta enormia *petræos*
 » *fætus* excluderint, in renibus em-
 » bryonatos, & intra urinæ cyste-
 » ram sensim auctos in molem usque
 » ovi columbini. Et ipsum profe-
 » ctô, imò quid majus ab *Hipp. vi-*
 » *sum* est, viro ubique *Praxeos* sum-
 » me peritæ.

» Calculorum Chymicam analysin
 » habes in Epimetris Thesium de *Lie-*
 » *nos*. Sed isthæc Chymica cal-
 » culorum vesicæ analysis, paucum
 » exhibet oleum, quô biliarii cal-
 » culi scatent tantô ut aquæ innatent,
 » & *toti* ardeant, picis instar. Deri-
 » dendos ergo sese propinant, qui

» profitentur biliarios calculos in ve-
 » sicula bilis & ejus ductibus concref-
 » cere ob prædominium *tartari* sive
 » *calcis*, & defectum *olei*, sive *sul-*
 » *phuris*. Et id ipsum nequidem ve-
 » rē proferrent de concretionibus in
 » arthritide nodosâ; nam è virili pe-
 » de, *mensis unius decursu*, gypsum
 » vidi, singulis diebus matut. edu-
 » ctum, quod glutine multô, è ten-
 » dinibus extensorum nudatis, &
 » lymphæ ductibus incisis, viscatum
 » erat; sed quod exiccatum, ac cerei
 » flammulæ admotum leviter tantum
 » arsit. Sulphuris itaque confors, fel-
 » lei calculi forte. Id autem tartari
 » singulis diebus à me collectum, su-
 » pra chartam emporeticam extende-
 » batur, exiccationis gratiâ; & ex
 » illo, (*ad unciam circiter unam*
 » *probè siccato*) frustra majora aquæ
 » imposui, ac etiam demersi; sed
 » suberis instar semper resiliuerunt &
 » innatarunt. Illorum igitur compa-
 » ratio cum calce vel gypso, can-
 » doris quidem ratione valet, sed pon-
 » deris ergò claudicat. At calculi uri-
 » nariæ vesicæ plani quidem innatant,
 » sed depressi resiliunt nunquam, flam-
 » mæ autem admoti non ardent, etsi
 » sulphuris non exortes, sed ob ejus
 » parcitatem non ignescunt.

» Isthæc rara quidem sed rariora 2.
 » proferam, I. de calculo 3xv. quem
 » inter *κεμήλια* fedulus conservo. Is
 » intra viri pancreas sensim increverat
 » cum gravitate ad lumbos, maximè
 » post pastum & inter ambulandum.
 » Vomitus denique cievit enormes &
 » lethiferam atrophiam intulit, omni
 » præpedito tam conficiendò quàm di-
 » stribuendo chylo. Mediæ est confi-
 » stentiæ atque soliditatis inter vesi-

» cales, quos farinaceos filiceosque
 » designavi. Fundum aquæ petit, nec
 » ardet, metalli more.

» Alterum est de Virgine ann. cir-
 » citer 20. quæ dira cephalæa seme-
 » stri discruciatâ, occœcata est tan-
 » dem, ac reliquis deinceps sensibus
 » orbata & mediis in planctibus ex-
 » tincta.

» Tota ipsi pinealis gland. saxea
 » fuit, unius ovi gallin. amplitudine,
 » & mole tantâ nervor. optico. tha-
 » lamos, nec-non reliquos tandem
 » nervos lethificè compressit.

Præcipuis calculi *Differentiis* per-
 lustratis, antequam ad ipsius *Sym-*
ptomatum Signorumque explorationē
 nos accingamus, operæ pretium vi-
 detur disquirere, quinam illi sint
 in quos gravis hic affectus imperium
 suum exercere soleat. Primum obti-
 nent locum, qui à patre vel à ma-
 tre, vel ab utroque calculosum acce-
 perunt characterem: nam ut ait
Fernelius lib. I. de morborum cau-
sis, cap. XI. nephritici, arthritici,
& epileptici, filios vitiosâ constitu-
tione gignunt, quâ tandem in mor-
bos similes, hæreditarios idcirco nun-
cupatos, incurrant, ut parentibus li-
beri succedant, non minus morborum,
quàm possessionum hæredes.

Quare mirum non videatur si tot
 infantes, totque adulti miseræ vi-
 tæ stadium sæpè imperfectè emeti-
 entes, tam horrendis cruciatibus dis-
 torqueantur. Apud ipsos enim mor-
 bosum patrimonium tam validas,
 tamque altas egit radices, ut nulla
 mortalium vis id unquam valeat pe-
 nitus extorquere, funditusque re-
 vellerè. *Gaudeant ergo bene nati.*

Prioribus

Prioribus succedunt ii qui à parentibus alioquin fanis oriundi, propter tamen magnam à causis externis in ipsos introductam alterationem, eodem ac præcedentes, affliguntur malo. Novit enim quilibet, quòd *causæ necessariae* quas declinare non possumus, ut sunt *aër* quem respiramus, *cibus & potus*, *motus & quies*, *somnus & vigilia*, quæ *excernuntur* aut *subsistunt*, *animi denique perturbationes*, totam animalis Oeconomiam gubernent, idèque eorum vitiò, vel ipsius animalis abusu, multa emergant monstra, humanæ valetudini infensissima. Hic inter marem & foeminam, discrimen aliquod interferendum venit. Quamvis enim acceptas à parentibus morbosas affectiones, æquali jure, portioneque partiantur, attamen propter diversam partium, vesicæ imprimis, varietatem, ille hæc, in calculum propensior evadit. Utriusque nimirum anatome docet maris urethram longam, curvam, & angustam, foeminæ verò ductum, brevem, rectum, amplumque existere, adeoque difficulter ex illius, verum ex hujus, vesicâ, facile satis calculum nondum seniore posse eliminari. Non omittendum ad ultiores, renum, infantes verò & senes vesicæ calculo magis esse obnoxios. Illis scilicet arteriæ & venæ sanguine adeo fermentato turgescent, ut cum serum in renibus à massa sanguinea segregatur *spiritus urinosus*, quo tinctum est, tali jam polleat virtute, ut particulas sulphureas & salinoterrenas in renum anfractibus statim coagulet,

quo peracto latex aquosus per ureteres in vesicam stillans in ipsa sterilis omnino residet, ut pote saxeo semine in renibus orbatus. In infantibus senioribusque contrà res habet. In illis enim adhuc tenellis & imbecillibus, sanguinis principia, tanto fermentationis orgasmo non percelluntur, nec his senio pene confectis spirituum *δυνάμεις* adeo vegetæ, ut *coagulator urinosus*, tartareas particulas, in renibus, dum eos cum sero pertransit, queat in unum cogere. Exinde salvis sæpè renibus in vesicam cum seroso latice depluit, ubi majori robore, atque imperio in particulas sulphureas & salino-terrenas, comparatis, earum vibrationes infringit, & quasi arctis compedibus revinctas impedit, quò minus vesicæ carcerem effugiant. Haud dubiè tamen multi sunt senium à limine salutantes, qui calculos in vesica, ex renibus contraxerint, eodem pacto, quo cum *Fernelio*, suprà narravimus.

Symptomata, quæ calculum vulgò comitantur, & ex quibus affectûs *διάνωσιν* haurit Medicus, quinque enumerat *Hippocrates*, lib. 4. de morbis. *Σημεία δὲ ἡ νεφρὸς ἔχει πέντε, ἐπὶ ἅντις ἔρῃσαι. Πῆλη, πονέεται. καὶ τὸ ὕρον κατ' ὀλίγον ῥέει, ὥσπερ σπασμωκοῖσι. καὶ ἔστιν ὑφαίμον οἶα τῆς κύστις ἡλκωμένης, ὑπὸ τῆς λίθου. καὶ ἡ κύστις φλεγμαίνει. ἀλλὰ τὸτο μὲν ἀφανὲς σημεῖον δὲ ἀκροποδῖν.* *Signa autem morbus quinque habet: nam ubi mejere vult, dolore affligitur, & urina paulatim fluit, velut in urinæ stillicidio: & est subcruenta nimirum vesicâ à lapide exulceratâ, & vesica inflammata est; verum hoc*

signum inconspicuum est : indicat tamen summa glandis pars. Horum symptomatum signorumque causas has esse ducimus. Primò quidem ἐπὶ πάντεσσι ἔρῃσαι θέλη, πονέεται. Quia cum muscoli abdominis, nec non diaphragma, vesicam in urinæ excretionem comprimant, valdè verosimile est eorum & membranæ musculosæ vesicæ actionem, lapidem è suo loco dimoveri, atque asperitatibus ejus interioris membranæ fibras corradi : unde non parùm sensilis debet exoriri dolor. Verùm quandoquidem totus omnium prædictorum musculorum impulsus, urinam ad meatum urinarium impellit, maximè probabile est, calculum eadem vi, eodem loci pelli, præsentiaque suâ quâ egressum urinæ ferè præcludit, eam finire κατ' ὀλίγον ῥέειν ὡς περ σταγυρικοῖσι, id est veluti in urinæ stillicidio dolorifico : quod est tertium symptoma. Quartò καὶ ἔστιν ὑφαίμων, & est urina subcruenta. Cujus symptomatis rationem reddit ipse Hippocrates : οἷα τὸ κύστις ἡλκωμένης, ὑπὸ τοῦ λίθου, nimirum vesicâ à lapide exulceratâ. Quintò tandem, καὶ ἡ κύστις φλεγμαίνεται, & vesica inflammata est. Quo de symptomate nutare videtur Autor, id enim vocat ἀφανές. Exinde conjectare licet, illud symptoma non esse perpetuum nec παθογνωμονικόν, sed tantùm in iis locum habere quibus vesica calculo impensè læsa fuerit : adeo ut etiam ἀκροποσία, id est, summæ glandis ardor illud significare debeat, seu potius ordinariò manifestet. His accedit subsequens Hippocratis textus, ex quo aphorismus 79. sect. 4. Οὐρόσειον ἐν τῷ

ἔρω φαρμάκεια ὑφίσταται, τατέοισιν ἡ κύστις λιθία; quibus in urina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat. At hic aphorismus tam renum quàm vesicæ calculo competere mihi videtur. Renibus quippe calculo laborantibus, sabulosa etiam excernuntur. Vesicam tamen vel renes speciatim potest respicere, modò cum aliis signis magis particulare conjungatur, seu coincidat. Hæc & alia signa ut crurum inter-cruciationes, manuum pudendis admotio, priapismus, tenesmus, &c. tam ab Hippocrate quàm Fernelio, Sennerto, aliisque magnæ notæ Autoribus probata, cum fructu possunt usurpari si calculus vagus fuerit : at si laterali vesicæ parti, vel etiam ejus fundo adhæserit, vix ullum ex prædictis signis de illo nuntium referet. Hac in re nobis favet Fernelius de part. morb. & sympt. lib. VI. cap. 13. Huc accedit memorabilis historia ab Helmontio descripta tractatu de lithiasi, cap. 3. §. 40. de quodam Prædicatore prope Barciaiam in Anglia, qui anno 1629. sanus atque solpes contendens à prandio, librum è sublimi ad se trahere, in imo ventre, magno percussus pondere atque dolore, certis inde à quatrinduo signis, scivit se calculo gravatum. Ex hujus narrationis conditione & circumstantiis, judicare possumus Prædicatorem, nullum antea ab isto calculo tulisse molestiam, nec ullam forte utcunque manifestam, de illo suspicionis causam habuisse. Omnia hoc in casu Medicorum dubia solvit catheter : ipse etenim leniter & industrie

striè in vesicam immisso omnes explorantur amfractus, omniaque labibula, in quibus alioquin calculus omnem Medicorum solertiam & sagacitatem eluderet.

Jam hujus ægritudinis curationem suscipiendi, hora est. Sed *hoc opus, hic labor est*. Nam etsi concepta, causarum externarum immoderatione, atque intemperie, in calculum inclinatio, earundem moderatione, & temperie, sæpe avertatur & emendetur, hæreditariam tamen, nullâ posse fugari ratione, raturum habeo. Rara etiam, at fortasse ignota sunt medicamenta, quæ ore assumpta activitatis sphæram, tam longè latèque ferant, ut ad calculum in regione vesicæ situm, ea extendatur. Tentandum tamen est quod ratio experientiæ maritata nobis est dictatura.

Verâ & rectâ hujus hostis debellandi, methodo insitemus, si primò grassari incipientis progressus inhibeamus, eumque si fieri queat, capite truncemus. Secundò, si eum jam vesicæ muris loricatum atque munitum, foras ejiciamus, integrâ, imprimis, remanente arce. Primam *indicationem* absolvere poterimus, tali vivendi ratione, quæ massæ sanguineæ succos, ad pristinam *suppressionem* revocet: adeo ut *spiritus urinosus* omni suâ ferociâ depositâ, cum partibus tartareis, tragicam suam personam amplius non possit agere. Primò si *æër* sit intemperatus, atque vaporibus seu effluviis è cryptis saxeis avolantibus, infamis, proinus deferatur. Hæc etenim non solum fermenta seu se-

mina, calculo excitando idonea largiuntur, sed & homines, bestias, carpenta, reliquamque suppellectilem, in rupes aliquando valent convertere: uti legitur in *Helmontio de lith. cap. I. §. 18.* multisque in aliis autoribus. Secundò, summâ cautio in *esculentis & potulentis* capienda. Quippe ut ea, nimiam quantitate ingesta, grave ventriculi fermento, detrimentum inurunt, & vitalem auram maximè pessumdant, sæpèque suffocant, sic nocivâ qualitate, pluribus heteroclitis affectibus, ac præcipuè huic, ansam præbent. Absit tetra ingluvies, quæ plures quàm *gladius perimit*. Procul panis male fermentatus nec benè coctus. Legumina ferè omnia, rubris ciceribus exceptis, caseus, lacticia omnia, pisces grandiores, haleces passæ, seu infumatæ, ostreæ & conchyliæ, & tandem omnia quæ copiam seminis petrificantis secum gerunt. Horum vices subeant caro vervecina, vitulina, capones, perdices, turdi, coturnices, vitelli ovorum &c. amygdalæ amaræ, pistacia, pineæ, nucleis persicorum, cerasa, ficus, rubra cicera. Inter herbas malva, atriplex, petroselinum, asparagus, & imprimis chærefolium *Sennerto* singulare calculi remedium. Vitetur cerevisia nondum benè fermentata, in eamque dum coquitur semen dauci injiciatur. Fugiatur etiam vinum non defæcatum. Nam ea morbi causam secum portant. Ex insalubrium numero est aqua stagnans, in fundo conceptaculi, filicibus, seu arenis orba; talis enim impura est, & terrenis gravida. Verum ea op-

tima cenfetur, quæ perenni fcaturigine, jugique fluento è terræ visceribus per summum ejus corticem derivatur, innumerisque calculis & arenulis fundum stratum habet. Motu nimirum, à corruptione vindicatur, & à spermate lapidescente purgatur, dum ipsum in arenas fæcescens subsidet. Vinum Rhenanum, album, liquor pomaceus, pyraceus, propter vim diureticam, valdè juvant. Si qua autem purgatione utendum, ad succum sanguineum reformandum, inter alias hæc esto, à celebri Riverio probata. ℞. Cassiæ recentè extractæ cum ol. amygd. dulcium ℥j. Diaphœnici ℥iij. rhæbarb. pulv. 3j. cum pulvere liquiritiæ, fiat bolus. Ad hujus affectûs *προφύλαξιν* mirè faciunt aquæ minerales acidulæ, & vitriolatæ; ut etenim eæ varia corporum concreta valent dissolvere, ita calculosam dispositionem potenter enervant. Plura utilissima apud *Paracelsum*, *Helmontium*, *Sennertum*, *Riverium*, aliosque magnæ famæ Medicos, quorû ampliora volumina hîc inferere non decrevi. Tertiò excernendorum *excretioni*, & non excernendorum *retentioni* prospiciatur. Quartò motu nimio pretiosum hominis *balsamum* non profundatur, nec pigriori quiete torpeat, aut gravetur. Quintò de *somno & vigilia*, idem dicimus. Sextò *animi perturbationibus* consulendum, eæ etenim, idem ac motus intensior, & quies desidior, præstant. Omnia igitur medio modo procedant. His & aliis, quæ opusculi brevitâs recenseri renuit, ingruenti huic affectui succurritur.

Ad alteram *indicationem* adimplendam non ita pollet Medicus. Vix etenim pharmaca cum suâ operandi facultate, ad vesicam pertingunt. Tentanda tamen quæ calculum minuire feruntur. Radices apii, petroselini, brusci, graminis, asparagi; Folia pariet. Semina anisi, fœniculi, dauci, carvi, ameos, carthami, rutæ; sal prunellæ, crystal. tartar. Primas obtinet sanguis hirci, vel integer, vel distillatus per B. M. Studendum autem cum Riverio, ut hircus nutriatur per mensem, saxifraga, pimpinella, bacis juniperi, petroselino, aliisque diureticis, sine potu. Vinum alkekengi ab Arnolâdo Villanov. maxime commendatur: quod fit fructus alkekengi contundendo, cum vino albo, & colaturam exhibendo. *Horatius Augenius* historiam refert cujusdam typographi filii, calculo liberati per pharmacum à Jesuita ipsi oblatum, quod tale est. ℞. pulv. millep. 3j. ad summum ℥iij. aquæ vitæ 3℔. juris cicerum rubrorum 3ix. vel x. capiat horis ante prandium quinque. Spirit. salis Hispalensis extollit *Helmont. de lith. cap. 8. §. 28.* aitque ipso calculum imminui. His omnibus ore haustis palmam præriperent medicamenta, quæ suadente *Paracelso*, aliisque in vesicam syringâ transfunduntur; at ægrorum experientia id alienat. Nam mitiora medicamenta, in ipsam vesicam injecta, dolores magnos cient. Si igitur *diætæ* appositæ, & remediis deglutitis, affectus rebellis non cedat, sacra anchora, *κυστοτομία*, amplectenda. Vesicæ inflationem, flabello peractam,

etiam, apud Ægyptios olim exercitam, abhorremus: varia etenim abhinc crudelia imaginamur tormenta, nec commodam calculi educationem. Nec scriptus à Fab. Hildano extrahendi calculi modus, magis nobis cordi est. Regnet ergo ea sola calculi eruendi ratio, quæ tot excellentibus practicis, Celsoque præfertim, maximè arridet. Si quis autem nosse aveat, quale in viro, quale in puero, mulieribus, aut virginibus calculi educendi ἐνδείξιμα excellat, peritorū χερσέων monumenta

adeat. Sed à tædioso librorum evolvendorum labore abstinere queat, quicumque eximiam dictam Epistolam, ab ipso naturæ Genio scriptam, consulere voluerit. Hic sisto calamus, & DEO TRIUNI gratias ex imo meo corde fundo, & ipsum demisso, humilique rogo animo, ut tentamini huicce benignus faveat, Luminisque scintillulam gratus impertire dignetur, quò densis ignorantiae tenebris mens mea tandem eripiat.

Dissertationem hanc primam, alia jam Præclarissimi Martini Listeri, excipiat. Quæ sic habet.



DISSERTATIO MEDICINALIS

D E

C A L C U L O H U M A N O, &c.

Calculi ubique corporis humani at præcipuè in Renibus & vesica generantur: cujus rei rationem infra privatim exponam. Igitur inventi sunt Calculi sub lingua, in ductibus pituitariis, in cerebro, in hepate, in pulmone, in vesiculis seminalibus, in utero, in ventriculo, in intestinis, in articulis tum manuum tum pedum, at multò frequentius in Renibus & vesica. Adis *Historiæ Medicinalis* Scriptores, & præcipuè mortuorum dissectores.

Calculi autem, etiamsi maximè inter se discrepare videantur & figura & colore & pondere; nam in iis sunt læves, sunt asperi: alii opaci, alii pellucidi & crystallorum æmuli: sunt & tophacei & valde friabiles: alii verò verè metallici, ponderosi, penèque silicei videntur: alii rotundi, alii inæquales: alii quadrati; alii fissiles, alii testacei &c. tamen eorum natura & generationis ratio eadem est, non solum in hominibus, sed etiam in aliis animalibus, ubi calculorum quoque quam

quàm maxima, varietas differentiæ-
que occurrunt.

At licet ea distinctio calculorum
secundùm loca, & *animalium gene-*
ra laudabilis & Historica sit, in-
stituti tamen nostri brevitās nos diu-
tius insistere istiusmodi minutiis non
patitur.

Verùm ne futilibus conjecturis o-
ratio nostra procedat, primùm viden-
dum est, quid nobis de calculorum
natura, & ex eorum analysi per
ignem, & cùm crudi nondumque
ignem experti fuerint, existimare li-
ceat.

De calculo autem humano crema-
to hæc exhibet diligentissimus Leu-
wenhoekius ope microscopii.

» In calculo humano, inquit,
» ignis vi in calcem redactò, magnâ
» copiâ insunt & salia fixa & vola-
» tilia. *Idem alibi*, ex sale volatili
» & fixo maxima pars calculi con-
» stituitur; *itemque*, calculi vesicæ
» humanæ ex magnâ particularum
» salinarum copia constant.

Porro: » *ex calculo combusto* cry-
» stalli erant pellucidæ, atque ita
» angulares ac lateribus planis, ac
» si ipsum fuisset crystallum.

» Rursus ex calculo adusto cui
» aqua infusa est, sal coagulatur, ac
» *tam durum fit ac rigidum*, ut
» quamvis aqua ad coctionem usque
» ferveſcat, sal illud tamen cum aqua
» non denuò conjungitur.

» Item sal volatile *calculi* adeo
» *rigidum & firmum* est, ut, ubi
» coagulatum est, humido cælo dis-
» solvi nequeat.

» Ex capite mortuo *calculi com-*
» *bus*to, cui aqua pura infusa est,

» eadem aqua sensim in aëre siccata
» detegi plures salis figuras, pelluci-
» das instar Adamantum: nec so-
» lum erant pellucidæ, sed & an-
» guli earum erant adeo glabri, ac
» adamantum anguli possint poliri.
» Inter eas verò maxima erat plana,
» & ejus basis triangularis: unus ex
» angulis erat obtusus, juxta hanc ve-
» rò jacebat particula salina, cujus
» basis erat sexangularis, &c.

» Præterea jacebat (præcipuè in
» liquoris superficie) magna copia
» particularum salinarum, similium
» iis quas in *Arthriticis calcem* ap-
» pellamus.

» Etiamſi cœlum, dum accuratè
» intuerer salis particulas, admodum
» esset humidum ac frigidum, omnes
» hæ particulæ undique, quasi aqueo
» humori injectæ erant: unde earum
» rigiditas facillè conjici potest.

» *Calculus crudus* ex aqua frigida
» infusus *suos quoque sales* similiter
» rigidos dat.

» Nullam vidi particulam salinam,
» ex tot myriadibus salis, qui calcu-
» lo humano insunt, communi no-
» stro sali similem. Neque illud
» ex siccato humore detegi potuit.

» Omne sal palato nostro non sa-
» pit; ita nec sal è testis conchylio-
» rum crematis, ex alabaſtro crudo;
» ita nec sapit qui elicitur ex calcu-
» lo humano: id est, *aërem & aci-*
dum saporem ad modum salis com-
munis non exhibet; sed sal tamen
esse non desinit, i. e. suum habet
peculiarem saporem, de quo suprâ
fatis dictum est.

» *Capiti mortuo* materiæ calcariæ
» *Arthriticorum* ad nigredinem exu-
sto,

» sto, aquâ adjectâ inest magna co-
 » pia particularum salinarum, simi-
 » lium salium in calculo humano :
 » scilicet rigidorum, pluriumque an-
 » gulorum : nihil salis vulgaris, quò
 » in cibis utimur, inest materia calca-
 » ria arthriticorum. *Hactenus Leeu-
 wenhoekius.*

Illud autem notes velim, figura-
 rum salium illorum varietatem ac im-
 perfectionem, apud eum ab incredi-
 bili particularum salinarum exiguita-
 te dependere, quæ, ut is testatur, vix
 tantæ sunt, ut multæ earum myriades
 arenulam æquent : adeoque propter
 parvitatem vix satis rectè depingi po-
 terant.

In crystallos itaque majusculas
 (quantum fieri potest) aliquo arti-
 ificio cogendæ sunt, ut lenta siccatione
 in umbra, idque diebus maximè ca-
 lidis : quo certè tempore ex aquis
 nostris mineralibus crystallos ad ses-
 qui scrupuli pondus habuimus : dein-
 de quo major quantitas salis erit, eò
 promptius experimentum ejus con-
 cretionis in crystallos, magnitudinis
 conspicuæ & perfectissimæ successu-
 rum est.

Hæc autem non exhibui, ac si ali-
 quod dubium sit de veritate experi-
 menti à Leeuwenhoekio de illis sali-
 bus expositi, sed ut, etiam sine mi-
 croscopio, vel nudis oculis res mani-
 festaretur.

Igitur de copia & natura salis in
 Calculo Humano jam satis ferè di-
 ximus ; item de ipsa calce similiter
 sive materia calcaria & metallica.

Illud autem unum addam de hac
 calculi humani materia, scilicet quod
 in eorum aliquibus debite crematis

etiam ipsum *ferreum metallum*, ad
 aliquot grana adhibito magnete, pos-
 se extrahi ; id quod olim ostendi co-
 ram *Societate Regia Londinensi*, cum
 ibi fortè caput mortuum dictum ali-
 cujus calculi humani à *D. Slare* exposi-
 tum fuisset. Appello autem *Registra*
 ejusdem *S.* de fide experimenti.

Quæ verò præterea calculi, *chy-
 micæ analysi* dent, minùs moror, nem-
 pe olea & aquam. Cum non alia sint
 à sanguine humoribusve corporis :
 adeoque minus faciunt ad calculi ge-
 nerandi intelligentiam ; quæ tamen
 hujus dissertationis præcipua intentio
 est.

Igitur his expositis quale sit id,
 quod in homine lapidescat, satis in-
 tellectum puto, atque ita *calculus*
definitio, nempe esse quid verè lapide-
 um à sale lapideque calcario & in-
 terdum à ferreo metallo, humoribus-
 que quibuslibet corporis concretum,
 atque in plerisque ductibus viscerum
 excretoriis, maximè verò in Renibus
 & vesica natum.

Causam itaque *materialem* calcu-
 li in solis humoribus, ut in pituito-
 sis, crassis, viscosis, tartareis aut fœ-
 culentis non posuimus. Etenim ma-
 teriam non solum concretionis ap-
 tam, quales sunt humores, indicare
 satis est, sed aliam etiam verè lapi-
 deam & metallicam calculi exigere
 videntur, atque ea ipsissima est, quam
 in proximè superiore Tractatu Ana-
 tomico exhibuimus, è quibus Con-
 chyliorum Testæ fiunt, inque Fonti-
 bus Medicatis inveniri diximus ; nem-
 pe succum lapidescentem è saxo quo-
 vis calcario, Pyriteve sive ferreo me-
 tallo *Germinante* ortum, atque aquis

abreptum, nobis aliisque animalibus quovis alimento, maximè verò portione assumptum.

Humor autem iste sive succus lapidescens, etiamsi ejus effectus passim extra nos innumeris exemplis appareant, tamen à nemine quod scio, explicatus est. Etenim Helmontii somnia hic non vendito; videlicet cuncta metalla ex mera aqua fieri, specifica metallorum semina, fermenta, odorem & spiritum nescio quem urinæ lapidificum, Terram ejusdem volatilem, spiritum vini urinæ incolam, hæ meræ nugæ sunt.

Non semen, inquit Helmontius, cum aqua sibi subdita solum petrescit, quin insuper corpus sibi contiguum, odoris feminis petrifici, solo attactu petrificat, at si ita esset, cur renes & ipsa vesica non petrificarentur: ubi interdum semen istud, odor & fermentum tam vehemens est ut innumeros & sæpe ingentes calculos generare potis sit; ἀλλὰ εὐνδεις τὸ τῆς εὐνδεις τῶν λόγων λίαν ἐξετάζειν.

Quæ verò passim observare licet, ea tantum exhibeo, scil. saxa calcaria, & pyriten, i. e. ferri metallum sulphurulentum, præ omnibus metallis, *salia sua lapideis particulis gravida* edere, more plantarum pullulantium; has verò *plantas salinas* aquarum cursibus dissolvi, iterumque vel ob moram, adhæSIONem ex aptitudine quadam partium & contiguitate, imbibitionem, aliave ignorabilia accidentia inter se coire, & in primam suam materiam redire, hinc, inquam, petrificationes extraneas, & calculos intra nos fieri verisimile est.

Est itaque peculiaris quædam materiæ sive succi lapidescentis aptitudo ut in lapidem convertatur, nimirum ex salis lapidei naturali coitione, ejusque rigiditate, ut dissolutioni, ut dictum est, resistat: itemque ex copia & qualitate particularum lapidearum in isto succo contentarum, suo scilicet sali ex quadam harmonia ortis, promptè committendarum, nexu haud facile dissolubili.

Igitur calculi materiam ab esculentis & potulentis, quæ hujusmodi salibus lapideisque particulis abundant, provenire. Si verò corpus bene se habeat foras ejiciuntur, neque in renibus aut vesica retinentur; si renes imbecilli fuerint & vesica labefactetur, in lapidem coire apta sunt.

Efficiens itaque causa calculi est copia materiæ lapideæ in ductibus viscerum excretoriis imbecillis diutius suppressa.

Si qua verò sit in aliquibus hominibus hæreditaria dispositio ad calculum generandum, ea oriri possit ex malâ partium constitutione, ex usu tamen quotidiano victus, lapideâ materiâ maximè infesti, vel in maximè integris hominibus calculi, etiam generantur, videlicet si alimentis continuo & magna copia utantur, quæ plurimum succi lapidescentis in se contineant, aquasve bibant tali succo vitiatas, quia in illis aquis aut cibis causa materialis; unde est, quod in quibusdam regionibus præ aliis incolæ complures calculo laborent.

Itaque renes & vesica vitiantur vel ex nativa constitutione, vel victu calculoso supervacaneo, quam autem rem sic intelligo, nimirum à nimia copia

copia & pondere materiæ metallicæ arteriolæ capillares, renum ductibus excretoriis commissæ, distenduntur, præterque naturam valdè ampliantur, unde excretio debilitatur à constrictione arteriolarum labefactata. Igitur materia metallica in ductibus excretoriis imbecilibus sensim accumulatur moramque trahit, unde ejus coitio in calculos; idem cognita in labe hæreditaria, ubi mala renum constitutio.

Inter causas autem calculi antecedentes & procatacticas, hæ rectè numerantur.

I. Mala concoctio quæ chylus crudus & lentus quo involvitur succus lapidescens, indiscriminatim intra habitum corporis assumitur, etiamsi verò causa calculi materialis non ex stomacho deducenda sit, tamen eo labefactato in officio suo chyli conficiendi, succus putrescens plus minus in omnigeno alimento necessariò & naturaliter existens, possit ob chyli crassitiem citius & facilius in majores arenulas coire in renibus.

Profectò robur inæquale partium est calculosorum præcipua ratio; ita renum alter calculos parit altero sano, quod satis evincit calculi vitium à parte labefactata, potiùs quàm ab ullo materiæ calculosæ defectu oriri, quæ semper, ut dictum est, adest: at raro supra modum arenularum concrevit, nisi vitietur tonus & vigor renis expulsivus.

2. *Lactea infirmata*: nam ab iis integris etiam chylus bene digestus à succo istiusmodi putrescente ex parte purgatur; quòd scilicet is fluori minus aptus sit, adeoque inter alimen-

ti soluti excrementa per intestina dejectur, antequam venas lacteas subire possit.

3. Hyems autumnusque calculos renum parit, autore *Aretæo*, an quod magis laborent renes, suppressa ex frigore perspiratione cutanea.

Sed ad alia pergamus, & privatim materiam calculi suppeditant maximè *ostrea* & omnia *Testacea* animalia; *aquæ medicatæ*, quæque vel calcario vel ferreo metallo imbutæ, & quæ petrescentes ob conspicuos effectus præcipuè audiunt. *Vina* aut quælibet alia alimenta locis aqua petrescente vitiosis nutrita.

Salsæ autem *carnes* minimè, prout *Leeuwenhoeckius* extra dubium posuit; scilicet in calculo omninò nil salis culinarii repertum esse.

His verò adjici possunt *vehementissima quæque Diuretica*, quæ materiam morbificam vel nimio impetu ad renes deturbent, vel victum per se minus noxium infestum reddant, quòd ipsi renes ob nimiam excretionem infirmentur.

In his quoque causis *Balnea* ponenda sunt, quibus renes nimirum laxentur, item alimenta vehementer calida, ut *Piper*, *Allia*, *Resinæ* quævis, exercitium vehemens, *Venus* immoderata.

Audi Hippocratem, (a) » Pueris » calculi principium *ex lacte impuro*, pituita enim ex eo lacte urinæ » sedimento admixta, glutinum evadit; ac primum quidem parva lanugo accrescit, deinde quod accedit » arenosum. Rursus autem alimen-

N n n 2 » tum,

(a) *Lib. 4. de Morbis.*

» tum solidum aut lapidosum effici-
 » tur, non secus ac *ferrum ex lapidi-*
 » *bus* &c.

Ita nobiscum satis benè sentit antiquissimus Medicus, calculum accrescere ex arenâ pituitæ commistâ, i. e. ex materia verè lapidea, primòque mollem velut lanuginem, mox virtute arenosæ accessionis solidum ac lapidosum effici: non secus ac *ferrum ex lapidibus*.

Hactenus de calculi natura, ejusque generandi modo causisque; proximo autem in loco ipsius *morbi* ratio sive *pathologia*, sive is in renibus sive in vesica fiat, instituenda est; cum *Diagnosticis* verò incipiam.

Hæc autem Calculi in Renibus indicia sunt. I. Omnium certissima significatio, calculus excretus est.

2. Ad renem doloris gravitas. (a)

3. Femoris è directo stupor sentitur, *idem ibidem*.

4. Nausea & vomitus.

5. Urina cruenta: at hoc perpetuum non est: unum tamen è præcipuis est quando contigerit quod dolorem nephriticum à colico distinguat.

6. Urina in principio aquata, pauca, aut integra suppressio: à moto verò calculo per ureteres, ea copiosa, ferè turbida, arenosa.

Hæc autem indicia per se patent, neque ulla explicatione, certè arte peritis, indigent.

Ubi verò id malum in vesica fuerit, his indiciis, inquit *Celsus*, (b) cognoscitur. » Difficulus urina redditur; paulatimque, interdum

» etiam sine voluntate destillat, eadem
 » arenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut *purulentum*
 » aliquid cum ea excernitur; eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximè hi, qui grandes habent calculos, quidam etiam inclinati reddunt, eamque extendendo dolorem levant. Gravitatis quoque cujusdam in ea parte sensus est; atque ea cursu omnique motu augetur: quidam etiam cum torquentur, pedes inter se, subinde mutatis vicibus implicant. Foeminae verò oras naturalium suorum, manibus admotis, scabere crebrò coguntur; non nunquam si digitum admoverint, ubi vesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt.

Neque multum aliter Hippocrates. (c) » Hic morbus quinque habet signa: Dolor in urina reddenda; ejus stillicidium: interdum cruenta, à vesicæ inflammatione vexata: verum id non apparet, indicio tamen est *summa præputii pars* (i. e. inflammata) interdum arenosa reddit, interdum duos aut plures calculos.

Aretæus ex antiquissimis autoribus in plerisque consentit. » Si vesicæ inhæserit calculus, ex colliquationibus patefiat, neque doloris neque gravitatis expertes sunt, licet urinam expedite reddant: Sin minùs & urinæ difficultas accedet: omnes verò calculos ex sabulosis urinæ subsidentiis deprehendes, & quòd istis virilia sæpius arriguntur: quando enim mejunt subestque calculus, dolent, tractant, attrahuntque

(a) *Hipp. Epidem. l. I. S. I.* (b) *l. 2. c. 7.*

(c) *Lib. 4. de Morbis.*

que pudenda, anus quoque vitii
particeps redditur.

De *Inflammatione* autem vesicæ
satis constat ex observatione Hippo-
cratis, cum ad summam glandem ferè
visibilis sit ex insigni rubore; unde
non mirandum est si molestus inter-
dum *pruritus* sit in pudendo, *dolor-*
que in vesicæ collo incipiens, ad
glandis extremum usque porrigatur,
unde etiam *Virilium* frequens *ere-*
ctio, non secus ac cantharidibus
sumptis.

Urinæ autem *Stillicidium*, & pon-
deris sensus: item mictio facilior in
uno corporis positu quàm in alio:
item deijciendi cupiditas, quæ mictio-
nem excipit; hæc omnia à magnitu-
dine, & figura & motu calculi oriri
videntur.

Ultimum autem & omnium cer-
tissimum signum est exploratio, vel
per digitum in anum, vel per cathe-
terem in ipsam vesicam immissum.

De illo autem Hippocratis (a)
Aphorismo magna interpretum dis-
sensio est à Galeno ad nostra tempo-
ra. Quibus in urina arenosa (*ἁρ-
μωδία* subsident,) his vesica calculo
laborat.

Johannis Zechii (b) opinio, ut
video, plerisque arridet; qui hanc
subsidentiam non meram arenam esse
vult, sed gluten istud mucaginosum
in plerisque calculosis conspicuum;
at hoc non perpetuum signum est,
adeoque minimè pathognomoni-
cum.

Sed; brevitatis causa, missis alio-
rum disputationibus, mihi videtur
Hippocratem hic, generationis are-

næ locum, non calculi existentiam
indicare voluisse, & dicit tantum
ipsam vesicam in vitio, ubi arenæ à
mictione formantur atque subsident;
ita quidem expono ἡ νύσσι λισία, imò
idem Hippocrates (c) alibi ait are-
nam non esse signum calculi in vesica;
atque ita ille Aphorismus diverso ab
hoc sensu intelligendus est.

Verum ais, arenæ non sunt calculi,
neque negandum est, quod à quibus-
dam exhibetur, scilicet vix è decem
unum reperiri, qui arenas cum lotio
non excernant; raros tamen esse; qui
renum calculo laborent, & rariores
multò, qui vesicæ.

Quamvis autem arenæ revera cal-
culi sint, nec ab iis essentialiter dif-
ferant; tantum secundum magis &
minus, nam perexiguus Calculus
arena est; tamen aliquo sensu, in
gratiam Medicorum, probanda est ista
distinctio, nempe arenarum quoti-
dianarum cum urina ejectarum, &
calculorum majusculorum non sine
dolorè & difficulter excernendorum,
utræque tamen partes, & Renes &
Vesica tum suas arenas, suosque cal-
culos generant, neque aliter visum
est Hippocrati, ut suprà dictum est in
diagnosticis: vult autem in hoc Apho-
rismo arenas ex urina micta subsiden-
tes præcipuè à vesica vitiata oriri,
eamque calculis generandis præ reni-
bus pronam esse innuere. At hic
prætereunda non est singularis opi-
niò Fernellii, qui statuit omnem ve-
sicæ calculum, rudimentum quod-
dam, ceu interiorem nucleum ex re-
nibus trahere, è quibus per nephri-
ticum dolorem excidens, si sit gran-

N n n 3

dian-

(a) Aphor. 79. S. 4. (b) Conf. 58.

(c) L. de in affectibus.

diusculus, in Vesica hæret, & for-
dium illic allatarum adhæsu coag-
mentatur, dum adoleverit in justum
lapidem; eo, inquit, argumento, quod
neminem offenderit in vesica calcu-
losum qui non fuerit diu ante ne-
phritide vexatus: item quod in con-
tritis vesicæ lapidibus nucleum quen-
dam se reperisse asserit, diversi à
reliquo integumento coloris & sub-
stantiæ.

Huic autem opinioni ipse addo,
etiam in mediis calculis, è vesica eve-
ctis, vidi & *ferramenta* (a) & ossa,
per ipsum penem injecta: possint ita-
que arenulæ renum esse pro rudimen-
tis calculorum vesicæ: at hoc perpe-
tuum non est.

Etenim priorem hujus rei ratio-
nem alii Medici ex propria sua ex-
perientia negant; nempe in pueris
calculosos dari, quibus nulli nephri-
tici dolores antecesserunt: item non
in omnibus calculis nucleum istiusmo-
di inesse.

Illud quidem verum est, calculos
renum sive arenulas ab iis plerumque
fulvas esse, vesicæ verò albicantes:
quare? calculorum color, ut supra
dictum est & consistentia varia: mo-
dò rufi, modò nigricantes, modò
albidi sunt nempe pro ratione cibi
portionisve assumpti; at ferè à reni-
bus subcrocei, à vesica albidi: an quia
in renibus urina defæcatior, puri-
orque ei insit arenularum materia ad
ocram accedens, in vesica verò eadem
pituitæ mucosæ & albicanti, è glan-
dulis excretæ: mista & contaminata
fit.

Sed ad *Prognostica* transeamus.

Lapis magnus potione, neque me-
dicamento frangitur, autore Aretæo.
Chimicorum insomnia hætenus va-
na sunt.

Morbus periculosus: hæreditarius
incurabilis: nam calculorum procrea-
tionem (cum Aretæo loquor) è fœ-
cunda sterilem reddere, nemo po-
test: facilius est enim uterum à pa-
riendo prohibere quàm calculosos re-
nes calculis vacuare.

Vitia renum & vesicæ in senibus
difficiliter curantur. (b)

Hippocrates in Coacis vult lapi-
dem in vesica non generari à 14. æta-
tis anno usque ad 60. nisi prius exti-
terit.

Ita parvi & senes sunt ipsis viris cal-
culosiores. Pueri autem magis cal-
culo vesicæ laborant, senes verò cal-
culo renum: quid ita? audi Galenum
(c) quia in pueris facultas renum
expultrix fortior est, ejus autem ac-
tio naturalis est, item retinendi in ve-
sica facultas non minus fortis est; at
cùm vesica propriè receptaculum est,
& pueri parum bibant, parumque
mingant, cùm mictio actio volunta-
ria est, vesicæ exonerandæ non at-
tendunt, sic calculorum coitioni ma-
jor opportunitas ex mora.

Ex anatomia autem discimus, ubi
calculosis ægris mucosa urina effun-
ditur, vesicæ corpus cancrosum esse,
& digiti aut pollicis crassitiem non-
nunquam adeptum esse: in calculosis
verò, qui claram ac tenuem urinam
mingunt, vesicæ substantia invenitur
membranosa, ferèque ut in statu
naturali se habet, de his autem ita
sentio, calculum primùm exiguum con-

(a) *Acta Philosoph. Lond.* (b) *Hipp. Aphor. 6.5.6.* (c) *In 6. Epid. sect. 3.*

concrevisse, vesicâ adhuc integra: aucto verò calculo, ab ejus pondere, asperitate, motuque vesicam lædi, ejusque membranarum glandulas inflammari, intumescere, indurari, i. e. cancrasas fieri: unde veluti puris sive pituitæ viscosæ, interdum cruentatæ ingens copia cum urina profuit.

Postremò in *sectione* sola cura magnorum lapidum. *Cælio Aureliano* (a) autore.

At, inquires, cur non quibusdam medicamentis dissolvantur, certè quidam lapides majores, cum ex calculis in humano corpore repertis quidam tophacei & friabiles & leves quales sub lingua & in articulis orti² respondendo in vesica lapides ferè filicei sunt; rarò molles; & si ita, tamen ex arenulis duris compaginantur; ratio est, quia per majores vias & in majoribus conceptaculis metalla, sive particulæ tum salinæ, tum lapideæ, è quibus iste succus petrescens constat, ponderis sui virtute ferè copiosius & excernantur, & in calculos concrescunt; atque hæc hactenus. Proximo autem in loco de curatione & medicamentis dicendum est.

Curationes autem hæ ferè instituendæ sunt: vel ad calculos minores, arenasve, cum molesti fuerint, expellendos, specialibus adjutoriis: atque hæc ferè diuretica sunt: vel materiam calculosam minuendam, doloresque acerbos mitigandos, in majoribus calculis excretioni ineptis: atque illa prophylactica anodyna sunt, profectò qui dolorem sustulit, satis

(a) T. P. l. 5.

ad valetudinem profuit.

Quoniam autem instituti nostri ratio brevitate requirit, & ut repetitiones supervacaneæ evitentur, ex adversariis nostris ægros aliquot, qui nobis commissi fuerint, eorumque curationes paucis enarrabo, deinde medicamentorum, maximè à nobis exhibitorum rationes exponam.

Hi autem *Nephritide* laborarunt.

1. *Ægrotus.*

D Dryden Presbyter Ecclesiæ Eboracensis, mediæ ætatis vir, ex pluribus mensibus sanguinis mictione miserè affectus est, maximè ab omni equitatione, aut vehementiori corporis motu: item calculos innumeros, ferè arenosos (& in iis fuerunt, qui seminum coriandri grana implebant) excernere consuevit; huic etiam frequentissimè mingendi cupiditas.

Is autem multa à multis frustra sumpsit: tandem hoc remedium à me feliciter præscriptum est (*R. sem. & rad. pæoniæ maris, agarici, vitrioli Romani, mithridat. an. ʒij. conservæ ros. rubr. ʒiij. Syrup. è ros. q. s. f. Electuarium.*)

Convaluit & à sanguinis mictione, & à Calculo.

2. *Ægrotus.*

D. Breeden de Pangburne, unus è Parlamento Jacobi Secundi Regis, sexagenarius, ex vehementi saltatione in uno & dextro pede per hortos suos, quo exercitio aliis

aliis sæpius certare consuevit, sanguinem minxit.

Huic malo curando ei pluries sanguis è brachio missus est, aquas *fer-ratas* sumpsit; aliaque plurima medicamenta frustra ab aliis atque aliis medicis adhibita sunt.

Post sesquiannum autem hominem in hac conditione inveni. Sanguinis plus minus ab aliquot septimanis quotidie mingebat, non sine urinæ stillicidio; tumor ingens & durus in abdomine contra renem dextrum; item dolor continuus in dorso: summus ardor in imo abdomine è regione renis dextri: *venæ* abdominis externæ ejusdem lateris *varicosæ* & præter modum tumidæ; habitus corporis qualis in Leucophlegmatia: multum sitiebat: parum dormiebat. Denique huic coxendicum stupor, & summa crurum imbecillitas.

Huic autem malo sic auxiliandum censui. (℞. *Mithridatii sine opio confecti* ʒjß. *G. Tragacanth. aq. rosac. dissolut.* ʒß. *f. pilul. n. vj.*) ex his unam singulis noctibus sumpsit.

Item (℞. *aq. hordei* ℥ij. *olei vitrioli guttas* vj. *succi limon.* ʒiv. *C. C. usti* ʒj. *sacch. candi albi* ʒiiß. *misce; de quo ad* ʒvj. *bis quotidie propinavit.*)

Item ℞. *Balsami martis* (i. e. *salis martis ex balsamo Lucatelli* ʒj. *optimè super marmor contriti*) gr. iij. *horâ aliquâ vespertinâ devoravit.*

Ex his autem medicamentis intra diem unum, vel alterum multò melius se habuit.

Postremò bis hominem purgavi

Hieræ diacolocynthidos ʒj. quod medicamentum facile tulit.

NB. Quavis in reliquis mire à meis medicamentis levatus est; adeo ut non amplius sanguinem mingeret, & optimè dormiret, & sat benè cibum appeteret, tamen vix ambulare centum passus præ mira imbecillitate crurum potuit, aut sc alas ullatenus ascendere.

In hoc statu ad tres hebdomadas mansit: tandem nulla amicorum prece prohiberi potuit, quin rus iret ad quinquagesimum ferè lapidem à Londiniis, ad videndum uxorem moribundam; ex itinere autem (quamvis letica veheretur) iterum sanguinem minxit, & aliquot postea diebus ex urinæ suppressione interiit.

Ex dissectione Ren dexter immensæ magnitudinis inventus est, cancerosus, ad quinquaginta uncias pendebat, atque in eo inventi sunt plurimi exigui calculi.

Nequeo sanè mirari satis veterum diligentiam; nam cum rarissimum sit hoc morbi genus, idque mihi semel tantum in Praxi occurrit, tamen apud Aetium summa accuratione descriptum illud legere est.

3. Ægrotus.

D. Athins, Quinquagenarius, unus è regni Justiciariis, Eboraci, cum publica negotia obiturus erat, calculo laboravit, huic in altero Rene dolor vehemens, vomuit, mingere cupivit, at frustra, nam paucam tantum urinam reddidit, eamque aqueam.

E lenioribus autem medicamentis hæc sumpsit; nimirum præmisso enemate

mate è Therebinthina ex vitello ovi dissoluta in decoct. communi cui vini Emetici ℥iij. adjectæ fuerint, parum effecimus: ideo statim hæc Purgatoria exhibuimus cum diureticis mixta & stomachicis. [℥. *Elect. lenitiv.* ℥℔. *asellorum*, *cochineil. an.* ℥j. *sal. absinth.* ℥j. *m. f. bolus*, huic superbibat potionem sequentem. ℥. *decoct. sennæ Gereon.* ℥ij. *syr. è spina cervina* ℥j. *s. aq. mirab.* ℥vj. *olei amygdalarum dulcium* ℥j. *misce f. potio.*] bene fecit: calculos enim aliquot albidos cum urina subfulva & fœculenta excrevit; & postridie publicis negotiis præfuit.

4. *Ægrotæ.*

Domina *Bellingham* quadragena-ria, subito post dejectionem vehementi dolore nephritico & ad alteram abdominis partem correpta est; vomuit; mox quatuor calculos excrevit cum tantillo urinæ: ab his primis calculis dolore perseverante hoc medicamentum præscripsi. (℥. *Cassia recentè extractæ* ℥. *pulv. jalap.* ℥j. *mercurii dulcis gr.* vj. *olei cinnam. gut.* i. *m. f. bolus.*) alios autem multos calculos deinceps per aliquot dies reddidit.

NB. Horum autem calculorum color *luteus*; figura omnium subteres; at non eadem magnitudo: ad grana verò piperis majusculi; omnium durities insignis: aliquot ex iis fractis cortex lapideus unus, more ceparum alteri superinjectus est; item interior medulla similiter & lapidea, & rufescens.

5. *Ægrotus.*

D. *Harduich*, mediæ ætatis vir, ex itinere primum sanguinem minxit, cum renum dolore; post aliquot verò menses calculos *rufos* exiguos non sine vomitu & vehementi renum dolore excrevit, item intra annum tertium eodem dolore renum correptus est, cum vomitu & calculorum excretionem.

Huic sic præscripsi (℥. *Agarici pulv.* ℥j℔. *jalap. pulver.* gr. vj. *summitat. hyperici pulverisat.* ℥ij. *vini veteris Rhenani* ℥v. *m. f. potio.*) ab ea vigesies minimum, deiecit, neque tardè aut cum ullis torminibus alvum movebat; convaluit.

6. *Ægrotus.*

D. *Ascough* senex calculo sæpe vexatus est, renisque alterius vehementi dolore, vomitu, sanguineo mictu, is autem dolor, ante meum adventum sine febre ad octiduum manserat, exhibui statim *Cassia* ad ℥vj. &c. in bolo, à quo non sine levamine purgatus est; at rediit vehemens dolor; ideo nocte dormituro data est *Trochisc. Alkekengi* ℥j. optimè se habuit, postridieque manè sine ullo dolore calculum grandiusculum minxit.

7. *Ægrotus.*

D. *Rhodes* diu multumque renis dolore affecta est, cum vomitu: multa & enemata & alia remedia data sunt, à quibus inducias trium cir-

O o o

citer

citer dierum habuit, tandem huic dormituræ vesperi *Trochisc. Alkekengi* ʒj. exhibuimus; ea nocte placide quievit, & postridie horâ aliquâ pomeridianâ tres calculos majusculos fere sine dolore excrevit, convaluit.

NB. In his Trochiscis insunt præter baccas solani *Alkekengi* dictus, & amygdalas amaras, & opium, &c.

8. Ægrota.

D. *Legger* quinquagenaria, primaria foemina, diu febre intermittente luctavit, tandem ad me venit, Eboraci degentem: graviter præter febrem Symptomatis hysterici affecta est, huic adeo Apozema præscripsi ex Cortice Peruviano, Phyllitide, Ceterac, ruta muraria, &c. Singulorum ad ʒiij. in vino post longam macerationem leviter coquend. de eo per aliquot dies sumpsit; tandem febre victa, vomitu & vehementi renis dolore correpta est, calculumque majusculum excrevit; id quod semel tantum in vita ante quinquennium fecerat, agnosco autem libens, & expertus jam egregiam vim herbarum capillarium ad affectus uterinos; at suspicor illas herbas non tantum calculum expellere, sed etiam ex parte illum ab iis, tanquam materia, gigni; quod rupibus ferè calcariis, locisque montanis, uliginosisque naturaliter crescunt, ubi eas plurimum succo calcario imbui nutritique necesse est.

Idem de eodem Apozemate in alia atque alia foemina, D. *Rooks-*

bie, &c. observavi: unde magis magisque fidem do jam positæ sententiæ.

D. *Green* Coquus aliquoties calculos à renibus excrevit; at ultimo paroxysmo, quo me accersivit ut opem ei ferrem, ex communi consilio cum D. *Barwick*, collega meo dignissimo, *dysuriam* ad triduum passus est magna corporis jactitatione atque anxietate; in extremis autem cum penè de hominis vita desperatum fuerit, sic præscripsimus. [*℞. Cantharid. probè tostatum, tantum non crematarum* ʒß. *aq. spermatis Ranarum* ʒj. *m. f. haustus*] paucis horis elapsis urinam ad quatuor minimum libras reddidit, & unâ plurimos calculos, convaluit.

Hi autem Calculo Vesicæ laborarunt, renibus forte in plerisque non integris.

9. Ægrotus.

D. *Ramsden*, mercator Eboracensis, mediæ ætatis vir, ex patre calculis miserè afflicto natus, & ipse renum & vesicæ calculo à multis retro annis vehementer laboravit, item ejus filius unicus triennis calculo correptus est, & suctione tandem à pene pueri grandusculus calculus exemptus est: gravissimis autem symptomatis malum in dies & molestius & periculosius fit; nam sanguinem sæpius minxit; modò dysuria, modò lumborum contra renes dolore, horrendum! cruciatus est: sæpenumero verò calculos ferè asperos, & inæquales

les excrevit, tum albidos, tum flavos hordei grani magnitudine.

Tandem verò ab equitatione primum observavit se humorem quandam albidum tenacem cum urina reddidisse; is autem humor præ lentore suo matulæ fundo adhæsit, nec facile cum urina effundi potuit; & interdum ad plures uncias diei unius spatio excretus est; neque unquam sine dolore excerni potuit; propter virgam (puta) inflammata & acrimoniam frigidæ, & marcescentis urinæ; nam vetustatem redoluit, etiam si novissimè fuerit reddita.

Sanè hunc hominem, cum primum medicinam facerem, curavi; mihiq; adeo ex propria experientia minus notæ erant medicamentorum vires, illud equidem unum totis viribus efficere conatus sum, scilicet ut materiam istam lentam aut minuerem, aut liquefacerem, quò minore cum dolore per urethram exire posset.

Neque aliud magis profuit, quàm *mercurius dulcis ad gr. vi. ex pulver. jalap. ℥j.* exhibitus: quippe eo & alvus diu liquefacta est, & materia lenta & mucosa in grumos farinaceos divisa est: ac sic multò melius se habuit & ratione dysuriæ, & minus frequentes mingendi cupiditate vexatus est: tandem verò, maxima ex parte desuit prodire iste mucosus, at foetor urinæ usque permanfit, etiam cum cætera sanus sibi visus fuerit.

Post mensem verò ex frigore & cruditatibus, eodem mucò mirè viscido tentatus est.

Tum verò hominem sic purgavi. (*℥. Rhei Torrefacti 3℔. Therēbinth.*

Venet. ad duritiem coct. & pulverisat. 3℥j. f. Pulvis: detur ex haustu sequenti. ℥. mellis despumati 3j. aq. sperm. ranar. 3ij. misce.)

Urina autem quæ antea aquea fuit, jam ex rheo intense colorata est, eique ex Terebinthina odor suavis conciliatus est, at postridie idem urinæ pallor atque idem foetor redierunt.

Porro, ex semicupio, in quo semel tantum ad mitigandos dolores demissus est, involuntaria mictio sequuta est, idem observavi ex usu opii.

Rursus, ex mercurii dulcis aucta dosi ad gr. x. & pro secunda vice dato, idem effectus sequutus est, ut sc. mucosæ urinæ materia in exiguos grumos incideretur & matulæ fundo vix amplius adhæreret: at propter stimulatam anum, & ex consensu communi cum sphinctere vesicæ, diarrhœam plurium dierum, imò ferè integri mensis induxit, item aphtæ in ore & faucibus ortæ sunt.

Cum verò levi febricula sub eo malo corriperebatur, venam in brachio incidimus: sanguis autem missus & refrigeratus, crassa pelle albida contextus est.

Tandem ex communi consilio aliorum mecum Medicorum, & Trochisci, Alkekengi & emulsio cum seminibus frigidis minoribus, cum decocto Symphyti majoris, &c. præscripta sunt.

Ab his autem remediis calculi multi parvi, sed *albissimi*, qualis color fuit emulsionis, excreti sunt; item postridie rediit urina mucosa & lenta & dolor vehementer auctus est, & urinæ difficultas; ideo abstinui à

præscriptis medicamentis : itaque spiritus salis Armoniaci, cum Gummi ammoniaci destillati ad guttas vj. ter quotidie sumpsit ex aquæ spermatis ranarum haustulo.

Ejus autem medicamenti post aliquot dies effectus erat, ut urinæ malus odor, ferè sublatuſ est, & ejus sedimentum jam bona ex parte similagineum, candidius & leve factum fuerit.

Rediit autem appetitus, & ex usu salsamenti veteris, apud nostrates *Ling*, dicti, alvus subito compressa est, & urinam rursus continuit; cæteraque omnia incommoda mirificè levata sunt præter unicum in urina foetorem, neque amplius urina viscosa.

Hic autem vir, tolerabilem valetudinem consequutus, Eboraco Londinum se contulit, ubi à chirurgis, ejus artis peritis examinatus digitis in anum immisſis, calculus ad ovi magnitudinem compertus est.

Illud sedulò autem notavi, medicamenta leniter diuretica, & Renum dolorem supra modum intendisse, & si è valentissimis fuerunt, & Testiculorum, ipsiusque urethræ, & glandis, ad exitum, inflammationem & rubedinem excitasse.

Ab eo tempore, quo Eboracum rediit, nihil, quantum scio sumpsit; certè unum vel alterum annum vixit, sed graviter decubuit, nec calculum ullum postea excrevit.

Tandem nescio cujus suasu, unciam unam Guttarum dictarum à *Goddard* autore, à Londino naſtus, in aqua parietariæ bis aut ter in die sumpsit, hoc autem medicamentum (ut postea didici ab ipso Rege Caro-

Secundo, qui à vidua *Goddard* magno pretio secretum redemit) nihil aliud fuit, quàm *Spiritus* salinus volatilis à *serico crudo* vi ignis elicitus, at tanta erat ejus malitia in optimo viro, ut biduo à sumptione, sanguinis miſtu, & diris cruciatibus, correptus, misereque convulsus, diem ultimum obierit.

Sub eo tempore in eadem urbe duo senes, metallorum fossores, ex calculo à plurimis annis decumbentes (*Smith* unus appellatus est, alterius nominis oblitus sum) convulsi perierunt, potione spiritus *Terebinthinæ*, ad ℥ij. aliquoties exhibiti, unde inflammatio inum ventrem ex toto occupavit, in *Gangrænam* protinus mutata, hoc medicamentum suasu cujusdam *Agyrtæ chymici* sumpserunt, quorum alterum, super pontem habitantem, prece viduæ, dissecui.

IO. Ægrotus.

Illustriſſimus Baro D. *Franshavy*, Puer novennis, calculo vesicæ ab aliquot annis laboravit, illum *Sandbeck* vidi, villam amoenissimam D. Comitissæ de *Castleton*, dum ibi ejus matri decumbenti advocatus sum.

Hujus autem pueri urina, instar feri lactis recenter concreti, turbida & grumosa erat, item in fundo ejus reſedere grumi albissimi, verè caseosi, ejusque urinæ odor ipsissimus qui casei recentis: is autem puer, ex præscripto Medicorum, quotidie lac asinum bibere consuevit, ex ejus verò vesica postea calculus feliciter exſectus est Londini.

Illud autem ex hoc casu constat, sc. la-

sc. lactearum venarum imbecillitatem, easque officio suo non rectè fungi, quòd (cætera sanus puer) odorem & substantiam fracidi casei ejus urina exhibebat; aliter multo, quàm in integris etiam puerulis lactantibus, quorum urinæ suus odor & consistentia est.

II. Ægrotus.

D. Little Prætorix cohortis eques, Eboraci tum degens, mediæ ætatis vir, ex equitatione, primum urinæ difficultate correptus est: mox ea ferè ex toto suppressa est cum vehementi dolore circa pubem & in ipso penis itinere.

Cum urina verò exiit mucus quidam albidus, visci instar tenax, maturæque fundo pertinaciter adhærens, item ejus odor foetidus, qualis ex urina veteri.

Ob vehemens verò malum sæpius animâ defecit, & misere convulsus est.

Hæc autem ante meum adventum, statim oleum amygdalarum dulcium leniter tepefactum, injiciendum vesicæ præscripsi, cum bono eventu, deinde hoc medicamentum exhibui devorandum. (℞. *Mercurii dulcis* gr. iv. *pulv. jalap.* ℥j. *Cassia* ʒij. f. *bolus*) à quo alvus septies mota, dolores levati sunt; nocte Troch. Alkekengi ad ʒj. dati. Verùm postridie & sanguinem minxit & aliquam-multos majusculos calculos albidos excrevit; aliofque per aliquot dies: calculis autem excretis & iste mucus exire desiit: convaleuit: hunc fortè hominem in Nosocomio militari Chelsiensi superiore anno vidi, beneficii mei non immemorem, & (ut mihi narravit) post viginti annos, calculos quod attinet, sanum.

12. Ægrotæ.

D. Hedley, in Vicinia Leedes, oppidi agri Eboracensis degens, quinquagenaria, admodum obesa, ex multis annis *calculi cujusdam arenacei* excretionem vehementer cruciata est. Ii autem calculi ipsum *Saxum molare* nostrum arenaceum valdè referebant; nam *ex arenis majusculis Crystallinis, inter se coagmentatis* in calculos majusculos constabant, interdum verò solidos, interdum solutiores eos, quotidie, haud modica quantitate cum urina reddebat.

Hæc autem Symptomata præter calculorum excretionem passa est, cordis palpitationem, assiduam mingendi cupiditatem, lumborum & vesicæ dolorem, urinam aqueam, cibi inappetentiam, &c.

His autem malis sic occurrendum esse censui, (℞. *Lingæ cervinæ, Trichoman. an.* ʒj. *macis* ℥ss. f. *pulvis subtilissimus, detur ex aq. hordei haustu, post horam infusionis, ter quotidie*) post 4. dies non amplius calculos reddidit; urina jam fulva, qualis sanorum cum sedimento albido, quod ferè defuit ante: ad aliquot amplius dies iisdem medicamentis, at alia atque alia compositionis ratione, usa est; præter opinionem convaleuit.

Reversa autem ad suos, rursus calculorum id genus excretionem correpta est: iterumque ad me Eboracum venit: atque, iisdem medicamentis similiter sumptis, convaleuit.

Huic domum redeunti usum cerevisiæ præcepi tantummodo ex aqua fluminis, & non putei, ut ante consueverat, confectæ: nam non sine ratione arbitratus sum, aquas puteales horum cal-

culorum materiam, ut pote succum lapideum, in se continuisse.

13. Ægrotus.

D. Freestone de Hornecastle, micturitione admodum dolorosa & frequentissima, cum viscosa materia matulæ fundo adhærente, correptus est: nisi tamen erectus mingere haud potuit, ut multoties per noctem mingendi causâ è lectulo surgere coactus sit. Diu vitam sic miseram traxit, huic sic præscripsi. (℞. Balsami martis) i. e. bals. Leucatell. & salis martis an. ℥j. f. pilula sive bolus, quem sumat nocte & tantundem mane: quò per triduum sumpto non amplius cubitum per noctem reliquit: sed faciliè resupinatus in lecto mingere potuit, item huic minor dolor in Urethra & extremo pene.

Item (℞. Aq. spermatis Ranarum ℥j. C. C. usti in subtilissimum pollinem contriti ℥j. gummi Tragacanth. 3j. misce hujus bene conquassati ℥iv. ter quotidie bibat.)

Item (℞. Balsami veneris ℥j. dividatur in sex doses:) has autem per triduum sumpsit singulis diebus mane: à quo alvus die tertio leniter mota est. Omnino melius se habuit, rursusque abiit, nescio an hic æger calculosus fuit, nam in adversariis nostris de calculo nihil scriptum inveni.

14. Ægrotus.

D. Lane, Divi Laurentii in Urbe Ludi-magister, ex tribus circiter annis, Urinæ stillicidio vehementer cruciatus est. Item plurimos calculos excrevit. Huic autem mingendi cupiditas bis aut ter aut pluries in ho-

ra, die nocteque: alvus firma: urina foetida & visco quodam referta, item doloris acuti sensus in ano, & circa pubem.

Huic autem sic præscripsi. (℞. Succ. hypocistidis glycyrrhizæ ana ℥j. mithridatii sine opio 3j. Gummi Tragacanth. aq. sp. ranar. dissolut. ℥ij. CC. usti 36. misce f. pilul. viij. ex 3j. harum pilularum unam vesperi atque alteram mane quotidie sumat.)

NB. Tertia nocte ab iis sumptis ter tantum minxit; at quotidie alvus bis aut pluries soluta est. Ab eo autem tempore ad dies septem tantum bis aut ter in nocte minxit, & placide dormivit, & mirifice levatus est; meque opium ei dedisse putavit: imò planè se convaluisse affirmavit; adeò dolor mitigatus est præ eo, quem ante meum adventum sentire consuevit, at potioni, præ fiti, contra meum præceptum indulgere voluit. Unde rediit mingendi frequens cupiditas, & remediis abstinuit.

Alios autem multos calculosos omitto, quibus hæc medicamenta in micturitione, sive mingendi importuna cupiditate profuerunt: neque aliud malum gravius est, ex iis quæ humano generi contingunt; imò omnium perhibente Plinio, ex decisione veterum Medicorum, longè gravissimum est stillicidium urinæ.

15. Ægrotus.

D. Spacy ex multis annis sanguinem mingere consuevit: Interim plurima intervalla optimæ sanitatis habuit, eoque malo vacuus. Tandem verò mucum quendam, sive Pituitam vitream, viscidamque reddidit, fundo matulæ

matulæ pertinaciter adhærentem: jamque urinæ odor foetidus, ejusque stillidium molestum; at à mictione in extrema penis glande sævissimus dolor.

Huic sic medicinam feci. *Trochiscos Alb. Rhasis* ex aq. sperm. ranar. in penem injici feci.

Item (℥. *Merc. dulcis* ʒj. *Elect. lenitiv. mithridatii* an. ʒiʒ. f. *Bolus vesperi detur*) mane alvus soluta est mannæ potione.

At his medicamentis, calculos plurimos excrevit albidos, leves, angulosos. Symptomata ex bona parte sublata sunt.

16. Ægrotus.

D. Montege, sexagenarius & amplius, optimus vir, calculosus cum urina mirè viscida; huic viscositati urinæ ter remedia præscripsi, & toties ex ea ad mensem minimum convaluit: Scil. (℥. *Aq. simplicis limacum*, ex lacte destillatæ ʒiʒ. C.C. usti & in tenuissimum pollinem cont. ʒj. *Jacch. cand. alb.* ʒʒ. misce. *Hujus probè conquassati & turbidi* ʒiv. ter quotidie potavit.) Item ℥. *Penis viridis testudinis furno siccati* ʒij. *Hujus pulveris ad* ʒj. *alternis diebus sumpsit ex eadem aqua*: At ex recidivis frequentibus, mali vitæque pertæsus, in lithotomorum manibus, tertio à sectione die, obiit.

Verùm ægrotorum & mihi & tibi fortasse Lector satis superque est: ad medicamentorum verò rationes explicandas, quorum præcipuè causâ hæ narratiunculæ ex adversariis nostris transcriptæ sunt, propero. Simplicia autem medicamenta calculo maximè accommodata, sive *specialia adjutoria*, ut Coelii Aureliani verbis utar, hæc

sunt, nempe, quæ in quatuor classes commodè redigi possint.

Prima autem & præcipua *Classis* est eorum, quæ ex *Insectis* animalibus oriuntur.

Penis Testudinis viridis tostus. Margaritæ. Conchyliorum testæ, & crudæ, & crematæ. Millepedes sive Aselli. Scorpionum, Cantharidum, Cochineil, lumbricorum terrestrium, apum, formicarum nascentium cinis. Coccus baphica. Spongia Bedegaris sive Rosæ Sylvestris mel. aq. spermatis Ranarum, cochlearum terrestrium. Jus conchyliorum marinorum, sericum, ejusque spiritus destillatus.

Hæc autem omnia mirificè calculos expellunt; idque communi ferè virtute præstant, nempe septica, quæ vehementer corrodunt, stimulantque ductus viscerum excretorios, præcipuèque majores Renum & vesicæ.

In horum autem aliquibus ea vis tanta est, ut illa cruda sumere, nemo impunè ferre possit, quin Sanguinem quoque cum calculis effundat, contractionesque nervorum patiatur. Ideo torrenda sunt, ut igne mitescat vis illa septica, salinis particulis acrioribus ex bona parte evaporatis.

De horum autem aliquibus privatim differere lubet. De millepedis audi *Scribonium Largum*† *Asellos* quinque ex aquæ cyathis tribus suffundere (i. infundere) & per urinam extrahere lapides certum est. Tanta erat de his animalculis experientia apud veteres.

Hic autè præterire nolo, quod olim *ediderim, nempe ex *multipedarū* genere esse *speciem* quandam apud nos non infrequentem in sepibus, teretem,

lon-

† *Comp. 151. * Act. Philos. Lond. N.*

longiufculam, ad digitum puta; quam fi conteras naribusque protinus admoveas, eos tanto odore fulphurulento & corrosivo percellit, ut multo mitior fit odoratus ex integra uncia spiritus urinæ destillati.

Haud diffimilis verò odor è *Formicis* crudis contritis prodiit, maximè ab *Hippomyrmecis* nostris, consule nares.

Pulveris autem *Lumbricorum terrestrium* tostorum Salsedo insignis est.

Margaritarum verò & Conchyliorum crematorum calx sale supra fidem abundat, teste Leeuwenhoekio.

Vis autem salina è serico evaporata apud nostrates notissima est, sub nomine (*Goddards drops.*)

Cantharidum, apum, formicarum, Scorpionum vis septica & exurens, ab illorum animalculorum effectibus, si viva aliquem pupugerint, cuius admoveantur, neminem latet.

Idem cogita de *Coccô baphicâ*, spongiâque dicta *Rosæ Sylvestris*, quæ ex Apiculis conficiuntur, foeturæ gratia.

Neque ob aliam rationem Gallæ, (ut id hîc obiter dicam) tanti usus sunt, ad lanas tingendas aliave, in arte insectoria, nisi quod Insectorum mera opificia sint, eorumque excrementis & veneno septico penitus imbuantur, at pergant ad ea quæ restant.

Cochineil verò medius status est aliqujus scarabæi Indici, i. e. Cantharidibus congeneris; at multò mitioris virtutis.

In hoc autem censu sunt *Cicadæ*, ad calculosos commodæ; vide *Aetium*, nempe *Insectum* quoddam ad Scarabæos accedens.

Cochleæ autem maximè earum cer-

vices, ubi organa generationi dicata, ut vesicam & penem mirificè afficiant, diximus in prima exercitatione ex *Petrônio*.

Idem puta de pene Testudinis viridis, Ranarumque aqua stillatitia, magna equidem volumina non affecto; res tantum attingo, earumque virtutes quasdam communes indicare contentus, ut in singulis admiratione dignam quandam vim septicam & urentem, vehementer adeo stimulantem ductum excretoriorum; privatim verò renum & vesicæ, mecum agnoscas.

His autem annumerari debent insectivora quædam animalia, propter victus rationem, calculis expellendis idonea. Tales sunt Aves quædam, ut Hirundines, ille *Regulus* sive *Passerculus* quidam *Troglodites*, nostratibus *aweren* dictus, de quo consule *Aetium*. *Hanc autem Aviculam ad calculosos summè efficacè, magna accuratione describit, ejusque condiendi cohibendique modum. Naturalem autem, inquit, vim omnino admiratione dignam habet, itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus morbum perfectè sanat: & *novi* adeo quosdam ab ejus usu nunquam amplius ab affectione vexatos: & infra, de causa tantæ virtutis rectè judicare videtur. Arbitror, inquit, & Sanguinis istius aviculæ naturam quidam in se complecti, quod minimè vulgariter profit, cui amplius stercoreis efficacia accedit; ac revera & in Sanguine & in stercore insectorum, quibus vescitur, vis septica insignis est.

Secunda autem classis sit ex animalibus, vel *frigidis*; nempe ossa cremata in capite

* *Tetr. 3. Sermon. 3. c. II.*

capite Tuberonis, Afelli piscis, simi-
liumque: hæc quidem parem virtu-
tem habent cum conchyliis crematis,
& ob eandem rationem, quod in cal-
cem salinam similiter comburantur;
vel *calidis*; scilicet Tunicæ interio-
res Ventriculi Gallinæ, & stercus al-
bum ejusdem, item cinis corticum
ovorum adustorum: atque illa ean-
dem facultatis suæ expulsiuæ ratio-
nem habere videntur cum superiori-
bus. Nam Tunica illa tanquam cor-
nea est: albumque stercus & urino-
sum, & ipsum cortexque ovorum
ad testaceum genus quàm proximè
accedunt.

Tertia verò classis ex herbis diu-
reticis ferè est ut Terebinthina, Bal-
samum Judaicum, Peruvianum, Co-
pivi &c.

Omnia autem Terebinthinata ve-
hementer urinam movent, quòd cuti
admota corrodant: neque vim suam
emplasticam, nisi uestione quadam ex-
erunt. Etenim quatenus vulneris car-
nem putridam marcescentemque exe-
dendo abstergant; viva interim, quæ
subsistit, in cicatricem commodè nutri-
tur.

Ex illa autem corrosione calor ac
inflammatio oritur: unde ductus urinæ
maiores ad vehementem contractio-
nem, explosionemque stimulantur.

Porro in hac classe numerare licet
Tartarum ex vino, ipsumque vinum al-
bum acidulum, vel per se, vel sulphu-
re, more Gallorum, vel ex Gypso, mo-
re Hispanorum conditum: item suc-
cum limonum: Balaustia ex granatis
acidis ac sylvestribus: atque hæc om-
nia herbarum sale essentiali dicto, &
utrinque mucronato, tenuissimis acu-
tissimisque particulis constante abun-

dant, quò maiores ductus renum &
vesicæ continuò laceffantur.

In hac quoque classe & *Legu-
mina* habentur, præ reliquis verò *ci-
cèra rubra* decantantur ob acrium fla-
tuum copiam: nam hos mirè excitant;
forte materiam iis non paucam adjiciat,
ita velut mantissâ quâdam addi-
tâ ferociam quandam flatibus, in cor-
pore præexistentibus, præstant, eos-
que per Renes trahant. Quàm ve-
hementer autem penem, eosque du-
ctus afficiant, scire licet ex testimonio
Veterum: quos adi. Igitur verisimi-
le est conferunt & flatu excitantia,
quòd illas partes distendere & expul-
sione ob acridinem promovere apta
sint.

Postremò ad hanc classem pertinent
nuges avellanæ, amygdalæ præcipuè
amaræ: hæc autem medicamenta le-
nire potius videntur quàm expellere;
adeoque inter anodyna censenda sunt:
at amaritudo amygdalarum aliud sua-
det.

Reliqua autem olea dulcia iter ex-
pediunt, lubricando. Sanè hujusmo-
di olea verè pingua sunt, nec con-
crescere apta; perinde ut alibi de oleo
lini, nucum juglandis, & Papaveris
à me dictum est.

At pereunt, inquires, istiusmodi vir-
tutes à concoctione: scilicet succus,
puta citri, ex prima digestionem aco-
rem suum amittit; minimè verò: si
rectè se habeat aliquis & dolore vacuus
sit, ita esse concedo: ubi autem adest
Nephritis, ac horrenda illa à vesicæ
renumve calculo symptomata, digestio
ex bona parte cessat, corporis habitum
medicamenta tantum non integra per-
transeunt, inque venas viscerum excre-
torias promota, parum mutata egre-
diuntur

diuntur, ita in maximis calculi dolores is succus v. c. subcrudior vim suam extensivam in ipsis renium glandulis vehementer exerit; profectò in ægris Renes, ut & omnia alia itinera tam citra quàm extra sanguinis curriculum, magis aperta sunt, ac laxata; unde virium medicamentorum mira retentio & celerrima trajectio.

Ad *Quartam* autem ac ultimam Classẽ pertinent à metallis medicamenta: scilicet corallium; lapis Judaicus, nitrum Veterum, spiritus salis vitrioli, sulphuris, sal prunellæ, aquæ medicatæ, vel acidulæ, ferratæ, calcariæve, vel mixtæ scilicet muriaticæ, calidæ, frigidæque, mercurius dulcis. Atque ex his fere medicamentis vani homines Lapidum renium & vesicæ non expulsionem tantum, sed & fractionem comminutionemque vehementer jactitant.

A salibus certè metallicis, fateor, obstimulum & summam acrimoniam vehemens contractio majorum ductuum & lapidum expulsio expectanda est: idque Veteribus probè cognitum est ex multiplici experientia; quos consule, unam aut alteram tantum instantiam exhibebo.

Nitri vitriolati pondo, ex vino, in arenam solvit lapidem, Scribonio Largo Autore. †

» Aquæ calidæ quæ sunt in Tusciâ
» Ferratæ, mirificè remediunt vesicæ
» vitiis; appellantur itẽ *vesicariæ* quon-
» dam Milonis Gracchi, Prætorii ho-
» minis optimi ad quinquagesimum la-
» pidem reddentis eodem* perhibente.

Iis qui vesicæ lapidibus afficiuntur erunt aquæ eligendæ *salsæ*, vel quæ Nitri habeant qualitatem, ut apud Te-

nariam Insulam, quæ potandæ & lavacro adhibendæ sunt. ita Cœlius Aurelianus.

At in labefactatis calculo renibus & vesica, maxima opera danda est, ne quid metallicorum, aquarumve medicatarum nimis exhibeatur. Etenim fortiter licet calculum expellant, tamen propter imbecillitatem istarum partium metus est, ne & ipsa quoque remedia ibidem concreverent in lapidem, cum ipsissimam lapidis novi materiam in se contineant: scilicet & salem & succum lapideum, id quod vehementer moneo, sæpiusque dicendum esse putavi.

Huic autem nostræ sententiæ favet illud Hippocratis præceptum; qui sanus est ac valet, is * nullo habito delicto crimine, semper eam aquam bibat, quæ adest. Qui verò *morbi causa* (puta calculi) eam, quæ maxime conveniat, bibere volet, is sanitatem consequetur.

Item alibi; calculis maximè tentantur & renium morbis qui *aquas salsas*, (i. e. medicatas) bibunt.

Ejus autem rei rationem reddit;
» scilicet aquæ quarum Fontes in saxosis locis sunt, *duræ* sint, necesse est:
» aut si ubi aquæ calidæ existant, aut *ferrum* nascitur, aut *sulphur*, aut *Nitrum*.

» Etenim aquæ salsæ, nitrosæ, ferratæ, saxosæ *indomitæ* nascuntur & coqui nequeunt, sunt tamen naturæ quædam & *morbi* quibus tales aquæ potu sunt commodæ, i. e. ventribus mollibus & humidis & pituitosis; iis durissimæ aquæ & coctu difficiles & aliquantulum salsæ accommodatæ sunt. Profectò

† Comp. 153. * Comp. 146.

* Taral. P. l. 5. † L. de Aere locis, & aquis

Profectò illud sæpius vidi, ex iis qui animi tantum causa aquas nostras medicatas biberunt, quosdam inter ipsa remedia nephritide primum correptos fuisse, & calculos excrevisse; quos ex aquis istis putrescentibus (ita omnes aquæ medicatæ meritò, ut ex supra narratis satis ostensum est, existimandæ sunt) ortos fuisse nullus dubito, cum in renum pelvi aut ureteribus nulla arenula majuscula, vel momento consistere possit sine vehementi dolore, non magis quam in aspera arteria vel minima mica panis putà sine gravi Tussi.

At, inquires, nulla fere aqua succo petrescente prorsus vacua est, atque adeo hoc nomine nobis noxia foret. Quid igitur indulsit natura humano generi præ reliquis animalibus? libenter accedo pleraque aquas, certè quatenus succi petrescentis participes sint, non usque adeo tutas esse.

Atque idem olim nobis exhibuit Hippocrates. * Qui magnis fluminibus bibunt, in quæ alia flumina decurrunt, & de stagno in quod multarum & cujusvis generis aquarum rivuli decurrunt: quippe adventitiis (per fistulas plumbeas putà) aquis aluntur, quæ ex longo intervallo deducuntur, & calculo maximè tentantur, & renum morbis ac urinæ stillicidio &c. scilicet quia ex iis mixtis aquis aliæ falsæ sunt, i. e. medicatæ.

Idem quoque nobis abundè manifestatur, ex aquis plerisque nostris coctis, tam fluviatilibus, quam marinis: videlicet in fundo lebetis lapidem quendam calcarium, lapidis alicujus fissilis more, adhærere.

Providentia tamen Divina admi-
* *Ibidem.*

randa est, vel ob hoc commune beneficium omnibus animalibus concessum: atque homo solus culpandus est, si eò non rectè usus fuerit ex intemperantiâ: siquidem noluit natura uspiam deesse materiam animalium testis offibusque generandis, nutriendis, firmandis.

Igitur, suadeo, memor sis admonitionis illius Hippocraticæ, supra positæ; nempe de aquis non sollicitus sit sanus; at qui calculo puta laboret, aquis petrescentibus abstineat; certè de iis admodum parcè, cautèque bibat ne justas intemperantiæ poenas luat. atque hæc hæctenus; antequam verò manum de hac Tabula auferam, illud quoque Hippocraticum de aquarum vitiis verbo considerandum non alienum erit; nimirum, Pravæ sunt aquæ omnes, quæ ex *nive & glacie* fiunt: ubi enim semel concreverint, non amplius ad pristinam naturam redeunt. Hinc, inquit, Urinæ stillicidium & Herniæ; an quòd ex frigore intenso eadem particularum petrescentium concretio metuenda sit, ac ex coctione? sanè constat experientiâ, & ex observatione, olim edita, D. Johannis Raii inter principes hujus seculi philosophos, mihi que veteri amicitia conjunctissimi, ab hyeme durissima, & à longa aquarum congelatione æstatem maximè morbosam sequutam esse.

Verum cum nivatæ aquæ ad se nunquam redeant: tamen cur eadem aquæ Fluminis alicujus, Thamesis nostri putà, toties putrescant, & suaves denuò ac potabiles fiant, inquirere lubet: certè ad Indiam Orientalem navigantes experiuntur, istam aquam ferè intra Tropicos & sub linea Æquinoctiali su-
P p p 2 pra


pra modum foetere turbidamque fieri: mox limpidam reddi & bene olere, item eandem aquam iterum foetere & turbari in reditu ad nos; denuò purgari à foecibus & à malo odore, imò interdum sub hac mutatione illam ardescere ad candelam admotam, instar spiritus vini, dolio aperto exhalanteque.

Hujus equidem rei rationem sic intelligo, scilicet omnem aquam fluviatilem plus minus Insectis refertam esse; quod microscopio adhibito extra dubium ponitur, hæc autem animalcula, quòd nostratia sint, sub ardoribus pereunt, unde aquæ tantus foetor: ubi verò ista putredo è bestiolis corruptis in fundum dolii subsederit, coiveritque aqua fit limpida odore ma-

lo vacua. Rursus in Indiâ eadem aqua novis Insectis Indicis repletur, quæ tamen in reditu similiter moriuntur, unde novus foetor ac aquæ turbatio; iisdem quoque rationibus aqua ad claritatem suam suavitatemque redit.

Ad ardorem verò & inflammationem aquæ istiusmodi quod attinet, ab insectorum quoque putrefactione, id commodè oriri possit, perinde ut flatus intestinorum per anum emissos, & ab alimentorum coctione putredinosa ortos, flamma admotâ ardere, notissimum est: atque ita exposui, quàm brevissimè potui, medicamentorum ad calculos maximè accommodatorum cognatas virtutes, earumque rationes & usus ex Veterum ferè diligentia fideque.





THOMÆ SYDENHAM, M. D.

I N T E G R I

P R O C E S S U S

In MORBIS ferè omnibus CURANDIS.

Quibus accessit

GRAPHICA SYMPTOMATUM DELINEATIO,

Undè cum quamplurimis observatu dignis.

EDITIO novissima plurib. ARTICULIS aucta.

Nec non

D E P H T H I S I

Tractatulus nunquam antehac editus.

A M I C E L E C T O R ,

Specimen habes Praxeos eximiae, in dilectissimi filii M.D. usum, cautè & diligenter excogitatum, sua ipsius manu conscriptum, mihi autem pro familiaritate ista qua omnes exceperit, concessum à Cl. Sydenham, Viro sanè cui vix ætas superior parem dederat, vel postera datura est, non modo in arte sua mirà sagacitate, & ingenii acumine singulari, conspicuo: sed & probis moribus, & in humanum genus, studio & amore insignibus adeò, ut apud omnes summum sui reliquerit desiderium: Cujus præcepta licèt animo meo & imo pectore infixæ sint, ne tamen fortè fortuna in mei ipsius & ægrorum detrimentum excidant memoria parum fida, typis haud ita pridem mandabam, exemplaribus circiter viginti impressis, ut amicis quoque inservirem. Nescio autem quo pacto in lucem irrepserit publicam inter Miscellanea Curiosa superioris anni Norimberg. editum, sed inepta mole inutile. Prodiit tandem eo modo vestitum ut tibi sit in quovis loco paratum; figmentis cerebri vanis & futilibus sciolorum dogmatis nequaquam refferum, nec hypothese placida solidis ut videtur rationum momentis undequaque constipata superbiens; humile autem & modestum accuratè morbos depingit, & accurate

tius adhuc medetur; in id solum sollicitum innotescat quod natura faciat aut ferat. Et si verum loqui liceat, modo partium situs noveris, pateant tibi per Symptomata ægritudines, (quod assidua ediscas observatione) scias deinde veram & genuinam medendi methodū per diætā & Pharmaciā adhibere, fælicissimus eris practicus, & tibi & infirmis optimè consules. Parum interim tua refert utrum Alkali peccet an Acidum, num in Spiritibus Animalibus, an in ipso sanguine aut in recondito aliquo Viscere deliteſcat morbi minera, unde de periodico Intermit-tentium reditu doctè satis & prolixè possis differere, dum interea ipsa Febris sine ullis ambagibus, inquietudine, siti, calore, pulsu celeri, nausea, cæterisque Symptomatis, etiam astantibus palam est, & aperte dignoscitur: Hinc sæpius mirari subit, quamobrem anxie ita & scrupulosè immediatas & proximas morborum causas, dum Medicinam pertractandam suscipiunt, indagare satagunt, & è tenebris istis, quibus natura obduxit, irritò licèt conatu, eruere, gravi & subactò iudicio viri, & in praxi versatissimi; satis interim gnari se latere vel quævis obvia; unde enim dimanat graminis viridis, aut albus nivis color. Quid est quod humana anima ratiocinari nequeat dum adhuc Infantes aut Pueri sumus? Unde forma tua Specifica? Satiùs esse Medicum quàm Philosophum agere (quis enim unquam Cartesium sibi Medicum voluerit) minutissima Phænomena planè & ritè enumerare, & remedia quibus unusquisque morbus faciliùs cedat, candido & sincero animo proponere: ita tandem limites suos prætergressa, quibus angustis nimis jam includitur nobilissima, omnibus, quaquaversum patet orbis, fæliciter satis & prosperè salutem, filiis autem suis honores summos conciliabit.

Meditabatur paulo ante obitum tractatum de Phthisi peritissimus medicus in perquirendo naturæ methodum, qua morbos amoliri studet, ut adjutrices porri-geret manus, & miseris hominum subveniret, diu noctuque pensitabundo, & anxio animo, exercitatissimus; hinc fidissimarum observationum serie & irrefragabili edoctus experientia, medicinæ praxim ornavit, & ad saniores reduxit regulas; sed vix tabidis, dum hujusmodi nunquam intermissis studiis detenti & defatigati spiritus, solitis non vacabant excubiis, truculentissimus hostis, Podagra, quæ per multos annos obsederat, & debilitaverat artus, impetu factò in interiora viscera irruit, per vomitum & secessum enormiores intentans mortem, uni-co autem morbo nescit cedere Medicorum Princeps, sed cum malorum cumulo accessit & Renum Calculus, qui corrasis vasorum osculis, sanguinem liberaliùs, quàm senectus tulit, urinæ permixtum effudit, se jam non amplius opponens, nec vitæ, nec mortis cupidus, placidam, & pacatam expiravit animam. Ne tamen auxilio prorsus destituantur tabidi, fragmenta quædam quæ autorem ubivis sapiunt, in primo saltem morbi stadio plerumque proficua, (neque enim fas est, quod ægrotanti proximo opituletur, celaret) in publicum prodeunt, ut exinde pateat quam accurata, & omnibus numeris absoluta, si modo Deus Opt. Maximus concessisset vitam, expectari potuisset Phthisiologia.

Quid in Febribus, Variolis, Morbillis, acutis cæteris, ut & Chronicis sanandis valuit optimè meritis Autor noster, sequentes indicant paginae. Regimen & Diætā instituuntur aptissima; præscribuntur remedia pauca, sed necessaria, nec

in Pharmacopolarum lucrum excogitata, nec inani ostentationi composita: sitibundis ægris (eodem modo quo & ipse sitim suam restinguere solitus erat) cerevisiam tenuem affatim & pro libitu hauriendam, unde mirè reficiuntur & refrigerantur, concedit; nec immanitate plus quàm barbara precibus eorum, surdus, Apozemata & Julapia, præ ingrato sapore fastidita, substituit; maximam adhibet cautelam ne exæstans nimis, vel igne luculentiori, vel stragulorum onere, plus adhuc incalesceret, vel à propinatis forsan remediis eum in finem ut per poros eliminetur materia morbifica cruda adhuc & inconcocta, quæ tamen hac data ansa concitato motu cerebrum petit, unde Phrenesis aut Coma, aut extravasato sanguine deturpant cutim maculæ purpureæ, aut eruptiones quas vocant miliares collum & pectus ubivis obsident. Numquid ad amissim magis depingi poterat quàm Variolarum historia? eruptionis diem in utraque specie designat, pustularum ingenium ad unguem describit, quo tempore incipiat, & quamdiu continuetur Salivatio, quo iterum faciei manuumque tumor se prodatur, quid tandem quolibet die expectandum disertè explicat. Paregoricorum usum, quo emolumento judicent Practici, primus persuasit, malum ingerendi Cardiaca, ante eruptionem, morem, unde sæpe accersitum fuerit confluentium genus, meritò primus improbavit. Melius autem hæc ex ipso fonte. Valeas itaque amice Lector, & sicubi scateant Menda ignoscas.

Amico suo Integerrimo M. D. Expertissimo Domino S. M.

Solum sequaces prætulimus diu
Cum Medentes; Compar habebitur
Qui clariorem te, minori

Reddidit hoc, Medicina! Libro
Non hic tumori Mole superbiens
Blattis futurus Præda opulentior:
Sensu sed arcta Ditiori

Conciliant sibi Verba Pondus.
Frustra molesto vasta Volumine
Lustres Galeni scripta; Minutula
Acumen huic majus Tabellæ;

Se stupet hic Medicina totam.
Hic non remoto sordidus Angulo
Sensim fatiscet, Sedula strenuè

Manus quotannis, Spe perenni
Deteret, auctior ut resurgat.
Applaudet Votis Turba Medentium:

Non Febris illum, Morbus atrocior
Haud afflet ullus, Commodis qui
Immoritur satagendo Vestris.

Sic Vovet,
Christophorus Crelle, M. D.
MEDI-

M E D I C A M E N T O R U M

Quædam formulæ in praxi magis familiares.

Potio Communis Purgativa.

℞. **T** Amarind. ʒß. fol. Sennæ ʒij. Rhei ʒiß. coq. in s. q. aq. ad ʒiij. in Colatura dissolve Mannæ & Syrup. Rosar. solut. an. ʒj. m. f. Potio.

Emeticum Commune.

℥. Aq. Cardui Benedict. ʒij. Infus. Croc. Metal. ʒj. Syr. Caryophyll. ʒß. m. f. Vomitorium. Sumat hora 4. pomeridianâ, superbibendo post singulas vomitiones haustum largum liquoris possetici.

Julapium Perlatum.

℥. Aq. Cerasor. nigr. lact. Alexiter. an. ʒiij. aq. Cinnamom. ʒj. Margarit. præparat. ʒiß. sacchar. Crystall. q. s. adde aq. Rosar. Damascen. ʒß. f. Julap. de quo cap. cochlear. iv. vel v. in Languoribus.

Julapium Cardiacum.

℞. Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nigr. an. ʒiij. aq. Epidem. Syr. Caryophil. & de succo Citri, an. unc. ʒ. m. f. Julap. de quo capiat sæpius.

Decoctum Diæteticum.

℞. Rad. Sarsaparill. unc. vj. ligni Sassafr. & Chinæ ana unc. ij. Glycyrrhiz. unc. j. coq. in aq. font. Congiis ij. per horæ dimidium, deinde stent clausè super cineres calidos per horas xij. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem; Cum primùm ab igne amoveatur, infunde sem. Anisi unc. ʒ. post duas horas coletur, & postea depuretur per residentiam, & liquor reponatur in lagenis vitreis probè clausis ad usum. Sit pro potu ordinario per xxx. dies.

Apozema Aperiens & Antiscorbuticum.

℥. Rad. gramin. Cichor. Fœnicul. & asparag. ana unc. j. uvarum Corinthiac. & passul. enucleat. an. unc. ij. fol. hepat. ling. cerv. & cap. Ven. an. M. j. Fol. Beccabung. sub finem addit. M. ij. coq. s. q. aq. fontan. ad ℥ij. sub finem adde vini Rhenani ℥ß. Colaturâ adhuc calente, infunde ad duas horas, vase clauso, Cochl. hortens. M. j. colatur. adde syr. è quinque radic. & è succo Aurant. ana unc. ij. aq. Cinnamom. hordeat. unc. j. M. f. Apozema. Sumat. ℥ß. manè & 5. pomeridianâ per xjv. dies.

Eclegma Incrassans in Tussi.

℥. Ol. Amygd. dulc. unc. j. Syr. Papav. Rhæad. Portulac. Jujub. & Looch sani, ana ʒß. Sacchar. crystall. q. s. M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatium, & f. Linctus perfectè mistus; recondatur in olla figulina, ad usum. Cap. sæpius lambend. è baculo Liquiritiæ.

Eclegma

Eclegma fortiùs incrassans.

℞. Conserv. Ros. rub. Syr. violar. & de Mecon. an. unc. j. sem. papav. alb. 3iij. contundantur simul & per setaceum trajiciantur, deinde adde ol. nuc. moschat. express. gr. vj. f. Eclegma.

In Defluxione tenui.

℞. Conserv. ros. rub. unc. ij. Syr. de Mecon. & jujub. an. unc. j. Oliban. Mastich. & Succin. an. 3j. ol. nuc. Moschat. per expressionem gr. vj. M. f. Lohoch. de quo lambat sæpe; bis in die cap. eclegm. descript. cochl. j. instilland. Balsam. Sulphur. Anisat. à gut. viij. ad gutt. xij.

Cerevisia Purgativa.

℞. Polypod. Querc. ʒj. Rad. Rhabarb. Monac. fol. sennæ & passul. enucleat. ana ʒss. Rhabarb. incis. & rad. Raphan. Rustican. an. unc. iij. fol. Cochl. hortens. salv. an. M. iv. Aurantior. incis. Num. iv. infunde in Congiis v. vel vj. Cerevisiæ non lupulatae, fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies xiv. vel xxj. præcipuè verò sumat haustum singulis Auroris.

Emplastrum Hystericum.

℞. Galbani in tinctura Castor. solut. & colat. 3iij. Tacamahac. 3ij. f. Emplast. pro umbilico.

Catharticum pro Infantibus tenellis.

℞. Syrup. Cichor. cum Rhabar. Cochl. j. parvulum.

Decoctum Amarum Purgativum.

℞. Decoct. amar. duplicatâ sennâ un. iv. Syrup. de Spina Cervina unc. j. Elect. de Succ. Rosar. 3ij. M. f. Potio.

Laudanum Liquidum Authoris.

℞. Vini Hispanici lib. ij. Opii unc. ij. Croci un. j. pulv. Cinnamomi, & Caryophyllorum, an. 3j. infundantur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat. Colatura servetur pro usu.



P R O C E S S U S I N T E G R I I N M O R B I S

fere omnibus curandis.

De Affectione , in foeminis Hystericâ , in maribus Hypochondriacâ , dictâ.

CUm à casu aliquo graviore molestum patitur humana anima, ataxiam concipiunt animales spiritus; urina subinde limpidissima copiosè excernitur; sanitatis recuperandæ spes omnis protinus abjicitur, tristissima quævis sibi ominantur ægrotæ; quâmcunque corporis partem morbus infederit (plurimas autem insidet) symptomata ei parti competentia confestim urgent; in capite apoplexia, hemiplegia soluta, statim à partu adoritur; spasmi epilepsiæ persimiles (vulgò uteri strangulatus, in quo venter & præcordia guttur versus intumescunt) infestant; clavus hystericus, in quo dolor in capite atrocissimus, quem transverso pollice possis contegere; ægra interim materiam viridem bili porraceæ parem evomente, miserè excruciat; cordis palpitationem, tussim, passionem iliacam & colicam, nephritin, urinæ suppressionem æmulatur paroxysmus; vomitiones enormes, diarrhoeam subinde excitat; externè in carne musculosa nunc dolorem, nunc tumorem inducit in tibiis hydropis instar; nec (quod mireris) intactos dimittit dentes; dolor dorsi creberrimè sævit; & sæpe sæpius adeò refrigerantur externæ partes ut cadaver planè referant; in risum & lachrymas effusissimas sine ulla *ὑποπόνο* ridiculè erumpunt; ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut Mercurio delibutas facillè crederes. Dolores hystericæ, quâmcunque partem obsident, ubi discesserint, teneritudinem, quæ tangi recusat, relinquunt, ac si verberatæ fuissent carnes.

Mittitur Sanguis ad unc. viij.

Emplast. de Galbano umbilico admoveatur. Sequenti mane aggrediatur usum sequentium pilularum.

℞. *Pil. Coch. maj.* ʒij. *Castor. pulv.* gr. ij. *Balsam. Peruv. gutt.* iij. f. *Pil.* xij. cap. iv. singulis vel alternis matutinis, pro ratione virium, hora 4. vel 5. matutina, superdormiendo.

℞. *Aq.*

℞. Aq. Rutæ ℥iv. Bryon. comp. ℥ij. Castor. nodulo ligat. & in vitro suspens. ℥℔. Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap. de quo capiat cochl. iv. vel v. in omni languore. Post has pilulas sumptas utatur sequentibus.

℞. Limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Extract. Absinth. f. Pil. N. iij. Sumat summo manè, & repetantur hora 5. pomeridiana per xxx. dies, superbibendo haustum Vini Absinthitis.

Sin forma boli magis arrideat.

℞. Conserv. Absinth. Roman. & Conserv. flaved. Aurant. an. unc. j. Angelic. condit. Nuc. Moschat. condit. & Theriac. Andromach. an. unc. ℔. pulv. Ari comp. ℥iij. Zingib. condit. ℥ij. cum s. q. Syrup. de succ. citr. vel, ejus defectu, Syr. Aurantior. f. Electuarium.

℞. Elect. præscript. ℥ij. limatur. Chalyb. gr. viij. cum s. q. Syrup. Aurantior. f. Bolus fumendus manè & sero, superbibendo haustum vini absinthitis, vel Cochl. vj. seq. Infusionis.

℥. Rad. Angelic. Enul. campan. & Imperator. an. unc. j. fol. Absinth. vulg. Centaur. min. Marrub. alb. & Chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incis. affunde vini Hispanic. q. s. ad supereminentiam duorum digitorum. Coletur tempore usus. Vel

In Delicatulis Chalybs exhiberi poterit in forma pulv. sequentis.

℞. Limatur. Chalyb. probè trit. unc. j. pulv. Ari comp. ℥vj. sem. Coriand. præparat. Anisi, Fœnicul. dulc. an. unc. ℔. Cinnamom. acutiss. Corall. rubr. præparat. ana ℥iij. Nuc. Moschat. ℥ij. f. omnium pulvis subtilissimus, cui adde sacchar. albiss. ad pondus omnium, hujus cap. è Cochleari ℥℔. bis in die per 4. dies, tum ℥j. bis in die per 40. dies superbibend.

℞. Aq. Lact. Alexiter. unc. xij. Gentian. comp. unc. iv. Absinth. magis. comp. unc. ij. sacchar. albiss. q. s. f. Julap. Vel

℞. Vini Rhenan. Absinth. ℥℔. aq. Gentian. comp. unc. ij. Syr. Caryophyll. unc. j. f. Julap.

℞. Myrrh. elect. Galban. & Assæfætide, an. ℥j. Castor. ℥℔. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. è singulis drachmis xij. Sumat iij. singulis noctibus, superbibend. aq. Bryon. compos. Cochl. iij. vel iv. per totum decursum hujus processus.

Si Pilulæ præscriptæ ventrem moverint, utatur sequentibus.

℞. Castor. ℥j. sal. succin. volatil. ℥℔. cum s. q. extract. Rutæ. f. pilulæ N. xxiv. cap. iij. singulis noctibus, superbibendo Julapii hysteric. Cochl. iij. vel iv.

Sp. CC. ad gutt. xvj. vel xvij. in aqua aliqua appropriata sæpius exhibitus, valde confert.

Si verò his non cedat remediis, tum capiat sequentes pilulas;

℞. Trochisc. de Myrrh. pulv. ℥j. Balsam. sulphur. Terebinth. gut. iv. cum s. gumm. Ammoniac. solut. f. Pil. N. iv. cap. manè & serò superbib. Julap. hysteric. Cochl. iv. vel v. instillando Sp. C. C. gut. xij.

Electuarium Antiscorbutic. cum aqua ibidem descripta pròdest in his affectionibus, ut & Electuar. corroborans cum additione Conserv. Cochl. hortens. unc. j. pulv. Ari Compos. ℥vj. superbibendo præscriptam aquam.

At si affectus his non cedat remediis, eundum est ad *aquas ferreas*: & si neque his, tum ad *Sulphureas*, quales sunt *Bathonienses*.

Inter bibendum aquas ferreas hæc observanda; si aliquod Symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis æger abstineat, donec Symptoma istud penitus evanuerit. Æger in earum usu per sex septimanas ad minimum, vel potius ad duos menses perseveret. *Zingiber conditum*, vel *Semina Carvi Saccharata*, ad calefaciendum ventriculum subinde sumat. *Pilulæ etiam hystericæ iij.* devorari possunt per primas x. noctes, superbibendo *julap. hysteric. Cochl. iv. vel v.*

Quoad usum *aquarum Bathoniensium*, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum Balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per sex septimanas vel duos menses.

Si *Chalybs* justo plus corpus calefaciat, tum per ejus usum, quarta quaque Aurora sumat *aq. mineralium purgantium ℥iv.* Quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient, ut solent Cathartica ex officinis deprompta.

Si *Chalybs* magnas perturbationes inducat, Laudanum aq. aliqua hystericâ mistum, singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum.

Cum à morbi diuturnitate fractæ & attritæ fuerint vires, venæsectio, & Cathartica non sunt præmittenda, sed à Chalybe statim incipiendum.

Ubi Symptomata sunt mitiora satis est sanguinem mittere, & alvum solvere ad dies *ij. vel iv.* dein pilulas hystericas ad dies x. manè & serò exhibere.

In dolore intolerabili, vomitione, & *Diarrhæa* enormioribus, exhibendum Laudanum, & postea corroborandi spiritus, at modò per vires liceat, ante usum Laudani, educatur è venis sanguis, & Catharticum propinetur: in viraginibus præsertim, & sanguineo temperamento præditis; in debilioribus autem, & haud ita pridem paroxysmum passis sufficit ventriculû Congio uno lactis cerevisiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere, dein largam dosin *Theriac. Androm. vel Elect. Orvietan.* imperare, & *Cochl.* aliquot liquoris alicujus Spirituosi, cum pauculis Laudani liquid. guttulis, superbibenda dare. Quod si ægra jam pridem vomuerit, & ulterius emeticis sollicitare periculo non vacabit, Laudanum sine mora propinandum est, ea dosi, quæ Symptoma vincat, & post singulas vomitiones toties quoties repetendum, in forma potissimum solida, vel in liquida, in parco vehiculo, viz. gutt. aliquot in *Cochl. j. aq. Cinnamom. fortior. ægra* interim conquiescente, & caput immotum tenente.

Perdomito Symptomate, manè & serò, ad dies pauculos continuetur usus Laudani.

Hæc duo diligenter notanda, quòd cum semel post évacuationem Laudano uti coeperimus, ea dosi, atque illa toties repetita, sumendum est, donec Symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noscamus quàm alteram ingeramus, deinceps cum Laudano morbum aggredimur, nihil movendum est, nihil evacuandum, vel per mitissimum enema

Theriac.

Theriaca Andromachi crebro, diuque usurpata, magnum est in hoc, & aliis morbis quamplurimis à caloris, & concoctionis defectu ortis, remedium.

Vina *Hispanica* gentiana, angelica, absinth. centaurio, corticum aurantior. flavedine, aliisque corroborantibus infusis medicata, si ad aliquot Cochlearia ter in die potentur admodum conferunt, modò ægra tenui non fuerit biliofoque corporis habitu.

Cortex Peruv. ad ℥j. manè, & serò, per septimanas aliquot deglutitus, præsertim in spasmodicis hystericis miras habet vires.

In tenui biliofoque corporis habitu potest usurpari Diæta lactea, præcipuè in Colica HystERICA, si modo ea incommoda possint superari, quæ primis ferè diebus apportat, quòd nempè tum in ventriculo coagulatur, tum etiam viribus corporis, in statu conservandis, sustentandisque minus sufficiat.

Nihil tamen æquè sanguinem spiritusque fovet, & confirmat, ac diu multaque, singulis ferè diebus equo vehi, nec itinera in curru facta suo carent successu.

De Febre Depuratoria annorum 1661. 62. 63. 64.

Si æger juvenis sit, extrahatur sanguis è brachio & eodem die post aliquot horas, vel sequenti die, duabus horis post leve prandium, *Emeticum ex infus. Croc. Metal. paratis Zythogal. ℥vj. vel viij.* ut quoties vomuerit, aut alvum exoneraverit, è vestigio sumatur haustus; exhibeatur & post finitam operationem Emetici, hoc vel simile paregoricum.

℥. *Aq. Cerasor. nigr. ℥jß. aq. Epidem. 3ß. Laudan. liquid. gutt. xvj. Syr. Caryophyl. ℥ij. M. F. Haustus.*

Vomitoria ex infus. *Croc. Metal. parata*, puerulis, ullisve infra adolescentiam constitutis, vel minima quantitate, non est tutum exhibere.

Post hunc diem usque ad undecimum, vel duodecimum, singulis Auroris, injiciatur enema sequens.

℥. *Decoct. commun. pro Clystere ℥j. (vel lactis vaccini eandem quantitatem) Sacchari Culinar. & Syrup. violac. an. ℥ij. f. Enema.*

Post dictum diem alvus constipari permittatur, quo materia febrilis citius concoquatur, ad quem etiam finem Cardiacæ moderata his ultimis diebus exhibita apprimè conducunt.

℞. *Pulv. è Chel. Cancror. comp. gr. xiv. Elect. de Ovo 3ß. cum s. q. Syr. Caryophyl. f. Bolus sumendus octava quaque hora, superbibendo sequentis Julapii Cochl. v. vel vj.*

℞. *Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nigr. an. ℥ijj. Aq. Epidem. & Syr. Caryophyll. an. ℥j. M. F. Julap. vel alia his similia.*

Hæc methodò sollicitè observatâ, usitatò circa xv. diem (tum ex laudabili in urina separatione, tum ex manifesta Symptomatum omnium remissione) tempestivum esse Portionem Purgantem communem exhibere percipies.

Accidit interdum, maxime in Senibus, curata Febre, & purgato corpore, ægrum nihilominus valdè debilem esse, & quandoque tussi, interdum etiam screatu, magnam glutinosi viscosique phlegmatis copiam expectorare. Hoc in casu vinum Malaganum annosum, cum pane tosto ei immixto, bibat æger.

Si superveniat iliaca passio, præscribatur Sal. Absinth. ʒj. ex Coch. j. Suc. Limonum, manè & serò; intermediis temporibus cap. Aqu. menth. stillatit. sine Saccharo, Coch. aliquot, bis quaque hora; dum hæc fiunt, catulus vivens nudo ventri indefinenter accumbat, postquam dolor cum vomitu per biduum triduumve cessaverit, exhibeatur *Pil. Coch. maj.* ʒj. in *Aq. Menth.* soluta, nec removendus catulus ante pilularum usum.

Ad recidivam præcavendam, persistat in usu prædictæ aquæ per longum tempus, & duplicatis pannis laneis ventrem à frigore defendat.

De Febre Pestilentiali 1665. 66.

Post venæsectionem in lecto celebrandam, æger stragulis obruatur, & Lacinia Lanea sincipiti alligetur; tum, si vomitus non adsit, hoc vel simile Hydroticum exhibe.

℞. *Theriac. Andromach.* ʒβ. *Elect. de ov.* ʒβ. *Pulv. è chel. cancr. comp.* gr. xij. *Coccinel.* gr. viij. *Croc.* gr. iv. cum s. q. succ. kermes, f. *Bolus*, quem sumat sexta quaque hora, superbibendo Coch. vj. seq. *Julapii.*

℞. *Aq. Card. Benedict.* & *Scord. compos.* an. ʒiv. *Aq. Theriacal. stillat.* ʒii. *Syr. caryophyl.* ʒi. *M. F. Julapium.*

Si adsit Vomitus, hydroticum differatur, donec solo tegumentorum pondere sudor promanare incipiat, linteaminis parte vultui superinducta.

Incepta Diaphoresis haustulis *Zythogalæ* salvia alteratæ, vel *Cerevisiæ* cui macis aliquantulum incoxeris, subinde repetitis ad naturalis diei spatium (i. e. horas 24.) est continuanda; in sudore licet jusculis confortativis ægrum reficere.

Ubi tumor enatus fuerit, venam aperire non sustinui; per horas adhuc à finito sudore xxiv. ægro se in lecto continente frigus cautè devitetur. Indusium sponte sua in corpore arefcere permittatur, potulenta omnia calidiusculè hauriantur, & *Zythogalæ* salvia alteratæ usus etiamnum continuetur, in seq. luce potio purgat. communis exhibeatur.

Anni 1667. 1668. Febrim Variolosam & Variolas produxerunt.

Anni 1669. 70. 71. 72. Febrim Dysentericam.

Anni 1673. 74. 75. Febrim Comatosam.

Curationem febrium horum annorum non attingo; quoniam methodo in febre anni 1685. &c. descripta curari eas potuisse autumo.

De Febribus Intermittentibus.

Cum rigore & horrore adoritur paroxysmus; quibus mox succedit calor, & huic tandem sudor, & subsequens ἀπυρεξία: licet in primis morbi diebus, Autumno maximè, aliquoties remissio potius quàm intermissio persentiscatur, in calore æquè ac in rigore vomiturit ut plurimum ac vehementer ægrotat miser cum siti & lingua arida. In tenera ætate abdominis inflatio, in adultis crurum tumor febris solutionem; tonsillarum dolor, rauco, oculi cavi, facies Hippocratica, mortem denunciant.

℞. *Cort. Peruv. subtiliss. pulv. unc. j.* cum s. q. *Syr. Caryoph.* vel de *Rosis siccis*, f. *Electuarium dividendum in xij. doses*; quarum unam capiat quarta quaque hora,

hora, superbibendo Vini cujuslibet haustum, incipiendo immediatè post paroxysmum.

Si autem præscripti boli ventrem moverint, in haustu Vini dentur *gutt. Laudan. liquid.* singulis vel alternis vicibus post assumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipuè in quartana) repetatur processus prædictus singulis septimanis per tres alias vices.

Sin forma Pilularum magis arrideat.

℞. *Cort. Peruv. pulv. unc. j. cum s. q. Syrup. caryophyll. f. Pilulæ mediocris magnitudinis*, quarum capiat *vj.* quarta quaque hora.

℞. *Cort. Peruv. pulv. unc. ij. Vin. Rhenan. ℥ij. stent simul in Infusione frigida*, & coletur per manicam Hippocratis. Usus tempore cap. *unc. iij.* tertia vel quarta quaque hora.

Sin ob vomituritionem, ferè continuam, Corticem deglutire nequeat æger, tum sexies, vel octies, Spatio duarum horarum, *Succi Limonum* recens expressi *Cochl. j.* cum *Salis absinth. ℥j.* assumat, dein *Laudan. Liquid. gutt. xvj.* cum *Aq. cinnam.* fortior. *Cochl. j.* ac brevi post, cessante vomitu, Corticis usum aggrediatur.

In intermittentibus vernalibus, nonnunquam emeticum, tempestivè propinatum, ut nempe ante paroxysmum negotio suo defungi possit, foelicissime successit. Nonnunquam Enema in diebus intermittentibus, per triduum, vel quatrimum injectum, Curationem absolvit. Quæ sequenti quoque modo tentari potest.

℥. *Serpentar. Virgin. subtiliss. pulverisat. gr. xv. Vin. alb. unc. iij.* Sumat duabus horis ante Paroxysmum, & stragulis coopertus æger sudet per *ij.* vel *iv.* horas, idem faciendo per duas alias vices ante Paroxysmum.

Si ab ingeminatis paroxysmis summè debilis fuerit æger.

℞. *Conserv. Flor. Borag. Bugloss. an. unc. j. conser. Anthos. unc. ℔. cort. citr. condit. Nuc. Moschat. condit. Theriac. Andromach. an. ℥ij. confectio. Alchermes ℥ij. M. F. Opiata*, cap. ad quantitatem avellanæ, manè & vesperi, superbibendo Cochlearia paucula, alicujus *Aq. Epidemicæ* simplicioris, Saccharo edulcoratæ, interdicto interim enematum usu.

Si sub morbi exitum occurrat hydrops, nondum tamen depulsa Febre, curatio non est instituenda remediis purgantibus, sed infusionibus rad. *Raphan. Rustican. Summitat. Absinth. centaur. Min. Baccar. Juniper. cinerum genist. &c.* in vino factis, exulante autem Febre, Catharticis, & aperientibus.

Pro Infantibus Febre intermittente laborantibus.

℥. *Aq. cerasor. nigr. & Vini Rhenan. an. unc. ij. cort. Peruv. subtiliss. pulv. ℥ij. Syr. caryophyll. unc. j. M. f. Julap. cap. Cochl. j.* alterumve, pro ratione ætatis quarta quaque hora, donec Paroxysmi non amplius discrucient, instillando alternis vicibus, si Diarrhœa adfuerit, *Laud. liquid. gutt. j.* vel *ij.*

De Febre Stationaria, ab an. 1682. ad 90.

℞. Calor & frigus se invicem excipiunt, artus pariter & Caput dolent, pulsus interim

interim ferè sanus, non nunquam tussis, dolor circa collum & fauces, exacerbatio Febris prope noctem, inquietudo, fitis, lingua vel humida & ex omni parte pellicula alba & scabra vestita, vel sicca, fusci coloris in medio, quam partem undique cingit fimbria inalbescens. A jugi in lecto decubitu coma & phrenesis, à calido regimine petechiæ, maculæ purpureæ, eruptiones (quas vocant) miliares morbillis magis rubentes, pulsus inordinatus, tendinum subsultus, atque ita tandem mors. Sudores in initio symptomatici divexant, qui si ab arte provocentur, viscosi à Capite erumpunt, & materiam morbificam in Caput aut in artus transferunt.

Mittat. Sanguis ad unc. x. è brachio. Reiteretur Venæsectio; si modo respirationis difficultas, dolor Capitis inter tussendum lancinans, & alia signa Peripneumoniæ nothæ adsint. In hoc casu tam venæsectio, quam Catharsis repetenda, donec æger convalescat.

Vesperis applicetur Epispasticum & sequenti Aurora Potio Lenitiva præscribatur, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetatur, & hora somni post Catharsin haustus pacificus propinetur.

℞. Aq. Paralyf. ℥iij. Syr. de Mecon. ʒj. Succ. Limon. recent. extract. cochl. ij. M. F. Haustus.

Aphthæ & singultus post curationem febris supervenientes sponte sua evanescent; Si in longum tempus decurrant, facile fugatur Cortic. Peruv. ʒj. cum Syr. Papav. Rhæad. q. s. in formam Electuar. vel pilular. redacta, superbibend. haustum lactis deflorati. Remedium hoc certissimè scopum attinget, si non frustrantur ejus vires ex jugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis sequentia præscribentur.

℞. Conserv. Eujul. & cynosbat. an. unc. j. conserv. Berber. unc. ʒ. crem. Tart. ʒj. cum s. q. Syr. de Limonib. f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. Nuc. Moschat. ter in die, superbibendo sequent. Julap. Cochl. vj.

℞. Aq. Portulac. Lactuc. Paral. an. ℥iij. Syr. de Limonib. ʒiʒ. Syr. Violar. ʒj. M. f. Julapium. Vel

℞. Aq. font. ℥j. aq. Rosar. Succ. Limonum, Sacch. albiss. an. unc. iv. coq. lento igne dum despumaverint, cap. unc. iij. ad libitum. præscribatur quoque seq. gargarisma.

℞. Succ. Pomor. agrest. ℥ʒ. Syr. de rubo Idæo unc. j. m. f. gargarisma.

Si febris ita ventriculum infestet, ut æger potionem retinere nequeat, Pil. Coch. maj. ad ʒij. exhibeantur, tum etiam hypnoticum est concedendum, v. gr. Laudan. Londin. gr. iʒ. cum simili quantitate Mastic. vel Laudan. Liquid. gut. xvij. in aq. Cinnamo. hordeat. unc. j.

Decoctum album paratum, ex ʒj. C. C. usti, in aq. communis ℥iij. cocti & postea Saccharo albissimo edulcoratum. Sit pro potu ut & Cerevisia tenuis pro libitu.

Post Catharsin bis celebratam, concedatur ægro. Pullorum carnibus vesci & post ultimam Purgationem, modò febris aliquantulum deflagraverit, vini Canarini Cochl. iij. vel iv. manè, & serò, ut & post prandium, per dies aliquot propinentur.

In

In Phrenitide, ut & Comate, nihil perinde confert, atque ægri caput radi, nullo admoto Emplastro, sed Pileolo tantum.

Si (quod foeminis hystericeis quandoque accidit) post venæsectionem, & purgationes hujusmodi iteratas, etiamnum duret, procurratque febris, modo signa Peripneumonix, & inflammationis circa partes vitales absint, singulis noctibus Paregoricum, & medicamenta hysterica, bis vel ter in die injungantur.

De Infantibus febre stationaria laborantibus.

Hirudines duæ utrinque ponè aures applicentur, dein *Emplastr. Epispasticum* cervici amoveatur.

Cerevisia, in qua *Rhabarbarum* fuerit infusum, purgetur.

Si post Catharsin febris intermittere videatur, tum *Julapium cum Cortice Peruviano* (in Capite de febre intermittenti pro infantibus descriptum) exhibeatur.

De febre Scarlatina.

Æstate exeunte, infantes præcipuè infestat. Rigent & horrent sub initium; nec tamen admodum ægrotant; cutis universa maculis parvis rubris, crebrioribus, latioribus, & magis rubentibus quàm in morbillis interstinguitur: Ad duos tresve dies persistunt, quo quidem tempore evanescunt, & decedente subjecta cuticula squamulis furfuraceis, ad instar farinæ, cutis conspergitur.

℞. C.C. usti & pulv. è *Chel. cancr. comp. an. 3℔. Coccinell. gr. ij. Sacchar. Crystal. 3j. M.f. pulvis subtiliss. in xij. Chartulas dividend. quarum unam cap. 6.* quaque hora, superbibendo *Cochl. ij. vel iij. sequentis Julapii.*

℞. *Aq. Cerasor. nigr. aq. Lactis Alexiter. an. 3iij. Syr. e succ. citri 3j. M.f. Julap.*

Applicetur etiam *Epispasticum* cervici, & qualibet nocte *paregoricum ex Syr. de Mecon.* propinetur, & postquam symptomata cessaverint, purgetur æger.

De Pleuritide.

Inter Ver & Æstatem dominatur. A rigore & horrore orditur, quos statim comitantur calor, sitis, inquietudo & cætera febrium symptomata; elapsis pauculis horis, æger vehementi dolore punctorio in laterum alterutro circa costas corripitur; qui nunc versus omoplatas, nunc spinam, nunc anteriora pectoris sese propagat, tussi crebra excruciat: Materia sputo rejecta in initio morbi pauca est & tenuis, & sæpe sanguinis particulis intermixta, progressu verò copiosior & magis concocta, sanguine etiam permixto. Febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore, & pro ratione liberiori expectorationis sensim imminuitur; nunc alvus est assrida, nunc soluta nimis. Eductus è vena sanguis sevi liquati speciem præ se fert ubi refrixerit.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad 3x.

℞. *Aq. Papav. Rhæad. unc. iv. Sal. prunel. 3j. Syr. Violar. unc. j. M. f. Haustus* sumendus statim à prima venæ sectione.

℞. *Amygd. dulc. excorticat. N.v. sem Melon. Pepon. an. unc. ℔. sem. papav. alb. 3iij. aq. hord. 4℔. aq. Rosar. 3ij. cum s. q. sacchar. cand. f. s. a. Emulsio, Cap. unc. iv. 4. quaque hora.*

℥. Decoct. Pectoral. ℥ij. Syr. Violar. & cap. Ven. an. unc. iß. M.f. Apoze-
ma. cap. ℥ß. ter in die.

℞. Ol. Amygd. dulc. unc. ij. Syr. Violar. & cap. Ven. an. unc. j. Sacchar.
Cand. q. s. M.f. Eclegma, de quo sæpe lambat.

Oleum Amygd. dulc. per se, vel Oleum sem. Lini recenter extract. exhiberi
potest.

℞. Ol. Amygd. dulc. Lilior. & unguent. Dialtheæ. an. unc. j. M.f. Linimentum,
quo inungatur latus affectum mane & serò superimponendo fol. Brassicæ.

Repetatur Venæ sectio ad tres alias vices, ad eandem quantitatem, quatuor
diebus continuis, ubi dolor & respirandi difficultas suadent.

De peripneumonia notha.

Ingruente hyeme & sæpe sub ejus exitum emergit, insultu primo nunc inca-
lescit, nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflam-
mantur genæ, oculique; tussit, & inter tussendum dolor capitis lancinans pre-
mit, potulenta vomitu rejicit, urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleu-
riticorum æmulus, anhelus crebrò & celeriter spiritum ducit, dolente tho-
race. Ab asthma sicco planè distinguitur, quòd in isto nusquam comparent
febris indicia, in hac manifestò se produnt, licet minora longè & magis obscura
quàm in peripneumonia vera.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. x. Die sequenti æger hanc po-
tionem sumat.

℥. Cassiæ extract. unc. j. Glycyrr. ʒij. ficus pingues N. iv. fol. senn. ʒiiss. Aga-
rit. trochiscat. ʒj. coq. s. q. aquæ ad unc. iv. in Colatur. dissolv. Mannæ unc. j.
Syr. Rosar. solu. unc. ß.

Si verò potionem assumere nequeat, Cap. Pil. Coch. maj. ʒij. horâ quartâ
matutinâ.

Sequenti die celebretur iterum Venæsectio, ad eandem quantitatem; ac po-
stero die repetatur Catharsis, quæ porrò repetenda est alternis diebus, vel post
majora intervalla, pro ratione virium; Atque insuper si Symptomata non ces-
saverint, extrahatur iterum sanguis, semel adhuc, bis, vel sæpius, diebus aliquot
interjectis, prout res postulaverit; sed ut plurimum venæsectio bis celebrata
sufficiet; Interim, dum hæc fiunt, præsertim in diebus à purgatione vacuis,
utatur decocto Pectorali, Eclegmate & oleo Amygd. dulcium, in Pleuritide de-
scriptis.

De Rheumatismo.

Rigorem & horrorem & cætera febrium symptomata patiuntur, elapso die
uno alterove (est & ubi citius) dolor adest atrox, nunc in hoc, nunc illo artu,
in carpis, humeris & genibus præsertim, vicissim hos relinquens & illos occu-
pans, rubore & tumore in parte, quam postremum affecit, adhuc residuis. Febris
sensim evanescit, manente dolore, quin & non nunquam immaniùs sæviente.
In lumbagine rheumatica immanis dolor est, circa lumborum regionem fixus,
nephritim mentiens, nisi quòd æger non vomituriat, qui procumbere nequit, sed
vel è lecto exilit, vel super eodem erectus sedet, corpore perpetuâ agitatione,
nunc versùs anteriora, nunc posteriora inclinato. Sanguis pleuriticorum similis.

Mittatur

Mittatur Sanguis è Brachio lateris affecti, ad unc. x.

℞. Aq. Nymph. Portulac. Lactuc. an. unc. iv. Syr. de Limonib. un. iſ. Syr. Violac. un. j. M. f. Julap. de quo bibat ad libitum.

Præscribend. Emulsio è 4. Sem. frigid. maj. Cataplasma è mica panis albiss. & lacte Croco tincto applicetur parti dolenti.

Die sequenti eadem sanguinis quantitas detrahatur; atque iterum, die uno vel altero interjecto, reiteretur, atque porro quater vel pluries, si opus fuerit, hoc observando, ut post secundam Venæ sectionem majora sint intervalla inter singulas sanguinis missiones.

Diebus à Phlebotomia vacuis, Enema è lacte saccharato subinde injiciatur, vel sequens.

℞. Decoct. commun. pro Clystere ℥j. Syr. Violar. & Sacchar. culinar. an. unc. ij. M. f. Enema.

Si Imbecillitas ægri repetitionem Phlebotomiæ non ferat, tum post secundam vel tertiam venæ sectionem, Curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus *portionem purgativam communem*, donec convaluerit, & iisdem noctibus Paregoric. ex Syr. de Mecon.

Sin his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualescunque ferre nequeat, aggrediatur usum *Elect. & aq. Antiscorbutic.* in scorbuto descript. quæ etiam locum habent in Rheumatismo Scorbutico.

In Juvenibus, atque iis qui temperatè vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus Diætâ simplici admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æquè foeliciter, ac repetitis Venæ sectionibus (quas minus ferre queant) profligari potest. Ex. grat.

Solo Lactis sero ad dies quatuor vescatur æger, postea præter serum pane similagineo semel in die loco prandii, donec penitus convalescat, nisi quòd postremis diebus iterum panem in coenam indulgere liceat, Symptomatis cessantibus, carnes pullorum elixorum, cæteraque eupepta concedantur, tertio autem quoque die solo lactis sero victitet, donec tandem pancrative valeat.

De febre erysipelatoſa.

Nulla non corporis pars, præsertim facies, tumet, dolet & summè rubet, pustulæ densæ, parvæ, in vesiculas subinde facessunt, quæ per frontem caputque serpunt, oculi tumore obruti, rigor & horror atque reliqua febris indicia adsunt. In alia hujus morbi specie, liquorum attenuantium potationi superveniente, febricula adest, pustulæ urticarum puncturas referentes, nonnunquam in vesiculas sublatae, mox recedentes, tuberculorum more, sub cute se condentes, maximè pruriunt, & scalpendo rursus apparent. Est & alia eruptionis species, pectus ut plurimum obsidens, macula nimirum lata, cuti vix supereminens, porriginosa, cum squamulis flavis, qua vigente, æger bene se habet; eadem evanescente, leviter ægrotat, urina turbida & flava, iisdem remediis, quibus pruritus ferinus, cedit, vino utatur æger & carnibus eupeptis.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥ix. vel x. Die sequenti sumat *portionem communem purgativam*.

℥. Rad. Althææ & Lilior. an. ℥j. fol. Malv. Sambuc. Verbasc. flor. Chamæ-
me. Melilot. summit. Hyperic. & centaur. minor. an. M. j. sem. Lini, fœnugræc.
an. ℥β. coq. s. q. aq. libr. iij. Coletur liquor & tempore usûs adde singulis libris
decocti, Sp. Vini unc. ij. Stuphæ è panno laneo huic decocto immersæ, ac ex-
pressæ, calidè admoveantur bis in die, & pars affecta post fotum sequenti mix-
turâ illinatur.

℥. Sp. Vini libr. β. Theriac. Androm. unc. ij. pulv. piperis longi, & Ca-
ryophill. an. ℥ij. f. mixtura. quâ Charta Emporetica madefacta parti affectæ
circumvolvatur.

Si primæ venæ sectioni non cedat morbus, tum repetatur; & nondum
cessante, ad duas alias vices celebretur, interposito semper die uno.

Diebus à Venæ sectione liberis Enema è lacte cum Syr. Violarum. Emulsio
Refrigerans & Julap. refrigerans, sunt præscribenda.

De pruritu ferino, & inveteratis cutis eruptionibus, quæ
Venæ sectioni & Catharsi non cedunt.

℥. Theriac. Andromach. 3β. Elect. de ovo ℥j. rad. Serpentar. Virgin. subti-
liss. pulver. gr. xv. Lapid. Bezoar. oriental. gr. v. cum s. q. Syr. è conditur:
citri. f. Bolus, horâ somni sumendus per dies xxj. superbibendo cochl. vj.
sequent. Julapii.

℥. Aq. Card. Benedict. unc. vj. aq. Epidem. & Theriacal. Stillat. an. unc.
ij. Syrup. Caryophil. unc. j. M. f. Julap.

Singulis matutinis cap. liquoris possetici libr. β. calidè, & sudet horæ unius
spatiô.

His finitis, si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti Linimento partes
affectæ inungantur.

℥. Unguent. ex Oxylapatho unc. ij. Unguent. Pomati unc. j. flor. Sulphur.
℥iij. ol. Rhodii ℥β. f. Linimentum.

Verumtamen Medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæ sectione
& Catharsi ritè præmissis.

De Angina.

Angina inter Ver & Æstatem ut plurimum aggreditur. Sequuntur febris
insultum, dolor & faucium inflammatio, unde à tumore uvulæ, tonsillarum &
laryngis, nec deglutire queat Æger, nec spiritum ducere.

Mittatur Sanguis è Brachio copiosè. Tangantur partes inflammatae melle
Rosaceo Sp. Vitrioli, vel Sp. Sulphuris ad summum acorem permixto, vel Sp. Vi-
trioli solo. Mox Gargarisma sequens usurpetur, non vulgari modo; sed ita ut
sine ulla agitatione in ore contineatur, donec incalescat; dein expuatur, & re-
petatur subindè.

℥. Aq. Plantag. Ros. Rubr. & Sperm. Ranar. an. unc. iv. album. ovor. in
aquam agitando redact. N. iij. Sacchar. Crystall. ℥iij. M. f. Gargarisma.

Emulsio Refrigerans in Pleuritide descripta indies sumatur.

Sequenti manè, nisi febris & dolor inter deglutiendum remiserint, Venæ se-
ctio repetatur, Catharsi in diem posterum rejectâ, alias Catharticum lenitivum
exhibeatur.

Manente

Manente adhuc affectu (quod oppidò rarum) repetatur adhuc Venæ sectio, & Catharsis, Epispasticum amplum ac forte applicetur cervici post primam Venæ sectionem. Omni manè, nisi diebus purgationi datis Enema refrigerans & Emolliens injiciatur, Diætâ tenui utatur æger, & lecto per horas aliquot quotidie absistat.

In his omnibus Febris, quas intercurrentes appello, ut etiam in illa, quæ stationaria est, cautè observandum, quòd æger à lecto abstineat magnam diæi partem, ut jusculis hordeaceis, avenaceis, ac id genus aliis victitet, & cerevisiam Lupulata & hydrogalam pro potu ordinario bibat.

De Morbillis.

Infantes plerumque impetunt. Primo die rigent horrentque, calent & frigent alternatim. Secundo consummatam febrim accersunt, ægritudo vehemens, sitis, inappetentia, lingua alba, (non verò sicca) tussicula, capitis & oculorum gravedo, & somnolentia perpetua, acriter premunt, humor è naribus & oculis fugiter stillat (quæ lachrymæ certissimum morbillorum signum.) Huc accedunt sternutatio, tumor palpebrarum paulò ante eruptionem, vomitus, diarrhoea, cum dejectionibus colore viridi in dentientibus præsertim; Symptomata ingravescent ad quartum usque diem, quo quidem die (non nunquam quinto) in fronte & facie maculæ parvæ, rubræ, pulicuin morsibus persimiles prodeunt; quæ numero & magnitudine auctæ, racematim coalescunt, & faciem maculis rubris majusculis interstinguunt: Hæ maculæ è parvulis papulis, supra cutim paulum elevatis conflantur, quarum protuberantia digito levi, vix oculorum acie deprehendi possit.

A facie, quam primò solùm occupant, ad pectus ventreinque, crura deinde tibiasque propagantur maculæ; in his autem partibus latæ & rubræ, superficiem cutis non superantes conspiciuntur. Eruptione morbillorum non perinde delinuntur Symptomata ac in variolis. Vomitus post eruptionem nullus: sed tussicula & febris cum spirandi difficultate, intenduntur, in oculos defluxio, somnolentia & inappetentia perseverant. Die sexto aut circiter frons & facies asperescunt, emorientibus pustulis, ruptæque cuticulæ, in reliquo corpore maculæ latissimæ sunt, & maximè rubescunt. Octavo circiter die in facie evanescent, & vix in reliquo corpore permanent. Nonò nullæ prorsus sunt, per faciem verò & artus quandoque & totum corpus in farinam quandam & squamas faceffunt, & tunc temporis febris, spirandi difficultas, & tussicula augentur. In adultis à calido regimine livescunt primò, mox nigrescunt exanthemata.

℞. Decoct. Pectoral. ʒiij. Syrup. Violar. & Cap. Ven. an. ʒiij. M. f. Apozema, Cap. ʒiij. vel iv. ter vel quater in die.

℞. Ol. Amygd. dulc. ʒij. Syr. Violar. & Cap. Ven. an. ʒj. Sacchar. Cand. albiss. q. s. M. f. Eclegma, de quo sæpius lambat, præcipuè quando tussis urget.

℞. Aq. Cerasor. nigr. ʒiij. Syr. de Mecon. ʒj. M. f. haustus singulis noctibus sumendus, à primo morbi insultu, usque dum convalescit æger, dosin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger se contineat in lecto per biduum post primam eruptionem.

Si post Morbillorum discessum, Febris, respirandi difficultas, & alia Symptomata Peripneumoniam mentientia supervenerint, sanguis liberaliter extrahendus è brachio, semel, bis, vel ter, prout opus fuerit, convenienti spatio inter singulas Venæ sectiones: Atque etiam continentur *decoctum Pectorale suprâ descriptum*, ut & *Lohoch*, vel *Ol. Amygd. dulc. per se*. Circa diem *xij.* ab invasione Cathartico lenienti purgetur.

Diarrhoea, quæ morbillos excipit, Venæ sectione sanatur.

De Variolis.

Distinctæ sunt, vel confluentes, & in diētis invadunt rigor & horror, calor intensus, capitis & dorsi dolor vehemens, vomituritio, in adultis ingens in sudores propensio, (& hinc minimè confluxuras esse licet conjicere) dolor sub scrobiculo cordis, si manu prematur, stupor & somnolentia, non nunquam & insultus epileptici (in infantibus præsertim) quibus si, dentitione peractâ corripiantur, in procinctu esse variolas possis prædicere; ita ut si fortè insultum epilepticum sub vesperam patiantur, sequenti Aurorâ in conspectum se daturæ sunt variolæ, mites ut plurimum & rarissimè confluentes. Quarto inclusivè ab invasione die, non nunquam seriùs, rarò tamen ante illum erumpunt, quo tempore, vel minuuntur Symptomata, vel prorsus evanescunt. In eruptione autem subrubræ primò pustulæ tenuissimarum acicularum puncta æquant, sparsim se produnt per faciem, collum, pectus, & corpus universum; tunc in faucibus dolor, qui cum pustulis surgentibus augetur. Circiter octavum à primo insultu diem intervalla pustularum priùs alba rubere jam incipiunt, in tumorem attolli, & dolore tensivo affici; extenduntur palpebræ, & ut vesica inflata, oculos claudunt. Proximè è facie intumescunt manus, digitique distenduntur, pustulæ faciei antea leves & rubræ, jam asperæ (primum maturationis indicium) & subalbidæ apparent; succum insuper luteum, colore à flavo non abludentem evomunt, faciei & manuum inflammatio jam summa in pustularum interstitiis colorem exhibet floridum, & rosarum Damascenarum æmulum, quem quidem colorem, quo mitiores sunt variolæ, eo magis tum pustulæ, tum cutis interjecta ad amissim exprimunt: Quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie ac magis flavæ pro maturationis ratione; quæ manus & reliquum corpus minùs asperæ albæque magis conspiciuntur indies. Die undecimo saniei tumor & inflammatio recedunt, pustulæ & justam magnitudinem (viz. pisi grandiusculi) adeptæ exarescunt deciduntque. Decimo quarto vel quinto pereunt funditus; manuum autem pustulæ pertinaciores, albæ adhuc & recentes die uno aut altero moras trahunt, & tandem disrumpuntur, cæteræ autem, faciei nimirum & corporis desquamantur, & in facie squamulis hisce surfuraceis succedunt foveæ. Per totum morbi decursum alvus vel prorsus constipatur, vel rarissimè dejicit. Maxima eorum pars, qui ex hoc morbo pereunt, octavo die in discretis, undecimo autem in confluentibus intereunt: Quippe cum in discreto hoc genere promoventur sudores tum cardiacis, tum regimine calidiore, prædicto die facies, quæ turgida &

per interstitia pustulis interjecta inflammari debuerat, è contra flaccida reperitur, & albescens, pustulis nihilominus rubentibus & elevatis, etiam post ægri mortem, sudor, qui huc usque manaverat, derepentè evanescit, æger interim phrenitide corripitur, anxietate, jactatione, ægritudine, vehementibus, urinam parcè reddit ac frequenter, & tandem paucissimarum horarum spatio ad plures migrat.

In Confluentibus eadem Symptomata, (sed atrociora) febris scilicet, anxietas, ægritudo, vomituritio, &c. immanius sæviunt, licet non ita promptè, ac in discretis, in sudores dissolvitur æger. Diarrhœa non nunquam eruptionem præcedit, & ad diem unum aut alterum post illam protrahitur, quod in discretis vix contingit. Tertio in die aut citiùs, rarò tardiùs, erumpunt; & quo citiùs, eo magis confluunt. Quandoque ad quartum vel quintum diem differitur eruptio ob atrox aliquod symptoma, v. g. acutissimum dolorem in lumbis, nephritici æmulum, in latere pleuritici, in artubus rheumatici, in ventriculo cum ingenti ægritudine & vomitu. Non perinde, ac in discretis, mox ab eruptione remittunt symptomata, sed & febris & alia ad multos etiam dies post eruptionem pustularum ægrum discruciant: Nunc erysipelatis ritu, nunc morbillorum erumpunt, eruptionis licet tempore planè distinguantur. Crescente morbo, non in molem aliquam spectabilem attolluntur; sed in facie sibi invicem implicitæ, tanquam vesicula rubra vultum omnem contegunt, quem maturius elevant quàm discretæ: postmodum ad instar pelliculæ vultui agglutinatæ cutis superficiem non admodum superat. Præterlapso die octavo, pellicula alba quotidie paulatim magis exasperatur, colore fusco: Intensus magis est dolor cutis, donec tandem in truculentiori morbo non nisi post diem vicesimum latioribus laminis desquamatur. Hoc interim observatu dignum, quòd quanto pustulæ maturescentes propiùs ad colorem subfuscum vergunt, eò deteriores lentiùs abscedunt; quo magis autem flavescunt, eò minùs confluerint, & ocyùs se proripiunt. Ubi primùm deciderit pellicula, nullâ scabritie vultus afficitur, at verò mox illam excipiunt squamulæ furfuraceæ, indolis perquam corrosivæ, quæ foveas relinquunt patentiores, & sæpe cicatrices. Quandoque humeri & dorsum cuticulâ denudantur, Morbi periculum à pustularum frequentia & numero in facie sola, æstimandum. Pustulæ manuum & pedum majores, & quò altiùs ab extremitate artuum ascenderis, eo sensim minores & contractiores extant. In adultis salivatio, infantibus diarrhœa (licet non ita certò) confluentium comes. Ptyalismus nunc cum eruptione se prodit, nunc biduo triduo præterito, materiam primò tenuem, die undecimo viscidiorè ægerrimè, excreat. Siticulosus est æger, voce raucâ, somnolentiâ & stupore ingentibus corripitur, inter bibendum subinde tussit: & potius per nares revertitur. Tunc cessat ut plurimum salivatio, cui nisi faciei intumescencia (quæ licet hoc ipso die pro morbi genio aliquantisper remitti debeat, non tamen nisi post diem unum alterumve omnino recedere debet) & manuum jam insigniter incipiens & diutiùs perdurans suppetias tulerint, ægro protinus moriendum est. Diarrhœa non ita maturè infantes occupat ac ptyalismus

ptyalissimus adultos. In utraque variolarum specie febris ab insultu ad eruptionem dominatur, inde dat inducias ad pustularum maturationem, quâ peractâ, definit. Superveniunt à malo regimine symptomata anomala; qualia sunt, pustularum flacciditas & subsidentia, phrenitis, coma, maculæ purpureæ pustulis interspersæ, & in earum summitate maculæ nigræ exiguæ in medio subsidentes, sanguinis mictus & sputum sub initio morbi, urinæ suppressio.

Separationis tempus cum febrili ebullitione tribus vel quatuor primis diebus transigitur: Expulsio per reliquum morbi tempus, mediantibus parvis abscessibus, in carne perficitur.

Die in quo maximè periclitatur æger, in confluentibus, in minimè crudo, maximè vulgari genere, à primo morbi insultu, est undecimus, in crudiore adhuc, decimus quartus, & in crudissimo, decimus septimus; non nunquam tamen, sed rarius, non ante diem vicesimum moritur æger. Quin imo per spatium illud omne, quod inter dies undecimum, & decimum septimum interjacet, appetente vespérâ, molestissimo inquietudinis paroxysmo, quotidie vexatur æger.

Mittatur sanguis quovis ex tribus primis diebus ab invasione ad unc. *ix.* vel *x.* & postea *Vomitorium* exhibeatur ad *ʒj.* vel *ʒiſs.* *Infusionis Croci Metallorum.*

His primis diebus diluatur sanguis frequenti potatione Cerevisiæ tenuis Lupulatae, cui Vitrioli Spiritus immisceatur usque ad plenam pustularum eruptionem.

Cùm variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum est sexto die post invasionem) vesperi propinetur *Syr. de Mecon.* *ʒj.* quæ repetatur dehinc singulis noctibus ad diem decimum post invasionem. Et nocte, si Variolæ è Confluentium genere fuerint, augeatur dosis ad *ʒiſs.* quæ dein repetatur ad *ʒj.* manè: & ad *ʒiſs.* serò, singulis noctibus, donec æger convalescat.

Si *Syr. de Mecon.* minus congruat, substitui possit *Laudan. liquid.* viz. *gutt. xviii. pro ʒj. Syrupi, & gutt. xxv. pro unc. iſs.* Hoc interim observandum, quod si paregoricum bis in die exhibitum orgasmum compescere non valeat (quod in Variolis insigniter confluentibus, sub finem earum sæpe accidit) tum 8. quaque horâ exhibendum, vel sæpius, si opus fuerit.

At si variolæ interstinctæ fuerint, satis erit, ut solummodo singulis noctibus, post plenam eruptionem exhibeatur Paregoricum; atque etiam in minori dosi.

Qualiscunque autem generis variolæ fuerint, atque etiam qualicumque morbi tempore, si Phrenitis acciderit, omnino oportet ut inordinato spirituum motui frænum injiciatur, ac proinde si prior Paregorici dosis metam non attingat, alia atque alia assumatur, donec tumultus penitus compescatur, interposito inter singulas doses spatium aliquo; ut pernoscere valeamus, utrum dosis ultima id, quod quærimus, præstiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ suppressio acciderit, æger è lecto eximatur, & aliquantulum obambulet.

Si saliva ob calorem sit adeò viscida, ut expectorari non possit, tum Gargarisma cum Syringa sæpe in fauces injiciatur. Componatur è *Cerevisia tenui* vel *aq. hord. cum Melle Rosarum*; vel sequens usurpari poterit.

℞. Cort. Ulmi 3vj. rad. Glycyrrhiz. unc. 6. Passul. enucleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. s. q. aq. ad 16i6. in Colatur. dissol. oxymel. simp. & mell. Rosar. an. 3ij. M. f. Gargarisma.

Si epispastico opus fuerit, amplum satis & acre nuchæ applicetur nocte ista, quæ magnam morbi crisin præcedit, mox ab assumpto paregorico, plantis quoque pedum applicari potest allium, à die octavo, usque ad morbi finem, singulis diebus renovandum.

Si infans, Symptomatis dentitionem comitantibus jam securus, derepente spasmo corripitur hic cogitandum est, convulsionem istam, fortassis à naturæ conatu, quæ variolas, scarlatinam Febrem, aut morbillos, in corporis habitum protrudere satagit, pendere, applicetur itaque Emplastr. Epispasticum nuchæ, lecto quàm primum committatur æger, exhibeatur insuper cardiacum, cui paregorici pauxillum est admiscendum, puero nempe trienni *Laud. Liquid. gut. v. in aq. Epidem. cochl. j.*

Si die undecimo, vel alio quovis post eum, febris secundaria cum inquietudine, jactatione & cæteris id genus symptomatis, usque adeò efferatur, ut Paregoricis utcumque repetitis sufflaminari nequeat, & mors quasi immineat, tum sanguis in satis magna quantitate illicò detrahatur; nempe ad unc. *xij.* vel circiter, atque porrò repeti possit, vel bis in sequentibus diebus, si symptomatum dictorum ratio idem postularit: at non aliàs. Catharsis etiam blanda die decimo tertio (non antea) vel quovis alio die eum insequente (modo Venæ sectio præcesserit) institui possit, nempe ex *Electuarii Lenitivi unc. j. dissolut. in aq. Cichor. vel lactis Alexiter. unc. iv.* Verumtamen nec Venæ sectio nec Catharsis impediunt, quo minùs Paregorica in usum veniant, quæ, (haud obstantibus iis) tam quoad largam dosin, quàm repetitam exhiberi debent, si opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo semper confugiendum.

Quando Puslulæ perfectè exaruerint, inungatur facies Linimento ex æqualibus partibus *ol. Amygd. dulc. & Pomat.* per biduum; at non ultra.

Die *xxj.* post invasionem mittatur sanguis è brachio; & sequenti die Catharsis celebranda, quæ porrò alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad Regimen, à lecto abstineat ad sextum diem post invasionem, in quo postea se contineat usque ad *xvij.* non aliis stragulis tectus, quàm quibus sanus uti solebat.

Jusculis Avenac. hordeac. Pomis coct. & Cerevisiâ tenui victitet, & post undecimum diem vini Hispanic. Coch. *iv.* vel *v.* bis in die exhibeantur, si æger voluerit.

Si crurum tumor non evacuationibus præscript. cedat, tum fotu fol. Malv. verbasc. Sambuc. Lauri, cum floribus Chamamel. & Melilot. in lacte coct. facile fugatur.

Si primis morbi diebus æger Hæmoptoë laboret, vel urinam reddat sanguineam, ea quæ in capite de Hæmoptoë præscribuntur, sextâ quâque horâ (donec Symptomata ista prorsus cessaverint) diligenter exhibeantur. Quo etiam casu Paregorica liberali manu propinanda.

De Choreâ Sancti Viti.

Convulsionis species quædam est, pueros puellasve à decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more, manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicitam, nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticationes, circulatorum instar, exhibebit: Non enim rectâ lineâ ori admoveat, sed deductâ à spasmo manu, huc illuc aliquandiu versat, donec tandem fortè fortunâ labris propius apponens liquorem derepentè in os injicit, & avidè haurit, deditâ tanquam opera, ut spectantibus risum moveret.

Sanguis ad ℥viij. plus minus, pro ætate, ex brachio educatur.

Die sequenti, dimidia pars, vel quiddam amplius, pro ratione ætatis, positionis commun. hauriatur; & vesperi haustulus sequens propinetur.

℞. Aq. Cerasor. nigr. ℥j. aq. Epilept. Langii ℥iij. Theriac. Andromach. ℥j. Laudan. Liquid. gut. viij. f. haustus.

Potio Cathartic. ad tres vices, alternis diebus, repetatur; & haustus Paregoricus iisdem noctibus.

Postea Sanguis iterum extrahatur; & ad Catharsin, uti prius, æger revertatur, & sic sanguis mittatur, & alvus subducatur ad tertiam quartamve vicem; spatio tamen inter alternas evacuationes observato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis sequentia præscribantur.

℞. Conserv. Absinth. Roman. & flaved. Aurantior. an. ℥j. Conserv. Anthos ℥β. Theriac. Andromac. vet. & nuc. moschat. condit. an. ℥iij. Zingib. condit. ℥j. Syr. è succ. citr. q. s. f. Electuar. de quo capiat ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quintâ pomeridianâ, superbibend. vini sequentis Cochlear. v.

℞. Rad. Pæoniæ, Enul. Campan. Imperator. & Angelic. an. ℥j. fol. Rut. Salv. Betonic. Chamædr. Marrub. alb. & summitat. Cent. min. an. Mj. Baccar. Juniper. ℥vi. Cortic. duor. Aurantior. Incidantur & infundantur frigidè in vini Canarini lbvi. Coletur tantummodo usûs tempore.

℞. Aq. Rut. ℥iv. aq. Epilept. Lang. & Bryon. comp. an. ℥j. Syr. Pæon. ℥vi. M. f. Julap. cap. Cochl. iv. singulis noctibus. cubitum iturus, instillando Sp. C. C. gutt. viij.

Applicetur plantis pedum Emplast. è Caranna.

Ob Recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, eâ ipsâ anni sequentis tempestate (vel paulo ante) quâ morbus invasit.

Verisimile

Verisimile mihi videtur, quòd hæc methodus curationi Epilepsiæ Adultorum convenire possit, quòd tamen non adhuc expertus sum. Cum verò Chorea *Viti* ætates teneras adoriri soleat, in Epilepsia Adultorum tam sanguinis detrahendi quantitas, quàm Catharticorum dosis adaugeantur.

De Apoplexia.

Somnus est profundissimus, & omnimoda sensûs & motûs privatio, exceptâ respiratione, quàm ægri habent difficilem cum stertore.

Mittatur sanguis è brachio ad ℥xij. quamprimum, ac postea ex venis jugularibus ad ℥viii. deinde *Vomitorium ex ℥ib. vel unc. ij. Infus. Croc. Metal.* propinetur statim.

Emplast. Epispastic. satis amplum ac forte cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus sedeat æger in lecto, nec stragulis nimis ob-
rutus.

Sp. Sal. Armoniac. optimè rectificatus admoveatur naribus.

Finitâ Vomitorii Operatione, subinde exhibeantur *Cochl. iij. vel iv. sequen-*
tis Julapii.

Rx. Aq. Rutæ ℥iv. aq. Bryon. compos. & Antiepilept. Lang. an. ℥j. Sp. C. C.
gut. xx. Sacchar. Crystal. q. s. f. Julap.

Vel *Cochleare j. Sp. Lavendulæ compos.* per se propinari possit bis vel ter,
durante paroxysmo, horâ dimidiâ vel integrâ interposita.

Cavendum est, ne Cardiaca plus justo calida, ac nimis frequenter (uti
mos est) exhibeantur; nam quacunque demum specificâ virtute pollere vi-
deantur, plus damni quàm emolumenti ægro apportant, ut pote quæ humores
fundere (ac proinde malum augere) apta nata sunt: quod etiam incommo-
dum non minùs infertur ex nimia stragulorum congestione.

Paroxysmo jam finito, ad præcavendam recidivâ sequentia exhibean-
tur.

℥. Pil. Coch. maj. ðij. cap. tertia quaque die per 6. vices horâ 4. matutina
superdormiendo.

℥. Conserv. flor. salv. Rorismarin. an. unc. j. Conserv. flaved. Aurant. ℥vj.
nuc. Moschat. condit. & Zingib. condit. an. unc. ℔. Theriac. Androm. vet. ℥ij.
pulv. elect. diamb. diamosch. dulc. an. ℥j. cum s. q. Syr. conditur. citr. f. opiata.
ad magnitudinem Castaneæ manè & serò voranda, superbibend. *aq. Epilep.*
Lang. Coch. ij.

Rx. Ambr. gris. ℔. ol. destil. sem. Anisi, ciinamom. nuc. moschat. an. gut.
ij. ol. Caryophil. gut. j. Sacchar. in aq. flor. aurantior. solut. unc. iv. f. s. a. Ta-
bellæ, quarum capiat unam ad libitum.

Ab usu potus generosioris cujusvis sibi temperet, vescatur jusculis avenaceis,
hordeaceis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoque etiam (præ-
cipuè inter purgandum) carne pullorum, agnorum ac id genus ciborum eu-
pepton.

De Ophthalmia.

Ex oculorum inflammatione patet.

Mittatur Sanguis è brachio ad unc. x. Sequenti die sumat potionem purgativam communem, quæ repetenda est per duas alias vices, duobus diebus interpositis; iisdem noctibus sumat *haustum paregoricum ex Syr. de Mecon. unc. j.*

Diebus à purgatione vacuis sumat ter aut quater in die *unc. iv. Emulsionis ex sem. frigid. maj. & Papav. alb.*

℞. Aq. Plantag. Ros. rubr. & Spermat. Ranar. an. unc. j. pulv. Tutie præparat. ʒj. f. Collyrium, cujus guttæ aliquot instillentur oculis bis in die; at non incipiendum, nisi post primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur Venæ sectio semel vel bis, (præcipuè si sanguis Pleuriticus apparuerit) ut etiam Catharsis.

Abstineat ab usu vini & cujusvis liquoris generosi, ab usu etiam ciborum coctu difficilium, & sale conditorum; & diebus inter purgationes bibat hydrogalam coctam.

Nota, quòd sæpè accidit, quòd Venæ sectione & Catharsi utcunque repetitis Ophthalmia non cedit; hoc in casu *Paregoric. ex Syr. de Mecon. unc. j.* singulis noctibus exhibitum, curationem sine aliorum suppetiis absolvit.

De Uteri Procidentia.

℞. Cort. Querc. ʒij. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub finem addendo Cortic. Granator. contus. ʒj. ros. rub. flor. Granator. an. Mij. dein adde vini rubr. ℥ss. Colatura sit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur manè horis duabus, antequam è lecto assurgat, & nocte post decubitum, donec symptoma penitus evanuerit.

De Paroxysmo Nephritico.

Adiunt dolor fixus in lumborum regione, urinæ cruenta, arenularum aut calculi excretio, stupor cruris è directo renis laborantis, testis retractio ejus lateris, in quo est dolor, nausea & vomitus. Dolor colicus nephritico haud absimilis; licet in quibusdam symptomatis planè discrepet, quæ recensita in *Capite de Colica biliosa* videas.

Si Æger temperamento sanguineo fuerit, mittatur sanguis è brachio affecto reni respondentem ad ʒx. dein *liquoris possetici* cui *Rad. Althææ ʒij. incoctæ fuerint Cong. j.* quàm citissimè deglutatur, & Enema sequens injiciatur.

℞. Rad. Althææ & Lilior. an. ʒj. fol. Malv. Parietar. Branc. Ursin. & flor. Chamæmel. an. M. j. Sem. Lini & Fænugr. an. ʒss. coq. s. q. aq. ad ℥ss. M. F. Enema. Rejctis Vomitorio & Enemate, *Laudan. Liquid. satis magna dosis* propinetur, viz. *ad gutt. xxv. vel Pil. Matth. gr. xv. vel xvj.* In senibus verò, & morbo diuturno fractis, ut & vetulis Vaporibus obnoxiiis, (præcipuè si sub initium Paroxysmi urinam eæ reddant nigram & sabulosam) Venæ sectio omittatur; at quoad reliqua, eadem quæ dicta est via omnino procedendum.

In mictu Sanguineo calculo renibus impacto.

Capiat æger, statò quodam die, singulis hebdomadis, *Mannæ ʒiiss. in feri lactis ℥ij. solut.*

Conducit aliquando haustus cerevisiæ tenuis liberalior.

In calculo renum grandiori, dolor hebes, & obtusus, nullatenus auctus, sed satis tolerabilis perſentitur, nec paroxyſmus nephriticus comitatur.

Aquis chalybeatis æger ſe non tutò committet, niſi prius certò ſciat, calculum majorem non eſſe, quàm ut per ureteres viam poſſit invenire, quod hoc tantum modo certò poteſt dignoſci, ſi nempe, jam antea, paroxyſmum aliquem nephriticum fuerit perpeſſus, (cum dolore ſæviffimo in renum alterutro, per ureterum ductus propagato, & vomitu enormi) pro comperto habeat, non tam grandiore aliquem calculum pelvi concludi, quàm lapillorum exiguorum congeriem, quorum unus ſubindè in ureterem illabitur, atque ita paroxyſmum invitat, qui fere non deſinit, niſi calculo in veſicam detrufo, cum ſic ſe res habeat, nullum eſt magis efficax remedium, quam aquarum chalybeatarum potatio; quòd ſi calculoſus, nullo unquam paroxyſmo nephritico fuerit tentatus, cum jam major ſit calculus, quàm qui ex pelvi poſſit elabi, devitandæ ſunt aquæ ferreæ.

De Dysenteria, Diarrhœa & Tenefmo.

Rigent horrentque, ſequitur deinde totius corporis calor, quem brevi excipiunt ventris tormina, & hæc, dejectiones crebræ, & mucoſæ omnes (niſi quod ſtercoroſæ nonnunquam interponantur) cum ingenti cruciatu & moleſtiſſimo viſcerum omnium quaſi deſcenſu, quoties exoneratur alvus, ſanguinis interim lineamentis intertextæ, licet aliquando ne minimum ſanguinis per totum morbi decurſum admisceatur. Progreſſu morbi ſanguis ſincerus quandoque excernitur, & gangræna inſanabili afficiuntur inteſtina. Si æger floreat, vel cardiacis incaleſcat. Febricitat admodum; lingua eſt ſubalbida, quadam mucilagine denſè obſita, interdum nigra & ſicca. Proſternuntur vires, diſſipantur ſpiritus, aphthæ inſuper oris interna faucesque obſident, præſertim ubi materiæ peccantis evacuatio adſtringentibus præpoſterè impeditur, non exacto per cathartica morbi fomite. Aliquando exulante febre, agmen ducunt tormina & cætera morbi ſymptomata ſequuntur.

In diarrhœa humores excrementitii ſine ſanguine aut inteſtinorum exculceratione excernuntur.

In tenefmo affidua eſt deſidendi cupiditas, nihil tamen præter mucoſum quoddam & ſubcruentum aut purulentum rejicitur.

Mittatur ſanguis è brachio quamprimum, eademque nocte *Paregoricum* propinetur; & mane ſequenti *Potio purgans communis*, repetenda alternis diebus ad duas alias vices, & *Paregoric.* poſt purgationes, quamprimum ſuo deſunctæ ſunt munere, ac diebus à purgatione vacuis idem manè & ſero eſt exhibendum.

Poſt Venæ ſectionem & Catharſin ſemel celebratam, per totum morbi decurſum, ſequens Cardiacum exhibeatur.

℞. Aq. Ceraſ. nigr. & fragor. an. ℥iij. Aq. Epidem. Scord. comp. & Cinnam. hordeat. an. ℥j. Margarit. præparat. ʒiſſ. Sacchar. cryſtal. q. ſ. adde Aq. Roſar. Damascen. ʒß. ad gratum ſaporem. m. f. Julap. de quo cap. cochl. iv. vel v. in languoribus, vel ad libitum.

Potus sit Lac coctum cum *Aq. Triplo*, vel *Decoct. Alb.* ut
Rx. C. C. C. & Mic. panis alb. an. ℥ij. coqu. in Aq. font. ℔ij. ad ℔ij. postea
f. q. Sacchar. Albiss. edulcoretur. Vel si dejectio virium postulaverit, *Aq. font.*
℔ij. cum Vin. Canarini ℔j. simul coctæ, pro potu frigide assumantur.

Cum per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio usui *Laudani* bis vel ter in die repetiti postea incumbit, nisi quod *Enem. ex Lact. vaccin. ℔℔. & Theriac. Androm. ℥i℔.* subinde injiciatur, quod in alvi egestionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in Diarrhoeam tantum assurgat, Phlebotom. & Catharsi præscripsit. omittis, sequ. Bolus singulis matutinis exhibeatur.

Rx. Rhabarb. pulv. 3℔. (plus minus pro ratione virium) cum f. q. Diascordii. f. Bolus, addendo Ol. Chym. cinnam. gutt. ij.

Noctibus insequentibus *Paregoric. ex Aq. cinnam. hordeat. unc. j. & Laudan. Liquid. gut. xiv. exhibeatur.*

Ubi tormina sicca sine dejectionibus excruciant, curantur diluendo sero lactis frigide propinato, & tepide injecto; ut in Cholera morbo pullorum jusculo aut lacte cerevisiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeo ut omnis ejus vis in rectum intestinum decumbat, cum assidua desidendi cupiditate, Diæta Analeptica instituat, & liquor aliquis Cardiacus pro libitu ingeratur, ut restaurari possint vires, quibus redeuntibus Tenesmus sponte se proripit.

In dysenteria male curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot excruciant, in hoc casu Phlebotomia repetita pristinam sanitatem restituet.

Notandum est quod in constitutionibus huic morbo minus faventib. omittis evacuationibus dysenteria Laudano solo sanatur, quod mane & sero repetendum, donec symptomata penitus evanuerint, vel etiam ter Nycthemeri spatio, si opus fuerit.

De Colica biliosa.

Intestinorum dolor atrocissimus est, per horas aliquot affligit febris in hunc morbum desinens, qui aut quasi injecta fascia constringit, aut in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur, mox recrudesceat. Sub initio non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur, neque tam crebra vomituritio, neque alvus ita pertinaciter cathartorum vim eludit; quod autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio frequentior, & major alvi adstrictio, colica tandem in iliacam transeunte. A nephritide sic distinguitur. 1. Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus vero vagus est, & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu colicus dolor augetur: Nephriticus potius imminuitur. 3. In colico dolore, ab excretionem per alvum & per vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: In colica urinæ ab initio crassiores existunt.

Sanguis

Sanguis è brachio paulo liberalius educatur, & post horas *iiij.* vel *iv.* *Anodyn.* exhibeatur. Postero die *Catharticum Lenitiv.* & interposito die unô, ad tertiam vicem propinetur.

At si malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avidè ingestis, originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cerevisiato affatim hausto eluendus est; quô exantlatô *Anodynum* propinandum est; sequenti autem die vena secanda est, & in ordine præscriptô procedendum.

Ubi hic morbus minùs peritè tractatus diutissimè fatigaverit, & ægrum penè confecerit, liberalior sive aquæ *Epidem.* sive *Mirab.* sive aliùs cujusunque, quâ sanus maximè delectabatur, usus, ægrum hoc tempore ultra spem omnem juvit.

De Cholera Morbo.

Intra Augusti limites se continens, vix in priores Septembris hebdomadas evagatur. A crapula & ingluvie excitatus similis affectus, nullo temporis discrimine insurgit, qui licet eodem curetur modo, alterius tamen est subellii. Adfunt vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio; cardialgia, sitis, pulsus celer ac frequens, parvus & inæqualis, æstus & anxietas, nausea molestissima, sudor, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, & similia, quæ ægrum in 24. horarum spatio interimunt.

Pullus tenerior in tribus circiter Aquæ font. Congiis elixetur, ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat, hujus decocti vel (defectu ejus) liquoris posseticici capaciores aliquot cyathos æger tepidè exhauriat; & eodem tempore ex eodem liquore *Enemata* successive repetenda. Haustibus & Clysteribus *Syr. Lactuc. Violar. Portulac. Nymph. eorumve* alicujus, uncia subindè admisceri poterit.

Exantlato hoc Eluvionis penso (quod *iiij.* vel *iv.* horas sibi vendicat) *Paragoricum* curationi Coronidem imponit.

Si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhaustus, & jam frigescant membrorum extrema, tum ad *Laudanum Liquidum* confugiendum est, in paulò majori dosi, (viz. *Laudan. liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. unc. i.*) & cum cessaverint symptomata, nihilominus manè & serò quotidie est repetendum; at in minori dosi, donec pristinas vires receperit.

Est species quædam Cholerae morbi infantibus valdè familiaris, ac sæpenu-merò funesta, ex Dentitione, vel Crapula originem ducens.

Horum ætas tenella minimè fert, ut diluatur ventriculus largâ liquorum potatione, multo minùs ut Cathartici tumultus major in humoribus excite-
tur, sed Curationem *Laudano* solo aggredi oportet; quamobrem *gutt. ii. iiij.* vel *iv.* vel *plures*, pro ratione ætatis, *Cochlear. j.* cerevisiæ tenuis vel Aquæ cujusvis appropriatæ instillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit.

De

*Processus Integri
De Colica Pictonum.*

Est species quædam Colicæ, quæ degenerare solet in Paralyfin, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem, quam hoc nomine *Riverius* in capite de Paralyfi indigitat, & apud insulas Caribum notissima est, utpote quæ magnam vim hominum infestat.

Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsam. Peruv.* frequenter ac in magna dosi exhibitum, nempe si *ejus gutt. xx. xxx. vel xl. Sacchar. Albiss. cochl. j. instillentur*, & bis vel ter in die dentur: at Paralysis huic remedio haud cedit.

De Iliacâ Passione.

Peristalticus intestinorum motus invertitur, propinata cathartica & injecta enemata in emetica statim transeunt, alvi fæces per vomitum rejiciuntur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. ix. vel x. post aliquot horas exhibetur sequens Pulvis.

℞. Resin. Scammon. vel (defectu ejus) Resin. Jalap. gr. xij. Calomelan. Turquet. ʒj. m. f. Pulvis; cap. è *Cochl. i. lactis vaccini*, superbibendo ejusdem lactis *Cochl. j. vel alterum*, vel si forma Pilularum magis arrideat.

℞. Pil. ex duob. ʒss. Calomel. Turquet. ʒj. cum s. q. Balsam. Peruv. f. Pil. iv. sumend. è Cochl. j. Syr. Violarum.

Sin autem æger hoc remedium per os rejecerit, *Laudan. Liquid. gutt. xxv. Aq. Cinnam. fort. ʒss. instillatæ* statim propinentur, cum verò horum usu vomituritio, ac ventris dolores, remiserint, catharticum dictum iterum exhibeatur, verum si anodynorum virtute ac vi jam penitus infractis, vomituritio ac dolor iterum redierint, cathartico interim in corpore resitante, ad usum paregorici supra descripti revertendum, idemque eò usque repetendum quarta vel sextâ quaque hora, donec intestinis quies omnino inducatur, quo quidem tempore catharticum operationem suam per sedes exeret.

Nec sanè abs re fuerit elapsa una, aut altera, post Venæ sectionem horâ, clysterem aliquem, ex iis qui potentiùs operantur, injicere, fumum scilicet nicotianæ, ex tubulo inverso, per vesicam majusculam, in intestina validissimè insufflatum, quæ quidem operatio post aliquot horas reiterari debet, nisi citius meatus deorsum pateat.

Finita operatione Cathartici,umat sequentem haustum.

℞. Aq. Cinnam. fort. unc. j. Laudan. Liquid. gutt. xxv. m. f. Haustus, qui porrò repetendus est bis, ter, vel sæpius in die donec vomituritio & dolor penitus cessaverint, atque etiam, istis symptomatis cessantibus nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes, capiat idem paregoricum in minori dosi cubitum iturus.

De Fluxu Mensum immodico.

Menstruorum fluxus, naturaliter constitutus capacitatem testæ ovi anserini implet. Patet autem immodicus ex difficili tolerantia, virium lapsu, inappetentia, cachexia, colore cadaveroso, & pedum intumescencia.

Mittatur

Mittatur sanguis è brachio ad unc. viij. sequenti mane sumatur *potio purgativa communis*, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem, *Paregoric. è Syr. de Mecon.* exhibeatur.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

℞. *Conserv. Rosar. sicc. ʒij. Trochisc. de terra Lemnia ʒiʒ. Cort. Granator. Corall. rub. præparat. & boli Armen. an. ʒij. lapid. hæmatit. Sanguin. Dracon. an. ʒj. cum s. q. Syr. Cydonior. f. Elect.* de quo sumat ad magnitudinem nucis moschat. maj. manè & horâ quinta pomeridianâ, superbibendo sequentis Julapii Coch. vj.

℞. *Aq. Germin. Querc. & plantag. an. ʒiiij. Aq. Cinnamom. hordeat. & Syr. de Rosis siccis an. ʒj. Sp. Vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

℞. *Fol. Plantag. & Urtic. an. q. s. Contundantur simul, & succus exprimat. & postea clarificetur*, de quo cap. Coch. iv. vel v. sæpiusculè ad libitum.

Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni Lumborum.

℞. *Emplast. de Minio & ad Herniam an. part. æq. extendantur super alutam; f. Emplastrum* regioni Lumborum admovendum.

De Colica hysterica.

Est species quædam, seu potius insigne ac valdè usitatum affectionis symptoma; cui comitem se adjungit dolor circa scrobiculum Cordis atrocissimus, uti etiam humorum viridi colore per vomitionem ejectio.

Primò, quò saburra vitiosorum humorum in ventriculo contentorum minùs impediatur Paregorici efficaciam, satis magna quantitas *liquoris possetici* affatim ingurgitetur, atque iterum per vomitionem rejiciatur, nempe *ejusdem liquoris Cong. iʒ.* quo peracto *Laudan. Liquid. gutt. xxv. in Aq. cinnam. fort. Aq. Epidem. vel alius vehiculi unc. i.* propinetur.

In usu Paregoric. hoc notandum, quòd eò usque repetendum est, donec symptomata omnia penitus cessaverint, debitum interea tempus interjiciendo, ut dijudicare valeamus, quid prior dosis effecit, antequam novam ingeramus.

Si sanguineo temperamento præditus sit æger, vel si antea hoc symptomate haud multum infestatus fuerit, ac viribus fractus, hoc in casu sanguis primùm à brachio detrahendus antequàm vomitorium præscriptum propinetur.

Hâc ipsâ Methodo Clayus hystericus curatur. Sin verò Colica Hysterica diuturnior fuerit per Paroxysmos affligens: tum in eorum intervallis, sive extra paroxysmum, seq. usurpentur.

℞. *Zedoar. subtiliss. pulv. ʒj. cum s. q. Syr. è conditur. citri, f. Bolus*, sumendus manè & serò per xxx. dies, superbibendo sequentem infusionem.

℞. *Zedoar. incij. minutim unc. ʒ. vini Canar. unc. iv. infundantur frigide per xij. horas; deinde colentur pro usu; vel Balsam. Peruv. ut in Colica Pictonum*, usurpetur.

Quæ de Colica Hysterica hîc dicuntur, de Colica etiam hypochondriaca dicta sunt; ut & hoc diligenter advertendum.

Utriusque affectus natura sibi vindicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quasi genuinè morbus cedit; tametsi ut plurimum Chalybs imprimis confert.

Colica Hysterica tam in hypochondriacis, quàm hystericis sæpissimè in icterum definit, qui sensim sponte suū faceffit, sin autem longas moras nectat, exhibeatur Apozema sequens.

℞. Rad. Rub. Tinctur. curcum. an. unc. i. chelidon. maj. cum toto & summat. centaur. an. M. j. coq. in æqualib. partibus Vini Rhenani & Aq. fontan. ad ℥ij. colatur. dissolv. Syr. de 5. radicibus unc. ij. m. f. Apozema, de quo capiat ℥ss. calidè manè & serò, usque dum convalescit.

De Ictero, colicâ neutiquam prægressâ.

Color flavus in toto corpore, præsertim in oculorum albis est conspicuus, quo quidem colore objecta omnia apparent afflictis, tincta; corporis pruritus, segnities, & lassitudo, linguæ amaror, vomitus biliosus interdum, singultus, egestio alba, urina crocea, & pannum immersum eodem colore inficiens, morbum indigitant.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur usum sequentium, & durante eorundem usu, Catharticum præscriptum quarto quoque die exhibeatur.

℞. Conserv. Absinth. Rom. conserv. flaved. Aurant. an. unc. i. Angelic. condit. nuc. moschat. condit. pulv. Ari compos. & chalyb. cum Aceto præparat. an. unc. ss. Extract. Gentian. & cremor. Tartar. an. ʒij. croc. Anglic. pulv. ʒss. cum s. q. Syrup. de 5. radicibus, f. Electuarium, de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. manè & horâ quinta pomeridianâ, (vel vice Electuarii sumat pilulas chalybeatas) superbibendo post matutinam dosin aquarum mineralium purgantium ℥iv. & post pomeridianam dosin Apozemat. in colica hystERICA descrip. lib. ss.

At si signa hydropis adfuerint, tam mane quàm serò apozema superbibat. Si vel his diu continuatis morbus adhuc persisterit, ad aquas ferreas eundum est, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ad præcavendum Abortum.

Eadem præscribenda, ac in Fluxu mensium immodico, omittis solummodò catharsi & succis.

De immodico lochiorum fluxu.

Fluxum lochiorum naturalem tria constituunt, sanguis scilicet purus, copiosus, per triduum primum fluens; dehinc sanguis aquosus, loturæ carniū crassiori similis per quatrduum præter propter durans; hinc postmodum materia viscosa & mucilaginosa, pauco aut nullo sanguine permixta, per quinque aut septem dies prodiens, & sic porro ad mensis finem.

Fluxus autem eorum immodicus dijudicandus est ex virium dejectione, animi deliquio, sanguine grumoso effluente, cibi fastidio, dolore in hypochondriis, ventris tensione, pulsu debili & frequenti, visus obtenebratione, aurium tintu, & convulsionibus.

Victus incrassans instituat, & potus sequens addatur.

℞. Aq.

℞. *Aq. Plantag. vin. rubr. an. lib. j. coq. simul ad tertias, & deinde edulcoratur s. q. sacchar. albiss. cujus, cum frigescat, cap. lib. ℞. bis vel ter in die.*

Interim Julap. aliquod Hystericum (at satis mite) subinde propinetur, & nodulus sequens naribus applicetur.

℞. *Galban. Assæ fætid. an. ℥ij. castor. sal. succin. volatil. an. 3℞. m. f. nodulus, vel*

℞. *Sp. salis Ammoniac. 3ij. quem sæpe olfaciat.*

De suppressione Lochiorum.

Intumescit venter, dolor gravativus inum ventrem, lumbos & inguina occupat, facies rubescit, difficilis est respiratio, perturbantur oculi, rigores, febres acutæ adfunt, animi deliquia, sudores frigidi, pulsationis & ardoris sensus in utero; paralytis in partibus inferioribus, ut & interdum epilepsia.

E vestigio lecto addicatur, & *Emplast. hystericum* umbilico admoveatur quamprimum; Elect. seq. adhibeatur.

℞. *Conserv. Absinth. Rom. Rut. an. unc. i. Trochisc. è Myrrh. 3ij. Castor. croc. Anglic. sal. volatil. sal. Armoniac. & Assæ fætid. an. 3℞. cum s. q. Syr. è 5. radicib. f. Elect. cap. ad magnitud. nuc. moschat. quarta quaque hora, superbibendo seq. Julap. Cochl. 4. vel 5.*

℞. *Aq. Rutæ unc. iv. Bryon. compos. unc. ij. Sacchar. cand. q. s. f. Julap. vel sumat Trochis. de Myrrh. 3j. quarta quaque hora.*

Si tota prædictorum quantitas consumatur, & Lochia adhuc supprimantur, *Laudanum* unica saltem vice exhibendum, ut *Laudan. Liquid. gutt. xiv. in Aq. Bryon. compos. vel Laudan. solid. gr. i℞. cum Assæ fætid. 3℞. in pilulas duas redactum.*

Si hæc nihil proficiant, tum Enema ex lacte Saccharato, unica saltem vice injiciatur.

De Hydrope.

Foveæ à digitorum impressione in surarum parte inferiori sub noctem conspicuæ manè evanescentes, hoc malum primum indicant, maximè si spiritus interim ægrius ducatur, (haud rarò tamen foeminæ prægnantes, & quibus catamenia sistuntur: ut & viri ab asthmate inveterato derepentè liberati eodem tumore tentantur) pedibus crurisque ad extremum extensis, in abdomen ruunt aquæ, & ad ultimum capacitatis suæ limen paulatim distendunt, donec tandem in viscera nobiliora impetu ab iis facto æger submergitur. Pro rata qua partes à morbo obsessæ mole augentur, aliæ magis magisque gracilescent, urgentibus dyspnœâ, urinæ paucitate, & siti intensâ. Viros ingravescente ætate, foeminas, ubi jam parere desierint, ut plurimum adoritur.

Indicationes curativæ dirigendæ sunt primò ad aquarum evacuationem, deindè ad instaurandum sanguinis robur; quo novus aquarum proventus præca- veri possit.

℞. *Vini albi ℥iv. jalap. subtiliss. pulv. 3j. zingib. pulv. 3℞. Syr. de Spin. Cervin. unc. j. M. f. Potio, sumendaque singulis vel alternis diebus, pro ratione vi- rium donec partes affectæ detumuerint; vel,*

℞. *Tamarind. unc. ℔. fol. Senn. 3. ij. Rhei. 3℔. Coq. in f. q. aq. ad unc. iij. in Colatur. dissolv. Mannæ & Syr. Ros. solut. an. unc. j. Syr. de Spin. cervin. unc. ℔. Elect. è succ. Rosar. 3iij. M. f. Potio, sumenda ut supra; vel,*

℞. *Pil. ex duob. 3j. Elater. gr. iij. Ol. Chym. Caryophyl. gutt. ij. f. Pil. N. iij. cap. summo manè, repetanturque, ut opus fuerit; vel,*

℞. *Gambugii gr. xv. vin. alb. & aq. Cichor. an. unc. ℔. m. f. Potio sumenda ut supra; vel,*

℞. *Cortic. interior. Sambuc. lact. & aq. partibus æqual. è lignô derasi M. iij. coq. in aq. mistorum ℥iij. ad ℥j. Colaturæ capiat dimidiam partem manè, & alteram serò quotidie, donec convalescat. At hoc remedium, nisi in corporibus, quæ facillimè purgativis cedunt, nihil confert.*

Circa usum Catharticorum in hoc morbo hæc tria advertenda sunt.

Primò, utrum ægri corpus facilè, an verò difficulter Catharticis cedere soleat, cum in iis qui facile purgantur *Syrup. de Spin. Cervin. solus ad unc. i.* exhibitus, aquas sat copiosè eliciat, in illis verò, qui difficulter purgantur, Cathartica supra descripta, utut valida, vix scopum attingant.

Secundò, Cathartica omnia, quæ segnius operantur, magis officiunt quàm profunt; quamobrem purgatio paulò fortior & nimia, justo debiliore est præferenda.

Tertiò, Aquæ eâ maximâ celeritate exhauriri debent, quam ægri vires ferre queant: ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aq. denuò affatim colligantur.

Est autem ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorsus omitti possint ac debeant; quoties enim æger constitutione est infirmiori, vel foemina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio Diureticis solum committenda, inter quæ ea sunt efficacissima, quæ ex salibus Lixivialibus fiunt; ut,

℞. *Cinerum Genistæ ℥j. infundantur frigide in vini Rhenan. ℥iv. liquoris per filtrationem colati unc. iij. manè quintâ pomeridianâ, & serò singulis diebus exhibeantur, usque dum humor evanuerit.*

Aquis jam penitus evacuatis, Calefacientia & corroborantia medicamenta usurpanda; ut

℞. *Rad. Raphan. Rustican. fol. Cochl. hortens. absinth. vulgar. Salv. summitat. centaur. min. & Genistæ; infundantur in cerevisia forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando sine Catharticis subvenit, vel sequent. utatur.*

℞. *Conserv. Cochl. hortens. absinth. Roman. an. unc. j. Extract. Gentian. Absinth. vulgar. & Centaur. min. an. 3iij. cum s. q. Syr. è cortic. citr. f. Electuarium de quo sumat ad quantitatem nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & vesperi, superbibend. unc. iv. sequentis infusionis.*

℞. *Rad. Gentian. unc. j. summitat. Genist. Centaur. min. & Absinth. vulgar. an. M. j. Sem. fenicul. & Petroselini an 3ij. incisis minutim affunde vini Rhenani ℥v. stent. simul in infusione frigida, & coletur solummodo tempore usis.*

Notandum

Notandum, cum ad corroborantium usum deventum fuerit, ægrum nullo modo esse purgandum, tantisper dum sanguinis corroborationi navetur opera.

Quod & per salium Lixivialium usum omnino observandum: quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

℞. Rad. Raphan. Rustican. unc. iij. fol. Coch. Hortens. Absinth. vulg. salviae, summitat. Centaur. & Genistæ, an. M. iij. Aurant. incis. N. iij. infundantur in Congiis vj. Cerevisiæ fortis non lupulatae, inter fermentandum, sit pro potu ordinario.

De Gonorrhœa virulenta.

Corripiunt dolor genitalium insolitus, & rotatio testiculorum, in non recutitis macula morbilli æmula glandem occupat, statim à cujus exortu liquor, seminis instar, exstillat, qui quotidie à seminis colore & consistentia recedens, flavescit tandem dilutius ovi vitello; in lue virulentiore virescit, & aqueo humori permiscetur sanguine tincto. Pustula dicta ulcus fit, aphthis infantum simile, indies latius & profundius depascens, superveniente orificii callo. Verpi non glandis ulcere, sola Gonorrhœa tentantur. Mox magnus dolor in pene, quoties erigitur, quasi manu transversus fortiter constringeretur, noctu præcipue urget, dum æger lecto incalescit. Curvatur penis à fræno contracto. Accedit ardor urinæ, inter mingendum vix perceptibilis, sed mictu finito, per urethræ ductum ductum acriter urens, maxime quia in glandem desinit. Carunculae lotii exitum quandoque impediunt, & scroti dolor ac inflammatio non nunquam superveniunt.

℞. Mass. Pil. Cochiar. maj. ʒiij. Extract. Rud. ʒj. Resin. Jalap. & Diagryd. an. ʒʒ. cum s. q. Opobalsam. f. Pilul. è singulis drachmis vj. Cap. iv. singulis Auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ seminiformis, admodum imminuantur. Postea alternis diebus ad septimanas adhuc duas; ac sub finem bis in septimana, donec humor stillare prorsus cessaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, subinde intercalari possit potio communis purgativa, cui addantur, Syr. è Spin. Cervin. & Elect. è Succ. Rosar. an. ʒij. vel, curatione minus feliciter succedente Turbith. Minerale ad gr. viij. exhiberi potest bis vel ter, diebus quatuor interpositis, vel vice Turbith. Mineral.

℞. Pil. ex duob. ʒʒ. Merc. dulc. ʒj. cum s. Opobalsam. f. Pil. iv. summo mane sumendæ.

Si æger à dicta Catharsi abhorreat, pilulas primò descriptas, tribus Auroris continuisumat, tum manè & hora quinta pomeridiana quotidie injiciatur Clyster sequens, nisi quòd semel aut bis in hebdomade, omisso Clystere, Cathartic. imperandum.

℞. Elect. è succ. Rosar. ʒvj. Terebinth. Venet. Vitello ovi solut. ʒʒ. dissolvantur in Aq. hord. ʒʒj. Colatur. adde Syr. Violar. unc. ij. M. f. Clyster.

Singulis noctibus Cap. Opobalsam. vel Balsam. è Mech. gutt. xxv. Sacch. frustulo exceptas. Hujus defectu Terebinth. Cypr. ad quantitatem Avellane substitui possit.

Sit pro potu hydrogala; at Cerevisia tenuis in pastubus.

Vel sequentem methodum aggrediatur.

℞. *Pil. ex duob.* 3℞. *Opobalsam. gutt. iij. f. Pil. n. iij.* Cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo, repetanturque alternis diebus, vel tertiâ quâque die. Diebus à purgatione vacuis injiciatur manè & horâ quintâ pomeridianâ Clyster suprâ descriptus.

Procedente curatione (quâcunque eâ demùm methodô tentetur) sanguis sub medium curationis semel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incrassans præscribatur, & medicamenta iisdem virtutibus pollentia, qualia sunt *hydrogala*, *Emulsiones ex seminib. frig.* &c.

Si Penis tumore afficiatur.

℞. *Rad. Althææ, Lilior. an. unc. i℞. fol. Malv. Verbasc. Sambuc. Hyoscyam. flor. Chamæmel. Melilot. an. M. j. sem. Lini, Fænugræc. an. unc. ℞. coq. f. q. Aq. font.* & f. f. fotus parti affectæ admovendus per horæ unius spatium bis vel ter in die.

Peractâ fomentatione, perungatur pars affecta ol. sem. Lin. rec. extract. dein *Emplast. è mucilaginibus alutæ agninæ inductum* labiis præputii tumidis circumponatur.

Si ulcus in præputii labiis, vel in subiecta Glande hæreat, tum sequens Linimentum præscribatur.

℞. *Unguent. Basilic. 3vj. Unguent. Nicotian. 3ij. præcipitat. Aq. Rosar. loti* & optime levigat. 3℞. *M. f. linimentum*, quo lintei rasura imbuatur, & ulcusculo admoveatur semper post fotûs præscripti usum.

Si scrotum tumore afficiatur, statim sanguis è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præscriptus parti affectæ admoveatur, singul. fotubus addendo *Sp. vin. Gallic. Cochl. j. vel alterum; vel Cataplasma ex Oxycrato & farina fabarum* ejus loco applicandum.

Cathartici interim & refrigerantibus modò descriptis intro sumptis utendum est.

De Lue Venerea.

Ubi aut à Gonorrhœæ mora, aut indebito astringentium usu labes sanguini imprimitur, exoritur Lues. Comparent in inguine bubones, in capite dolores & artubus, articulorum interstitiis, noctu præcipuè invadentes in lecto calido; crustulæ & porrigines in variis corporis partibus, quæ ad instar favi flavescent. Quo magis scabies diffunditur, tantò minùs æger discrucietur. In cranio, tibiis, brachiisque exostoses, ossium inflammatio & caries; ulcera phagædenica in variis partibus, sed fauces ut plurimum primò aggredientia, quæ sensim per palatum in nasi cartilaginem propagata, mox eam absumunt, ita ut fulcro destitutus nasus planè concidat. Ulceribus, carie & dolore indies exacerbatis, pereunt per vices membra; lacerum donec cadaver, & jam Superis grave humo condatur.

℞. *Axung. Porc. unc. ij. Mercur. crud. unc. j. M. f. Linimentum*, in tres æquales partes dividendum, quarum unâ brachia, crura & tibias ad tres noctes continuas manibus suis æger perungat.

Si intra tres dies post ultimam inunctionem salivatio haud procedat tum gr. viij. Turbith. Mineral. in conserv. Rosar. rubr. exhibeantur, aut corporibus minus robustis, Merc. dulc. ℥j. Sed si salivatio jam incepta prius elanguescat, quàm symptomata penitus disparuerint, exstimulanda subindè est eadem dosi Mercur. dulc.

Ptyalismus ita moderari debet, ut lib. iv. Nycthemeri spatium exspuat, aut circiter.

Si justo altius exurgat Ptyalismus, cum inflammatione nimia, atque id genus symptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus est medicamentis Catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum symptomata cessaverint, statim immutentur indusium & tori lintea; at sint ea, quæ prius usurpata fuerint.

Si Diarrhoea supervenerit, (quod plerumque accidit antequam salivatio benè assurgat) tunc sistenda est usu Laudan. liquid. ita dosim augendo, ut debitum opus absolvat.

Si os exulceretur, Aq. Ros. Damascen. vel lacte Aq. permisto, vel seq. decoct. idem colluatur.

℞. Rad. Alth. Hord. mundat. an. unc. j. sem. Cydonior. unc. ℔. coq. s. q. ad lib. ij. M. f. Gargarisma, quo sæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in Catharsi imperanda, nisi quod primis aliquot diebus liquore possético, jusculis avenac. hordeac. ac cerevisia tenui tepesacta nutriatur.

His omnibus ritè peractis, (etiamsi symptomata omnia evanuerint, ac subindè morbus penitus profligari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatur, ægro semel in septimana per 4. vel 6. vices, Merc. dulc. ℥j. exhibendus, utcunque bene se habeat, & etiamsi jam domo egrediatur.

De Fluore albo.

Quod effluit, modò album, modò pallidum, flavum, viride aut subnigrum, modò acre & erodens, tetrum quandoque & graveolens, decoloratur facies, dolet spina dorsi, prosternitur appetentia, oculi pedesque intumescunt.

Mittatur sanguis è brachio ad unc. viij.

℞. Pil. Coch. maj. ℥ij. Castor. gr. ij. Balsam. Peruv. gutt. iij. f. Pil. N. iiij. cap. horâ quartâ matutinâ, superdormiendo; repetanturque per duas alias vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.

℞. Aq. Rut. unc. iv. Aq. Bryon. comp. unc. ij. Sacchar. Crystall. q. s. f. Julapium; Cap. Cochl. iij. vel iv. in omni languore; deinde aggrediatur usum sequentium.

℞. Theriac. Andromac. ℥i℔. Conserv. flaved. Aurant. unc. j. Diascord. unc. ℔. Zingib. condit. & nuc. moschat. condit. an. ℥iiij. Pulv. è Chel. cancr. comp. ℥i℔. cort. exterior. granat. Rad. Angeli. Hispan. corall. rub. præparat. & Trochisc. de terra Lemnia an. ℥j. Boli Armen. ℥ij. Gumm. Arabic. ℥℔. cum s. q. Syr. de Rosis siccis, f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, horâ quintâ pomeridianâ, & nocte per mensem integrum, superbibendo sequent. infusionis Cochl. vj.

℞. Rad.

℞. Rad. Enul. campan. Imperator. Angelic. Calami Aromat. an. ʒ℥. fol. Absinth. Roman. Marrub. alb. Centaur. min. Calamenth. vulgar. salv. sicc. an. M. j. Junip. unc. j. incidantur minutim & infundantur in Vini Canarini ℥iv. stent simul in infusione frigida, coletur tantummodò tempore usûs.

Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab usu olerum & fructuum qualiumcunque, & singul. partibus bibat vinum Hispanicum.

De Diabete.

Succi sanguini illati per vias urinarias crudi & incocti exitum sibi quærunt, unde sensim labefactantur vires, colliquescit corpus, & quasi substantia ejus per hanc cloacam exinanitur, cum siti, ardore viscerum, lumborum còxarumque intumescentiâ, & salivæ spumosæ expuitione crebrâ.

Eadem præscribenda sunt, quæ in fluore albo, omisâ solummodò Venæ sectione & Catharsi.

De Dolore Hæmorrhoidum.

Intensissimus inter excernendum dolor excruciat, & excrementi superficies cruore conspergitur: Non nunquam tumores verrucis similes in sphinctere delitescent, vel in margine ani apparent.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. x.

℞. Sem. Melon. Pepon. an. unc. β. sem. papav. alb. ʒij. Amygd. dulc. excorticat. N. v. contundantur in mortario marmoreo, sensim affundend. Aq. Hord. ℥ββ. Aq. Rosar. ʒij. Sacchar. albiss. q. s. f. s. a. emulsio; Cap. sæpiuscule.

℞. Flor. Sulphuris, Pulv. Glycyrrhiz. Salviæ an. ʒj. cum s. q. Balsam. Lucatel. f. Pil. è sing. drachm. vj. Cap. iij. ter in die, superbibend. Emuls. præscript. Cochl. vj.

℞. Aq. Spermat. Ranar. unc. iiij. in qua dissolv. Lithargyr. ʒij. Opii ʒj. f. mixtur. cujus tantillo Linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel si tumor intus lateat, Cochl. iij. ejusdem mixturæ modo Clysteris injiciantur.

Pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aquam hordei, & à carnis usu abstineat. Singulis noctibus sumat Diacodium.

De fluxu Hæmorrhoidum immodico.

Innotescit ex viribus prostratis, copia & diuturnitate sanguinis excreti, fœdo corporis colore, ad citrinum (ut in ictero) vergente: Succedit cachexia, & deinde hydrops.

Eadem conferunt, quæ in fluxu mensium immodico, omisâ solummodò Catharsi.

De Epilepsia Puerorum.

Vel primo mense aggreditur à frequentibus nimis alvi dejectionibus; (quo in casu *Diascordium ad quantitatem grani piperis in Aq. Saxifrag. aut lacte materno solutum*, & exhibitum, præstantissimum est remedium.) Vel circa dentitionis tempus, à septimo ad decimum mensem, tussi comitata est, aut (quod multo deterius) vomitu & diarrhoeâ, viridia (ut solent hystericæ) egerente infante. Quandoque improvisò occupat paroxysmus, os oculosque distorquens, nigredine vultum perfundens, & artus varios convellens; quandoque præsentitur ex digitorum in pugnū contractione, & ex stabili & insolita oculorum orbi-

tarum

tarum immobilitate. Nunc feriùs, nunc ociùs se proripiunt paroxyfmi, certâ subinde periodô, vagô aliàs insultu revertentes : fed , appetente morte , à tergo fe invicem premunt : Si quando inducias dent , in foporem proclives funt in-
fantes , donec à novo refufcitantur insultu.

Applicetur *Emplaſtr. Epifpaſtic.* cervici quamprimum.

℥. *Aq. Epilept. Lang. ʒiij. Laudan. Liquid. gut. j. vel ij. vel plures , pro ratione ætatis. Syr. pæon. ʒj. M. f. Haufus , fumendus quamprimum.*

℥. *Aq. Rutæ ʒiij. Aq. Epilep. Lang. & Aq. Bryon. comp. an. ʒj. Syr. Caryo- phyll. ʒß. M. f. Julap. Cap. Coch. j. fingulis horis , fi haufus præſcript. paro- xyfimum non fugaverit.*

De Rachitide.

In Rachitide adfunt partium laxitas & mollities , debilitas & languor, ignavia & torpor, & inæqualis earundem nutritio, viz. caput juſto majus, facies plenior & floridior, partes carnoſæ infra caput emaciantur, nodis protuberant articuli, maximè carpi, paulo minùs tali, tument & extremitates coſtarum, oſſa incur- vantur, præcipuè tibiæ & fibulæ, hinc ulnæ & radii; aliquando femoris & hu- meri, dentes tardè & moleſtè erumpunt, vacillant, nigrefcunt, & fruſtulatim excidunt, pectus à lateribus anguſtum, anteriùs acuminatum, abdominis re- pletio, & hypochondriorum tenſio, tuſſis & pulmonum vitia laceſſunt, late- ralis decubitùs modò dextri, modò ſiniſtri averſatio.

℥. *Fol. Abſinth. Vulgar. centaur. minor. Marrub. Alb. chamædryos, Scor- dii, calament. vulg. Parthen. Saxifrag. pratens. hyper. Virg. aureæ, ſerpill. menth. ſalv. Rutæ, Card. Benediçt. Puleg. chamæmel. Tanacet. Lilior. convall. omnium rec. collect. & inciſ. an. Mij. axung. Porcin. ℥j. ſev. ovin. & Vin. cla- ret. an. ℥ij. macerentur in ollâ fictili ſuper cineres calidos per horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis conſumptionem, poſtea colentur, ut f. Linimentum, quo venter & hypochondria illiniantur manè & ſerò, ut etiam & artus hoc malo affècti, per 30. vel 40. dies, vel donec convaluerit.*

℥. *Singulor. ingredient. præſcript. an. Mij. infundantur frigidè in Cereviſiæ non lupulat. Cong. iv. pro potu.*

In Tumoribus Infantum ventres occupantibus ab Evacuationibus nimiis procedentibus.

Sanguis & Viſcera herbis corroborantibus confortentur, ut in Rachitide vera; niſi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus.

De Febribus à Dentitione ortis.

Sp. C. C. gutt. ij. vel iij. vel iiij. pro ratione ætatis in Coch. j. vel altero Aq. Ceraſor. nigr. vel Julap. alterius appropriati; exhibeantur quarta quaque horâ ad vices quatuor, vel ſex.

De Febre heçtica Infantum.

Sine inſigni calore languent cum appetitus dejectione, artus & truncus corporis emaciantur.

Rhabarb. inciſi ʒij. in lagenam vitream cereviſiæ tenuis ℥ij. capacem immit- tantur pro potu ordinario.

Epoto hoc liquore, *aliæ ℥ij. eidem Rhabarb. superaffundantur ad tertiam vicem.*

Si verò potus vi Cathartica saturatius imprægnetur, tum ℥j. epota, altera cerevisia mox adjiciatur.

De Tussi Puerorum Convulsiva.

Phlebotomia, & repetita Catharsi, eaque sola, expugnatur hæc tussis, malum aliàs pertinacissimum, & fere insuperabile; sed leniora tantum cathartica hîc conveniunt, eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

De Hæmorrhagia Narium.

Dolor & calor sinciput lancinant.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans & incrassans injungatur, Julap. refriger. & incrassans, cum Emulsionibus refrigerantibus præscribantur.

Singulis diebus injiciatur *Enema refrigerans*, atque omni nocte *Paregoric. ex Syrup. de Mecon.* exhibeatur, & semel vel bis *potio purgativa commun.* præscribatur.

Lintea quadruplicata immersa Aq. frigida, in qua sal Prunell. dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, & utrinque cervici sæpius in die.

Post Evacuationes liquor seq. applicetur.

℥. *Vitriol. Hungaric. & Alum. an. unc. j. Phlegm. Vitriol. ℥ss. Coq. tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & à Crystallis subinde natis separa, liquori residuo adde Ol. Vitrioli duodecimam partem, vel potius:*

℥. *Aq. Plantag. unc. iij. Bol. Armen. subtiliss. pulver. unc. β. probè miscantur; Turunda ex linteo raso liquore hoc humectata nari, ex quo sanguis stillat indatur per dies duos istuc relinquenda.*

Hoc minus succedente, *Vitriol. Rom. Aq. commun. dissolvatur, qua Turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta, & applicata sanguinem sistunt si ex parte externa diffuat.*

De Chlorosi.

Adfunt vultûs & totius corporis decoloratio, intumescencia in facie, palpebris & malleolis, gravitas totius corporis, crurum ac pedum tensiva lassitudo, respiratio difficilis, cordis palpitatio, capitis dolor, pulsus febrilis, somnolentia, pica, & mensium suppressio.

Sumat *Pilulas Chalybeatas*, vel *Pulv. Chalybeatum* in affectione hysterica præscript. plus minus pro ratione ætatis, superbibend. haustum vini cujuslibet ad libitum, vel infusion. corroborant. cum Rad. Angelic. ibidem descriptam. Si Ægra non valde debilis fuerit, purgetur semel vel bis ante præscriptorum usum.

De Suppressionione Mensium.

Cibum fastidiunt mulierculæ, fœdus faciei color est, gravitas totius corporis, dolores sincipitis, lumborum, crurum & imi ventris: pedum tumores infestant.

Eadem

Eadem præscribenda ac in Hysterica affectione; at si iisdem remediis affectus non cesserit, tum seq. sunt præscribenda.

Singulis Auroris, & quarta pomeridiana, sumat *Julap. Hysteric. sine Castor. Coch. v. instilland. Sp. C. C. gutt. xij.* Singulis noctibus sumat cubitum itura *Trochis. de Myrrh. ʒj. cum syr. de Artemis. in formam boli, vel Pil. redact.*

De Vomitu sanguinis, vel etiam de Hæmoptoë.

In Hæmoptoë dolor & calor pectus obsident, cum debilitate quadam.

Mittatur sanguis ex brachio dextro ad unc. x. Sequenti mane sumat *potionem purgativ. commun.* & eadem nocte *Paregoric. ex unc. iij. Aq. Cerasor. nigr. ʒ Syr. de Mecon. unc. i.*

Postea aggrediatur usum sequent.

℞. *Bol. Armen. unc. j. Pulv. Radic. Symphyt. ʒij. Terr. Sigillat. Lapid. hæmatit. ʒ Sang. Dracon. an. ʒj. Sacchar. Albiss. ad pondus omnium; M. f. Pulvis subtilissimus, cujus cap. ʒj. manè, quinta pomeridiana, & nocte, superbibend. sequent. Apozemat. unc. iv.*

℞. *Fol. Plantag. Rubi Sylvestris, ʒ millefol. an. M. j. coq. s. q. Aq. ad hbiß. in Colatura dissolv. Syrup. de Symphyt. unc. i. M. f. Apozema; vel cap. Coch. vj. sequent. Tincturæ.*

℞. *Flor. Ros. rubr. ʒvj. Cort. intern. querc. unc. ʒ. sem. Plantag. parum contus. ʒij. Aq. font. hbiß. Sp. Vitriol. q. s. ad levem aciditatem, infundatur in vase clauso, calore leni, per 4. horas; Colatur. adde Aq. cinnam. Hordeat. unc. iij. Sacchar. Albiss. q. s. ut f. Tinctura gustui grata.*

Si ab usu Pulveris abhorreat, utatur Electuario in fluxu mensium immo- dico præscripto.

Enema quotidie injiciatur, & Diacodium hora somni propinetur.

Phlebotomia insuper semel, bis, vel ter (ut opus fuerit) reiteretur, diebus aliquot interpositis, & semel iterum, si res postulet, repetatur potio purgativa.

Diæta incrassans & refrigerans observanda.

De Punctura Tendinis.

Humor aqueus, vel ichor quidam, ex orificio venæ incisæ jugiter distillat.

℞. *Rad. Lilior. alb. in lacte vaccin. ad teneritud. coct. ʒ contus. unc. iv. farin. sem. Lin. ʒ Avenac. an. unc. iij. coq. ad cataplasmatidis consistentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere, applicetur parti affectæ manè & serò.*

De Ambustis.

Foveatur pars affecta *linteis Sp. Vini imbutis*, usque dum evanescat dolor, ac deinceps de novo imbuatur *lintheum*, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur.

De Mania communi.

A nimis exaltata & vivida sanguinis crasi oritur. Est & alia mania species febres intermittentes diuturniores excipiens, in stultitiam tandem degenerans, producta quidem à debilitate & vappiditate sanguinis, à diutina fermentatione. Præscribantur itaque cardiaca generosiora, viz. *Theriac. Andromach. Electuar. de ovo. Pulv. Comitiss. Pulv. Gualt. Ravvleigh, in Aq. epidem. theriacal. vel alia, & diæta instituat analeptica.*

In junioribus mittatur sanguis è brachio ad *unc. viij.* vel *ix.* bis vel ter, diebus tribus inter singulas Venæ sectiones interpositis. Tum semel extrahatur sanguis è venis jugularibus. Postea tota curatio innitatur sequenti Cathartico, quod sumat tertia vel quarta quaque die, donec convaluerit, hoc interim observando, quòd cùm octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio Cathartici ad septimanam unam vel alteram omittatur.

℞. *Pharmac. domestic.* (i. e. *Rad. Bryon. alb.*) *pulv.* 3j. *lactis vaccin.* *unc. iv.* vel,

℞. *Ejusdem* *unc. ℔.* vel 3vj. *Vin. alb.* *unc. iv.* infundantur per noctem, in colatura dissolve *Syr. Violar.* *unc. j.* *M. f. Potio*; vel

℞. *Gambugii gr. xxv.* *Aq. Cerasor. nigr.* *unc. iij.* *Syr. Caryophyll.* *unc. ℔.* *f. Potio.*

De Contusionibus.

Mittatur sanguis è brachio lateris affecti ad *unc. x.* die seq. exhibeatur *potio communis purgativ.* ac deinceps eodem modo Venæ sectio & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decursu, si internæ partes lædantur, sequentia præscribantur.

℞. *Decoct. Pectoral.* *℔℔.* *Syr. Violar. cap. Ven. an.* *unc. ij.* *f. Apozema*; *cap. ℔℔.* ter in die. Item *Ol. Amygd. dulc. rec. Cochl. j.* sæpius propinetur.

℞. *Ol. Amygd. dulc. unguent. Dialth. & Pomat. an.* *unc. j.* *M. f. Linimentum*, quo inungatur pars læsa manè & serò, superimponend. fol. Brassicæ.

De fursure, sive porrigine capitis.

Potio purgans communis bis propinetur, dein

℞. *Ol. Amygd. Amarar. & Laurini, Cinerum fol. Abrotani an.* *unc. j.* misceantur probè, & *f. Linimentum*, quo inungatur totum caput singulis matutinis; diligenter infricando, & postea superimponendo vesicam fuillam.

At primùm abradatur totum capillitium, & postea defricentur squamulæ sensim singulis auroris, prout decidere pronæ fuerint.

De morsu canis Rabidi.

Post 40. dies aut plures melancholica adsunt symptomata, febris, sitis, hydrophobia, & tandem partium extremarum convulsio.

℞. *Sp. vin. optimè rectificat.* 3iv. *Theriac. Andromach.* 3j. *f. mixtura*, qua illiniatur pars læsa ter in die, superimponendo linteum eadem mixturâ imbutum.

De Ulcere Vesicæ.

Pus graveolens, aut sanguis, non nunquam squamulæ seu pelliculæ membranæ ac veluti furfuraceæ crustulæ (sin in renibus hæreat ulcus carunculæ minutulæ, aliquando crassiores) unâ cum urina excernuntur, perpetua dysuria & continuus earum partium dolor infestant; renibus autem affectis ulcere, dilucida dysuriæ & doloris dantur intervalla, plus etiam excretum copiosius est, album, leve & minimè foetidum, lacti similis profunditur urina: & longè post mictionem pus ab eo separatum in fundo residet.

℞. *Emplastr.*

℞. Emplastr. Flos unguent. dict. ʒiʒ. f. Pil. N. ix. cap. iij. horis medicinalibus, superbibendo sequentis Aq. Coch. vj.

℞. Rad. Fœnicul. Consol. Aristolochi & Caryophyll. an. ʒiij. fol. Agrimon. Hyper. Sanicul. Plantag. an. M. vj. incidantur minutim, & destillentur in vini alb. & lact. an. ℥iv. & eliciantur solummodo ℥ij. pro usu.

℞. Pulv. rad. Consolid. maj. & gumm. Arab. an. ʒj. Sacchar. Penid. ʒj. f. Pulv. cap. Coch. j. bis in die.

De Asthmate inveterato in iis, qui sanguineo temperamento præditi sunt.

Dividitur in tres species; Dyspnœam, quæ difficilis est respiratio, in qua crebrior densiorque est spiritus tractio ex infarctu pulmonum sine stertore oriunda: Asthma, ubi frequens & magna respiratio, in qua diaphragma, musculi intercostales, tum etiam abdominis, violenter moventur, cum stertore & sibilo. In priore specie substantia pulmonum, in posteriore bronchia opilantur. Est Orthopnœam, quæ est maxima spirandi difficultas, sub qua ægrotantes non nisi sedentes, erectâ cervice respirare possunt, Musculi etiam pectoris & scapularum vehementer exagitantur.

Mittatur sanguis è brachio dextro ad unc. x. Die sequenti sumat *portionem purgativam communem*, quæ repetatur tertiâ quâque die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis sumat sequentia.

Sem. Anis. subtiliss. pulv. ʒij. cum s. q. Balsam. Lucatell. f. pil. ex. singulis drachmis vj. cap. iij. manè & quintâ pomeridianâ, superbibend. decocti amari sine purgantibus unc. iv. calidè.

Si Symptomata adhuc maneant, repetatur de novo integer Processus.

De Paralyfi.

Sensus & motus in partibus quæ afficiuntur, vel simul, vel alterutra tantum facultas aut prorsus extinguatur, aut vitiatur.

Sumat pil. Coch. min. ʒij. alternis matutinis per vj. vices; deinde capiat ter in die per xxx. dies *Electuar. Antiscorbutic.* ʒij. superbibend. Aq. Antiscorbutic. Coch. vj. Vide in Scorbuto.

℞. Unguent. Nervin. unc. iij. Sp. Lavendul. comp. & Sp. Coch. hortens. an. unc. iʒ. M. & inungantur partes affectæ, ut spina dorsî, &c. manè & serò.

Pleraque præscriptorum, utut curationi scorbuti solum destinari videantur, attamen cum humores crudos ac fixos volatilifare præ aliis apta nata sint, in Paralyfi etiam conveniunt.

De Tussi & Phthisi.

Tussis per se patet. Phthisis autem invadit ab ætatis anno 18. ad 35. Externatur totum corpus. Febris molestat hectica, à cibo invalescens, (quæ ex celeritate pulsûs, rubedineque genarum dignoscitur) materia per tussim excreta est aut purulenta, quæ in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aquâ repletum, fundum petit. Sudores nocturni superveniunt, livescunt tandem genæ, facies pallet, exacuantur nares; temporum quoque collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denunciant.

Si Tuffis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia signa Peripneumoniam notham comitantia, accersiverit, vel si à Pleuritide, aut Peripneumoniâ, ob neglectam sufficientem Phlebotomiam, malè curatis, eadem nequaquam orta fuerit, satis erit, ut æger per dies aliquot ab usu vini & carnis abstineat, & his similibus remediis ad libitum utatur.

Balsamum sulphuris Anisatum ad gutt. x. Cochl. i. Sacchar. crystal. instillatum bis vel ter in die devoretur; ut etiam Tabellar. sequent. quas secum æger continuo portet unam frequenter assumat.

℞. *Sacchar. cand. ℥i. coq. s. q. Aq. font. usque dum adhærescat extremis digitor. tum adde pulv. Glycyrrhizæ. Enul. Campan. sem. Anis. & Angelic. an. ʒss. pulv. Irid. Florentin. Sulphur. an. ʒij. Ol. Chym. Anisi ʒij. f. s. a. Tabellæ domesticæ vocand.* atque hoc interim Eclegmate utatur.

℞. *Ol. Amygd. dulc. ʒij. Syr. cap. Ven. Violac. an. unc. j. Sacchar. cand. q. s. f. Lohoch.* de quo sæpius lambat ex bacillo Glycyrrhizæ, quando tuffis urget.

In defluxione tenui *Eclegma incrassantia* exhiberi poterint.

Sin verò Tuffis his remediis haud cessaret, (præcipuè autem si febrem comitem habeat, vel si à Peripneumonia aut Pleuritide originem ducat) tum ineptum fuerit pectoralibus fidere, sed Venæ sectione & Catharsi debellanda est, ut in methodo, quæ in curatione Peripneumonix nothæ describitur.

Verum enimverò cum, his omnibus non obstantibus, Tuffis non modò non curationi cesserit, sed & diuturnâ Pulmonum concussionem eos adeo debilitaverit, ut Phthisis tandem subingressa fuerit, tum hac methodo præcedendum.

℞. *Balsam. Peruv. gutt. x. instillantur Cochl. j. Syr. Hederæ terrestris,* vel si id minus gratum fuerit ægro, *Cochl. j. Sacchar. crystal. cap. ter in die superbibendo Decocti Amari sine purgantib. unc. iv.* vel (si idem ventrem moverit) *unc. iij.*

Sed omnibus aliis (quotquot adhuc inventa sunt) *Equitatio* ad satis longa & diutina itinera facile palmam præripit, hoc observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quàm si puer aut juvenis esset, & sanè haud multò certius Cortex Peruv. febrim intermittenti, quàm in hac ætate *Equitatio* Phthisi medetur.

De Scorbuto.

Adfunt spontaneæ lassitudines, corporis gravitas, dyspnœa, præcipuè ex motu corporis, gingivarum putrefactio, oris graveolentia, sanguinis è naribus crebra eruptio, ambulandi difficultas, crurum nunc intumescencia, nunc extenuatio, in iisdem perpetuo maculæ lividæ, plumbeæ, flavæ, aut violaceæ, faciei color plerumque ex pallido fuscus.

Extrahatur sanguis è brachio ad *unc. viij.* nisi signa Hydropis adfuerint: Seq. mane exhibeatur Potio Purgat. communis, quæ repetatur tertiâ quaque die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam postea, per mensem unum vel alterum sumat sequentia.

℞. Conserv. Cochl. hortens. unc. ij. Conserv. Lujul. unc. j. pulv. Ari compos. 3vj. cum s. q. Syr. Aurantior. f. Electuar. de quo cap. ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè, quintâ pomeridianâ, & nocte, superbibendo Aq. Raphan. compos. Cochl. vj. vel sequentis.

℞. Rad. Raphan. Rustican. rasp. ℥ij. rad. Ari ℥j. fol. Cochl. hort. M. xij. fol. Menth. Salv. Nasturt. Aquat. & Beccabung. an. M. j. Sem. Cochl. hort. parum contus. lib. β. unc. Moschat. unc. β. Vin. Alb. lib. xij. destillentur organis communib. & eliciantur solummodo lib. vj. pro usu.

Vel Folia Rec. Cochl. hortens. per se destillentur, pro usu dicto.

Porro sequens cerevisia sit pro potu ordinario.

℞. Rad. Raphan. Rustican. recentis incisi 3ij. fol. Cochl. hort. N. xij. passular. enucleat. N. vj. Aurant. Cum toto incisi dimidium, in Lagenam vitream lib. ij. Cerevisiæ tenuis capacem subere mox probè obturandam immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore Lagenæ pro usu, & post aliquot dies sex aliæ, antequam priores exhauriantur, & sic deinceps; vel,

Vice hujus Cerevisiæ seq. mixturæ Cochl. iij. vel iv. immisceri poterunt singulis haustibus potus communis.

℞. Rad. Raphan. rustic. & sem. Cochl. hortens. an. unc. β. fol. Cochl. hortens. M. ij. pulpam unius Aurant. Contundantur simul in mortar. marm. sensim affundendo vin. alb. lib. β. Coletur cum levi expressione, & reponatur pro usu.

Eadem remedia, Phlebotomiâ & Catharsi omissis, in Rheumatismo scorbuto, sive hysterico, valde profunt.

Phthisis seu Tabis Descriptio & Cura.

Plures sunt Tabis species: Prima ferè oritur è frigore hyeme contracto. Paulò enim ante solstitium Brumale quamplurimi ab ingruente tempestate frigida, tussi tentantur: Quæ cum illos invaserit quibus pulmones ab ortu sunt infirmiores, omnino necesse est ut à repetitis tussiendi conatibus magis adhuc debilitentur; atque ita tandem alimento sibi proprio assimilando, præ mala διαθήκη, prorsus impares reddantur. Hinc jam ingens pituitæ crudæ copia aggeritur, quæ continua pulmonum agitatione & vehementi nisu affatim per os rejicitur. Pulmones exinde pure referti purulenta *μίσματα* quaqua-
versum in carnes dispergunt. Hinc enascitur Febris putrida, cujus Paroxysmus sub vesperam fatigat; sub auroram verò sudore copioso ac vires imminuente solvitur. Denique ad malorum cumulum Diarrhœa succedit, partim ab humoribus putridis ex arteriis Mesentericis in intestina depositis excretisque, partim à labefactato pessundatoque viscerum Tono. Atque ita demùm æger proxima æstate fato suo fungitur, à morbo cui prægressa Hyems viam straverat, extinctus. Atque hæc præcipua Tabis species.

Porro cum sanguis hac tempestate particulis humidis admodum scateat, respiratioque à subita pororum contractione plus satis inhibeatur, particulæ hæ in pulmones depluunt per interspersos Venæ Arteriosæ ramos; vel per Ductus Salivales in glandulis fauces occupantibus reponuntur; unde jam humor per Asperam Arteriam delapsus in pulmones, Catarrhi ritu, eos ita
jugiter

jugiter irritat, ut creber & vehemens tussendi conatus, tum illam debilitatem, tum alia quæ diximus symptomata, brevi accersat. Cumque non jam amplius naturalem sibi pulmones œconomiam statumque tueri valeant. Glandulæ & Tubercula adnasci solent; quæ in ægris ex hoc morbo decedentibus, si aspiciantur pulmones, purulenta sanie plurimum distenta reperiuntur.

Ubi semel evaluerit hic morbus & radices egerit, remedia plerumque aspernatur. Tentari utcunque potest Medicatio, minuendo causam defluxionis in pulmones, pertusa in Cubito Vena, Catharticis mitioribus, tum medicamentis pectoralibus dictis, ad varios morbi status accommodatis. Incrassantibus sc. ubi humor subtilior & tenuior vim Expultricis facultatis videtur eludere: Attenuantibus verò ubi pituita crassior ægrè & cum molestia per os rejicitur. Dein & hectica Febris remediis refrigerantibus temperantibusque coercenda. Talia sunt *Lac Asininum*, *Aqua Lactis Stillatitia*, *Emulsiones ex Amygd. dulc. Sem. Melon. Pepon. Papav. alb. Aq. Fl. Paralys.* &c. Denique & curando Ulceri opera danda est; cui rei Terebinthina illa Liquida, Opobalsamum vulgo dicta, apprimè conferre censetur.

Hujusce Morbi Curatio, me Judice, hæc methodò optimè ac felicissimè instituetur. Primum educatur è brachio sanguis, dein subducatur Alyus ad tres dies continuos, vel *Pil. Coch. majoribus*, vel *Decoct. Leniente à nobis præscripto*. Tertia nocte exhibeatur *Syr. de Mec. unc. 8*. Intermisso biduo, tri-duove, pro re nata, repetatur Purgatio, idque toties fiat quoties opus esse videatur, donec symptomata vel prorsus evanuerint vel saltem mitescant. Post singulas Catharces jam finitas Opobalsami gutt. xx. Sacchari particulæ majori instillatas permixtasque nihil superbibendo. Vel *Pil. è Terebinth. ex Insula Chio cum Saccharo cando confectam*. Opobalsamum non assumendum est nisi prægressis evacuationibus debitis. Hujus loco *Electuarius è Balsamo Lucatelli, Glycyrrh. pulvere, semine Anisi & Terebinthina* concinnatum poterit substitui. Post evacuationes, sedulo conandum est ut Tussis sedetur, ne Pulmones jugi agitatione infirmiores evadant. Huc facit præ cæteris Syrupus jam laudatus, qui hac formula possit usurpari. *℞. Decoct. Pectoral. libr. j. Syr. de Mecon. Syrup. Capill. Ven. an. unc. ij. Cap. Coch. v. ter in die*. Medicamentum hoc ita frequenter haustum catarrhum in Pulmones depluentem paulatim sistet; eosque in pristinam *εὐξίαν* reducet, nisi jampridem à naturali statu nimium recesserint. Promovebit insuper purulentæ materiæ in iisdem aggestæ concoctionem.

At verò Palmarium hujusce Morbi præsidium est, ut Æger quotidie Equo vehatur. Et qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam Diætæ legibus adstrictus, nullo Cibi potusve genere privandus est: cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur. Quibusdam eorum qui ex hac methodo convalescere, tumor in collo exortus est non multum à Scrophulis abluens.

Est & alia Tabis species à Tussi prognata, longè diverso anni tempore, initio scilicet æstatis. Hæc Juvenes per sæpe illos invadit qui debilioris sunt corporis

corporis habitu, & quorum sanguis particulis calidis acribusque refertus est, Sanguinem isti è pulmonibus per tussim exantlant, nimio meri potu prius excalesfacti. Ægri dolorem sive ægritudinem quandam in pulmonibus persentiscunt: Quæ Symptomata nisi maturè remediis appropriatis eliminantur, primò scabrities, mox & ulcus accedit: unde pus confectum demum expuitur.

Dicta jam Tabis species Venæ sectione & Catharsi alternatim repetitis, saltem in principio, facile vincetur: Si Diætâ insuper Refrigerante & Incrassante utatur æger, & à carnibus in solidum abstineat.

Tertia hujus Morbi Species ortum debet materiæ Febrili in pulmones. Febre jam fatifcente, amandatæ, qui sensim infirmiores redditi à symptomatibus jam memoratis vexantur.

Quandoque oritur à sanie istâ purulentâ quæ à Pleuriticis non satis copiosè per expectorationem egeritur. Quo in casu eandem quam Empyema, Curationem postulat.

Sunt etiam qui à nimis copiosis, & debito frequentioribus evacuationibus debilitati in quartam Tabis speciem præcipitantur. Hos calor Hecticus à cibo potuque sumpto, sub noctem laceffit: Atque hos præ cæteris Aphthæ infestant.

Phthisis, seu Tabis descriptionem ac curam integram, Præclarissimus Author morte præoccupatus, absolvere nequivit, & pauca tantum, sed pro more suo quàm maximè accurata, in hoc argumento nobis reliquit, quibus in aliquale supplementum, adjicere non inconsultum credidimus Præclarissimi Caroli Leigh M.D. Phthisiologiam Lancastriensem, jam anno 1694. Londini editam. Opusculum sanè eximium, & Methodò Sydenhamianæ omnino affini conscriptum. Sit itaque



DE P H T H I S E O S

Speciebus & Causis.

C A P U T I.

Quo agitur de variis Phthiseos Speciebus & earum Causis.

PHthises in hac patriâ praxi vulgariter occurrentes ad sequentes reduci possunt, videlicet, sunt vel Scorbuticæ, Strumosæ, Chylosæ, vel Febres Epidemicas Intermittentes, Hy-

dropem, Rachitidem, Crapulas, Chlorosin, Fluorem album, Icterus, Rheumatismum Scorbuticum, Sarcocelen & Vermes sæpiùs consequuntur: nec non Hæmophysin & Vomitus Sanguinis; cum Phthises autem Scorbuticæ præ cæteris furiunt eas Choream ducere statumino.

Phthises Scorbuticæ fiunt vel ab aëre, vel à parentibus, vel ab erroribus sex non naturalibus. De iis autem quæ ab

aëre fiunt, quia locis plerisque Morbi ſtationarii appellari debent, imprimis agam. Iſtis terrarum areis quæ paludofis arenis falſis luxuriant, vel aëre fumô carbonaceô craſſeſcente tantum non epidemicè graſſantur; quæ Phænomena innuere videntur ex particulis vitriolaceis & ſulphureo-falinis. hunc morbum fomitem ſuum trahere, quò autem hæc res clariùs eluceſcat haud inconſultum duco tentamina quædam præmittere quæ auſpiciis hiſce facem ulteriorem accendant.

Imprimis. In ſalivam inſtillantur guttæ aliquot Spiritus Vitrioli, & ſtatim in coagulum album viſcoſum tranſit, quale per tuſſim in Phthiſi ſæpius eructatur.

Secundo. Guttis aliquot fontis Vitriolacei, juxta Haigh agro Lancaſtrienſi cum ſalivâ commiſtis, in coagulum viſcoſum tranſit cinerei coloris, quale in Phthiſi ſcorbuticâ haud ſemel notavi.

Tertio. Diſtillantur carbones foſſiles & aſcendet liquor Vitriolaceus, quò cū ſerô ſanguinis commiſtô, in coagulum viſcoſum tranſit, quale in Phthiſi ſcorbuticâ obſervare in proclivè eſt.

Hiſ poſitis, videlicet quòd per particulas vitriolaceas ſaliva, vel ſerum ſanguinis fit coagulum viſcoſum, ei tabidorum guſtû, conſiſtentiâ & colore ſimile.

Secundo. Quòd in reſolutione carbonum particulæ vitriolacæ catervatim ſublimantur, quod encheireſi pyrotechnicâ patet, adeoque illis atmophæra propemodum ſaturatur, cum in aëre huiusmodi Phthiſis fit morbus ſtationarius, haud abs re fore judicare exiſtimo, ibi terra rûper inſpirationem particulæ vitriolacæ mæſſæ ſanguinæ.

communicantur, adeoque ſæpè ſæpiùs Phthiſin inducunt.

Summa jam difficultas diluenda hæc eſt, nempe unde fit quod circa littorâ falſa paludofa hoc morbo tantopere inſeſtantur indigenæ, etiamſi ſolô ceſpite utuntur, cibisque fale & fumô conditis per totum vitæ decurſum abhorrent? & quomodò iſtis terrarum areis particulis ſalinis atmophæra conſtipatur? cû ſalia marina (ſicut ab eorum evaporatione conſtat) ſint fixioris naturæ, quàm ut radiis ſolaribus, vel vi ventorum aſcenderent?

Anxiè diu circa hæc cogitanti, hæc tandem conjectura in mentem mihi venit.

Obſervatu ſatis eſt obvium plagas iſtas maritimas, tam Sulphure, quàm fale luxuriare, hæc hypotheſis ſequentibus argumentis nititur.

Imprimis, Noctilucæ infinitæ horis veſpertinis hiſce quaſi tot *Phosphori* erumpentes, Sulphuris præſentiam arguunt.

Secundo, Sæpius odores foetidos emittunt, quales ex Sulphure & fale unitis percipiuntur; in hiſ itaque terris falſis paludofis, particulæ Sulphuræ fugam continuo moluntur, particulis autem ſalinis divortium haud ferentibus, particulæ Sulphuræ ſalia muratica ſecum gerunt, adeoque illis atmophæra conſtipatur; cû in aëre itaque huiusmodi Phthiſis fit Morbus ſtationarius, ibi ex particulis Sulphureoſalinis trahit Phthiſis illius pabulum ſicut opinari fas eſt.

In ulteriorem huiusce ſententiæ confirmationem argumentum è contrariô produci poteſt. Ubi hi limi ſalini deſunt hic Morbus rarò aut nunquam inſeſtat. Hinc ergò fit quòd in *Ruſſiæ* & *Nova*

Nova Angliæ quibusdam partibus per totum anni decursum tussis sonitus haud auditur, etiamsi mare sit in præcinctu; & hinc quoque forsan fit quod celeberrimus iste *Monspeliensium* aer antiphthificus evadit, etiamsi parum è Mari *Mediterraneo* distat.

Dum è contra haud in sese volvitur annus, quin Phthisis, Hydrops, Scorbustus, Febres intermittentes, & penè dixissem Morborum myriades in hisce terrarum areis truculenter grassantur; adeoque quod de terris hisce falsis paludosis tale propemodum dici potest, quale *Pythagoras*, de herbâ *Apraxi* de quâ sic talia dicit. Datur herba, radix cujus *Napthæ* ad instar ignem concipit; quique Morbo quocunque correpti sunt, hâc germinante, recidivam patiuntur, quoties illius effluvia per aërem diffunduntur.

De reliquis Phthiseos Scorbuticæ speciebus differere jam restat, de iis scilicet quæ ab erroribus sex non naturalibus, & illis quæ à parentibus derivantur. Jam verò cum Phthises ab erroribus diætæ & victû per causas allatas facile explicari possint, earum ætiologiis enodandis diutius immorari impræsentiarum inutile esset, quapropter de Phthisi Scorbuticâ hæreditariâ breviter jam attingam.

Inter omnes sanè Philosophantes foetum humanum in ovô formari ultra aleam dubitandi ponitur, de modo autem ova foecundandi haud tam bene inter se convenit Autoribus.

Ova duplici investiuntur membranâ propriisque tunicis involuti sunt, ad eò quod ne gutta quidem liquoris iis exprimi potest, hinc pro Gas quodam virili, sive aurâ feminali ovis foecundandis quidam viriliter contendunt;

in praxi tamen nihil vulgariùs occurrît quàm hunc Morbum intueri patris genium consequentem, etiamsi per totum vitæ decursum matre sat athleticè degente, quidam circa eandem ætatem cum patribus hõc Morbõ correpti sunt, alii citiùs, alii ferius, alii valetudinarii tantum vixere, alii sat pancraticè priusquam Phthisi confecti sunt, pro diversâ scilicet crasi seminis virilis, scilicet sicut spiritus eò nidulantes, magis vel minus sunt depressi, & particulæ salinæ evectæ, primis vitæ incunabulis varia format flamina vitæ, adeoque citiùs vel ferius infans vergit versus temperiem salinam, huic Morbo inducendo aptam. Ex præmissis mihi videtur inferre liceat, ab uterò semen virile per vasorum extremitates absorbetur, hinc massæ sanguineæ communicatur, & circuitu sanguinis, sicut opinari fas est, ova foecundat, arduum etenim mihi concipere videtur, quomodo hic Morbus, podagra, & calculus patris genium consequerentur, si ab aurâ seminali tantum ova foecundentur: ex præmissis patet ex quali prosapiâ huic Morbo sit origo, capite itaque sequenti venit symptomatum explicatio.

C A P. II.

*Hõc agitur de Symptomatum Serie
& eorum Causis in statu
incipiente.*

QUandoquidem Morborum scientia haud melius quàm ab eorum productis exprimitur, mihi hunc Morbum descripturo, haud aliâ videtur insistere methodo, quàm symptomatum syndrome delineanda. Milsõ itaque

olympicô pulvere cerebri circa futilia dimicantis, ea solummodô quæ ratio experientiâ suffulta dicitur brevibus aperiam.

Invadit frequenter cum appetitûs & virium dejectione, angustia pectoris, tussi titillante, sputo copiosô, crassô, albô, quandoque flavescente, pellucidô, cæruleô, cinereô, foetidô, falsô, acidô, subdulci, pro sanguinis dyscrasiâ scilicet, & obstructionum mole & geniô.

Sudoribus quandoque nocturnis, carnis intabescentiâ, calore & frigore levi & incertô alternatim succedentibus.

Urinâ lixiviali, sedimentô copiosô, albô, sæpiùs autem flavô, vel rufô saturatâ.

Aliquando diarrhoeâ, torminibus ventris, & partium extremarum tumore.

Hiscæ prælibatis Symptomatum explicationem aggredi jam incumbit.

Si de appetitu prostratô interrogemur, ideo evenire dicimus: glandulæ in ventriculi parte inferiore sitæ, quæ humores subacidos, fluxiles ex arteriis separare debent, humores viscosos elutiant, adeoque fibris nerveis titillandis (quô motû consistit appetitus) inepti sunt, hinc cibi fit fastidium, & hinc est, ni fallor, quod in quibusdam ab emeticô assumptô, tam immensam saburram viscosi phlegmatis per vomitum frequenter ejectam inspexi.

Per succum viscosum in pulmonibus extravasatum aëris inspiratio interrumpitur, adeoque angustia pectoris frequenter corripitur æger; quo pariter circa glandulas Tracheales depositô, & intra pulmones sputum

istud, ni fallor, efformat quod tantâ copiâ per tussim eructatur, ab hâc quoque trachæam oblinente raucedo procedit.

Hiscæ coagulis, folliculis in glandulis conglobatis gravidis, adeoque foraminulis lymphæ ductuum obturatis, latex serosus, qui per lymphatica peregrinare debuit, propriis emuntoriis orbatus, massæ sanguineæ regurgitat, & sic per vasa insolita eliminatur; hinc ergo ex glandulis trachealibus, imbribus penè dixissem continuis depluit, qui tussim titillantem & continuam inducit.

A pari ratione sudores tantopere profusi, diarrhoeæ, tormina ventris, & partium extremarum tumores huc collimant.

Quandoque viscosis humoribus mesenterii glandulis infarctis, Chyli transitus denegatur in sanguinem, quo pabulô diurnô orbatus, nutrimentô debitô privatur corpus, hinc vires dejiciuntur, emaciat corpus, & quandoque fœces albescunt, quapropter à viscosis hisce saburris venæ lacteæ mesenterio disparent, sicut in coelis *Galaxia* propter densas nubes interponentes.

Aliæ Chyli portiones per particulas salinas præcipitantur, & inde quandoque sputô albô, crassô, subdulci, per tussim eructantur. Aliquando per renes ablegantur, & indâ in hâc Morbo frequenter Urinæ sedimentô candidô copiosô saturantur.

Propter Musculos subsidentes humeros alatos observatur in proclivi est, quod (sicut plebeiis placet) malum portendit, quasi anima relictura corpus illius fugam appropinquantem indicaret.

ret. Hi *Hippocrati* aliisque Græcis *πρωγυδῆς* appellantur.

Propter glandulas in hepate obstructas bili transcolanti imponitur remora, quæ sanguini itaque regurgitat, ex eâ cum acidis in Sanguine effervescente, lenta febris sequenter in tabidis gliscit, & ni fallor ratio urinæ lixivialis tantâ flavescente hypostasi, & quandoque rufâ saturatæ, hinc quoque petenda est.

Quandoque calore & frigore alternatim succedentibus cruciatur æger, propter chyli acēscētis fermentationem, & inæqualem cum Sanguine mixturam.

Sputum frequenter in hōc Morbō fit crassum, album & dulce, quod (sicut prius innuimus) Chylum præcipitatum ponimus, aliquando fit tenue & pellucidum cum crassō commixtum, quod ponimus esse lympham quæ per lymphæ ductus transire debuit, propter glandulas autem conglobatas obstructas, per alia secretoria eliminatur, & in hōc quidem casu, quicumque humori huic sistendo medicamentis opiatis pertinaciter insistit, à verō deviat, & præstat *ei motos componere fluctus*.

Sputum aliquando fit cæruleum, falsum, acidum, & amarum, sicut bilis, & alia diversæ profapiæ variè cum eo miscentur.

Restat aliud Symptoma, nec minùs reliquis infrequens explicandum, viz. unde est quòd in hoc Morbo urina tam intensè lixivialis excernitur, sedimentum copiosum rufum deponens, suavem emittens odorem, parum ei dissimilem in urinis obvium post medicamenta terebinthinata, & quædam præparata Sulphuris assumpta, superficiem

gerens pelliculâ tenui oleosâ obductam? In hōc casu ponimus urinam particulis Vitriolaceis vel Muriaticis esse summopere saturatam; particulæ salinæ post ortam cum bile, effervescentiam præcipitant, adeoque urinæ tantam hypostasim deponunt: particulæ biliosæ ab effervescentiâ cum particulis salinis (sicut Sulphur ab incendiō adjunctō) rufescunt, & inde urinæ sedimentum lateritium deponunt. Particulæ salinæ oleosas quasdam particulas in fermentō incarcerant, quæ tumultu unâ cum illis per renes ablegantur, hinc urinâ aëri expositâ, particulisque fermentescentibus saturatis, particulæ Sulphuræ oleosæ divorcium conantur, adeoque in superficie pelliculam efformant, & odorem suavem emittunt; hypothese huic suffragatur Phænomenon in Spiritu Nitri dulci satis obvium, ibi etenim ab acidō cum Sulphure unitō, odor ejusmodi profapiæ observari potest.

Utrum in hōc statū tuberculis semper infarciuntur pulmones à clarissimo *Mortono* notatis; Hæc patriâ à cultrō anatomicō tanquàm à peste abhorrente, nec nego, nec affirmarem, hoc tamen (praxi suffragante) assererem; in hōc Morbō plures satis succumbere vidi, ne unō quidem symptomate Febris inflammatoriæ apparente; cui sententiæ adstipulatur Historia è Doctore *Bennet* desumpta Theatro tabidor. pagin. 96.

Cum apud *Bristollienses* Medicinam facerem, quâ urbe Pēnili tabes frequenter grassatur, nonnullos sputum subdulce levi conatu expectorantes, spatio trimestri fatiscentes, & totaliter enervatos vidi, horum verò quosdam, non omnes tussis vehementior aliquoties

corripuit, & arefcentes frigosi periere, in quorum unicæ detectionis causâ, licet Sanguinem (peractô salino ptyalismo) extuffierat, & pulmo ubique inteneratus tonum amiserat, universa spirabilia nec non viscera omnia naturalia, quoad sensum sana comperta sunt. Haud hîc intelligi velim quod in Phthisi pulmones hisce tuberculis nunquam infarciuntur, eos etenim sæpius ulceratos vidi: at hoc solummodo assero eâ Phthisi quæ tam vulgariter in agro *Lancastriensi* grassatur, quâ indies deflorescunt ægri sputum crassum album expuentes, in his dico, hujusce Morbi principiô & incrementô, rarô aut nunquam pulmones confodiuntur, imô aliquando, ægri è mediô tolluntur & (sicut opinari fas est) iis haud ulceratis, quibusdam etenim per totum Morbi decursum Febris hæcticæ symptoma haud apparuit unum.

C A P. III.

In hoc Capite Symptomata in statu confirmato recensentur, & eorum Causæ assignantur.

FAtiscente in dies naturâ in profapia propemodum vitriolaceam degenerat massa Sanguinis, hinc sputum frequenter aluminis vel vitrioli martis fit saporis, jam particulis salinis sui juris factis, effusis velut habenis hic Morbus affligit; hinc Febris fit continua & auctior, ex particulis scilicet vitriolaceis cum Sulphure Sanguinis effervescentibus, sicut ex oleis vitrioli & terebinthinæ permistis observare fas est.

Ex hac effervescentiâ vasis capillaribus circa genas distentis, inde est

quod rubor fixus genas utrasque occupat, mortis adstantis frequenter indicium; quasi vitalis flamma ellychnii ad instar, (cujus pabulum propemodum exhaustum est) receptaculô glisceret; *vel solis ad instar rubro colore hemisphærium spargentis, priusquam Cimmerias descendit in umbras.*

Conglobatis glandulis indies magis infarctis, & majori copiâ nutritiô succô quotidie præcipitatô, hinc est quod sputum sit copiosius & crassius, & ex fermentô vitriolaceô cum Sulphure Sanguinis permistô, aliquando saporis putridorum piscium.

Ex sputô copiosius in dies intra pulmones extravasatô, Asthmate frequenter corripitur æger. Et continuâ propemodum gravitate pectoris opprimitur. Sputum aliquando egregiè foetidum hîc statû quoque notavi, quod tamen haud semper ab ulcere pulmonum, sicut quibusdam placet, ortum sibi ducit, sæpius etenim hoc notavi, & patientes tam diarrhoeâ, quam sudoribus immunes, quod procul dubio haud evenire posset ulcere foetidô pulmonibus confossis, potius itaque foetoris istius causa in hîc consistere videtur, particulis Sulphureis volatilibus, particulis salinis aculeatis, hisque latice ferosô luxuriante, cum salivâ miscentur, jam particulis sulphuris ad evolandum satis aptis secum salinas vehunt, quas unitas effluviis saliva emittit, hinc sensorium olfactus tenellum vellicant, iisque itaque ingratis foetorem conciliant, sicut à contrario particulæ sulphuræ globosæ sine salinarum mixturâ, fibras olfactorias percutientes gratum odorem causant; sicut in aromatibus & balsamicis florum effluviis observare in proclivi est.

est. Grandiori mole in dies nutritio succo expectorato, hinc vultus evadit *Hippocraticus*, & corporis universi marasmus.

In dies conglobatis glandulis infartioribus, & versus temperiem salinam vergente Sanguine, hinc sudoribus profusis & diarrhoeis immanibus cruciantur ægri, nec non doloribus acutis, iis Rheumatismo versatilibus quibusdam atrocioribus, ossibus etenim in ipsis de dolore lancinante quidam conquesti sunt, iique quibus Morbum venereum suspicari nefas.

Hic Symptoma aliud haud minus commune, & summam quidem indagine dignum addi potest, strigosi plures, etiam si ad orci fauces propemodum sunt redacti, appetitu laudabili ditantur, post cibum assumptum hecticò nullo calore succedente, neque sudores, nec diarrhoeæ, nec ventriculi inflammationes adfunt; tamen in dies intabescit æger prægrandi copia sputum crassum album expuens. Auguriis nostris ex præmissis fat superque propalatis, particulis vitriolaceis frequenter luxuriare Sanguinem; circa hoc symptoma hæc conjectare liceat. Vitriolaceis particulis aculeatum naturale fermentum, ictu altiori fibras nerveas titillat, quæ quasi ab æstro percitæ, spiritus fibræ ventriculi indigeni in motus concitatiores adiunguntur, & inde est, ni fallor, quod appetitus sit voracior, esculenta quævis assumpta struthionis ad instar colliquans; hoc colliquamentum per lacteas ductumq; chyli ferum propagatum, cum Sanguine miscetur, quod in propriam naturam haud assimilatur, & inde in universi corporis nutrimentum, quin salinæ particulæ Sanguine nidulantes, in humoribus crassis hoc præcipitant, &

inde est quod alimenta assumpta etiam in Sanguinis naturam haud convertuntur, tamen nec per sudores, nec per diarrhoeas eliminantur, quin intra pulmones coagulò albò viscosò subsidunt, & inde est quod in dies intabescit æger.

Restat adhuc aliud Symptoma quod sub hoc larvatur vultu: plures hoc Morbò propemodum confectos Febris intermittens anomala frequenter invadit, quosdam semel tantum, alios bis vel ter spatio viginti quatuor horarum conquassat, ingruit sæpè cum horrore & pruritû inter scapulas, & circa regionem lumbarem, totum postea convellitur corpus per horam unam vel alteram tremulum permanens, calor postea succedit, & huic sudores & aliquando diarrhoeæ: ex lentoribus falsis circa membranas nerveas, nervorum extremitates, plexus, & glandulas subcutaneas miliares extravasatis, hæc frigoris & caloris reciprocationes procedere videntur, his ad plenitudinem aggestis, & acorem insignem nactis, partes nerveas vellicant, adeoque, ni fallor, dolores hosce frigorificos inducunt, lentoribus hisce per vasorum extremitates tandem absorptis, adeoque cum Sanguine permixtis, ex iis cum particulis Sulphureis Sanguinis nova repullulat fermentatio, calor itaque Febrilis succedit tandem autem materiâ morbificâ subactâ, aliquando per diarrhoeam amadatur. Alii in statu eufarco, etiam si animi indole dulcissimâ præditi, hoc Morbò tandem confecti, ex levi quolibet occasione irascendi ansam capiunt, itaque tam continuè ebulliunt, vix vocem vel visum alicujus tranquillè ferunt: ex succis hisce acëscantibus spiritibus animalibus continuò tanquam ab æstro percitis, sicut opinari fas est.

Hicce:

Hiscæ præmissis, de reliquis Phthiseos Scorbuticæ speciebus breviter differere adhuc restat; at cum eæ (scilicet utrùm sint hæreditariæ, vel ab erroribus in diætâ & victû) maximâ ex parte eadem vel similia symptomata præbent: verosimile mihi videtur eas à tali profapiâ oriri, quapropter earum ætiologiis explicandis diutiùs immorari impræsentiarum inutile esset; nobis itaque sufficiet in casu quolibet historiam unam vel aliam subnectere, & medendi methodum recensere.

C A P. I V.

Canones quidam generales circa hunc Morbum proponuntur.

IN hõc Capite Symptomata in statu deploratõ recenseri debent, at cum nullus sit propemodùm è plebe, quin in hõc statu ægro ex hõc vitæ curriculum manumissionem pronuntiet, diutiùs hisce immorari extra propositum esset; nobis itaque sufficiet Canones quosdam generales circa hunc Morbum proponere, exque iis medendi methodum efformare.

Canon primus:

In statu simplici incipiente facillè curatur Phthisis.

In statu complicato incipiente, visceribus & lymphaticis salvis, bonum sit expectandum.

In statu confirmato, difficulter, tamen quandoque curatur.

In statu confirmatõ complicatõ aleares est dubiõ plena.

In statu confirmatõ complicato, visceribus vel lymphaticis insanis, nil nisi malum sit pronuntiandum.

In statu confirmatõ Phthises hæreditariæ inducias frequenter patiuntur, rarò autem vel nunquàm curantur.

In statu confirmatõ, modò Febris adsit, lactinia sunt vitanda, in hoc quoque casu chalybeatis abstinendum est.

Urgente dyspnœâ, etiamsi catarrhò titillante infestetur trachæa, ex opiatistamquàm à peste fugiendum est.

C A P. V.

Hõc Capite medendi methodus in statu incipiente proponitur.

INtentiones in hoc stadio variis indicationibus respondentes ad sequentes reduci possunt.

Imprimis, Per emetica, vel lenia Cathartica, primæ viæ ex saburrâ viscosâ sunt detergendæ.

Secundo, In adultis Phlebotomiam semper proficuum inveni.

Tertio, Pulmones ab humoribus crassis sunt liberandi.

Quarto, Glandulæ infarctæ sunt aperiendæ.

Quinto, Temperies salina Sanguinis sit alteranda.

Sextò, Lymphæ succedentis in Pulmones defluxus sit præcavendus.

Medicamenta intentioni primæ respondentia, hæc vel similia esse possunt, quibus forma liquida arridet sequentia præscribi possunt.

Si Emetico opus est.

℞. Mell. Scillitic. ab ℥ij. ad ℥iiij. Aq. Cardui, hyssop. aa. ℥ij. syrûp. scabios. compos. ℥ß. M. S. F. Emeticum.

Si per Catharsin alvus sit subducenda, sequentia in usum veniunt.

℞. Decocti

℞. Decocti Senæ Gereonis ℥iiij. si-
rup. de spinâ cervinâ ℥i℥. crem. tar-
tari 3℔. aq. lumbricor. 3ij. M. S. F. P.
cum regimine sumend. Vel;

℞. Decocti Senæ Gereonis ℥iiij. Man-
næ Calabrinæ 3j. tincturæ sacræ 3j. crem.
tartari 3℔. aq. lumbricor. solutione gum-
mi Ammoniaci saturat. 3j. M. F. P.

Cum regimine sumend. huic sirup.
Rosar. solutiv. addi potest, pro re natâ.

Quibus forma pilularis arridet hæc
vel similia esse possunt.

℞. Pil. Stomach. cum gumm. 3j.
de ammoniacô Magistral. 3℔. tartari
vitriolati gr. vj. resin. jalapp. gr. vj.
Balsam. Peruv. q. s. F. Pil. No. 7. cum
regimine sumend. Vel,

℞. Pil. aloëphangin. tartarear. Quer-
cetan. aa. gr. IO. de ammon. 3℔. tartari
vitriolati gr. vj. resin. jalap. à gr. 6. ad
IO. Balsam. Peruv. q. s. F. Pil. No. 7.
cum regimine sumend. his Calomelas à
gr. I4. ad 3j. addi potest pro re natâ.

Quibus sit in animo Bolus, talis
esse potest.

℞. Elect. lenitivi 3vj. crem. tartari 3j.
syr. ros. q. s. f. bolus cū regimine sumend.

Pro puerulis doses & formæ variari
possunt, scilicet, pulveres de Rhabarbar.
senâ, Calomelan. resinâ jalappæ, & id
genus aliis; nec non Elixiria; & tinctu-
ræ (inter quæ tinctura sacra & Elixir
Salutis cæteris palmam præripiunt.)

Quibusdam cerevisia medicata præ
cæteris allubescit, & in eo casu talis
esse potest.

℞. Folior. senæ, Rhabar. polypodii quer-
cini aa. 3ij. epithymi 3i℥. pini, tama-
risçi summitat. aa. Mij. folior. becabung.
Mij. hederæ terrestris Mv. salviæ agre-
stis Mij. radic. 5. aperientium aa. 3ij.
lapath. acut. 3vi. baccar. juniperi 3j.
cortic. aurantior. No. vj. F. sacc. pro

tribus cong. cerevisiæ; dos. ℥ij. aurorâ
quâlibet, vel alternâ sicut vires fe-
rent. Phthisin incipientem tempore ver-
nali hac sola cerevisia haud semel cu-
ravi. Intentioni tertiæ, quartæ, &c.
medicamenta sequentia respondent.

℞. Conserv. Cynosbat. 3iiij. corall.
rubri 3iij. syrup. balsamic. q. s. F. Elect.
horis medicis sumend. Vel,

℞. Conserv. Cynosbat. florum cicho-
rei aa. 3i℥. extract. trifolii fibrini 3℔.
animæ martis ab insigni Vigani pp. 3j.
gumm. ammoniaci in aq. lumbricor.
solut. 3j. florum Benzoin. 3j. cum s. q.
syrup. balsamic. Tolutan. F. Elect. eo-
dem modô sumend. Vel,

℞. Conserv. Cynosbat. lohoch. de
pulmon. vulp. aa. 3i℥. enulæ Campan.
condit. 3℔. aristolochiæ rotundæ 3i℥.
glycirrhizæ 3ij. hederæ terrestris præ-
paratæ 3iij. florum sulphuris 3℔. syr.
de Erysimò q. s. F. Elect. Vel,

℞. Conserv. Cynosbat. 3iiij. martis
cum sulphure pp. 3iij. sal. spirituos. 3j.
cum s. q. syrup. è cortic. citri. F. Elect.

Electuariis præscriptis, sicut dysp-
næa magis vel minus urgebit, species
diaireos, solutio gumm. ammoniaci in
aq. lumbricor. fact. flores Benzoin.
extract. enulæ, radix aristolochiæ ro-
tundæ, addi possunt, vel omitti, sicut
medico videbitur idoneum.

℞. Syrup. Balsamic. Tolutan. è succ.
hederæ terrestris, capillor. veneris aa.
3iij. f. syrup.

℞. Aq. lactis alexiteriæ ℥ij. limac. ma-
gistral. 3ij. gentianæ cōpos. 3iij. lumbric.
3j. sacchar. perlat. q. s. F. julapium.

℞. Ingredientium q. s. ad ℥ij. decocti
pectoralis; adde radic. sarsæparil. 3i℥.
chinæ, fœnic. bardan. urtic. caryophyllat.
aa. 3vj. aristolochiæ rotund. 3℔. sem. anisi,
coriandr. urtic. aa. 3ij. passular. exacinat.

℞. baccar. juniperi ʒj. c. c. rasur. eboris aa. ʒv. folior. hyperici, capillor. veneris, hederæ terrestris, marrubii albi aa. Mj. coq. in aq. fontan. s. q. ad ℥iiij. colaturæ adde vini albi ʒiv. mell. despumat. sacchar. cand. albi aa. ʒij. M. F. Apozema usus eximii in asthmate & gravitate pectoris.

℞. Aq. limac. magistral. lumbricor. aa. ʒiiij. sirup. balsamic. Tolutan. de Prassio, Allio vel Erysimo aa. ʒj. spir. sal. armoniaci è gumm. ammon. distillat. ʒij. M. F. mixtura. Vel,

℞. Aq. lactis alexiteriæ ℥iʒ. gentian. compos. ʒvj. limac. magistral. ʒiʒ. sacchar. q. s. F. julapium.

℞. Pulveris milleped. pp. ʒiiij. radic. aristolochiæ, gumm. ammoniaci in aq. lumbricor. solut. aa. ʒiʒ. florū Benzoin. ʒʒ. extract. enulæ; croci an. ʒj. Balsam. Peruv. ʒj. sulphuris anisat. q. s. F. pil. mediocres in dyspnœa usus egregii. Vel,

℞. Florum Sulphuris, gumm. ammoniaci aa. ʒij. enulæ campan. aristolochiæ rotund. glycirrhiz. Ireos Florentin. aa. ʒj. sem. anisi ʒij. picis liquidæ Barbaeos partes iv. Balsam. Peruv. partem j. M. F. Massa pilularis. Vel,

℞. Balsam. Tolu. ʒiʒ. milleped. pp. ʒij. gumm. ammoniaci depurat. ʒiʒ. florū Benzoin. ʒj. Myrrhæ ʒj. Balsam. sulphuris anis. gut. 12. succi glycirrhiz. in tinctura croci solut. q. s. M. F. massa dos. ʒʒ. vel ʒij.

℞. Pulveris milleped. ʒiiij. animæ martis ʒj. gumm. ammon. in aq. lumbricor. solut. ʒj. extract. trifolii fibrin. q. s. F. pil. mediocres.

℞. Cinnabar. antimonii ʒij. F. pulvis. Capiat bis in die: Panacæa quoque antimonii Doctoris Needhā egregii sit usus.

℞. Pini summitat. Mij. folior. beccabung. Mij. salviæ agrestis Mij. ca-

pillor. veneris, hederæ terrestris, aa. Mij. radic. lapath. acut. ʒvj. baccar. juniperi ʒj. cortic. aurantior. N. 6. F. sacc. pro tribus cong. cerevisiæ.

℞. Pini, tamarisci summitat. aa. Mij. folior. beccabung. Mij. hederæ terrestris, capillor. veneris aa. Mvj. salviæ agrestis Mij. radic. osmund. Regal. ʒiv. enulæ campan. ʒij. lapath. acut. ʒvj. 5. aperientium aa. ʒij. sarsæparillæ ʒvij. baccar. juniperi ʒj. sem. anisi ʒʒ. cortic. aurantior. N. vij. F. sacc. pro tribus cong. cerevisiæ, de qua cap. ad ℥ij. in die cum sirup. & pil. prius præscriptis. His debitè adhibitis medicamentis ulterioribus vix opus est; quò autem intentio ultima omni ex parte perfici potest, externa etiam in usum veniunt v. capitis rasura, fontanellæ, vesicatoria satis ampla, quæ revera tussim Phthysicam tutius & magis radicitus tollunt, quàm medicamenta quævis opiata formâ quacunque sumpta, ingenuè etenim fateor ex opiatis copiosius sumptis, nil nisi inducias incertas mihi adhuc observare contigit.

C A P. VI.

Quo agitur de methodo in statu confirmatō.

INtentiones in statu secundo à prioribus tantum minutiis distant, nisi quòd in hoc stadio Catharses mitiores esse debent, Phlebotomia si omninò, manu tantum parciore sit celebranda; jam calor febrilis, qui vehementius exæstuat præ singulis sit temperandus: ad calorem febrilem temperandum varia ex variis Autoribus præscribuntur; pulveres scilicet testacei, antihectici,

conservæ, antidoti, analeptici, Julapia refrigerantia, emulsiones, & id genus alia, at ingenuè fateor in hoc statu, hac vel tali methodo haud Phthisin semel radicitus sanatam vidi; missis itaque ambagibus, ad Cortic. Peruvianum (modò adsit pulmonum ulcus) semel in die tantum exhibitum tanquam ad Asylum fugiendum est, hoc tantum observando, quòd tunc temporis pectoralibus fortioribus insistendum est, & die quolibet tertiò, vel alternò per catharsin levem alvus sit subducenda; hac methodo appetitum prius totaliter prostratum statim restitutum vidi, & calorem febrilem totaliter debellatum. Et cum ita se res habet ad coronidem methodo inceptæ imponendam, ad pectoralia detergentia, aperientia, & antiscorbutica mitiora, confugio, in hòc itaq; statu methodus sequens vel similis observari potest.

Imprimis si vires ferent Emeticum lene exhiberi jubeo: *v. g.*

R. Mell. scillitic. ℥iij. aq. cardui, hyssop. aa. ℥ij. sirup. scabios. compos. ℥℔. M. F. Emeticum. Ab hòc assumptò sæpius ingentem massam viscosi Phlegmatis per Vomitus ejectam inveni.

Aurorâ sequenti leve Catharticum exhibendum curo, scilicet cum quòdam ex iis cap. priori præscriptò: at si diarrhoea adsit, quæ sæpius in hòc morbo occurrit, infusionem sequentem exhibendam suadeo.

R. Aq. lactis alexiteriæ ℥vj. gentianæ compos. ℥iv. limac. magistral. ℥i℔. lumbricor. ℥℔. sal. tartari ℥ij. aq. menthæ fortioris ℥j. Rhabar. optimi incisi ℥℔. F. s. a. infusum de quo cap. 6. Cochlearia manè, Aurorâ qualibet tertiâ vel alternâ.

Ad calorem temperandum,

R. Conserv. Cynosbat. ℥iv. Cortic. optimi Peruv. pulverisat. ℥j. cum s. q. sirup. balsamic. Tolutan. F. Elect.

Methodus pro pectoralibus & antiscorbuticis ex cap. priori desumi potest, pro re natâ utenda; diætam ex cibis eupeptis instituo, jusculis scilicet, carnibus ovinis, vitulinis, pullis, ovis forbilibus, & id genus aliis, religiosè observando à lacticiniis abstinere; modò febris adsit, liquores pectoralibus & antiscorbuticis medicatos instituo. Hâc methodo quamplures ultra suos & omnium amicorum spes perfectæ sanitati restitui.

C A P. VII.

Quo agitur de Phthisi in statu deplorato.

IN hoc stadio remedia tantum palliativa exhiberi possunt, & vulgariè quicquid exoptat æger concedo. Utcunque ut ægri & amicorum votis importunis modò quocunque satisfacerem, remedium aliquod symptomatici maximè urgenti respondens præscribo. Universo scilicet marcere jam corpus colliquatur, & frequenter summo opere gutturis dolore lancinante laborat æger, tali scilicet, quòd vix aut ne vix deglutire potest, hinc lac asinum si haberi potest, ejus autem defectu vaccinum, per se, vel decoctis pectoralibus balsamicis exhibendum curo, haustu autem quolibet guttis aliquot olei tartari per deliquium, vel pulvere quodam testaceo commistò, quantum scio remediis ulterioribus haud opus est, quapropter his coronidem imponam.

HISTORIÆ
IN
STATU PRIMO.

Observatio I.

Carolus Fleetwood, Generosus & magno ingenii acumine, oppido de *Kirkham* Chirurgiam factitans, in carnis intabescentiam incidit, tussi laborabat gravi, & nycthemeris spatio saburram ingentem albi viscosi Phlegmatis expuebat, appetitus prostratus erat, quandòque Cochlearia aliquot Sanguinis expuebat, flatibus intumuit ventriculus, lassitudine spontaneâ & debilitate corpus universum macerabat. Me tandem in subsidium vocato, lenitivam potionem præscripsi, & semel repetendam institui, postea syrup. martis *Willisianum* cerevisiâ pectorali bis in die sumendum suasi, & horâ somni guttas aliquot Balsam. Peruv. cum syrupo Balsamico Tolutano, brevi tempore cessavit tussis, ipse vires recuperavit, & jam pancreaticè valet.

Observatio II.

Gilbertus Ousy de Chorley Caufidicus, post Febrem tertianam Catarrho continuo correptus erat; sputum crassum album expuebat, pulsus erat debilis & celer, calor & frigus sæpius in die alternatim succedebant, vultus erat pallidus, musculi totius corporis flaccidi, appetitus totaliter prostratus, vires dejectæ, & sudoribus nocturnis propemodum colliquatus. Electuarium cum cortic. Peruv. horâ quartâ

pomeridianâ sumendum suasi, aurorâ & horâ somni, pil. pectorales, sirupos Balsamicos deterfivos, & julapia pectoralia præscripsi, die quolibet tertio, 6. cochlearia infusi de Rhabarbaro in aquâ lactis alexiteriâ fact. sumenda imperabam, postea pil. pectorales & sirupos cerevisiâ pectorali sumendos institui, hâc methodo sanitatem pristinam recuperavit, & jam firmâ valetudine fruitur.

Observatio III.

Jacobus Sherdley Baccalaureus in Artibus, & celeberrimo viro Domino *Price* de *Blackburn* Curatus, incidit in tussim gravem, angustiam magnâ laborabat pectoris, sputum crassum copiosum expuebat cum Sanguine commixtum, vultus & oculi flavescebant, urina parca & lixivialis erat cum sedimento rubro, appetitus prostratus erat, & magnâ quidem debilitate laborabat. Electuarium cum Cortice Peruviano præscripsi, postea pil. pectorales, sirupos Balsamicos & Apozema deterfivum horis medicis sumenda suasi. Et postea pil. pectorales cerevisiâ pectorali aperitivâ semel septimanâ: nec non infusum de Rhabarbaro, vel dos. pil. stomach. cum gumm. & de ammoniaco magistral. sumenda suasi horâ somni; his assumptis evanuit morbus, & firmâ valetudine magnâ cum laude muniis jam solitis obitur. Eâdem, vel methodo simili *Evan Mandsley* de *Penwortham* sanitati restitui.

Observatio IV.

Dominus *Blackhurst* de *Preston*, tēpore vernali Anno 91. modò sequenti hōc Morbō laborabat, angustiam tantâ

tantâ pectoris constrictus erat, ut lineis tantum quibusdam describendis creber recurreret halitus, ab imò anhelans pectore; tussi continuâ titillante tempore decubitus infomnis jacuit, expuit sputum tenue, pellucidum, horis autem matutinis crassum, & quandoque æruginosum subflavum, vultus pallefcebat, intumescere pedes, appetitus prostermitur, & vires indies labefactabant. Eruptio miliaris cutem universam conspurcavit, urina erat exigua & lixivialis, & sæpius in die de calore & frigore conquestus est; in subsidium accersitus, statim Phlebotomiam celebrandam institui, & fontanellam in brachio secandam, leves Cathartes repetendas, præscripsi, electuario postea sequenti usus est, dosi quâlibet superbibendo haustum decocti amari alterantis.

℞. *Pulveris Ari compos. ʒiʒ. martis pp. ʒj. sal. spirituosi ʒj. conserv. cichorei, becabung. recenter fact. aa. ʒii. cum s. q. sirup. Chalyb. F. Electuarium.*

Hoc repetendum imperavi, & bis in die cum cerevisiâ pectorali sumendum brevi vires recuperavit, & ab hoc Morbo perfectè convaluit. Annò sequenti Dominæ perillustri connubiò conjunctus erat: & sex circiter mensibus elapsis recidivam passus est, rursus ad me misit, tunc temporis autem tertianâ epidemicâ me suspirante, Dominus *Parsons* in auxilium vocatus erat, eum quâ methodo tractavit nescio, in dies autem in pessum abiit, & hyeme sequente ad me rediit, at quantum mutatus ab illò! marasmò universali jam confectus erat, vultus erat *Hippocraticus*, Febris continua, rubor fixus genas utraq; occupavit, dolore lancinante guttur quotidie terebratur.

Cortic. Peruv. alcalicis, Balsamic. antiscorbuticis, remediisque aliis appropriatis incassum tentatis, auspicante vere, fatis succubuit.

HISTORIÆ

IN

STATU SECUNDO.

Observatio V.

DOminus *Wood* de *Kirkham* B.A. cum per totam hyemem gravi laborasset tussi, initiò veris me in auxilium vocavit; strigosum perfectè inveni, se quidem ad extremum marcorem redactò, nycthemeri spatiò libram unam vel alteram sputi viscosi cærulei eructabat, glutine propemodum tenacioris; de dolore laterali quotidie conquestus est, & magnâ constrictione, & quasi mole pectoris, & debilitate tantâ, quòd vires vix ei sufficerent ab aliâ tori parte ad alteram sibi movendo, urina lixivialis fuit, sitis autem parva, vel nulla, nec quantum meminì de calore quodam insigni conquestus est; imprimis bolum purgantem ex electuario lenitivo præscripsi, postea decoctum ex radicibus 5. aperientibus & salviâ agresti vice potius communis institui, deinde per mensis spatium pro potui communi decoctum amarum alterans, & traumaticum solummodò concessi, horâ somni linctu sequenti usus est.

℞. *Sirup. capillor. veneris, è succ. hederæ terrestris, balsamic. Tolutan. aa. ʒj. specier. diaireos ʒiiij. gumm. ammoniaci in aquâ lūbricor. solut. ʒj. florum Sulphuris ʒʒ. cum s. q. sirup. de 5. radicibus.*

dicibus. F. linctus, cap. cochlear unum horâ somni cum gut. 4. Balsam. Peruv. initio Aprilis, sumpsit de cerevisiâ pectorali aperitiva bis in die & perfectè convaluit, quod adstantes omnes tunc temporis pro mirò habuere. Anno 89.

Observatio VI.

Johannes Veale Armiger per totam hyemem gravi catarrhò correptus fuit, Ann. 90. initio veris ad me accedit, tunc temporis vultus erat pallidus & perfectè Hippocraticus, tussis continua & sicca, horis autem matutinis sputum crassum sanguinolentum expuebat, tantâ raucedine correptus erat, vix ut ullus vocem illius caperet, appetitus prostratus erat, sudoribus nocturnis propemodùm colliquatus, de angustia & pondere pectoris conquestus est, & continuis intestinorum torminibus; urina lixivialis erat, & scabies sicca manus præcipuè foedavit.

Imprimis decoctum lenitivum cum tincturâ sacrâ præscripsi, postea usum pilular. pectoralium, siruporum & decocti pectoralis, per 14. dierum spatium institui, & deinde pilulas pectorales & sirupos, cum cerevisiâ pectorali per mensis spatium; ab his sanitati restitutus fuit, & jam pancreaticè vivit.

Observatio VII.

Rogerus Threlfal tunc temporis vicò de Crosmore habitans, Anno 91. ad me misit; vultus erat pallidus & macilentus, nec non tabe universali macerabat corpus, sudoribus continuis, & Febre lentâ laborabat, nec non tussi continuâ, expuit & sputum crassum foetidumque, quandoque sanguinolentum; imprimis bolum purgantem ex electuariò lenitivò præscripsi, & deinde usum cerevisiæ pe-

ctoralis aperitivæ per mensis spatium institui, nocte qualibet horâ somni cepit gut. aliquot balsam. Peruv. in sirup. Balsamico Tolutan. & perfectè convaluit.

Observatio VIII.

Filia natû maxima Gulielmi Towning de Weeton, An. 91. tempore vernali ad me accessit; vultus erat pallidus, oculi concavi, nares acutæ, humeri alati & insigni quidem extabescentiâ totius corporis laboravit. Febris erat continua, sitis intolerabilis, tussis continua, aspera arteria perpetuò titillans, parùm vel nihil expuens nisi horis matutinis, & tunc sputum crassum eructavit, appetitus prostratus erat, & urina sedimentò copiosò albo saturata; ei infusum de Rhabar. in aquâ lactis alexiteriâ præscripsi, nec non pil. pectorales, electuarium cum cortice Peruviano, sirupos pectorales, & cerevisiam pectoralem, & ab his sanitati restituta fuit.

Observatio IX.

Gulielmus Farington de Ormskirk, Pharmacopola, & in arte quidem istâ hujusce Patriæ decus, pleuritide correptus erat, cui gravis successit Catarrhus, nycthemeri spatio libram unam vel alteram sputi pellucidi, saporis vitrioli martis per tussim eructavit, de gravitate & mole pectoris continuò conquestus est, indies extabuit corpus & appetitus prostratus erat, nec non calculi sæpius cruciante paroxysmo laboravit, in consiliò conjunctus cum medicò fideli & prudenti Doctore Grundy, Phlebotomiam repetendam imperavimus, & catharSES lenes repetendas pro renatâ, & usum pil. pectoral. Apoze-matis, & mixturæ pectoralis institui-mus,

mus, ab his valetudinem recuperavit, & per totam æstatem magnâ cum laude artem suam exercuit, tempore hyemali recidivam passus est, rursus in subsidium vocatus, methodum similem præscripsi, & julapia pectoralia succo millepedum imprægnata, his autem haud cedente morbo cursum chalybeatum temperatum institui, & quia de mole ventriculi cōquestus est, emeticum ex melle scilliticō propinandum suasi, à quō copiosè evomuit, & saburram ingentem viscosi Phlegmatis eiecit, hinc dolor & moles ventriculi evanuit, & tussis parvas inducias dedit, brevi autem tempore redeunte calculi paroxysmō, repullulavit Morbus, hinc suasi ut Morbi syndromen delinearem, eamq; celeberrimo *Gibbonsio* communicarem; his transactis vir celeberrimus aquas *Spadanenses* propinandas suavit, & cursum temperatum Chalybeatum: nec non *Bochetum* ex sarsaparillâ, pulveres quoque cinnabaris antimonii, pil. de styrace, liquores ex cerevisia *Brunswicensi* cum antiscorbuticis destillatos instituit, his horis medicis deglutitis, spes nova salutis affulsit, redeunte autem calculi paroxysmō rursus Morbus revirescebat; hinc æstate elapsâ *Thermas Bathorenses* adiit, rediit autem cum arundine lateri hærenti, expuit jam copiosius & crassius, & saporis ingrati, hecticō calore & Febre inflammatoriâ immunis, fatis succubuit.

Observatio X.

Anno 91. *Gulielmus Tate* de *Blackburn* siccâ laborabat tussi quâ nihil emolitus est, nisi horis matutinis, urina erat exigua & coloris cerevisiæ *Brunswicensis*, lingua sicca & nigrescens, sitis continua, extenuatio universalis

corporis, partes extremæ ad molem insignem tumuere, asthmate frequenter correptus erat, & pulmones tantâ mole oppressi vix *palmae ad instar depressæ* resurgebant, in pectore sibilus perpetuus aures percutit, cui talis ratiocedo succedit, ut vix sermo perceptibilis, tandem medicō istō expertissimō *Doctore Grundy* mecum in consilio conjuncto, methodum sequentem institui; Imprimis per leves catharthes alvum esse subducendam, deindè fontanellam in brachio celebrandam, & sequentia præparata.

℞. *Pulveris millepedum* pp. ʒiij. *Species diaireos* ʒiij. *gumm. ammon. in aquâ lumbricor. solut.* ʒj. *florum Benzoin.* ʒss. *conserv. cynosbat.* ʒiv. *cum s. q. sirup. Balsamic. F. Elect. bis in die cum sirup. & cerevisiâ pectorali aperitivâ sumendum, his adhibitis modicum salutis statum recuperavit, & adhuc muniis solitis obitur.*

Observatio XI.

Georgius Longworth de *Eccleston*, Anno 90. me in subsidium vocavit, vultus erat virido-nigrescens, appetitus prostratus, tussis continua & sicca nisi horis matutinis, quo tempore Phlegma lividum viscosum emolitus est, his successit extenuatio corporis, partes extremæ tumuere, torminibus intestinorum inducias vix ferentibus cruciatus est, urina coloris fuit nigrescentis, & hic revera ab omnibus adstantibus conclamatus; Morbum Phthisin scorbuticam judicavi, & methodum sequentem institui, leves catharthes imperavi, deindè Electuaria Chalybeata horis Medicis cum cerevisiâ pectorali aperitivâ sumenda, & perfectè convaluit.

D E

P H T H I S I

I N

P A R T I C U L A R I.

C A P. I.

De Phthisi ab Hæmoptysi.

Observatio I.

Vir insignissimus *Petrus Bold* de *Bold*, Armiger, à celeberrimo nec minùs antiquo *Stēmate* oriundus, & animi nobilitate inter eos illius ætatis facillè primus, Anno 92. ætatis 35. in gravem hæmoptysin incidit, mecum insigni Doctore *Grundy* in auxilium vocato, Phlebotomiam repetendam inculcavimus, nec non haustus succorum hederæ terrestres, plantaginis, becabungæ, & aliorum ejusmodi profapiæ julapiis refrigerantibus sumendos instituimus, ab his sedato fermento Sanguinis, ad vasa disrupta consolidanda, vel saltem hiantia constringenda, balsamica restringentia præscripsimus, ex *Balsamo* scilicet *Tolutano*, gumm. *Arabic.* & id genus aliis, postea ad præcavendam putredinem à Sanguine pulmonibus extravasato, decocta pectoralia balsamica deterfiva, nec non linctus, pilulas pectorales, & medicamenta talis profapiæ formis diversis institui-
mus; his debitò adhibitis cessavit hæmoptysis, & tussis, & revera sanitati restitutus erat, ad recidivā autem præcavendam ingurgitationem acidularū & cursum Chalybeatum temperatum

instituiimus, & evacuationes per *Epi-
crisin* diebus intermediis intercalandas. *At proh dolor!* vir celeberrimus indole animi dulcissimā præditus, ut tesseram hospitalē haud confringeret, liquores spirituosos nimis copiosè ingurgitavit, & brevi postea catarrho correptus fuit, tussis fuit sicca & clangosa; horis autem matutinis Phlegma viscosum subflavum ex glandulis per excreationes, & pulmonibus per tussim eructavit, indies emaciavit, appetitus dejectus erat, urina magnā ex parte suppressa, & sibilus continuus in pectore aures percutit; hinc pectoralia balsamica deterfiva, liquores antiscorbuticos, mixturas succo & infusione millepedum imprægnatas instituimus, his autem haud cessit Morbus; versùs autem hecticum calorem indies vergebat, ad hunc supprimendum corticem Peruvianum medicamentum *Herculeum* judicavimus; illius autem usu tunc temporis, hâc in regione vix lanuginem adepto, inculcavimus Morbi Syndromen delineandam, & quibusdam *Collegii Regalis Londinensium* communicandam, hinc viri celeberrimi Doctores *Rateliff* & *Gibbons* in subsidium vocati sunt, & doctissimus *Dr. Gibbons* methodum ex Cortice Peruviano, & lacte Asinino instituit; his debitò adhibitis Morbus inducias passus est, brevi autem repullulavit virus, hinc sputum crassius & copiosius, Febris adauctior, diarrhœa immanior, dolor terebrans fauces continuo infestavit, tumuere pedes, rubor fixus genas utrasque occupavit, quo tempore omnibus sibi cognitis lachrymas vi nullā coercendas effudentibus, quasi in tot *Niobes* conversis, fato irresistibili è medio tollitur.

Obser-

Observatio II.

Dominus Fletcher de Cartmell Mercator vir ingenio peracri, & totus negotiis deditus, Anno 89. in gravem Hæmoptysin incidit, nycthemeri spatium librarum aliquot purpureæ massæ dispendium passus est, ne loqui potuit quin ore pleno sanguinem eructavit; in auxilium vocatus, statim Phlebotomiam celebrandam institui, sanguis & eductus fuit tantoperè spumofus, haud adhuc similem vidi. Ingurgitationem julapiorum refrigerantium, & succorum institui, sedato fermento sanguinis, decocta pectoralia pro potu communi institui & ad catarrhum sistendum pilulas sequens.

℞. Succus hederæ terrestris per insolationem depurat. ℥j. florum farfaræ siccæ. summitat. hyssop. salviæ, pulegii aa. M. sem. anisi, carvi, fœniculi dulc. cōtus. aa. 3℔. distillantur in B.M. ad medietatem, deinde F. colatura, quæ distilletur ad consistentiam pilular. addendo succi glycyrrhiz. 3℔. pulv. radic. enulæ campan. flor. sulph. aa. 3iij. flor. Benzoin. 3j. Balsam. Peruv. 3℔. tincturæ sulph. 3iij. Ladani Parisat. 3ij. M.F. massa formetur in pilulas exiguas & sumat iij. hora somni; & primo manè cerevisiam pariter pectoralem antiscorbuticam præscripsi, cui folia linguae cervinæ addenda curavi; hac methodo perfectè convaluit per aliquot annos, & per plures annos pro potu communi lac cum aqua commixtum solummodo sumpsit: tribus annis elapsis recidivam passus est, rursus in auxilium vocatus Phlebotomiam celebratâ sequentia præscripsi.

℞. Conservæ Rosar. rubrar. cynosbat. an. 3iij. pulv. santal. omnium aa. 3℔. coral. rubri pp. 3j. croci martis rubicundissimi 3ij. sal. prunel. Div. cum

s. q. sirup. è coral. F. Elect. horâ somni & primò manè sumend. ad quantitatem nucis myristic. superbibendo haustum julapii sequentis.

℞. Aq. lactis pectoralis Batean. ℥j. portulac. spermatis ranar. an. 3iv. sirup. è succ. hederæ terrestris 3ij. sal. prunel. 3j. M. F. julapium; pro potu communi decocta pectoralia institui, & horâ somni gutt. aliquot Balsam. Peruv. è cochlear. sirup. Balsamic. Tolutan. quoties recidivam passus est hac methodo usus est, & nullò negotiò sanitatē recuperavit, annò elapso repullulavit virus, quo tempore me in agrum Eboracensem accersitò, vir præclarus ad medicamentâ veterina quasi valentissima auxilia confugit; tunc temporis autem Phlebotomiam manu liberali celebratâ fermentum sanguinis haud sedari potuit, hinc cortic. Peruvianum dosi prælargâ exhibendum curavi; hoc debitò adhibitò Morbus inducias passus est, & de magna constrictione pectoris jam conquestus est, & sputum crassum copiosum eructavit; hinc pil. pectorales deterivas, julapia pectoralia & sirupos præscripsi, & leves catharses repetendas institui, vires autem & carnes in dies labefactabant, tandem Kensington adiit, quo loco post lunarum aliquot circuitus fatis succubuit.

Observatio III.

Richardus Tinkler de Poulton hospes, cum diu gravi Hæmoptysi laborasset, gravi catarrho magnoperè emaciatus erat, appetitus prostratus, & reverâ unâ voce pronūciarunt omnes ei nulla vestigia retrorsum; in auxilium vocatus; Phlebotomiam repetendam inculcavi, die sequenti levem potionem exhibendâ curavi, & postea remedia sequentia.

℞. Conserv. Cynosbat. 3iv. sal. martis, Balsam. Peruv. aa. 3j. specier. di-

trion. santal. aa. ℥i℥. cum s. q. sirup. Balsamic. Tolutan. F. Elect. ex hoc sumpsit bis in die cum sirupis & decoctis pectoralibus, postea per 14. dierum spatium acidulas Larbricenses copiose ingurgitavit, perfecte convaleuit, & jam pancreaticè valet. Methodo simili Henric. Stirrup. Servus Edvardi Hyde Armigeri, post dispendium librarum aliquot Sanguinis ad integram sanitatem rediit.

Domina perillustis Domin. Marsden de Frekleton ex mensium suppressione toties Hæmoptyses passa est, post potiones lenitivas purgantes per electuaria chalybeata, & infusiones amaras chalybeatas nullò negotiò ad sanitatem rediit.

P H T H I S I S

Ex

Vomitu Sanguinis.

INsignis Domina Domin. Farington de Shaw Hallè, Confors Georgii Farington Armigeri, An. 91. æstivò tempore pro vomitu tantum Sanguinis dispendium passa est, vix fuit inter vivos habenda, algore universali correpta fuit, sudoribus algidis, pulsus & respiratio vix perceptibiles vox deficit, & ab omnibus conclamata fuit. In subsidium vocatus, sequentia præscripsi.

℞. Cortic. Peruv. ℥j. corall. rubri, hæmatit. croc. martis restringent. aa. ℥j. confec. Hyacinth. ℥ij. conserv. cynosbat. ℥iv. cum s. q. sirup. Balsamic. Tolutan. F. Electuarius horis medicis ex Julapio sequenti sumend.

℞. Aq. spermatis ranar. Cinnamom.

hordeat. tenuioris aa. ℥iij. boli armen. ℥j. sirup. coral. ℥i℥. F. Julapium.

His quarta vice dosi debitâ deglutitis rediere vox, respiratio & pulsus; & de dolore terebranti pulsatili ventriculi conquesta est, Dom. Worthington de Wigan Chirurg. expertus Apostema ventriculo pronuntiavit, ei autem sententiæ mecum Dr. Grundy reclamavit, quapropter ut methodò præscriptâ insisteret inculcavimus, diebus aliquot elapsis clysmata injicienda curavimus, & ingentem massam sanguinis instar picis nigrescētis per sedes ejecit, remediis sumptis, & semel repetitis, leves catharces instituimus, decocta Balsamica; & cerevisias pectorales, ab his ad sanitatē rediit, nisi quòd vicibus quibusdam de Phlegmate viscoso Bronchiis pulmonum adhærente conqueritur, levi autem conatu cum pectoralibus balsamicis deterfivis evanescit.

Phthisis ab Hæmorrhagiâ uterinâ.

Domina Towning de Weeton uxor Gulielmi Towning, cum per plures menses hæc laborasset, à magnò dispendiò sanguinis frequentes Lypothymias & quandoque paroxysmos hystericos patitur; ad fermentum sedandū sanguinis, Electuarius cum cortic. Peruviano pro basi præscripti, Antidoti autem vires morbo impares fuere. Quapropter electuarius sequens (cujus vires in eodem casu in dominâ Sudel de Preston expertus fueram) statim præscripsi.

℞. Corall. rubri pulverisat. succini flav. boli Armen. sanguinis draconis aa. ℥ij. sem. plantaginis, vitrioli martis, croci martis

martis restringentis aa. ℥j. cum s. q. conservæ de cynosbat. & sirup. de rosis siccis F. El. horis medicis Julapio sequent. sumend.

℞. Aq. melissæ, lactis alexiteriæ, cinnamom. hordeat. aa. ℥iij. confec. hyacinth. 3j. sirup. myrtini ℥j. M. F. Julapium.

His debitò sumptis fluxus cessavit sanguinis, & ipsa gradu lentò indies vires recuperavit; vere sequenti de doloribus continuis versatilibus conquesta est, flatibus admodum molestis, appetitu prostratò, calore & frigore sæpiùs in die alternatim recurrentibus, nec non de continuâ siti, & reverà perfectè strigosa fuit, ossibus scilicet nil nisi cute pendulâ adhærente. Hinc sequentia præscripsi.

℞. Pulveris Ar. compos. 3vj. florum sal. armon. 3b. animæ martis Vigani 3j. conserv. cynosbat. cochleariæ aa. ℥iib. lujulæ 3b. cum s. q. sirup. de cortic. citri. F. Elect. horis medicis cum julapio sequent. sumend.

℞. Aq. lactis pectoralis ℔j. limac. magistral. gentian. compos. aa. ℥iib. lumbricor. 3j. sacchar. perlat. q. s. F. julapium. in dos. quâlibet instillat. gut. 7. spiritus sal. armoniaci succinati.

His cum regimine deglutinis, & levi catharsi cum cerevisiâ aperitivâ antiscorbuticâ semel septimanâ repetitâ, integrè convaluit, & onus jam *Lucinæ* gerit.

Phthisis ab Impetigine.

Quam *Græcorum & Arabum* impetigines inter se discrepant, mihi brevitati studenti, Morbumque descripturo *Meridiano*, uti loqui amant

Mathematici, calculatum, à metâ propositâ alienum foret. In summâ tamen hoc dici potest hic Morbus Medicamentis vulgaribus rarò cedit, & priusquam pulmones illius venenò conspurcantur, post salivationem repetitam Morbum repullulasse novi. In hoc Morbò symptomata præ cæteris vulgaribus ad sequentia reduci possunt. Rubris, duris tuberculis vultus aliæque corporis partes defœdantur, his maturitatem adeptis squamæ furfuraceæ ab iis decidunt, tussi molestâ, tempore præsertim vespertino, corripitur æger, parùm vel nihil expectorans, nisi copiam satis amplam sputi pellucidi; frigore continuò horis antemeridianis convellitur, huic calor & sitis succedunt, adeoque inter duo extrema breves tantùm dantur induciæ. Dolores pungentes tantoperè fauces infestant, ut vix loqui vel deglutire valeat æger. Appetitus totaliter prosternitur. In hoc Morbo, cum statum confirmatū attigit æger, sputum est copiosum, crassum, foetidum, cærulei, quandoque rufi coloris. In veneno quodam fomes Morbi consistere videtur, quale autè sit parùm scio, conjecturam tamen proponere liceat; verosimile mihi videtur in hoc Morbo particulis salinis acidis luxuriare sanguinem, & genus nervosum, quæ cum particulis Sulphureis massa sanguinis eliminantur, adeoque more sublimati cujusdâ cuticulæ adhærent, sicut in tentamine sequenti conspiciere fas est; fume aceti acerrimi q. v. super lentum ignē impone organo quodam communi, vas linteo raro cooperies, particulæ Sulphureæ metallicæ unâ cū fumis acescentibus sublimabunt, & operculo forma sicca albescente adhærent, squamis impetiginosis parùm dis-

crepantes. His accedunt rationes sequentes, istis coelorum plagis hic Morbus præcipuè grassatur, quibus particulis atmosphaera constipatur falsis, scilicet paludosis, & summa hujus Morbi antidotus carne viperina consistit, cujus præcipua virtus acido infringendo constat, methodus medendi nititur, catharticis, acidulis, viperarum & millepedum præparationibus, cerevisiis antiscorbuticis mitioribus, antivenereis, nec non pectoralibus balsamicis. Historias plures recitarem, at in hoc casu nomina affigere forsan ingratum foret.

Phthisis à Rheumatismo Scorbutico.

Observatio I.

INter personas provectioris ætatis propè fluvios falsos habitantes hic Morbus vernaculus appellari potest. E quorum numero Dominus *Ashton de Lea* propè *Preston*, Anno 92. me in auxilium vocavit; tunc temporis præter Atrophiam universalem, arenulis quoq; propemodum confectus erat, per totum diem cruciatu immunis mansit, toro autem haud citius se commisit, quin *Hydra* nova reviresceret; insomnis per totam noctem frequenter decubuit, quandoque eò usque furoris Morbus advectus est, circa mediã noctem, lecto quasi tauro *Phalaridis* aufugiit, & levaminis causã per horam unam vel alteram cathedrã propè ignem se appofuit; appetitus prostratus erat, & vix nosocomium *Skeleton* quoddam magis visui objiceret. Calore & siti immunis fuit, nec ullã tussi afflictus fuit. Imprius potionem sequentem præscripsi.

R. *Decocti senæ Gereonis* ℥iij. *sirup. de spinã cervin.* ℥j. *diacnicu* ℥ss. *crem.*

tartari ℥ss. *aq. lumbr.* ℥ij. *M. s. F. P. cum regimine sumend.*

R. *Pulveris Ar. compos.* ℥vj. *florum armon.* ℥ss. *animæ martis Vigan.* ℥j. *extracti trifolii fibrini* ij. *conserv. cochleariæ, flavedinis aurantior.* aa. ℥ij. *cum s. q. sirup. è cortic. citri F. Elect. horis medicis julapio sequenti sumend.*

R. *Aq. lactis alexiteria* ℥j. *gentian. compos.* ℥iij. *limac. magistral.* ℥ij. *lumbricor.* ℥j. *succ. express. milleped.* N. 500. *sacchar. perlat. q. s. F. julapium.*

His deglutitis cerevisiam antiscorbuticam aperitivam institui, æstivo tẽpore acidulas *Larbricenses* ingurgitavit, & sanus evasit. Vere sequenti repululavit virus, methodum similem præscripsi, altius autẽ veneno tincto systemate nervoso, conatus omnis irritus fuit, hinc post summos cruciatus, pedes, tibiæ, & femora tumuere, quapropter mortem adstantem pronuntiavi, hinc vir probus, tunc temporis *populari Empirico* oppido *Prestoniensi* suo more medicinam factitanti, (columnis scilicet oppidanis schedulis suis obtectis) *panacæis theatri* se commisit. *Medicaster circumforaneus* etiam si *Atrophiam* in summo gradu adstantem conspiceret, nec morbum nec vocis quidem etymologiam cognovit, quin certam ac subitanam medelam promisit, at brevi tempore fraus *fallentis* detecta fuit, post mensem etenim unum vel alterum fatis succubuit.

Observatio II.

Illustrissima Domina Domina *Fleetwood* de *Penwortham*, cum cachexiã Scorbuticã diu laborasset, totam propemodum antiscorbuticorum *encyclopaediam* tentasset, parum autem levaminis recepit, *Thermas Bathonienses* adiit, conatus

natus autem omnis adhuc irritus erat, tandem suasu viri celeberrimi Doctoris *Baynard Coll. Regal. Londinens.* Socii, tunc tēporis herculeo successu, & summō ingenii cum acumine agro *Lancastriensi* artem Apollineam factitantis, *acidulas Eboracenses* adiit, has copiosè per mensis spatium ingurgitabat, & sæpius septimanâ balneō istō frigidō, *Saint Mungus* caractere insignitō se lavabat. Hinc dolores Rheumatici & Calor hecticus penitus debellati sunt, & per plures annos valetudini restituta fuit. An. 90. recidivam passa est, rursus *acidulas* ingurgitavit, & Morbus inducias passus est, verè autē repullulavit virus, & jam particulis salinis saturatō sanguine, indies vires labefactabant, tantā anorexiâ correpta fuit, ut à cibi usu vomitus in immanes incideret, & frequenter bilis æruginosæ copiam immensam eructaret, remediis quamplurimis incassum tentatis, indies sitis & calor hecticus eam affligebant, expuit phlegma viscosum cinereum, & quandoque æruginosum, asthmate postea correpta fuit, hinc Sanguinis uncias aliquot à brachiō sumendas suasi; Sanguis eductus crassa pelliculâ glutine tenaciore obtectus erat, hinc alcalicis, volatilibus, petoralibus, deterfivis, & antiscorbuticis cujuscumq; generis incassum tentatis, rediit Asthmatis paroxysmus, aphoniâ correpta fuit, & supremam clausit diem; hoc notavi, post dominæ celeberrimæ ab *acidulis* & *balneis frigidis* per totum Morbi decursum solummodò quid levaminis accessit.

Phthisis à Rachitide.

IN hoc Morbo tantopere vultus albescit, quòd nive propemodùm can-

didior infans, adeoque muscoli flaccescunt, vestimenti ad instar penduli cutis circumambit corpus, crura & pedes tantopere vacillant, corpori sustentando inepta evadunt, durities planæ & amplæ abdomine frequenter interspersæ, quæ idiomate vernaculo *Liver-cake* audiunt; tussi corripitur æger, & quandoque diarrhœa. Febris lenta, & siti continua. In *medullâ spinali* mihi fomitem Morbi consistere videtur, in hac quibusdam illecebris spiritus animales irretiti, influxu debitō spirituum privantur nervi ab ea ramificantes, hinc nervi & fibrillæ musculares pabulō diurnō orbatæ flaccescunt, & consequenter emaciat corpus, & incurvantur ossa: in hac etenim tenella ætate, quòd membra sint firma & recta, necesse est musculos membra circumambientes esse spiritu irriguos, aliter ex inæquali nutritione necesse est partes à situ naturali declinent, similiter ad erectionem istius floris *Heliotropium* dicti *radii solares* requiruntur, quod detractō lumine solari vultu torvo & pendente terram despicit. Propter spiritus nimis parcè fluentes albescit vultus, emaciat corpus, vacillant pedes, acescit Sanguis, hinc tussis, Febris lenta, & quandoque diarrhœa; Humores viscosi intra fibrillas musculares extravasati, durities prædictas constituere videntur. In infantibus methodus medendi constat ex linimentis nervinis, medicamentis volatilibus, specificis, inter quæ prima jure *ens veneris* & radix *Osmundæ regalis* recenseri debent. In Adultioribus methodus medendi constat ex medicamentis chalybeatis, decoctis & cerevisiis aperitivis, aquis mineralibus *acidulis*, *balneis frigidis*, & id genus aliis.

alijs. Methodo priori infantes viro-
rum illustrium *Ambrose Pudsay* de
Bolton Hale, agro *Eboracensi* Armi-
geri, & *Johannis Franc.* de *Preston*
convalescere. Posteriori Methodo ab
ipsis orci faucibus *Edmundus Forde*,
filius natu maximus *Lanceloti Forde*
de *Kendale*, sanitati restitutus fuit.

Phthisis à fluore albo.

INtemperiem salinam Sanguine mu-
tato, lentorum colluvie luxuriat pur-
purea massa, hinc viscosa saburra ven-
triculis infarcitur, quapropter nec edu-
lia assumpta recte concoquit, nec ma-
le concocta Sanguis assimilatur, hinc fit
quod magna chyli portio albô fluore
præcipitatur, portiones aliæ intra pul-
mones subsidunt, hinc tussi corripitur
æger, & sputum falsum viscosum al-
bum copiâ prægrandi eructat. Intu-
mescunt frequenter pedes; quod Sym-
ptoma ab eadem falsedine Sanguinis
deduci potest. Lenta Febris gliscit
indies ex salinô fermentô sicut mihi
videtur orta. Eruptiones miliares per
cutim universam frequenter intersper-
sæ sunt, & lumbago dolorosa sum-
mopere torquet, albescit vultus, &
caro indies intabescit, quæ Sympto-
mata per causam allatam facile expli-
cari possunt. Methodus medendi con-
stat in primis viis detergendis, massâ
Sanguineâ invigorandâ, & partibus
continuô humorum fluxu tonum amif-
fis, constringendis; Remedia huc col-
limantia, sunt emetica scillitica, ca-
thartica aperitiva, chalybeata, & bal-
samica parum adstringentia. Ab his
Serenissimæ quædam Dominæ oppido
de *Preston* & *Kendale* sanitatem inte-
gram recuperavere.

Phthisis à Chlorosi.

FOeminis quibuscunque bene se
habentibus, à natura infit ferment-
tum quoddam internum, à pubertate
finita ad senectutis usque lanuginem,
hujus gratia per quemlibet lunæ de-
cursum solennes suas evacuationes ha-
bent, ex quibus suppressis pleuritidem,
peripneumoniam, rheumatismum, &
phthisin haud semel pullulasse notavi.
Ab æstuantis quodam animi desiderio,
& vitio ventriculi fermento, hæ sæ-
pissimè suppressiones contingunt, qua-
lis autem profapiæ fermentum sit
menstruale haud magis forsan à priori
explicari potest, quàm fluxus & refu-
sus Oceani *Cynthiae* motum quasi tot
satellites observantes. At ne altum
silentium profiteamur, liceat conje-
cturam proponere; Chlorosin grave
quoddam animi desiderium consequi,
amorem scilicet, vel moestitiam, om-
nibus in propatulo est, nec non appe-
titum diætæ cujuslibet obscœnæ, cre-
tæ scilicet, calcis, carbonum & id
genus aliorum; Sanguinem in hoc
Morbo detractum semper glutinosum
inveni, & ventriculum viscosâ saburrâ
repletum, ex quibus opinari liceat,
ex pathemate quodam graviore spiriti-
bus nimium oppressis, vel circa quen-
dam appetitum æstuantem, copiâ ni-
mis prægrandi absumptis, penû spiri-
tuum diurno privatur massa Sangu-
inis, ex quô fit quod particulæ San-
guinis tenaciores tardius motæ arctius
cohærent & viscosæ fiunt, sicut in
tentamine sequenti videre est.

Rx. Aq. & glutinis, q. v. vase quo-
dam super ignem impone, dum parti-
culis igneis partes aquosæ circumagi-
tantur

tantur, efficiunt quo minùs particulæ tenaces cohæreant, & liquidæ manent, amoto autẽ igne, statim viscosæ fiunt; pariforsan modo dum particulæ ferofæ & segnes in massâ Sanguinis, vi spirituum circumagitatur, serum Sanguinis manet liquidum & lentoribus immune, cæstro autem amoto, spiritibus scilicet pathemate quodam nimium oppressis, vel appetitu quodam nimium absumptis, particulas segnes tardius movent, adeoque strictiùs cohærent & viscosæ fiunt, huic sententiæ suffragatur clarissimi *Sylvii* autoritas pag. 304. à mœrore autem solent humores reddi glutinosi ac viscosi, maximè in tenui intestino, & quidẽ propter succum pancreaticum idcirco factum austeriorem, modus reverà quò succi glandulares à quodam pathemate vehementi acefcunt, haud aliter ichnographiam admitti, quantum ego conjectando valeo, quàm liquores fermentescibiles ab ictu fulminis acefcientes. Methodus medendi sumitur à vomitoriis, catharticis, amaris detergentibus, volatilibus, martiatis, & aquis acidulis naturalibus & artificialibus, historias penè infinitas recitarem; at brevitati studens has omitto.

Phthisis Chylosa.

Post Febres cujuscunque generis inter infantes præcipue hic Morbus contingit, quapropter verosimile videtur conflictu Febrili spirituum penus summoperè absumitur, hinc in salinam dyscrasiam degenerat massa San-

guinis, & verosimile pars serosa Sanguinis per salia coagulatur, adeoque lentoribus glandulæ mesenterii infarciuntur, quapropter in intestina regurgitat Chylus; & si lacteæ totaliter obstruuntur emarcescit corpus, intumescit abdomen, albescunt fœces, & gravi tussi laborat patiens, quândoque lacteæ totaliter haud oppilantur, & hinc fœces haud albescunt, intumescit tamen abdomen, & emaciat corpus propter lacteas quasquam oppilatas; hoc symptoma frequenter notavi. Phthisis hujusmodi lentò procedit gradu, tractu tamen temporis, glandulæ infarctæ mesenterii strumofæ fiunt, & quandoque glandulæ pulmonares, & in isto stadio conclamatum est. Methodus medendi quæ mihi præ cæteris arridet, & quæ spem rarò aut nunquàm abludit, modò sit in principiò, vel augmentò Morbi, sumitur à catharticis aperitivis, inter quæ *Elixir Salutis* cæteris palmam præripit, diebus intermediis pilulas *extrifolij fibrino*, gum. *ammoniacò*, & *animâ martis* instituo, nec non in adultis *Electuaria Chalybeata*, & *cerevisias pectorales* aperitivas, *ens veneris* & *radix osmundæ* regalis egregii sunt usus, & ubi vermium suspicio, *æthiops mineralis*, abdomen sæpius in die linimentis emollientibus & aperitivis illiniendum inculco, & gestare *Sylvii* Emplastrum carminans, opiò omisso. Hæc methodò, filia natu maxima *Domini Smith*, de *Stalming Grange*, & fœmina quædam propè *Whitle hill* habitans, sanitati restitutæ fuere. Plures recitarem; ad umbilicum autem jam ducere incumbit.

Hic est finis Phthisiologiæ Lancastriensis; redeamus jam ad ea quæ restant de Clarissimi Thomæ Sydenham Processibus integris, &c.

T H O-

THOMAS SYDENHAM, DE PODAGRA.

EXeunte Januario aut incipiente Februario ingruit horâ fere secundâ matutinâ, dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque verò calcaneum, furam, aut talum; mox sequitur rigor cum horrore & febricitatione aliquali, dolor gradatim intenditur, (de pari passu rigor atque horror recedunt) idque in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, nunc tensionem violentam, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram, & coarctationem exprimens, hinc præ exquisito dolore, nec lintheorum superincumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussionem ferre Podagricus valeat; dolor non sedatur, nisi ante horam secundam, tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthemeri spatio à primo appulsu) & jam leni madore perfusus æger somno concedit, à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Sequenti die, fortè etiam ad biduum, triduumve dolet non nihil pars affecta, idque vehementius advesperascente die, levatur autem sub galli cantu. Intra paucos dies alter Pes eodem dolore torquetur. Postquam utrumque pedem exercuerit dolor, qui sequuntur Paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum durationem, atque ex serie horum paroxysmolorum, constat paroxysmus, qui dicitur Podagræ diuturnior breviorve, pro ægri ætate in iis qui vegetiores sunt, & quos Podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim, in senioribus, atque iis quos sæpius afflixit, duobus mensibus ferè desinit, iis verò, qui vel annis, vel diuturniore morbi mora fracti sunt, non prius valedicit, quam æstas jam adultior eam fugaverit.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, cum sedimento rubro, & quasi arenulis referto, alvus ferè constipata est, *Appetitus* prostratio, rigor totius corporis sub vesperam integrum Paroxysmum comitantur, recedentem Paroxysmum excipit pedis affecti inter digitos pruritus vix ferendus, unde decidunt furfures, & pedes desquamantur.

Haftenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, cum verò vel ab indebita medicatione turbatur Podagra, vel ob diuturnam morbi pertinaciam corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur; jam manus, carpos, cubitos, genua, aliasque regiones occupat, quandoque unum, pluresve digitos distorquens, fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemque concreciones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancrorum æmulantes, non nunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, ferè ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur cum rubore, non nunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili, at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger ferè undequaque contractos, & impeditos, ita ut claudicet; & permolestè prorepit. Urina illam calore imitatur, quæ in diabete excernitur, dorsum, aliæque partes molestè pruriunt, maximè sub horam somni.

Post multos, dirosque cruciatus Paroxysmi subsequentes, (naturâ partim onere materiæ peccantis partim senio oppressâ) ægrum quoad dolorem clementius

tius tractant, at loco doloris consueti, ægritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo spontanea, quandoque etiam propensio ad diarrhœam superveniunt, quæ symptomata evanescent, quoties articulos dolor fatigat, atque ita nunc dolore, nunc ægitudine, quasi alternatim laceffentibus, Paroxysmus longas moras necit.

Calculus Renum in quamplurimis parit hic affectus.

Fœminas perrarò infestat; easque, non nisi jam vetulas, & viragines, puerosque, & juvenibus minores vix adoritur.

Indicatio Curativa in eo vertitur, ut coctioni consulatur, indigestionibus sublatis, seu fit per Pharmaca, seu victus rationem, seu exercitationem, seu alia ex istis qualibet quæ sex res non naturales indigitantur.

Venæ sectio, Catharsis, ac Diaphoresis scopum non attingent, licet iis qui Renum simul Calculo, & exinde orto Mictu sanguineo laborant, non abs re erit semel in septimana, alvum Mannâ subducere, & singulis noctibus, post Purgationem Paregoricum exhibere.

Medicamenta, quæ prædictæ indicationi satisfaciunt, ea sunt, quæ moderate calent; & vel amaricant, vel linguam leniter feriunt, talia sunt, Rad. Angelic. enulæ, fol. Absinth. cent. min. chamædr. chamæp. &c. quibus addi possunt Antiscorbutica dicta, ut, Rad. raph. rustic. fol. Cochl. hort. nasturt. Aq. &c. quæ tamen parcius usurpanda veniunt, quia morbi fomiti aculeos subdunt, & calorem augent, præ istis aliis, quæ miti calore, atque amaritudine, ventriculum corroborant. Haud inutile est Electuar. sequens.

℞. Conserv. Cochl. hort. unc. iß. Absinth. rom. flav. Aurant. an. unc. j. Angel. condit. unc. mosch. cond. an. unc. ß. Theriac. Androm. ℥iij. Pulv. ari comp. ℥ij. cum q.s. Syr. Aurant. f. Elect. de quo sumat ℥ij. bis in die superbibendo seq. Aq. destillat. Cochl. v. vel vj.

℞. Rad. raphan. rustic. incis. unc. iij. Cochl. hort. M. xij. nasturt. Aq. becabung. salv. menth. an. M. iv. cort. aurant. No. vj. nuc. mosch. cond. No. ij. cerv. Brunsvicens. ℔vij. destillantur organis communibus, donec solummodo ℔vj. aquæ eliciantur pro usu.

Hæc autem remedia digestiva, constanter, atque omni adhibita diligentia, assiduè usurpanda, & in Paroxysmorum intervallis præcipuè in usum revocanda sunt.

Mediocritas ea in cibo observanda est, ut neque plus alimenti ingeratur, quam ventriculus concoquere valeat, neque è contra nimia abstinentia, partes ea proportionem alimenti defraudentur, quæ earundem robur & vigorem sustinere potis est. Quoad qualitatem autem ciborum, ægri palato consulendum est, & unica ciborum specie singulis partibus vescatur, de cæteris, dempta carne, prohibitu comedat, modo nec acria, nec sale condita sint, nec aromatis. Prandere tantum expedit, loco autem coenæ indulgeat sibi haustum cerevisiæ alicujus tenuioris, quo calculi concretio impediatur.

Liquores optimi sunt, qui neque ad vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem, ne frigore suo lædant ventriculum, deprimuntur. Hujusmo-

di est *Cerevisia tenuis Londinensis*, aut multa aqua cum paucò vino permixta, aqua autem pura & cruda periculosa est; cum autem universa ferè corporis substantia in podagram degeneraverit, à liquore quocunque fermento quantumvis levi, & tenui abstineat, & utatur *Decocto Diætico ex Sarsa*, in remedium formulis descriptò, ubi primum à paroxysmo convaluerit, per reliquum vitæ cursum.

Sin autem æger à longo, & nimio liquorum inebriantium usu, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino nequeat concoquere, in partibus haustum vini Hispanici sibi indulgeat, *Apozema Diæteticum* abdicans.

Æger, maximè hyemis tempore, maturè lectum petat, diluculo exurgat, animus sit tranquillus, nec nimis intentus studiis, & rebus seriis, cæteris verò omnibus, exercitatio corporis quotidiana, facilè palmam præripit, quæ moderata sit, & perseverans, nullo autem modo iusto vehementior; quoad exercitii genus, quoties nec grandior ætas, nec calculus intercedant, reliquis præferenda est equitatio constans, ac assidua aëre salubri, aut vectio in curru.

Veneris lenociniis ne indulgeat. Remedia externa nulla adhibenda.

Quamvis nihil magni in paroxysmo tentandum sit, conducet tamen fortasse per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, à carnibus abstinere, jusculo uti avenaceo, aut alio pari alimento; sin autem spiritus animales ataxiam concipere apti sunt, non expedit à carnibus abstinere diutius quàm ventriculus earum usum aversetur, nè quid autem vel in quantitate, vel in qualitate ciborum aut potùs peccet.

Symptomatibus iis occurrendum est, à quibus æger in paroxysmo de vita periclitatur, horum maximè familiare est, ventriculi languor, cum ventris torminibus, tanquam à flatu, hoc in casu, nihil æquè votis respondet, ac vini Canariensis haustulus subinde deglutitus, exercitio utatur æger, sin autem Symptoma, inducias haud ferens, mortem minitetur, modo caput malum non impetat, ad *Laudan.* statim confugiendum, viz. gutt. xx. in haustulo *Aq. Epidem.* & in lecto ad quietem se componat; hac ipsa methodo se ab imminente morte liberavit Autor clarissimus, ubi ex errore aliquo, circa res sex non-naturales, in ingentem ventriculi ægritudinem incidit, cum vomituritione, aliquali ventris dolore; artus interim, ex retrocessione materiæ Podagricæ, doloris erant expertes, ac ad motum plus solito habiles; Congium nempe unum liquoris possetici, vel cerevisiæ tenuis devorabat, & quam primum totum per vomitum rejecerit, Vini Canar. haustulum, cui instillatæ fuerint *Laudan. liq. gutt. xviii.* fumebat. Quod si huic remedio symptoma non cedat, sudor provocetur, methodo & medicamentis huic usui dicatis ad biduum, triduumve, mane & vesperi per duas tresve horas continuas.

Si autem metastasis fuerit materiæ peccantis in Pulmonum lobos, liberatis artibus à dolore, & tumore, tractandum est hoc symptoma, pari modo ac Peripneumonia absoluta, venæ sectione scilicet repetita, diætâ, & remediis refrigerantibus, & incrassantibus, purgandus est insuper æger, inter venæ sectiones, potionibus lenientibus, sudoris autem provocatio obest.



INDEX

MORBORUM quorum Curatio in Process. Integr. &c.
habetur.

A.

DE Abortu præcavendo Pag. 514
Ambustis 523

Angina 500

Apoplexia 507

Asthmate. 525

C.

Canis rabidi morsu 524

Chlorosi 522

Cholera Morbo 511

Chorea sancti Viti, 506

Colica biliosa 510

Colica Hysterica, 513

Colica Pictonum, 512

Contusionibus 524

D.

Diabete 520

Diarrhoea 509

Dysenteria. ibid.

E.

Epilepsia Puerorum 520

F.

Febre Stationaria, 491

Febre Constitutionum variarum, 488

Febribus à dentitione ortis 521

Febre depuratoria, 487

Febre Erysipelatosa, 499

Febre Hæctica Infantum 521

Febre Intermitt. 488

Febre Pestilentiali, ibid.

Febre Scarlatina, 492

Fluore albo. Pag. 519

Furfure sive Porrigine capitis. 524

G.

Gonorrhoea virulenta. 517

H.

Hæmoptoe 523

Hæmorrhagia narium 522

Hæmorrhoidum dolore 520

Hæmorrhoidum fluxu immodico. ibid.

Hydrope 515

Hypochondriaca affectione 490

Hysterica Passione, ibid.

I.

Ictero 523

Iliaca Passione. 512

L.

Lochiorum fluxu immodico 514

Lochiorum suppressione 515

Lue Venerea 518

M.

Mania communi, 523

Mensium fluxu immodico 512

Mensium suppressione 522

Mictu Sanguineo à Renum calcul. 508

Morbillis 501

N.

Nephritico Paroxysmo 508

O.

Ophthalmia. 507

A a a a 2 P.

P.		S.	
Paralyſi	pag. 525	Scorbuto	pag. 526
Peripneumonia notha,	492	T.	
Phthiſi	525	Tabis Descriptio & cura.	527
Pleuritide	492	Tenefmo	509
Podagra	529	Tuſſi	525
Pruritu ferino	500	Tuſſi Puerorum convulſiva	522
Punctura tendinis	523	V.	
R.		Variolis	502
Rachitide	521	Ulcere Veſicæ	524
Remediorum formulæ.	488	Vomitu ſanguinis,	523
Rheumatifmo	498	Uteri procidentia,	508



I N D E X

R E R U M E T V E R B O R U M

T O T I U S O P E R I S C O P I O S I S S I M U S .

A.

A Bdominis Tumor in Hydropica, ex tumultu à Catharticis excitato, novum aquarum proventum simulans. 342. Diacodii Syrupo integrè repellitur. ibid.

— Infantum, circa Lienem præcipuè, Febris Intermitt. Autumn. diuturnioribus eos discruciantibus enatus, primarium est indicium eas abituras; neque hæ prius discedere solent. 60.

— pro varia Februm Constitutione varius est, jam scirrositatem, jam flatuositatem tantum, æmulans. ibid.

Abortus remediis iisdem, quibus Mensum immodicus fluxus sistitur, præcavetur; Catharticis & succis Herb. omissis. 283. 514.

Abcessus. vid. Apostema.

Acu-punctura in Hydrope, non minori, quàm Vesicatorii applicatio, periculo vacat. 346.

Acuti Morbi, vid. Morbi Acuti.

Adfectio Hypochondriaca, vid. Hypochondriaca Adfectio.

— Hysterica vel Adfectus Hysterici, vid. Hysterica Adfectio.

Adfectus Comatosi, vid. Comatosi Adfectus.

Adfectus nervosi V.S. & Purgationibus repetitis sæpe indigent; uti in Choreæ Sancti Viti. 360.

— plurimi Scorbuti nomine insigniuntur, qui sæpe vel effecta morborum Fientium, h. e. qui nullum adhuc certum induerunt typum: vel infelices reliquæ morbi, non perfectè curati, tantummodo sunt. 172. Quod argumentis ex Arthritide incipiente, Podagra, Hydrope, evincitur. 172. 173. confer. itidem. 38. ad 39.

Adfectuum plurimorum Curatio, non caussarum, sed veræ atque expertæ Methodi, cognitione absolvitur. 66.

Adolescentes à Variolis plus periclitantur, quàm Fœminæ vel impubes. 234.

Adolescentium juxta cubantium calor, debilibus corporibus, proficius admodum. 39.

Adpetitionibus ægrorum, in Morbis plus sæpe dandum, quàm artis regulis. 241. 242. Exempl. hujus, 241. ad 242.

Adpetitus prostratus ex humorum depravatione. 266.

Adstringentia, in Cholera, tuta non sunt, in initio. 107.

— in Gonorrhœa virulenta scroti tumorem produciunt; Luem veram,

- & alia mala, inducunt. 211. 207.
 Adulti, in Variolis Confluentibus, Salivatione vexantur fere certo; & semel tantum omiffam vidit Auctor. 83. In Variol. Discretis, prodituris, ad Sudores proni, quam maximè sunt, non verò infantes. 79. 80. 84.
 Egri periculo pleni, respectu curationis modi, si inter primos occurrant, in Epidemica nova Constitutione, donec Morbi genium cognitum sit. 22.
 — à Peste convalescentes, postea sanissimi, nec aliis Adfectibus, uti post alios Morbos contingit, obnoxii sunt. 67.
 Ægritudines ab omni ævo cur terris incubuerint. 6.
 Ægritudo vehementior in Variolis, ipsas Confluentes fore prædicat. 243.
 Aër occulta quadam crasi, seu inexplicabili conditione, variis temporibus, varios Epidemicos Morbos producit. 21. 64. 117. 354. Exemplo sunt Variolæ ac in primis Pests. 64. Hancque Aëris Dispositionem, quidquid Philosophantium turba nugetur, planè ignoramus. ibid.
 — Effluviis terrenis inquinatus, Epidemicorum Morborum causa producens, & propagans aliquamdiu, considerandus. 22. 146. 149. 354.
 — ad hoc illudve tempus particulis scatet; Humani corporis, ut & aliquando Brutorum, Oeconomiae adversantibus; quod an fiat, quoniam Terræ viscera varias Mutationes subeant, unde Vapores exhalantes aërem inquinant; vel quoniam Atmosphæra inficitur ab alteratione ex Corporum Cælestium quorundam Conjunctione; idem erit, saltem inde Morbi producuntur Epidemici dicti, istius generis, ac illa μίαισματα inducere valent. 315.
 — Pestilentialis utut sit, tamen per se solus non videtur aptus Pests suscitandæ. 65.
 — ita per terræ quemdam tractum, tum laborantium, tum cadaverum, halitibus ita contaminari potest, ut ipsum remotum à Peste correptis, absque fomite vel personali consortio, modo corpus ad adflatum excipiendum paratum habeat, inferre valeat. 64.
 — Pestilentialis Constitutionis, Dei bonitate, rarius occurrit, quàm ille, qui aliis Epidemicis Morbis, minus exitiabilibus, suscitandis inservit. ibidem.
 — contemperatus, in Variolis, plus quàm V. S. impetum Morbi cohibet. 238.
 — frigidior, in Variolis, admittendus, qualis intelligendus? illoque modo plures à morte sunt liberati. 95. 96. Ubi Phrenitis, hic, ex defectu faciei intumescentiæ, adest, quantæ tum necessitatis ille sit, docent ægri, qui Nutricum curam fefellerè, & aëri semet exposuere, felici eventu. 96.
 — post Corticis Peruviani usum vitandus, donec vires restauratæ fuerint. 191.
 — liberior, in Variolis, quantum refocillet ægros. 241. Et in hoc casu, per Pulmones reciprocatus, plus facit ad sanguinem contemperandum, quàm alia quæcumque. 144.
 — nimis in Febre Scarlatina vitandus. 162.
 — manifesta quadam Crasi Tussim, seu novum Epidemicum Morbum, An. 1679. sub fine, infert. 194.

Aër pro Podagricis, in quo se exer-
ceant, rusticanus quare urbano præ-
ferendus. 324.

Aëri libero, in Variolis, quandonam
exponendus æger. 237.

Aëris Constitutio. *vid.* Constitutio Aë-
ris.

— mutatio in Febre Quartana post
illud tempus, quod sanguis ad suam
despumationem perficiendam exigit,
tantummodo convenit, nec prius; &
quare. 57. In Hydrope quando re-
quiratur. 342.

— particulæ cum humoribus nostris
non convenientes, nudoque sanguini
admistæ, unam, Morbos produ-
centium, Causarum universalium
Classem constituunt. 19.

— Qualitates manifestæ seu sensibi-
les, uti & Res. 6. N. N. corpora nos-
tra, ad hujus illiusve Morbi Epi-
demici generationem magis minusve
disponunt. 22. 23. confer. 160.

— Febres, quæ in qualibet Con-
stitutione se exerunt, quidem non ve-
rò illas quæ Constitutioni cuidam pro-
priæ ac peculiare sunt producant. 22.

— Qualitates manifestæ Constitutio-
ni cuilibet generali, tantam vim im-
primere non valent, ut Epidemico-
rum, qui ad eam referuntur, causæ
Productivæ sint; verum illos tan-
tum intromittere vel excludere pos-
sunt, hocce vel illo tempore, sub ea-
dem Constitutione, prout illis plus
vel minus favent, illis temporibus,
Qualitates manifestæ. 117. confer.
22. Hinc sese Morbi hi exserere so-
lent ea tempestate, ad quam sensibi-
les illæ Qualitates eot destinave-
runt. 117.

— occultæ Epidemicis plus favent,
quàm manifestæ. 184. Nonnulli ta-

men horum quoad Symptomata à ma-
nifestis pendent. *ibid.*

Aëris Temperies Epidemicos aliquando
elicit, ut citius invadant; & e con-
tra. 23.

— quo uberiore, vel parciore, ad-
paratu, ad Febres Intermittentes
producendas donata, eo maturius,
vel tardius, ipsæ inducunt. 43. & 49.

Æstas Morbos Chronicos minus progri-
gnit, quàm Hyems. 316.

Æstate Podagræ irregularis Paroxys-
mus paulo mitior est. 305.

Æstuatio in Febribus Continuis quomo-
do dirigenda. 31.

Ætas hominis unius Experimentis su-
pra Morbos instituendis, par non
est. 21.

Alexipharmaca pleraque calida sunt.
68.

— quælibet, forte, materiam Morbi
per sudores evacuando potius, quàm
specifica quadam virtute, ægrotanti-
bus succurrunt. *ibid.*

— in Peste, calidiora quamvis,
profunt per accidens, quatenus nempe
Diaphoretica simul sunt. *ibid.* Eo-
rum verò vis occultæ specificæ indolis,
tanquam antipestilentiali, non referri
debet. *ibid.*

— Antivenerea ut Mercurius, &
Sarsaparilla, evacuando forte potius,
quàm specifica virtute agunt. *ibid.*

Alexiterium Pestis proprium, in Natu-
ræ sinu, abditum, adhuc delitescit. 69.

Alium in Hydrope incipiente solum,
evacuantibus missis, hunc Morbum
aliquando depulit. 345. Pedibus ad-
plicitum omnium optimè revellit; hinc
Adultis Variol. Conf. laborantibus
applicatur. 250.

Alvi profluvium, & Vomitus, sudori-
bus, in Peste curantur. 75.

Alvus,

Alvus, in Variolis Discretis, toto morbo fere constipata. 81.

Ambustio Spiritu Vini omnium optime curatur, si lintea eo malida adplicantur, & aliquandiu retineantur. 169. 523.

Amentia, sive Mania, post Febres Intermitt. Autumn. 60.

Anatomix quænam notitia Medico necessaria. 338.

Anethi semen specificum habetur, in Singultu, sed non semper juvat. 43.

Angina quibusnam cum Symptomatibus invadat, & progrediatur. 176. 500.

Tempore quolibet, eo tamen, quod ver atque æstatem interjacet maximè adgreditur, 176. 500. Unde hoc.

177. A calore, intensum frigus subito excipiente, plerumque oritur.

22. Juvenes & Sanguineos, sed præcipuè rufos, adficit. 176. Periculo plenus Morbus, sæpe brevi suffocans. ibid.

— qua Methodo curetur. 177.

— Symptomata eodem Methodo qua Febris, cujus Symptoma est, curari debet: quod probe notandum. ibid.

in Angina Febris pro Morbo primario habenda; & reliqui adfectus, à quibus nomen mutuatur Morbus, tanquam Symptomata, quæ à materia febrili, à modo criseos, à parte in quam ruit, pendent, considerandi. 159.

— Gargarismata non, ut vulgo solet, usurpanda, sed sine agitatione in ore detinenda, donec incalescant. 177. Partes inflammatae Melle Rosar. cum Sp. Sulph. tangantur. ibid.

— V. S. fortis in brachio, tum in ranulis, instituenda. ibid. Et si Febris ac dolor inde minuuntur, Cathartic. lenitivum perutile. ibid. Hisce non

minutis, V. S. iteranda in brachio,

Catharsi in diem posterum rejecta.

ibid. Et si Morbus post V. S. & Catharsin non cedit, quod oppido rarum, quid agendum. ibid. 501.

Anginæ Epidemiæ. 160.

— verno tempore An. 1665. Londini, post hyemem frigidum, & siccum gelu, grassantur. 62.

— Pleuritides, aliæque inflammati Sanguinis adfectiones, per aliquot septimanas, Pestis Londinensis exortum antecesserunt. 67.

Aniculæ Medicorum Simiæ, stolidæ, ac infelices. 95.

Anima Mundi Philosophorum. 77.

Animi commotio Apoplexiæ speciem, in Puerperis Hystericis, sæpe excitat. 257.

— compages magis delicata, quam corporis structura. 265. Qualis ab Auctore concipiatur. ibid.

— Pathemata Spirituum systasin solvunt. 322.

— in Hypochondriaca seu Hysterica adfectione, atrociora. 259. ad 260.

— in Podagra sunt vitanda. 322. ad 323.

— Robur, unde. 265.

— & Corporis motus violentiores Adfectum Hystericum excitare valent. 133.

Animus in Hystericis & Hypochondriacis quomodo sit constitutus. 259. ad 260. In Podagra inveterata, contagio tandem etiam ita adflatur, ut rectius Iracundiæ, quam Podagræ, Paroxysmus dici queat. 307.

Annorum Constitutiones. vid. Constitutiones.

Annus, quo Pestis Londini grassabatur, cæteroquin salubris, & mitissimus fuit. 67. Ano-

- Anodyna. *vid.* Paregorica. 191.
- Avopēxiā ex Humoribus depravatis.* 266.
- Anthraces, in Peste, adustam faciem, pyrotici actualis impressioni non ab- similem, habent. 67.
- Antidotalia calida Pestem potius invi- tant, ut Vinum ipsum liberalius ad- sumptum, quàm arcent. 68.
- Antimonialia Emetica Puerulis, infra adolescentiam constitutis, numquam tuto exhibentur. 33. Neque tuto um- quam præbentur, nisi copiosè di- luantur. 32.
- Antiscorbutica Hydropem, ex Febre Intermitt. Autumn. natam, expellen- tia. 59. & 495.
- Antivenerea Alexipharmaca. *vid.* Ale- xipharm. Antivenerea.
- Aphorismus Hippocratis 22. §. I. tam in Sudoribus provocandis, quàm in subducenda alvo, locum habet. 312. Imo non tam Catharsin quàm Dia- phoresin spectat. 369.
- Aphthæ, Dysenteriis recedentibus su- pervenientes, unde nascantur. 116. ad 117.
- in Dysenteria, à Cathartico & aliis neglectis, mortem denunciantes. 109. ad 110.
- in Febre Dysenterica unde nasce- bantur. 117.
- An. 1669. ubi hæc rece- debat, erant frequentiores quàm in Fe- bre ulla nota; & quare? 116. ad 117.
- in Febre Epidemia nova, A. 1685. recidivam Febrium inducunt, quæ Symptomatica tantum est. 357.
- Cortice Peruviano quandonam sa- nentur. 358.
- Apoplexia qualis sit Morbus. 597. Quo- modo tractanda, tum in Paroxysmo, tum extra eundem. 507.
- Febribus Intermitt. An. 1678. su- perveniens, erat Febris ipsa, caput impetens. 191. Signa unde hoc con- stabat. *ibid.* Sed Cortice Peruviano curabatur. 192.
- Apoplexia vulgaris causam non habet eandem, quam Hystericarum Apo- plexia. 257.
- in Podagrico paroxysmo, sudori- feris exhibitis, cur nascatur. 311.
- Apostema talis Naturæ Mochina in carnibus, qualis Febris in humori- bus. 100. sive, Naturæ est Metho- dus, qua partes firmas ab extraneis liberat, quemadmodum Febris mate- riam peccantem ex Sanguine amoli- tur. 236.
- Apostemata quomodo Febrem, resorpto pure, excitent. *ibid.*
- ad Pestis veræ curationem, non- dum excitari à nobis possunt; neque tuto per Cardiacæ hoc tentaretur, licet ea sola, forte, hoc efficerent. 69.
- in Peste ubi ad maturitatem per- veniunt, licet Pestilentialem Mor- bum tollere possint, incertam ac fal- lacem tamen constituunt curationem. *ibid.* 77.
- Apozema aperiens & Antiscorbuticum. 488.
- pectorale in Morbillis ad Tussim. 121. In Pleuritide. 165.
- purgans post Febres Interm. Au- tum. propinandum, Hydropem ex iis natam sæpe tollens. 58.
- Aqua pura, & cruda ni. ab ineunte æ- tate adsumatur, nocua. 320.
- si potatur in iis, qui spirituosus li- quoribus diu adsueti fuere, Hydro- pem parit. 334.
- Podagricis, pura & cruda peri- culosa. 320. frigida ab Auctore Po- dagrico imprudenter potata, Diar- rhæam excitavit, quod materia in

- Artus non eliminabatur; quam Sudoribus curavit.* 328.
- Aqua pura Oleo præfertur ab Auctore, ad dilutionem veneni, & ex Mercur. subl. corrosivo, adsumti.* 200.
- *Menthæ in Vomitu egregiè confert.* 45. *In Ileio vero.* ibid.
- *Mirabilis, in Colica biliosa, quandonam conducat.* 131.
- *Rosarum capiti adplicata vigiliis medetur.* 41.
- *stomatitidis composita Antiscorbutica.* 174. 527.
- — — *ad Podagram.* 314.
- — — *in Rheumatismo Scorbutico.* 174.
- Aquæ Bathonienses in Hysterica Adf. si Tunbrigienses non juvant, adenda.* 272. *Qua methodo sumendæ, & quamdiu.* ibid.
- *Cardiacæ temperatæ.* 112.
- *Chalybeatæ, vid. Aquæ Mineræ.*
- — — *in Calculo Renum, sæpe mortem accerserunt.* 443.
- *Epidemicæ, in Colica biliosa, quando convenient.* 131.
- *Ferræ, vid. Aquæ Mineræ.*
- Aquæ Hydropicorum, maxima celeritate, quam ægri vires ferre queant, h. e. singulis diebus, expurgentur, & quas ob causas.* 336. *Nonnunquam verò dies unus aut alter intercalari potest.* ibid. 337.
- — — *Vomitone per Crocum Metallorum, ex abdominis cavitate, per sedem, & per os, potenter evacuantur.* 341.
- *in Hydrope, Vomitorii ope, non ita promptè expelluntur, ubi levis Abdominis tumor adest, quam ubi ingens aquarum copia adgesta fuerit.*

342. ad 343.
- Aquæ Hydrop. quomodo ex Abdominis cavo in Intestina transeant.* 338.
- *in Hydropica, diebus Purgationibus liberis, per sedem copiose excernebantur, & sub finem per Urinas etiam.* 341.
- Aquæ Mineræ Ferri Mineræ sunt participes.* 268. *Nihil sunt quam simplices aquæ, virtutè Mineræ, per quam transeunt imprægnatæ; quod, Clavos, ex calceis Equorum, aquæ communi injiciendo imitari possumus.* 272.
- — — *artificiales quomodo ex clavis fiant.* ibid.
- — — *& Naturales, diversos effectus non edunt.* ibid. *Diuretici sunt & aliquando Ventrem movent.* ibid.
- — — *quare ipso Chalybe potentius agant.* ibid. *Viam sibi met ipsis sæpe præcludunt, spiritus exagitando, turbandoque.* ibid.
- — — *ubi sumuntur, si aliquod Symptoma, Morbo proprium, superveniat, & transitum Aquarum impediat, ab iis per diem unum, alterumve, abstinendum, donec transierint.* ibid.
- — — *sine Purgantibus intercalatis efficaciores multo, quàm si interim exhibeantur hæc, 268. confer. 272.*
- — — *in Calculosis, ubi tantum lapilli in Renibus hærent, omni æstate liberaliter epotæ, præstantissimum ad eos exturbandos, horumque incrementum impediendum, medium est,* 446. 509. *Quid agendum ubi hæ non prostant.* 441.
- — — *non usurpandæ, nisi prius notum fuerit Calculum majorem non esse, quàm ut per Ureteres transire queat; cum aliàs multum noceant.* 446. 447. 509.
- Aquæ

Aquæ art. & nat. purgantibus admistis, in Calculosis, quomodo noceant, si Calculus major, quàm ut ex Renum pelvi ejici queat. 446.

— in Diarrhœa, Ventris Torminibus, Vomituritione, à Febre oriundis, perniciosæ sunt. 364.

— in Erysipelatosæ Eruptionis specie. 176.

— in Gonorrhœa virulenta quare noceant, & Scroti tumorem, ut & Carunculas, producant. 210.

— in Hysterica Adf. ubi Chalybs non juvat. 272.

— Podagricis quandonam malè cedant. 447.

— Sulphuræ calidæ uti Bathonienses, in Hysterica Adf. ubi Tunbrigienses non juvant, adeundæ. 272.

— Tunbrigienses ad Hystericam Adf. si Chalybs non juvat. 410. ad Icterus pertinacissimum. 134.

Ardor Urinæ in Gonorrhœa virul. qualis. 206.

Arenulæ Nephritidem ubi caussant, quid agendum. 278. ad 284.

Argentum vivum, & Globuli, plus mali, quàm boni, præstant, in Ileo vero. 45.

Argumenta Pestem inflammatorium esse morbum quæ persuadent. 67.

Aristoteles Melancholicos ingenio cæteris præstare adserit. 260.

Aromata in Podagra quare vitanda. 318.

Aromatica, si eorum species quædam misceantur, quasi aliquid tertium gi- gnunt; quod in ita conjunctis majorum est virium in pari quantitate, quàm in eorum quolibet. 313. ad 314.

Ars Medica haud rectius, quàm ab ip- sius Artis exercitio, atque usu, per- discenda. 3.

Ars Med. duobus mediis ulterius provehi potest, tum ope Historiæ Morborum exquisitæ, tum Methodi medendi fixæ ac consummatæ. 6. Hæc vide 7. & 10.

— si illa Methodo semper trade- retur, ut Indicationes ex Historia Morbi, seu Morborum Phænomenis, observando elicerentur, hocque Ex- perientia firmaretur, non vilesceret, quin potius illustraretur; & difficilior reddita, non nisi sapientes & peritos admitteret, atque rudi vulgo de uno aliove Morbo forte tantum constaret; nam uti major subtilitas in Naturæ operationibus, quàm in alia arte, sic Ars Medica quam Natura præci- peret, ingenium vulgi longius supe- raret, quàm ea, quæ à Philosophia docetur. 196.

— Febrium Curationem per Dia- phoresin imitari nequit: quia nescit quomodo materies ad exitum præpa- randa; istius præparationis nulla ha- bet indicia; & deinde ignorat quan- tum temporis in sudore persistendum. 370.

Arthritis sæpe habetur, quod verus Rheumatismus est, quamvis essentia- liter differant; sed fit quando hicce à Febre sejungitur. 170.

— & Pestis nec non plerique alii Mor- bi, Naturæ Medicatricis instrumenta sunt. 20.

— Scorbutum quandonam mentiatur. 172.

In Arthritide ubi exigua Malignitatis suspicio, haud minus ac in Peste, materiæ morbificæ recursus fatum ac- cersit. 70.

Articuli digitorum & Ligamenta in Podagra irregulari quomodo adfi- ciantur. 305.

Articuli in Rheumatismo sæpe invertuntur, cessante jam dolore. 170.
 Artus in Podagræ irregularis Paroxysmorum intervallis quomodo se habeant. 305.
 Artuum, in Podagra, impotentia ad motum præcavetur victione in curru, ipso Paroxysmi tempore. 326.
 — dolor, in Variolis, ingens ac si ex Rheumatismo, Confluentes eas fore prædicat. 243. ad 244.
 Alcites verus, pro deplorato habitus, æquè certo, ac alii permulti, qui non ita funesti vulgo æstimantur, subjungatur, modo viscera non sint corrupta. 346.
 — inveteratus, quomodo partes corrumpat, & insanabilis fiat. ibid. Atamen curationem Medicus adgredi debet, quia ignorat, quantum noxæ visceribus illatum. ibid.
 Asthma inveteratum, & de repente recedens, in viris habitus plenioris, tumorem Surarum excitat, Hydropicorum æmulum, ad mortem usque comitantem. 333.
 — quomodo curandum. 525.
 — siccum Febrim non habet, unde à Peripneumonia notha, distinguitur. 169.
 Ataxia Hystericorum malorum causa. 133.
 — Spirituum Materiam viridem, biliosam, æw νεῖνω plerumque semper exprimit; sive ipsa fuerit à Convulsionibus, sive ab Hysterica adfectione; sive à motu Maris in nave; sive à Purgantibus, vel Vomitoriis, excitata. 262.
 — Hypochondriacæ seu Hystericæ Adfectionis πρὸν γένεσις seu efficiens causa interna videtur; cujus

origo, seu antecedens causa, est debilior illorum crasis, qua facile dissipantur aut perturbantur. 261. 265. Hinc non videtur Hysterica Adfect. Morbus à depravatis humoribus pendens, licet ille ipsos inficere valeat. 265. Quod utrumque Adfectum pluribus Argumentis firmatur. 261. ad 266.
 — Ataxia humores putridos, in Hysterica Adfect. diuturniore, quomodo gignat. 265. ad 266. Et quinam exinde Morbi. 265.
 — Hypochondriacorum, & Hystericarum, Symptomata, ut Uteri strangulatum, quomodo producat. 261. ad 265.
 — Dolores producens, in Hysterica & Hypochondr. Adf. comparatur actioni vitri Incensorii. 263.
 Auctor sapere non audet ultra quam res ipsa loquitur. 146.
 — errores suos solito suo candore, ab Amicis, annosa & repetita experientia melius edoctis, reprehensos cupit. 351. ad 352.
 — an alii eadem cum ipso adserant, non ita quærit, quam, utrum ea quæ tradit, cum veritate consentiant. 301.
 — quid de Operum suorum repetita lectione promittat. 347.
 — in Acutorum Morborum Historia tradenda, non tam metam figere, quam aliis animum addere tentat. 16. Tractatum de Morbis Acutis edendo, viam præmonstrasse existimat, qua Viri docti Morborum Historiam & Curationem possint investigare. 203. Objectioni respondet, quam contra suam de Morbis Acutis doctrinam, quod Malignitati, quæ pluribus horum Mor-

Morborum adhæret, non satis ad-
versetur, fieri posse prævidet. 154.
ad 156. Veterum & Recentiorum de
Malignitate Opinionem non rejicit,
sed suam de eâ sententiam exponit.
154. ad 156.
Auctor Chronicorum Morborum Hi-
storiam promittit. 204. Temeritatis,
quod tanta Laudani copia in Chole-
ra exhibuerit, non est incusandus.
185.
— Epidemicarum Constitutionum vi-
cissitudinis causas, ex Aëris mani-
festis qualitatibus nondum expiscari
potuit. 22. Quoties Epidemica Con-
stitutio nova ingruit, anceps hæret,
qua nempe via insistet, ut ægris sub-
veniat; unde unus, aut alter, eorum
in principio vita periclitatur. ibid.
Dum Epidemicorum Morborum
Observationes aliquot Annorum suc-
cedentium, ita tradit, qualem fi-
nem habuerit. 27. Cum de Morbis
Epidemicis Constitut. 1676. ad
1680. scriberet; jam per triginta
Annos circiter Podagra, & diu
Calculo, triginta multatus fuerat.
182. Et Morbos Epidemicos An.
1677. non describit, quia eo tempore
Mictu sanguineo, dein Podagra sæ-
vissima, per tres menses, cruciatus
fuit. 185.

— in Febris ejusque Symptomatis
describendis, adeo sincerus, ut nul-
las Opiniones, nullaque cerebri
figmenta, orbi vendere cupiat. 179.
Veniam rogat, quod in eruenda cer-
tiore Methodo, ad Febres ejusque
Symptomata, debellandas, spretis
aliorum judiciis, suo magis confusus,
in semitas, nullo antea pede calcatas,
ingressus fuerit, & rebus novis stu-

duerit. 179. Integritate solita fate-
tur, se non semel in Febris ubi
de natura earum nondum constaret,
& sibi & ægris nihil agendo, optimè
consuluisse; dum interim invigilans
percepisset vel Febrem evanuisse, vel
ad Typum redactam fuisse, unde co-
gnosceretur. 158. De curatione Fe-
brium Intermittentium adhucdum
ignota conqueritur. 53. Serio monet,
de perquirendis mediis, Febres In-
termittent. Autumn. citius, quàm
solet, debellantibus. 57. Cuidam
novæ Febri, Pestilentiali quasi dein
reptæ, & Pestem Lond. ipsam præ-
gressæ, Methodum diversam ab ea,
quam hætenus cum successu, in hu-
jusmodi fere Febris, usurpave-
rat, adaptare cogitur. 73. Inter-
turbatur ægrorum damno, præ ad-
stantium protervia, ne tam libera-
liter V. S. instituat, in Febre Pesti-
lentiali, Pestem Lond. insecuta. 74.
Hinc in Febre Pestilentiali illa de
modo curandi, à V. S. diverso, co-
gitat. ibid. ad 75. Et Curationem
hujus Febris Pestilentialis, aliam,
quam per V. S. frequentiore, inve-
nit. 75. Hujusque inventæ Methodi
successus. ibid. ad 76.

Auctor in Hydropicis curandis, initio
sue Praxeos, decipitur, usu Syrupi Spi-
næ Cervinæ, quod hujus opè curata
Hydropica, quæ facile purgabatur,
existimarit omnem Hydropem isto Sy-
rupo curari posse. 336.

— in Hystericæ Adfectionis Historia
tradenda, illud facit juxta vera Na-
turæ Phænomena, & propriam Ex-
perientiam. 256.

— ad Medicam Artē, de ea ne vel
somniaans, quomodo Celeberr. Th. Co-

- xe *M. D.* hortatu, seriò se adcin-
xerit, 2. ad 3. Quare se ad *Artem*
Medicam nondum pervenisse putat.
325. Qua ratione *Medendi Scien-*
tia ulterius promoveri queat, *Tract.*
de Morbis Acutis, post diuturnas
meditationes, & fidam plurium *An-*
nor. *Observationem* in medium pro-
ferre decrevit. 6. ad 7. *Perpulchrè* de
Medicorum in *Morbis* curandis ni-
mia *festinatione* *ratiocinatur.* 141.
Auctor *Medicamenta* in *Hydrope* *sim-*
plicia, & *inartificialia*, quod tradat,
arguentes redarguit. 346. ad 347.
— de *Mictu Sanguineo* à *Calculo* re-
nibus *impacto*, tum de *Podagra*, quæ
mala in *semet ipso* expertus, *misera-*
tione erga *sodales* commotus, tantum
scribit. 442. 445.
— in *Peste* & *Pestilentiali Febre* de-
scribendis, *veniam* rogat, quoad
Dogmata Theoretica, naturam
Morbi quæ respiciunt: verum quoad
Praxin adserit, se *omni fide*, ea tan-
tum proposuisse, quæ *exploratissima*
habebat; & ægros suos ita tractasse,
ac ipsemet tractari cuperet, si hocce
morbo ægrotaret. 77. *Difficultates*,
in *Peste* curanda, *sudoriferorum*
effectu, *subortas* (72.) sua *Metho-*
do curativa solvit. 73. *Historiam*
Pestis tradit, quia *Medici alii*, qui
toto tempore adfuerunt, de ea ni-
hil, *publici juris* fecerunt. 68. *Fu-*
gientium turbis, *Pestis metu*, *ami-*
corum *suasu*, se adjungit. 74. *Tem-*
pore *Pestis Lond.* maxima parte,
complurium milliarium intervallo ab
Urbe semotus fuit. 68. 74.
— in *Pleuritide*, *Curationem* frustra
tentat, per *aliam præstantiorem viam*,
quàm per *V. S.* 167.
— *Podagræ An.* 1660. *immaniore*

- quàm ante, *Paroxysmo*, adficitur;
quem & *Calculus Renum* & *Mictus*
Sanguineus *insecuti.* 442. De *Pod-*
agra Tractatum edens, jam, per tri-
ginta quatuor *Annos*, ab ea vexatus
fuerat. 302. Et *calamum* regere im-
pos adjuvatur, à *Joh. Drake.* 301.
Podagricus in *semet ipso* *Diarrhoe-*
am, ex *materia morbi* in *artus* non
eliminata, sed *retropulsa*, propter
Aquæ frigidæ imprudentem usum,
enatam, *Sudoribus*, ubi nec *exerci-*
tiis, nec *Laudano*, neque *Cardiacis*,
vel nec *adstringentibus* cederet, cura-
vit. 328. *Sententiam suam* revocat,
sc. *Podagra* adfectis *Purgantia* mi-
nimè conducere. 444.
Auctor *Rheumatismi Curationem*, tẽpo-
re aliter edoctus, in quibusdam *emen-*
dat. 200. *Rheumatismi Scorbutici*
Curationem cum *publici juris* facit,
privato suo *commodo* *publicum*
præfert. 173.
— ad *Variolis decumbentes*, ne am-
plius accerseretur, cur exoptabat.
241. *Cujusnam essentia Morbus* sint
Variolæ, ignorat cum aliis. 86. Quod
in *Variolis* curandis *Methodum no-*
vam induxerit, eo magis erit excu-
sandus, quòd hæc *Recentiorum* tan-
tum *Curationibus*, cum *Hippocrati*
ac *Galeno* ignotus *Morbus* fuerit,
adversetur. 149. Qualem de sua, *Va-*
riolis Discretis & *lenibus*, *medendi*
Methodo fidem habeat. 92. *Integerri-*
mus in exponenda *Methodo* *Variola-*
rum curandarum. 240. In sua *Va-*
riolas curandi *Methodo*, non *phan-*
tasiæ, sed *Phænomenis* *præcticis* li-
tat, 254. ad 255. Quare non defi-
niat, an *Salivatio* ac *Diarrhœa*, in
Variolis *Confluentibus*, ideo à *Na-*
tura fuerint substitutæ, quod parvum
hocce

hocce pustularum genus materiem Morbi non ita exterminare queat, ac majores Pustulæ, in Discretis, faciunt. 83. Venæ sectionem negligit in Variolis. 148. De Variolis An. 1680. scribit ideo, ut, quæ olim deficiebant ex iis, quæ experientia jam annosior suggesserat, sarciret. 233. Filium suum, Variolis Anomal. Discret. laborantem, sua Methodo restituit. 127.

Auctor istius Sententiæ non est, Veneræ Luis Curationem docendam non esse; cum sui negotii existimet corpora sanare, non verò ægros censorio vexare fastu, Deo relinquens fontes castigare. 204.

Auctores in Morbis, horumque Historia sive Phænomenis, describendis, talia vulgo præbent subsidia, quæ sequentem potius in præcipitia agant, quàm in genuina Naturæ Methodo indaganda dirigant; nam nihil tradunt quàm Hypotheses, quas lascivientis ingenii luxuria peperit, ad quas etiam Praxin suam, in hominum perniciem non ad rei veritatem, componunt. 203. ad 204.

— qui Venæ Sectionem in Peste commendarunt. 70.

Aura liberior in Tussi Epid. 1675. concedenda. 86. 153.

— in Variolis vid. Aër liberior.

Autumno humores sunt viscidiores quàm Vere. 49.

Autumnus Dysenterii favet. 123.

Axiomata Hippocratis aliorumque Veterum, de Materia febrili præparanda ad Crisin per sudores rite faciendum, isti, ubi Febri Constit. 1661. ad 1664. qua Intermitteutes cete-

ris prædominabantur, videntur adaptanda. 156.

B.

Balsamus è Mecha, Terebinthinæ genus liquidum, & purum, in Gonorrhœa virul. bonus. 209.

Bolus purgans in Diarrhœa. 113.

Bolus Diaphoreticus in Pestilentiali Febre. 75.

— in Pruritu ferino. 175.

Botallus (Leonardus) unus, qui, æquè ac Sydenham, totum Pestis curationis negotium in copiosa Venæ sectione collocat. 71.

Botalli argumenta luculentissima exemplis plurimis stabilita, V. S. in omni Peste, supra omnia remedia salutarem esse. ibid.

Botanica sensuum testimonio debet inniti. 26.

Brassicæ folium in Pleuritide lateri imponendum. 166.

Bubo, vel Parotis, in Peste, Febri ardenti superveniens, ægros à luctuoso discrimine sæpe liberat. 65.

Bubones in Peste quomodo ex Materia Morbi subtilissima & maximè inflammabili fiant. 100.

— in Peste, ut alii tumores inflammatorii, in Abscessum terminantur. 67.

— Pestilenciales suppurantes licet, in Pestilenti Febre, incerti ac fallacis tamen successus sunt. 69. 77.

— interdum ex improvviso disparent. 69.

— Diaphoreticorum præmaturorum actione quomodo intropellantur & turbentur. 72.

— retrocedentes, Maculis purpureis succedentibus, letale. 69.

Cujus

Cujus sæpe causa sudoris expressio importuna. 69. 72.

Bubones Venerei, ex Gonorrhæa virul. primum Luis gradum constituunt. 206.

Butler M. D. in Africa Dysenteriam & Febrem Dysentericam eodem modo, ac Auctor in Anglia, curat. 114. ad 115.

C.

Cachexia ex Humoribus depravatis. 266.

Calculi minores ex Renum pelvi non melius deturbantur quam Aquarum Chalyb. usu. 446.

Calculus an major quam ut per Uretres transeat, vel an lapillorum congeries in pelvi hæreat, quomodo dignoscatur. 446. 509. confer. 447.

— *ex decubitu in dorso supra lectum submollem, primam originem suam, in Podagricis, sæpe desumit.* 442.

— *Nephritidem ubi caussat, quid agendum.* 278.

— *Renum vel Vesicæ aliquando videtur adesse, quod tantum effectus quidam Hystericæ Adfectionis est.* 132. 258. *Hujus Exempl. notabile, ubi Calculo dicata nocebant, Narcotica verò juvabant.* 168.

— *qua ratione se manifestaverit in ipso Auctore.* 442.

— *in Podagra inveterata plerumque nascitur.* 328. *Quid tum agendum.* ibid.

— *Podagricis superveniens, unde?* 307. *Et Ischuream aliquando excitans, ægrum de medio tollit.* ibid.

— *in Podagricis Potu acri, & attenuante, tum excitatur, tum generatur.* 321. *An ejusdem Podagri-*

cæ materiæ morbificæ portio? 307. *Exercitio corporis constantiore prohibetur; sed præsertim Equitatione, nisi grandior ætas, aut Calculus major impediverit; tum verò Vectio- ne in curru utendum; sed utrumque fiat in aëre rusticano potius quam in urbano.* 324. confer. 326. *Dein præcavetur lautiori usu Cerevisiæ tenuis.* 318. *Tum usu Potus Dietetici.* 321.

Calculus ubi adest, & vel Nephritidem, vel Mictum sanguineum producat, quænam medela. 328. 445. ad 447. 508. 509.

Calefacientia Antidotalia Pestem potius accersunt, quam præveniunt. 68.

— *in Apoplexia cur noceant.* 507.

— *in Chronicis, vid. Herbæ Excalefacientes.*

— *Corticis Peruviani salutarem actionem delent, in Febris Intermitt.* 186. 190.

— *in Dysenteria. & ætas florida, qualia Phænomena inducant.* 109.

— *à Medicis in Febris male exhibentur, ad Venenum suppositum percutim expellendum, ubi Refrigerantia requirebantur.* 370.

— *in Febris acutis quot mala inferunt.* 359. 360. *in Febre Epid. An.* 1673. *caput adsciebant.* 137. *In Febre nova Epid. quandonam Iliacam passionem excitare valent.* 365. *In Febre hyemali vitanda.* 349. *In Febris Interm. Aut. citius exhibita, vel has duplicant, vel in Continuas permutant.* 57. *In Febris Interm. Pueris exhibere periculosum.* ibid. *In Febr. Intermitt. An* 1678. *tamquam Oleum camino additum, eas exasperabant.* 186. *In Febre nova hyemali, quænam mala inferant.*

inferant. 356. 359. In Febre Variolosa Salivationi obficiunt. 103.
Calefacientia in Hydrope, quando, & quare, convenient. 343. ad 344.
 — Maculas purpureas in Febris augent, pro gradu quo calefaciunt, & contra. 155.
 — in Malignis Morbis quibusdam, quare ledant. 154.
 — quælibet in Morbillorum, & Variolarum, Curatione nocent. 121. Peripneumoniam letalem inducunt, aliaque mala inferunt, quibus temperantibus & V. S. succurritur. ibidem.
 — Pleuritidem Symptomaticam, quando inferant. 164.
 — in Pleuritide vera obesse possunt, quo minus V. S. omnem Curationis numerum absolvat. 152.
 — Medicamenta vegetabilia in Podagra, quæ amaricant vel linguam feriunt, vera sunt in hoc Morbo Digestiva: sed certa cum cautione usurpanda. 313. In aliis Chronicis quoque quare conducant. 314. confer. 316.
 — in Rheumatismo exhibita, frequentioris solito V. S. causa esse possunt. 171.
 — Spirituosa in Tussi Epid. 1675. sine periculo non exhibebantur. 151. 153.
 — in Variolis quænam mala, & quo tempore præsertim, inferant. 87. In Expulsionis, initio præsertim, æque ac in Secretionis, statu nocere possunt. 88. Et quare. 88. ad 89. In Eruptionis finem, Junioribus, & Sanguineis præsertim, præmaturè exhibita, eidem potius obicem ponunt, temperantibus amovendum. 86. Et in temperamentis vegetis, ex

Discretis, sæpe Confluentes inde redduntur. 90. Initio Morbi exhibita Confluxum Pustularum inducunt, illo modo, quo Aëris intemperies An. 1681. illud ipsum producebat. 234. Ea præmaturè exhibere, sive ægrum lecto adjudicare, ante diem quartum, æquè nocuum. 90. ad 91.
 Calefacientia ubi Symptomata à nimio frigore, vel ab Evacuationibus indebitis, concedenda, sed non diu. 97.
 — Anomal. Confluentibus exhibita in Dysenteriam quando eas mutabant. 125.
 — Menstruorum fluxu tempore non solito superveniente, adhibita, admistis licet adstringentibus, letalia sæpe fuere. 126.
 — Pustulas nigras augent, pro ratione qua calefaciunt; & contra. 155.
 — Regularibus Confluentibus magis adhuc quàm in Regul. Discret. vitanda. 93. Salivationem sistunt. ibid.
 — Discretis sudorem, per se promptum, urgentia, quantum, & quomodo, noceant. 84. Intumescen-
 tiam Faciei, quæ octavo die adesse debet, nec non ruborem inter Pustulas, avertunt. 95.
 — sudores promoventia, quando minus noceant, faciei que tumorem non ita impedian. 84.
 Calida in Febris, Variolis, &c. vid. Calefacientia.
 — tempestas insperata, acri gelu succedens, Dysenterias, mense Novemb. An. 1678. leves caussavit. 134. ad 135.
 Calidum Regimen, vid. Regimen Calidum.

Calor Febris ipse fere sufficit ad Materiæ concoctionem, ut sudore expelli queat; nec calefacientibus iis fervidis, forinsecus adlatis, indigemus. 141.

— *frigido diuturniori Vere, derepente succedens, Pleuritides, Anginas, qualiscunque fuerit Constitutio, inducit.* 160. confer. 22.

— *Lecti in Febr. Intermitt. vim Corticis Peruviani enervat.* 247.

— *Rheumatismum promovet.* 171.

— *in Variolis Confl. vim Morbi adauget, & vim Paregoricorum enervat.* 247. Plura de Lecti calore in Variolis, vid. Lectum.

Calor in Pleuritide nocuus. 166.

Canis rabidi morsus, huiusque Curatio. 524.

Capillorum abrasio in Phrenitide à calefacientibus inducta. 360.

Capitis Dolores in Febre Dysent. An. 1669. frequentiores, sed Sudores rariores. 116.

— *motus, in Vomitione, ex Hysterica Adf. ipsam præ cæteris provocat.* 277.

— *Obtectio lacinia lanea ad Sudores ciendos mirum quam conferat.* 75.

Carbunculi ac Bubones in Peste materiæ expulsionem inserviunt, uti Pustulæ in Variolis. 100.

Cardiaca servant ægrum, ubi, à Venæ-sectione temeraria, damna inlata. 30. Naturam languentem adjuvat ubi refrigerantibus, aut Clysteribus, debilitata. 52.

— *in Apoplexia, cur noceant.* 507.

In Dysenteria, qualia, quando, & in quibus, propinanda. 112.

— *moderatiores, uti & calidiora quo tempore Febris, & quonam in casu*

gradatim &c. sumenda. 36.

Cardiaca Febribus contin. An. 1661. &c. initio quare non exhibenda. 35.

Circa earum finem, quando necessaria. ibid. Post Evacuationes institutas, quænam esse debeant. 36. ad 37.

Quando in initio propinanda. 35. In debilibus requiruntur, ut Febres spatio 336. hor. h. e. 14. dier. depurationem suam absolvere queant. 52.

— *inopportuna transmutant Febres Intermittentes in Continuarum speciem.* 186. 190. Et Corticis Peruviani salutarem effectum delent. 190.

— *& Corroborantia in Febribus Interm. Autumn. ad Naturam sublevandum, quando & cur convenient.* 56. Sustinent adhuc Senes per tempus aliquod. ibid.

— *in Febre Scarlatina quare damnoſa?* 162.

— *in Febre Variolosa Salivationi obſcunt.* 102.

— *in Mania post Febr. Intermitt. diuturn. nata, exiguntur.* 61. Eorum usus quando dimittendus. ibidem.

— *vetantur in Phrenitide præſertim ante usum Narcoticorum.* 41.

— *in Variolis nocent, quod Ebullitionis statum nimis evehant.* 87. Intempestiva quænam mala producant. 241. Initio si vitantur. Maculæ purpureæ, & Mictus Sanguineus præcaventur. ibid. Ante diem quartum non necessaria, Diarrhœa quamvis adsit. 90. ad 91. Mortis sæpe causa sunt, licet V. S. prægressæ sæpius imputetur. 89.

— *Discretis sudorem, per se satis promptum, urgentia, quæ ratione noceant.* 84.

— *præmaturè exhibere, & lecto*

lecto ægrum adjudicare, ante diem quartum, æquè nocuum est. 90. ad 91. Quarto die quandonam exhiberi queant. 90. Sed Paregorica esse debent, & qualia. 91. Effectum hic quomodo edant. ibid. Omni tempore, quam occasione exhiberi queant; & quænam tum illa sunt. 97. Confluere faciunt Pustulas, si inopportunè adplicentur. 87. Hocque præsertim in temperamentis vegetis. 90. In Eruptionis finem & ad eam accelerandam, præsertim in junioribus & sanguineis, in initio præmaturè exhibita, Eruptioni potius obicem ponunt, temperantibus dein amovendum. ibid. Retrocedentibus Var. ex V. S. inopportuna, vel frigore nimio adplicato, adhibeantur; sed cautè, neque nimis fortiora sint. ibid.

Cardiacorum Generosiorum Formulæ. 61.

— Moderatorum series. 36.

Carnes vetantur in Podagræ Paroxysmo, si ab iis abstinere sine alio incommodo possunt; alias modice concedendæ. 325. Harum usus Hypochondriacos & Hystericas restaurat. 265. Et abstinentia ab iis Morbum sæpe invitat. 265. confer. 264.

Caruncula in Gonorrhœa Virul. est caro spongiosa in Urethra, ab ejus exco-riatione enata, sensim indurata, Urinæ viam intercipientis. 206. Ex ulceribus sibi adnatis ichorem sæpe quemdam evomunt; quod tum pessimum malum. ibid. Ex Aquis Mineral. sæpe nascantur. 210.

Casus rari ad Historiam Morborum non pertinent. 8.

Catamenia, vide Menstrua.

Cataplasma, ad dolores ab Allio pedi-

bus adplicito excitatos. 250. In Hydrope, Abdomini adplicitum ad discutiendum, nec nocet, nec prodest. 345. In Podagræ paroxysmo, quod Auctori præ ceteris profuit. 329. In Punctura Tendinis à V. S. 167. In Rheumatismo. 171. In Scro- ti inflammatione à Morbo Venereo. 211.

Catharri, & Tusses Epidem. An. 1675. videantur. 136.

Cathartica, vid. Purgantia.

Catulus vivens, in Ileo vero, nudo ventri quamdiu accumbendus. 45.

Causæ Proximæ & Conjunctæ solæ à nobis possunt cognosci; & ex iisdem tantum Indicationes Curativæ sunt mutuandæ. 11. Intellectui se sistunt, vel sensus testimonio, vel Anatomicis Observationibus ab aliis jam factis. 13.

— Remotiores Morborum, seu primæ, sunt inperscrutabiles, neque ex iis, sed ex conjunctis solis cognoscendis, Indicationes curativæ sunt mutuandæ. 11. Quod demonstratur. 12. confer. 13.

— Morbificæ Symptomatum peculiarium perceptione, deprehenduntur. 9.

Causarum Differentia quælibet specifica nos latet. 125.

Cerebrum humanum ita, forte, constitutum, ut non tam quid absolutè verum, quàm quid maximè conveniens, ac suis Naturis adcommodum, percipiat. 372.

— Sensus & motus fons, ac Cogitationum & Memoriam officina, quamvis nobis adpareat, tamen ex ejus substantia adsignare nemo poterit, qua ratione ex naturæ ejus vi, & structura partium, hæc illave facul-

- tas necessario fuerit exserenda.* 255.
Cerevisia generosior, in Hydrope, iisdem sub conditionibus admittitur ac Vinum. 344.
 — *medicata, in Hydrope, pro Pauperibus.* 345.
 — *purgativa.* 489.
 — *cui Macis aliquid incoctum, ad Diaphoresin, in Pestilentialibus morbis, continuandam.* 76.
 — *cum Rhabbaro pro Infantibus, quomodo paranda, & qua ratione adsumenda.* 367.
 — *tenuis Calculum arcet, in Podagricis.* 318. *In Calculo hausta ante motum in Curru, Mictum Sanguineum præcavet.* 445. *In Febribus, ægris non deneganda, sed potius commendanda.* 38. *cum Aurantiorum succo, in Febrili ardore.* *ibid.* *cum Vitrioli spiritu, in Mictu cruento, & Petechiis, ex Febre acuta.* 253. *In Morbillis Anom.* *An.* 1674. *pro potu.* 144. *In Peripneumonia notha.* 169. *Lond. in Podagra optimus potus, lupulata sit vel non.* 319. *In Tussi Epid. ubi Febris &c. adsunt.* 152. *In Variolis orgasmum temperat.* 184. *In Variolis Anomalis Discretis, pro Potu sufficit.* 127.
 — *In Variol. Confluent. qualis eligenda.* 250.
Chalybs in Chlorosi exhibitus quomodo pulsum & faciem immutet. 267. *In Hydrope, initio Morbi haud infimum sibi vendicat locum.* 345. *In Colyca Hypochondr. & Hyster. in primis confert, non ad Symptomata lenienda, sed radicem Morbi exstirpandam.* 514. *In Hysterica Adf. ad dies triginta adsumptus, post Evacuationes, Remedium est præstantissimum: Et qua ratione agat.*

267. *Statim ante Evacuationes exhibeatur, ubi nimis debiles ægræ.* *ibid.* *Si eam curare non valet, Aquæ Minerales adeundæ.* 272. *Quæsi non juvant, Aquis Sulphureis calidis utendum.* *ibid.*
Chalybs in Substantia omnium optimè, & tutò, & citius, opus persolvit. 267. *Ipsius Minera è terra effossa nondum ignem passa, an præstantior adhuc, ibid.* *In Syrupi forma post substantiam, præ cæteris formis conducit.* 268.
 — *in Substantia adsumptus, sine Purgantibus intermistis, an in Visceribus hærens nocere possit?* 270.
 — *sine Purgantium intermissione citius & præstantius suum edit Effectum.* 268.
 — *Exhibitus, si corpus nimis turbet, Laudano utendum.* 271.
Chemia plurimum emolumentum Medicinæ adferens, non tamen sola habenda Ars, quibus illa promoveri tantum possit. 339. 340.
Chemici Medicamentis suis nondum meliora præstare possunt, quam alii succis, vel Decoctis, simplicium. 262. *ad 263.* *Remedia optima nimis officiosa sedulitate enervant sæpius.* 267.
Chirurgus, in Castro Duntzar, V. S. audaci ac liberali, Milites à Peste sanat. 71.
Chlorosis idem ac Febris alba, species Hystericæ Adfect. ex Humoribus depravatis. 266.
 — *ea Methodo qua Hysterica Adf. sanatur.* 271. 522.
Chlorosi laborantes Clavo Hysterico frequentius adficiuntur. 257.
Cholera Morbus ex Epidemicorum Familia, Augusto exorsus, mensis spatio,

spatio, sua percurrit tempora. 23.
104. 106. 107. 511. Alio mense,
quam Augusto non grassatur, licet
eædem caussæ adsint; ac si in aëre tum
aliquid, quod specificam hanc altera-
tionem producit, resideret. 108.
Cholera Morbus alio tempore, quam
Augusto, invadens, à Legitimo toto
cælo distat. ibid.
— intra 24. horas interficere po-
test. 107. 511.
— foccus itidem datur, cujus u-
num modo vidit exemplum Auctor.
107.
— legitimus describitur. 108.
511.
— à fructibus horariis excita-
tur. 108.
— legitimus An. 1669. antea
numquam ita Epidemicus, grassari
incipit, semper intra Augusti can-
cellos contentus, vix Septembri
mense adparet. 104. 106. 177. 511.
confer. 23. Ejus Symptomata. 106.
511.
— ejus Symptomata licet à
crapula videantur, & eodem fere
modo curentur, alterius tamen Natu-
ræ Morbus est. 106. 511.
— curatur partim diluen-
do, & partim evacuando humo-
rem peccantem. 107. Adstringen-
tia & Narcotica intempestivè ex-
hibita pluribus malis occasionem
præbent, inimicum visceribus in-
cludendo, & bello intestino occa-
sionem præbendo; hincque Febrem
accendunt, quæ Emético tantum
tollitur, adeoque initio tuta non
sunt. 32. 107. Evacuantia tamen
hic etiam tuta non sunt. 108. confer.
107. Et Cathartica exhibere idem
esset, ac oleo ignem extinguere.

107. 108. Jusculum ex Pullo multa
aqua cocto, tam per Os, quam Ene-
mata, adsumptum, Syrupis leni-
bus admistis, magnam partem ab-
solvit, initio Morbi. 107. 511. Pos-
setum loco Jusculi ad abluendum sto-
machum exhiberi potest. 107. 511.
Quamdiu ita abluendum. ibid. Pare-
goricum, abluto jusculis ventriculo
exhibendum. 107. Vomendi conamen
majorem haustum Medicamenti vetat.
184. Post horas 10. vel 12. vomitus
& dejectionis, si Medicus accersitus
tantum, frigescentibus extremis, Pa-
regorica illico exhibeat; atque mane
& sero aliquamdiu in iis continuan-
dum. 108. 511.
Cholera Morbus An. 1676. exeunte
æstate Epidemicè regnare incipiens,
atrociore Convulsiones, & diutur-
niores, habuit. 184.
— Curabatur ut legitimus. ibi-
dem.
— Anodyna fortiora, & magis
repetita solito, exigebat. ibid. Quie-
tem corporis, ne vomitus de novo ex-
citaretur, diuturniorem commenda-
bat. ibid.
Cholerae Morbi species in Infantibus
ex Dentitione vel Crapula. 511.
Quomodo curetur. ibid.
Chorea Sancti Viti qualis Morbus sit.
360. 506. Ætates teneras adoritur.
360. 506.
— Caussam quamnam ponat.
361.
— curatur, minuendo humores
V. S. & Purgantibus; dein genus
Nervosum roborando. ibid. confer.
506.
— ubi semel invasit, facile se-
quenti Anno redit; quomodo præca-
venda. 362. 507.

Cccc 3 Cho-

Chorea raro adhuc Auctori occurrit,
& quinquies modo vidit, ac curavit.
360. 362.

Chronici Morbi, vid. Morbi Chronici.

Cibi eupepti in Febris Interm. & modicum Vinum, ubi Cortex Peruvianus nihil amplius efficit, rem sæpe absolvunt. 191.

— in Gonorrhœa virulenta quinam sumendi, quinam vitandi. 210.

Cicatrices post Variolas unde fiant, & cur primis diebus non adpareant. 81. 82. Ab humoribus nimis calidis sunt; sed Auctoris Methodo præcaventur. 148.

— — Anomalias, An. 1670. ad 1672. foediores erant. 125. Post Confluentes foedæ unde fiant. 82. Post Discretas raro relinquuntur. 81. Linimentis an præcaveri queant? 95. Regimine temperato præveniuntur. ibid.

Cicero laudatur. 183. Quod de superstitionis dicit, Melancholicis quadrat. 260.

Circulationis Sanguinis impedimentum & quasi strangulatus, à Venæ-sectione, in Febris, neglecta, quando. 30.

Clavus Hystericus describitur. 257. 263. Quomodo ex spirituum enormitate procedat. 263. Quomodo curetur. 513.

Clyster, vide Enema.

Cocta non cruda sunt medicanda. 102. 312. 369.

Cogitationes nimix Podagricis obficiunt. 233.

Colica biliosa Constitut. An. 1670. ad 1672. describitur. 127. 128. & 510.

— Chronicis cum adnumerari

debeat, quare inter Acutos hic describatur? 127. Hanc præcedebant Symptomata, quæ Dysenteriam istius temporis præcedere solebant: & Dysenteria ipsa aliquando præcedebat. ibid.

Colica biliosa quosnam, & quo tempore præsertim adoriatur. ibid.

— incipit cum Febre aliquot horarum, si Dysenteria non præcesserit. ibid.

— Dolorem quantum inferat. 128.

— ex Hysterica Adfect. orta. 262. confer. 257. Quædam Hysterica Adfectionis merus effectus. 132.

— ab ea, quam Hysterica Adfectio simulat, exquisitè distinguenda in Curatione. 279.

— à Nephritico dolore quomodo distinguatur. 510.

— in Iliacam Passionem facile transit. 128. 510.

— ab humore acri sanguinis, ad Intestina transato, orta videtur Auctori. 128.

— curatur evacuando humorem antecedentem in venis, & continentem in visceribus, tum impetum & dolores compescendo. ibid. Quæ persolvuntur V. S. Anodynis, & Catharticis. 128. 511. confer. 133. Quæ Methodus felicissimè Auctori præ aliis cessit, ubi Enemata carminantia crabrones irritent & Morbum diuturniorem reddant. 123. Sed à Narcoticis, omissis aliis, incipiendum aliquando, ubi ante Morbum hunc ægritudo quædam evacuationes copiosiores exposulaverit. 129. ad 130. Rei Exempl. traditur. 130. Si ægro alvo non facile solubilis, leniora Cathartica non exhibenda. 128.

Cathar-

Cathartorum vim quandonam eludat. ibid. Si Cathartica Ventriculo retineri nequeunt, Anodynum præmittendum est Cathartico; sed quidem horis duodecim, & ultra, interpositis. 129. Anodyna post Catharsin, & diebus inter Purgationes, mane & sero exhibenda. ibid. Ubi non amplius purgandum, in usu tamen Narcoticorum, & larga quidem dosi, continuandum mane & sero, donec dolores cessaverint, & non ultra. ibid. Ubi Fructus horæi, vel Cibi δυσπρότοι Morbi causa sunt, ventriculus Zythogala antequam alia instituantur, diluendus. 128. 511. Dein exhibeatur Narcoticum, & sequenti die vena secetur. 128. 511. Diæta quænam. 131. Diu adhuc post Curationem in illa continuandum. ibid. Equitationem vero postulat hic Morbus. ibid. Dolor ubi recidivus, Paregorico bis de die exhibitto, prævertitur, vel eo non juvante Equitatio unum superest remedium, vel in Curru vectio, simul cum Anodyno, post debitas Evacuationes, si diu continentur. 130. Colica biliosa ubi non bene tractata, si languor adest & macies, quænam exhibenda. 131. 510. ad 511. — Hypochondriaca eodem modo concipitur & curatur, ac Hysterica. 514. 133. — Hysterica describitur. 131. ad 134. 513. Ad unguem Colicam biliosam refert. 131. 132. Quasnam aliquando præcipue Mulieres afficiat. 131. Icterus aliquando comitem habet. 132. 133. — à Spirituum ἀταξία & inordinato motu, potius quam humorum vitio aliquo, producitur. ibid. Hoc

Causæ antecedentes probare videntur.

Colica Hyst. propriè est Adfectus Hystericus, Coli partes adjacentes occupans. 132. Dolor licet vehemens in eo, nullum tamen vitæ discrimen adportat, nisi perversa cura. 133. Dolor in eo Morbo acutissimus, ubi solvetur Paroxysmus. 132. Icterus hic aliquando comitatur, brevi sponte evanescens, ibid. Vel ex hoc Morbo oritur. 133. Animi levissima commotio Symptomata revocat. 132. Exercitium præmaturum idem facit. ibid.

— aliter longè curatur, quàm Biliosa. 133. V. S. Purgationes, Enemata, vetantur; Anodyna rem absolunt. 133. 273. Paregorica quamdiu, & qua Methodo, usurpanda. 513. Præstat verò Zythogala ventriculum abluere ante usum Anodyni. ibid. Anodyna post Curationem, ut in Colica biliosa, continuanda sunt. 133. Verum aliquando ob humorum in corpore abundantiam, Phlebotomia, vel Catharsis, Anodyno via aperienda est; quod tum præstantius agit, & minori dosi. 133. 513. Hæjus Morbi Curatio radicalis alio loco traditur; sed Symptomatum Curatio exhibetur. 133.

— Lactea Diæta præprimis curatur, ubi repetita Narcoticorum vis nihil amplius, cum recidiva sit, juvat. 273.

— si per Paroxysmos adfligit, ad eos prævertendos quid agendum. 513. Chalybs tandem post varia usurpata, in primis Morbum eruere valet. 514.

Colica Pictonum quinquam Morbus; & quomodo curetur. 512.

Collutorium in Oris exulceratione intole-

- intolerabili, ex Salivatione Mercuriali.* 216.
- Color Evacuationibus rejectæ materiæ,** non tantæ auctoritatis est, ut inde de *Malignitate* dijudicemus. 133.
- **Interstitiorum Pustularum in Variolis Discretis,** octavo die ruber, instar Rosarum Damascen. ex inflammatione legitima; si enim pallor adest, malum. 81. 84.
- **Materiæ viridis, in Hystericis rejectæ,** quomodo ex ἀταξία Spirituum. 262.
- **Pustularum, in Variolis,** haturam quomodo distinguat. 82.
- **Anomalis Discretis,** An. 1674. non niger erat. 146.
- **Genuinis naturaliter subflavus est.** 85.
- **ruber in Variolis,** in Interstitiis Pustularum, instar Rosar. Damasc. octavo die incipiens, bonus; si cito recedit, malus. 81. 84.
- **saturatus, Chemica arte,** ex duobus limpidis liquoribus exhibetur. 263.
- **viridis humorum nostrorum excretorum,** non magis exigit, ut acres hi sint, quam ubi isti acres, ut virides sint exigant. ibid.
- Colorum speculatio adeo lubrica,** ut de corporum natura, in quibus adparent, nihil certi possit deprehendi. ibid.
- Coma, in Febris,** plerumque Naturæ committendum, tumque tutè, licet tardè, recedet. 141. Confirmatur Historia. 142.
- **in Febre Epid.** An. 1673. ad 1675. quale fuerit. 137. 141.
- **Stupor in Febre Epid.** An. 1673. ad 1675. Naturæ ope sensim recedebat, sed aliquando tricesimo tantum die, 141. 142. Quo tempore absurda licet peteret æger, erant concedenda. 142.
- Coma ex Febre nova Epidemica à calore lecti.** 355.
- **in Febre nova Epidemica,** ubi adest apyrexia, adesse videtur, si linguæ albedinem excipias. 360.
- **in Febre nova Epidemica,** ubi instat, vel calefacientibus ubi inductum, tractandum ut Phrenitis. ibid.
- **in Febre nova Epidemica,** naturæ committendum, post V. S. & Purgationes institutas. ibid.
- **in Febre Scarlatina Infantium,** quomodo tractandum. 162.
- **à Paregoricis,** post purgantia exhibitis, non excitatur, sed potius amolitur: quod si Auctor cogitasset, cum in Febre Comatosa, An. 1673. Ene-mata præscriberet, ausus fuisset Purgantia exhibere. 357.
- **in Variolis,** aliquando Symptoma est. 85.
- **Confluentibus ex calido regimine natum,** contraria methodo, qua & præcaveri potuisset, itidem tollitur. 97.
- Comatosi Adfectus in Februm Intermittent.** Paroxysmis, tam in Infantibus, quam Adultis, sæpe invadentes, non attingendi, quin aggravetur malum; sed Febris tantum, cujus Symptoma sunt, tollenda. 243.
- **Variolas Confluentes præcedere solent.** 244. Quid tum agendum. ibid.
- Combustio, vid. Ambustio.**
- **in Podagra,** ad dolorem committigandum, Remedii genus est, quod, Indiis Orientalibus Moxa, seu Musci Indici, ope acceptum licet feratur, &

Et Europæis incognitum habeatur, Hippocrati jam ante bis mille annos, ope Lini crudi cognitum fuit. 329. In podagra incipiente tantum prodest. *ibid.* Combustio illa causam Morbi antecedentem, h. e. Indigestionem, non attingit, neque in Podagra inveterata, aut perversa cura intro repulsa, aliquid præstabit. *ibid.*

Commotio Febrilis h. e. Commotio inordinata massæ Sanguineæ, Febris vel causa, vel comes, à Natura quem in finem concitetur. 29.

— massæ Sanguineæ, qui differat à Fermentatione liquidorum. *ibid.* A Natura concitatur, tum ob materiæ ipsi adversantis secretionem. *ibid.* Tum ad sanguinis renovandum statum, Et immutandam diathesin. 30. Sic tamen, in utroque casu, hoc indicatur, in Febr. Contin. præsertim, ut illa intra modum, Naturæ proposito congruentem, sistatur; h. e. ne hinc plus æquo gliscat, nec illinc nimium torpeat: Et quare. *ibid.*

Commotionis Vocabulum, in exponendis Febris, cur potius quam vel Fermentationis, vel Ebullitionis, arrideat Sydenhamo. 29.

Computatio in Variolis, semper à primo Morbi insultu fit. 84.

Concoctio Materiæ febrilis quid sit. 35. Urina in Febris Continuis, in declinatione præsertim, hanc denotat. *ibid.*

— in Febris, quæ, exolescente Intermittentium Autumn. prædominio vigeant, decimo quarto die plerumque contingebat. 158. Acceleranda attemperantibus dictis non est. 36.

Concoctionem Materiæ febrilis promoventia Remedia, Medicis dicta, non intelligit Sydenham. 35. Quid juxta ipsum sint. *ibid.*

Concoctiones æstivo tempore cur melius persolvantur, quam hieme. 325.

— Motu corporis justo ut promoven-
tur; sic justo vehementiore læduntur. 323.

Conditum, *vid.* Electuarium.

Confluentes Variolæ, *vid.* Variolæ Confluentes.

Constitutio Epidemica generalis unde pendeat, *vid.* Constitutiones Epidemicæ.

— quælibet Morbos parit, à Morbis ejusdem generis, alio tempore grassantibus, multum abludentes. 22.

— Generalis quælibet propria ac peculiari sibi Febris specie funestatur, quæ extra illam nusquam comparet. 22. 79.

— Anni quælibet huic illive Morbo Epidemicè producendo favere solet, Et alios Morbos concurrentes, in ejus similitudinem detorquet. 153.

— alicujus Anni generalis variis speciebus Epidemicorum communis, eorum materiam ita effingit, Et format, ut licet ab invicem, quoad Typum Et formam specificam distent, præcipua tamen Symptomata omnibus paria sint; atque utut diversæ hæ quoque fuerint species, quoad tempus invasionis, sævitæ, Et remissionis, consimiles sint. 25.

— Epidemica Universalis eadem manet, licet Epidemici Morbi, qui ad eam referuntur nunc excludantur, nunc intromittantur, certo tempore prout aëris qualitates

Dddd mani-

manifestæ illis plus vel minus fa-
vent. 117. confer. 22. Quæ Aëris
manifestæ qualitates eam habent in
hos Epidemicos potestatem, ut in-
tromittantur aut excludantur prout
illis favent, atque hi se modo exse-
rere possint ea tempestate, ad quam
sensibiles illæ qualitates eos destina-
verint. 117.

Constitutio Epid. totius anni, à Morbo
circa Æquinoct. Autumn. maximope-
re furente, nomen suū adipiscitur. 25.
Et licet alii sub eadem Constitutione
occurrant Morbi, ille qui à Constitu-
tione generali pendet, & principatum
obtinet, Autumno iterum domina-
bitur, ipsique reliqui omnes cedunt;
ut patet in Variolis An. 1661. ad
1664. Autumno, Epidemicorum co-
horti, Febris nempe, cedentibus.
62. Tum in iis Morbis, Dysenteria
An. 1669. ad 1672. autumn. adsi-
duè cedentibus. 104.

— Epidemica generalis suas Perio-
dos augmenti, status, & declina-
tionis, haud alias quàm Epidemici
iidem in subiecto particulari, habent.
106.

— quælibet generalis exacto aliquot
Annorum curriculo, facessit, atque
alteri locum cedit. 22. 256. An ita-
que Constitutiones Epidemicæ aliæ
dantur, quàm ab Auctore traditæ,
an verò, exacto quodam Annorum
curriculo, aliæ alias, certo ac con-
stanti ordine, excipiant, ignorat Au-
ctor itidem, 159.

— Epid. in Variolis Anomalis. An.
1670. ad 1672. Phænomena plura
insigniora, à Constitutione An. 1667.
ad 1669. differentia, produxit. 123.

— Regularibus Confluen-
tibus, Maculas purpureas, Pustu-

lis interspersas, quandonam exci-
tet. 84.

Constitutio Variolosa triplex Aucto-
ri fuit nota, quarum gradus adeo
diversi fuere, ut posterior priorem
semper exsuperarit, cum ratione pu-
tredinis, tum minoris concoctilita-
tis. 146.

Constitutiones Epidemicæ variis An-
nis variant. 22. confer. 21. Quæ
varietas reperitur tam respectu Sym-
ptomatum, quàm ratione medelæ.
ibid. Et hujus diversitatis causa hac-
tenus latet. 22. 159. Equidem il-
læ suam vim, ut Epidemicos Mor-
bos producant, ab occulta & inex-
plicabili quadam Alteratione in ipsis
terræ visceribus, unde aër effluviis
humana corpora huic illive Morbo
addicentibus, determinantibusque,
contaminatur, quamdiu stat hæc,
illave, Constitutio, obtinent; non
vero à manifestis aut sensibilibus
Aëris Qualitatibus, ut calore, fri-
gore, &c. hoc pendet; sed illa Con-
ditio recondita Constitutionum cau-
sa productiva Epidemicorum Mor-
borum est. 117. confer. 22. & 160.
An forte Corporum cælestium influxus
hanc Epidemicorum Constitutionem
produceret? 315.

— partes inimicæ, aëri permixtæ,
in initio valentiores habent, quàm ubi
earum vires refractæ. 110. Exem-
plum datur in Peste, & in Dysenteria
Constit. An. 1669. &c. 110. & 111.
ad 115.

— quæ Intermittentes Autumna-
les promovent, communibus annis
multo sæpius recurrunt, quàm il-
læ, quæ ad Epidemicos ceteros fa-
ciunt. 28.

— Pestilenciales aëris, Dei bonitate,
rariùs

rarius eveniunt, quàm istæ, quæ aliis Morbis Epidemicis; minus exitiabilibus, suscitandis inserviunt. 64.

Constitutionum Genera quinque, currentibus An. 1661. ad 1675. exstiterè; quinque nimirum aëris Diatheses, totidem Febres Epidemicæ peculiare. 156.

1. Constitutio Epid. An. 1661. ad 1664. quæ ferme nihil, quàm Febres Contin. & Intermittentes, quæ ultimæ tamen principatum obtinebant, produxit. 62. 156. Variolæ tamen qualibet æstate confertissimæ quoque invadebant; sed Autumno Febribus cedebant. 62. Traditur hæc. 27. ad 62.

2. ——— An. 1665. & 1666. quæ Pestilentialis fuit: hacque durante, delitescabant Variolæ, quæ brevi post adparuere. 78. Traditur hæc. 62. ad 78.

3. ——— An. 1667. 1668. & partim 1669. Variolosa fuit; continebat Variolæ, simulque Febrem novi generis Variolosam, dictam, quod Pus-
tulis demtis, non multum ab illis abhorreret. 78. Accessit itid. An. 1668. Diarrhœa Epidem. ejusdem Naturæ ac dicta Febris. 103. Traditur hæc. 78. ad 105.

4. ——— An. pro parte 1669. ad 1672. Dysenterica præprimis fuit, nam & Cholera Morbus, & Variolæ, atque Febres Intermittentes, quæ tum grassabantur, quolibet Anno, Autumno superveniente, Dysentericæ cedebant; Febris verò Dysenterica hyeme regnabat. 104. ad 106. Traditur hæc. 104. ad 134. Quo ritu & ordine se mutuo subsequentes iterum sibi invicem cedentes, Morbilli, Tormina ventris, Variolæ,

Dysentericæ, Febres Dysentericæ, & Febres Intermittentes, sese habuerint. 104. ad 106. Constitutio hæc nondum penitus exstincta erat, quando Constitutio nova An. 1673. est ingressa. 134.

5. ——— An. 1673. ad 1675. insecuta est. Hujus omnes Morbi perquam Anomali & irregulares fuere. 136. Funestabatur equidem primo Anno Febre Continua illa Constitutio, quamvis tum nondum virtutis istius erat, ut Constitutionis præcedentis Morbos penitus excluderet. 134. Morbilli altero An. insecuti sunt, & Variolæ ingressæ dein; Tusses tandem, supervenientibus Pleuritide & Peripneumonia ortæ. 135. & 136. Traditur hæc. 134. 155.

Constitutionum Genus alterum ab Anno 1676. ad 1685. traditur. 183. ad 200. In eo, Morbi Constitutio An. 1676. Morbos eosdem ad Const. An. 1673. ad 1675. sed mitiores & minus Epidemicos peperit. 184. 185. Aëris tamen Qualitates manifestæ peculiare, illo Anno, quoad calorem & frigus, erant. 184. Quid inde concludendum. ibid.

Constitutio generalis An. 1678. ad 1685. adeo Febr. Intermitt. favebat, ut Febrim Continuam nullam toto tempore nisi forte ex perversa cura, viderit Auctor. 197.

— nova An. 1685. primo exsolvente gelu, mense Februario, se manifestavit. 354. An mutata sit Const. præ manifestis aëris qualitatibus Annorum binorum 1683. & 1684. sævissimo frigore ita notabilium, ignorat Auctor; cum pro comperto habeat Epidemicorum species non pen-

- dere à sensibilibus aëris Qualitatibus. *ibid.*
- Contagium quomodo propagetur. 154.
- Continuæ Febres, *vide* Febres Continuæ.
- Contusiones V. S. & Purgantibus, alternatim iteratis, tutissimè curantur. 330. 524.
- In Contusionibus quænam specifica vulgo habentur, 330. Quænam verò ad artis regulas exhibenda. 524.
- Convulsiones sive Vapores, promiscuè, vocari possunt Hystericæ Adfectionis Effectus. 132.
- partium particularium, forte, Adfectum Hystericum constituunt. *ibid.*
- Infantum, *vid.* Epileptici adfectus, vel Epilepsia.
- Convulsivi motus non semper Evacuationes inhibent. 360.
- Cordis Scrobiculus in Variolis dolet. 80.
- Cornu Cervi Spiritus, in Infantum dentientium Febribus, arcanum. 367.
- Corpus humanum cur sibi non semper constet, sed ægritudinibus obnoxium. 6.
- variis malis, quod variis impressionibus forinsecus advenientibus excipiendis aptum, obnoxium est. 19.
- Correctiva dicta Purgantibus admixta, Catharsin reddunt laboriosiore. 212.
- Corroborantia, *vide* Roborantia.
- Cortex Peruvianus vulgo Pulvis Patrum apud Londinenses jam, tempore Sydenhami, ab Annis circiter viginti quinque, ad Quartanas curandas, notus fuerat. 187. Quasnam laudes mereatur. 186. ad 187.

- Cortex Peruv. solus, specificum Medicamentum notum hætenus. 14.
- Dogmaticorum inscitiam, in dignoscendis Morborum essentiis ac Remediis, detexit. 332.
- Senatorem, Capitaneum, & Pharmacopolam, Londini necat. 187.
- innocens, & mali nihil inferens, Medicamentum, Princeps Remediorum haberi fere potest. 186.
- Rheumatismi Scorbutici speciem, facile superabilem, si umquam quid mali, infert; sed raro. *ibid.*
- damnatus fuit, paulo postquam inclaruerat, 1°. Propter Periculum quod inferebat; cum aliquando, licet raro, necaret, quando ante adventum Paroxysmi exhibebatur. 2°. Ob Recidivam; nam intra 14. dies recidivat Paroxysmus, in morbo recenti, nec tempore mitigato. 188. Hæc duo incommoda removere tentat Auctor. *ibidem.*
- infamiam obtinuit, vel propter mala Intermittentes diuturniores subsequencia, ne quidem gustato Cortice; vel ob facultatem, qua sine evacuatione sanat: unde existimant materiam Febrilem inclusam. 186. ad 187. Quæ ultima difficultas solvitur. *ibid.*
- Periculum, non ex sua natura, infert, sed quia immediate ante Paroxysmum deglutitus Naturam impedit, quo minus materiam Febris aggestam sua Methodo expellat: hinc potius exhibendus ilico post Paroxysmum, diebus intermissionis, usque dum novus invadat. 187.

Cortex Peruv. qua Methodo exhibendus. 55. 188. ad 189. 192. ad 193.

— si Methodo, jam ante ab Auctore descripta, administratus fuisset, viverent forte non pauci, quos jam terra tegit. 193.

— vires confortandi & invigoriandi eximias habet, si gr. xx. mane & sero, sumantur, ad septimanas aliquot. 412.

— adstringente virtute an Febres fugat, non tam facile demonstratur. 187.

— purgando, Febrem aliquando tollit. 187. 189. In quo casu, quare, & quomodo, Laudanum cum Cortice adsumendum. ibid.

— ad Aphthas, & Singultus, in Febre nova Epidemica quando. 358. 366. Ad Apoplexiam Febri Interm. supervenientem. 191.

— Dietam qualem exigat. ibidem.

— ad Febrim fugandam ubi exhibetur, nil nisi Methodus observanda venit, Diæta & Regimine quocunque, susque deque habito. 332. Lecti calor non prodest hîc. ibid. Ejus calore enervatur. 247.

— exhibendus neque Catharsin, multo minus Venæ sectionem, præmittendam expetit: & quare. 55.

— in Febrib. Intermitt. neque Cathartica, neque Enemata, aut Evacuantia quæcumque, curato jam Morbo, sine metu Recidivæ admittit. 19.

— si aliis, quam quæ vehiculo inserviunt admiscetur, aut ignorantia fit, aut dolo malo. 192.

— vomitu si rejiciatur, quid agendum. 190.

— intervallo à Paroxysmis lon-

giore potius, quàm paulo ante exhibendus. 56. Paroxysmum instantem subito confodens, quid mali inferat. ibid. Paroxysmum intervallis quomodo repetendus. 56. 193. Diebus Paroxysmos disternantibus exhibitus, novæ minere accumulationem impedit, reliquiis istius materiæ per Sudorem ultimi Paroxysmi eliminatis, sicque prævertitur Paroxysmus novus. 189. confer. 186. 187. Exhiberi debet in interjectis Paroxysmorum spatiis; tum postea repeti, ægro jam convalescente. 192. ad 193.

Cortex Per. Recidivam habet, quod sâguis non satis saturetur vi febrifuga: Quare devicto morbo, justis intervallis ejus usus repetendus. 188. 189. Recidivæ præveniendæ causa, octavo die, post ultimam dosin iterandus; quod sic dein, tertio quartove, faciendum. 189.

— non pertinaciter nimis exhibendus, ubi Recidiva frequentior; sed ejus loco Decoctum amarum. 191.

— in Febribus Intermittentibus est absolutè specificum. 332.

— omnibus aliis pal-
mam præripit. 193.

— quasi miracula præstat; licet quibusdam non placeat, quod tam certo ac subito curret. 273.

— An 1678. certissimam spem fecit. 186. Et isti tamquam Herculeo Medicamento, si justo exhibetur, fidendum. 188.

— à ——— malè multatos ægros, eorum magno emolumento, parum refocillat; dum hos ab ipsis per duas, tres, septimanas liberavit. 55. Dyscrasiæ, quam Paroxys-

- mi induxerunt, sine ope Cathartico-
rum, subvenit. 191.*
- Cortex Peruv. ubi Febres Interm.
in Continuarum speciem vergunt, ni-
hilo minus est exhibendus, ut apyre-
xia redeat. 190. Sed etiam multo ma-
jori dosi tum indigemus. ibid. Verum
in sua actione lecti calore & calefa-
cientibus, interturbatur. ibid. confer.
247. 332.
- an in omni Intermittentium
Constitutione, æquè conducet, igno-
rat hoc nondum expertus Auctor.
198.
- in Febribus Intermitt. Au-
tumn. quomodo exhibendus. 56. Præ-
maturè tamen nimis ingestus, quid
noxii inferat. 55. Hinc ne nimis præ-
maturè ingeratur, nec prius quam
Morbus parum protrititus; nisi ægri
nimia debilitas exigat. ibid.
- in Febre nova Epid., si
Methodo tradita non omnino cedat,
adhibendus. 368. Idem in Febre hac,
quare à Medicis nonnullis adhibitus.
363. Sed successus votis raro respon-
dit. ibid.
- in Febribus Tertianis Verna-
libus ac Autumnalibus, æquè ac in
Quartanis, exhiberi potest. 56.
- solus fere Febrem Quartanam
licet fugare videatur, Inducias tamen
potius impetrat morbo, quam quod
eum debellet. 55.
- qua Methodo in Febre Quar-
tana exhibendus. 56. 123. In hac
expugnanda ad ℥j. in doses disparti-
tam, exhibendus venit. 189. In Fe-
bre Quotidiana & Tertiana possunt
℥vj. sufficere. ibid. Si ad Continua-
rum speciem vergunt ℥i℥. vel ℥ij. re-
quiruntur. 190.
- in Febribus Quotidianis &
Tertianis, non uti in Quartanis,
primum Paroxysmum, sed secundum
tantum, vulgo quare antevertat. 190.
ad 191.
- Cortex Peruv. in Febrib. Inter-
mitt. non tantum, sed tum in Uteri,
tum Ventriculi, Adfectibus summa
præstat. 186.
- in Hysterica & Hypochon-
dr. Adf. præsertim, ubi Spasmi dis-
torquent, bona præstat. 273. Sed non
tam certò succurrit ac in Febrib. In-
termitt. 67.
- Infantibus quomodo exhibendus.
190. 367. 495.
- in Morbis inflammatoriis om-
nibus nocet. 198.
- in Podagra tamquam Dige-
stivum, mane & sero, ad aliquot
grana adsumtum, prima obtinet.
314.
- Rheumatismum Scorbuti-
cum, ubi diu iteratis vicibus ad-
sumtus, sæpe infert. 173. Estque
hoc unicum incommodum ex hoc
Remedio illatum, quod notum. ibi-
dem.
- Sambuci interior in Hydrope Asci-
te agit uti Crocus Metallorum, non
vi specifica. 309.
- Coxe (Daniel) M. D. à Dysenteria
Const. 1669. ad 1672. primo An.
Methodo Auctoris curatur. 115.
- (Thomas) M. D. hortatur Au-
ctorem ut Medicinæ se tradat. 2.
ad 3.
- Cranium grandius qui habet, Podagræ
obnoxius. 302.
- Crapula Febres producit. 160.
- Crocus Metallorum in Hydrope, &
Sambuci Cortex, eadem ratione agunt,
non vi specifica. 342.
- Quomodo adsumendus, & quoties
re-

repetendus. 327. ad 328. 341. In Variolis Regular. quandonam & quo modo adsumendus. 96.

Crurum Tumor, vid. Tumor Crurum.

Crustæ in Variolis corpus obtegentes habitus putridos, & olentes, non sine vitæ periculo reprimunt. 126. Quibus mediis tum occurrendum. 126. ad 127.

Crustulæ in Lue Venerea, flavescentes, quo signo internoscantur: & latiores, uti Lepra describitur, variis in partibus reperiuntur. 207. Quo majori copia adsunt, eo Dolores in corpore minores. ibid.

Cubiti in Podagra irregulari quomodo adficientur. 305.

Curatio Adfectuum plurimorum, non caussarum, sed veræ atque expertæ Methodi, cognitione absolvitur. 66.

Curationes Morborum, vid. Morborum Curationes.

Curationis in Morbis Acutis rectè institutæ character. 119.

Currus in Calculosis Mictum Sanguineum non excitat, si per vias lapidibus non stratas vehuntur. 445.

Curru itinera conficere loco Equitationis, in Morbis curandis, utcumque substitui potest. 275.

— vectio, ad Colicæ biliosæ dolores, vid. Equitatio in Colica biliosa.

— in Podagræ inveteratæ Paroxysmo quid boni præstet. 326. Quandonam verò vetatur, & lectulus præferendus. 326. ad 327.

Curvatura Penis in Gonorrhœa virul. à fræno constricto. 206.

Cuticula Humerorum & dorsi non nunquam deperditur, si Variolæ Confluentes sævissimæ. 82.

— in Sanguine Pleuriticorum tenax,

subalbida, post primam saltem V. S. unde fiat. 164. Si exagitetur digito sanguis ille recens, non nascitur illa. 165.

Cutis Adfectus, vide Cutis Eruptiones.

— Eruptio quædam minus frequens describitur, ejusque Curatio proponitur. 176. Hæc species à refrigerantibus abhorret. ibid.

— quænam Aquas ferreas pro remedio exigat. ibid.

— Eruptiones, Chronici modo sint Adfectus, Methodo qua Febris Erysipelatosa, V. S. scilicet & Catharsi iteratis, curantur quam plurimæ.

— Ubi his non cedunt quid agendum. 175. 500.

— Methodo alia, quam Febris Erysipelatosa tractandæ. 175. ad 176.

— inæqualitas, Variolis discretis deciduis, nec foveæ, in facie, primis diebus adparent, propter Squammulas Pustulis succedentes. 81.

D.

D*ebilibus Adolescentulorum adcutus mirè interdum prodest. 39.*

Decocta Lignorum post Salivationem Mercurial. non exhibenda, quia Recidivæ causa esse possunt. 213. In Gonorrhœa virulenta plus mali, quam boni, inducunt. 211.

Decoctum in Ictero ex Colica biliosa. 134. In Febrib. Tertianis Autumn. vulgare Antifebrile in Anglia, unde conficitur. 54.

— album, quomodo paretur. 524.

— In Dysenteria quomodo paretur. 112. In Variolis Anom. æstum temperans. 125.

Decoctum amarum Antifebrile in *Tertian.* An. 1678. 193.

—— Purgativum. 489. In Febribus Intermitt. ubi *Recidiva* frequentior. 191.

—— Aperiens & Antiscorbuticum. 488.

—— Diæticum. *ibid.*

—— ad Hydropem ex *Sambuci cortice.* 342. In Pleuritide essentiali *Pectorale.* 165. Pro Potu Diætico in Podagra. 321. Usus ejus initium fiat soluto quodam Paroxysmo, tumque in eo perseverandum in Paroxysmis, & extra ipsos, per totam vitam. 321.

—— Pulli in Cholera. 107. 511.

—— Vulnerarium, cum Spiritu Vitrioli, in Mictu cruento ex Febre acuta. 254.

Democriti, de Morbis ab Utero productis, sententia quomodo intelligenda. 260. In Democriti puteo Podagræ radicalis Curatio adhuc latet. 532.

Dentibus *Hysterica Adfect.* non parcit. 263.

Dentitioni Infantum superveniens Convulsio sola Venæ sectione curatur. 122. Specifica vulgaria hîc minus tuta sunt. *ibid.*

Depuratio sanguinis genuina fit secretionem, & per fæces, & per flores. 43.

Desperatio in *Hysterica Adf.* de recuperanda sanitate plerumque adest. 259. ad 260. confer. 258.

Despumatio Febrilis, seu tertium Intermittentium Paroxysmi tempus, quid sit. 46.

—— Febribus Continuae quibusnâ causis, & mediis, impediatur. 36. 39.

Desquamatio in Morbillis An. 1670. uti in Febre Scarlatina, farinosum

quid in cute relinquit: quod in Morbillis An. 1674. non contingebat. 144.

Diabetes quid, unde nascatur, quales edat Effectus. 192. 520. Ejus Indicationes curativæ & Medela. 520. 192. 520.

—— in Febribus Intermitt. Senibus quando, & unde superveniens. 192. Quomodo curanda. *ibid.*

Diacodium Laudano præferendum. 364.

Diæta, qua Auctor Mictu Sanguineo à Calculo, & Podagra, laborans usus est, describitur. 445.

—— in Angina, carnes, & earum juscula, vetat; Vegetabilia & farinosa præscribit. 177. In Apoplexia, Paroxysmo sublato, qualis. 507. In Chronicis Morbis quare observanda. 318. In Colica Biliosa. 131. Diu continuanda. *ibid.* In Cortice Peruviano utentibus. 191. In Diarrhoea, eadem ac in Dysenteria. 113. In Dysenteria. 112. In Dysenteria ex Torminibus ventris, in Febre nova Epid. oborta. 364. In Febre Dysenterica. 118. In Febre Epid. An. 1673. ad 1675. quænam. 139. Febrim in Tussi Epid. An. 1675. præcavens. 151. In Febre Erysipelatosa. 175. Cardiaca & corroborans in Febrib. Intermitt. Autumn. quando, & cur, necessaria. 57. In Febre hyemali. 349. In Febre Variolosa. 101. In Febribus Continuis. 38. In reconvalescentibus à Febribus Continuis, *ibid.* In Gonorrhœa virul. qualis. 210. Quare refrigerans. 208. In Hæmorrhagia narium qualis. 178. In Ileo vero, qualis. 45. In Lue Venerea ubi salivatio adhibetur, 216. In Mensium fluxu immo-

immodico. 283. In Mictu Sanguineo, à Calculo, qualis ab Auctore instituta. 442. In Morbillis. 121. In Morbillis Anom. An. 1674. quænam. 144. In Podagræ Intervallis respectu Cibi quantitatis, qualitatis, temporis. 318. Cur hic Palato aliquando consulendum. 318. In Podagra religiosè observanda. 318. ad 327. Utut religiosè vero observata enormioribus insultibus quidem liberat, & majora intervalla procurat; sed ab eo insultu, exeunte hieme præsertim invadente, rueri omnino non potest. 324. 325. In Podagræ Paroxysmis. 326. ad 327.

Diæta Lactea in Podagra. 318. ad 319. Qua ratione magis obest, quam prodest. 319. Emolumentum perbreve, ac fugax modo, infert. ibid. E Sero Lactis Phlebotomiæ loco, in Rheumatismo, substituitur. 199. Exempl. in Casu. 199. In Morbis pluribus quam Rheumatismo V. S. loco substitui posset, ni obstarent præjudicia vulgi. ibid. In iis vero qui virilem ætatem prætergressi, & qui vino ac spirituosius potati, nocet multum ac Hydropem infert. 200.

— in Salivatione Mercuriali pro Lue Venerea. 216.

— in Tussi Epid. 1675. absente Febre, &c. 151. 153.

— in Variolis Anomalis nigris An. 1670. temperans. 126. In Variolis Anom. nigris An. 1674. qualis. 146. In Variol. Anom. nigris pessimis. 146. In Variolis Confluentibus. 250. In Variolis Regularibus, primis initiis, ex temperatis seu refrigerantibus, & facilioris digestionis, commendanda. 90. In Variol. Regul.

Discretis, post Eruptionem, adhibenda. 91. & confer. 90. Sed sub finem Cardiaca paulo, ob halitus putridos, sit. 92.

Diaphoresis, vid. Sudor.

Diarrhœa. 509. In Febribus aliquando oritur à radiis inflammatoriis in Intestina inversis. 99. 102. 103.

— in Febribus Continuis, ex neglectu Emetici, ubi in principio Morbi vomendi propensio adest, excitari solet. 31. 43.

— in Febribus inflammatoriis, Emetico non tantum non impeditur, sed quandoque creatur. 43. Sic in Febre Const. An. 1665. Emetico non præcavebatur, ut in aliis sæpe, sed provocabatur. 63.

— in Febribus, ubi proclivitas ad vomendum comitatur, Emetico, vix adstringentibus, tollitur. 31. 33. 43. Sed, si Emetico non cedit, Enema adstringens adplicandum. ibid.

— in Febrium continuarum declinatione, an tamquam critica permittenda, vel sistenda. ibid.

— in Febribus continuis non tam sæpius, ac quidem vulgo existimatur, criticè morbum solvit. ibid.

— si nimis, in Febribus continuis, toleratur, mediam modo sanguinis depurationem procurat. &c. ibid.

— in Febr. contin. 1661. &c. quandonam, & quidnam, producere valebat. 28. Vomitorio quomodo avertenda. 31. 32. 33. Quomodo aliter noceat. 32. Symptomata, quomodo curanda. 43.

— Constit. An. 1668. Febre Variolosa adhuc regnante, Epidemice grassabatur, & Dysenteriam subsequentem prægredebatur. 103. Qua

Eeee tum

tum regnabat post Febrem Variolosam, ipsa erat Febris Variolosa, ejusdem essentiae, sed forma diversa, seu in Intestina introversa, nullo signo febrili exterius se prodente. ibid. Qualia cum Febre Variolosa Symptomata communia, præcipue dolorem, ad scrobiculum cordis, & alia, habuerit. ibid. Dolorem hunc ad Epigastrium usque exporrigebat. ibid. In Epigastrio inflammationem habuit aliquando, quæ in Apostemate, & morte, terminabatur. ibid. Curatio ejus. ibid. Hæc perficiebatur eodem modo ac illa Febris Variolosæ; Venæ-sectione scilicet, Regimine refrigerante, Dieta simili. ibid. Si contrariis tractaretur, & purgantia lenitiva aut adstringentia adhiberentur, ex leni natura in exitialem transibant. ibid.

Diarrhœa An 1670. ad 1672. Dysenteria regnante, quomodo curabatur, in Adultis, tum in Infantibus. 113.

— in Febr. Epid. An. 1675. Symptomata quomodo curabatur. 142. & 143. Autumno potius Symptomata, quam Morbus essentialis erat. 135. 137. & 142.

— in Febre variolosa, unde & quomodo curetur. 99.

— ex Hysterica Adf. cum rejectione materiae viridis, sed sine dolore, quandam. 258.

— in Morbillis, à Calefacientibus, diu fatigans. 121. Post Morbi recessum superveniens, V. S. curanda. 122.

— Peripneumoniam excipiens, V. S. curanda. ibid.

— & Vomitiones in Peste & Febre Pestilentiali, sudore excitato, illico

sistuntur. 75. ad 76. Historia confirmatur. 76.

Diarrhœa in Pleuritide ac aliis inflammatoriis Morbis, quare aliquando contingat. 99. Pleuritidem veram excipiens, V. S. curanda. 122.

— in Podagra inveterata, ex materia Morbi ad Artus non eliminata, quod Aquæ frigida usu fieri potest; si Laudano, exercitio, cardiacis & adstringentibus, non cedat, per Sudorem curanda. 328.

— in Salivatione Mercuriali, initio sæpe, simul ac Mercurius Sanguini admiscetur, antequam Salivatio bene adsurgat, exoritur; quæ Opiatis reprimenda, cum & Salivationem, & Curationem, inde pendentem, impediat. 213.

— in Variol. Anom. pessim. Salivationis vicem quando subeat. 147. In Variolis Confluentibus aliquando Eruptionem præcedit, & quare. 91. Atque aliquando post illam protrahitur. 81. Neque Paregoricis sistenda, quia Natura rem absolvit. 91. In Adultis Symptoma periculosum est, ex frigore nimio ortum. 86. In Infantibus æquè certo, ac Salivatio Adultis, maturescentibus Pustulis supervenit. 94. Aliquando tamen non ita certo adest. 83. Iis tamen salutaris est. 97. Et Infantes tardius invadit, quam Ptyalismus Adultos, sed sibi commissa singula Morbi studia decurrit. 83. Materiae morbigicae eliminandæ inservit. 94. Adeoque Infantibus inservit; uti Salivatio Adultis, Naturæ dono. ibid. Hinc non sistenda, in iis, sed Naturæ committenda; nam Muliercularum consilio malè suppressa Infantium millia leto dedit. ibid. Quare hic

hic Discrimen non adferat ac in Dis-
tinctis. ibid.

Diarrhoea Confluen. & Salivatio, hæc
in Adultis, illa in Infantibus,
Symptomata sunt non prætermitten-
da. 83. Et adeo in hac specie neces-
saria, ac sunt Pustulæ, vel & fa-
ciei, ac manuum intumescencia.
ibid. An à Natura ideo substitutæ,
quod per parvulos Abscessus mate-
ria exterminari, ac in Discretis per
maiores, nequeat, quare non defi-
niat Auctor. ibid.

Discretis Symptoma a-
nomalum ex repercussione Vario-
larum à frigore nimio, vel Eva-
cuationibus indebitis, oriri solitum.
97.

Variolas Epidem. Constit. 1667.
ad 1669. ultima æstate præsertim,
concomitans, erat tantum Febris
Variolosa istius Constit. introversa.
78. ad 79.

colliquativa in Tabe, aliisque
Chronicis, mortem anteire solet.
275.

Diascordium ad Diarrhoeam, 113. Ad
Diarrhoeam in Salivatione Mercuria-
li. 213. 215.

in Febris Continuis quando ex-
hibendum. 33.

Dies Eruptionis in Variolis, vid. Erup-
tionis Dies.

Die Primo, in Morbillis, calor &
frigus se expellunt. 120.

Diebus prioribus Natura Variolas di-
gerit. 86.

Die Secundo, Febris manifesta, in
Morbillis, & alia Symptomata in-
gruunt. 120.

vel Tertio, Variolæ Ano-
mal. Confl. Constit. An. 1670. erum-
pebant. 124.

Die Tertio, Variolæ Anomalæ Dif-
cretæ erumpunt. ibidem.

Variolæ Confluentes Regula-
res erumpunt. ibid.

in Var. Confl. quid contin-
gat. 81.

Quarto, vel Quinto, Morbilli
erumpunt. 120.

erumpebant Morbilli Anomali,
An. 1674. semper. 144.

in Variol. Confluent. inclusive
ab eruptione puta, omnes Pustulæ in
conspetu sunt, nec plures expectan-
dæ. 236. 244.

erumpunt Variolæ Distinctæ
Regulares. 124. Nam hicce Vario-
larum Eruptionis proprius est, ac
naturalis, dies. 90.

in Variol. Discret. quid con-
tingat. 80. & 81.

Sexto, Morbilli exsiccari inci-
piunt. 121.

in Variol. Confluent., ab inva-
sione puta, Pustulæ omnes in conspe-
ctu sunt, nec plures expectandæ.
236. 244.

Octavo, Morbilli evanescent in
facie. 121.

in Variol. Discretis, & Un-
decimo, in Confluent. Symptoma-
ta Anomala quænam adsunt. 84.
ad 85.

in Variol. Confl., & post,
quid contingat. 82. Tumor Faciei
incipit & undecimo subsidet, in-
cipiente tum tumore Manuum.
248.

in Variol. Discret. quid con-
tingat. 80. & 72. Facies si non tu-
met, & Pustularum interstitia pal-
leant, malum. 95. In Discretis ma-
lignis Constit. An. 1661. ad 1664.
periculum aderat, illo die. 62.

Die Nono, Morbilli undequaque disparent. 121.

— Decimo tantummodo, Puerpera tenerior & vaporibus obnoxia, se lecto contineat. 279.

— Undecimo, in Variolis Anomal. Confluent. mitioribus, Febris secundaria, dicta, à Pure, exoritur. 234. 238. 249. Et periclitatur æger, præ copia Pustularum. 235. Hinc dies ille vulgo periculo plenus, nisi Medicus se interposuerit. 381. Et hoc die Mors invadere solet. 240. Caloris & Inquietudinis Paroxysmus semper vexat. 247. Hinc Pægorica temporius, quàm aliis diebus, h. e. hora quinta exhibenda, ob Paroxysmum vespertinum. ibid. Et horum defectu plures extincti. ibid. Hoc die quoque Tumor Manuum incipit, subsidente eo tum Faciei, qui ad Pustularum maturacionem usque perdurat. 248.

— in Variol. Regul. Confl. quid contingat. 83. 84. Periclitantur tum, eoque plerique moriuntur. 125. Sed licet discrimen inferat, eo semel elapso salva res erit. 145. Et qui moriuntur, ex Saliva spissa suffocante intereunt. 97. Saliva aliquando adeo viscosa, ut ægrum, stupore inducto, suffocet. 96.

— in Variol. Regular. Discret. quid contingat. 81.

— Decimo quarto, in Febr. Epid. An. 1673. ad 1675. qui vulgaribus Symptomatibus adfecti erant, restituti erant. 136.

— in Variolis Confluent. mediocris generis, Febris secundaria, dicta, à Pure, exoritur. 234. In Variolis Anomalis Confluent. An. 1670. ad summum Decimo sep-

timo periculum adest, quibus superatis, salva res. 145. Et die decimo quarto moriebantur tantum, in Variol. Confluent. Anom. Constit. An. 1670. ut plurimum. 124.

Die decimo quarto vel quinto, in Var. Regular. Discret. quid fiat. 81.

— Decimo septimo, in Variolis Confluent. pessimi generis, Febris secundaria dicta, à Pure, exoritur. 234. Hoc die moriebantur aliquando, in Variol. Confluent. Anom. Constit. An. 1670. Hocce verò præterlapso salvi erant. 125.

— Vicesimo, in Lochiorum suppressione, jam ferè in vado res est. 281.

— in Variolis Anomal. Confl. An. 1674. & aliquando posterioribus adhuc, periculum adest. 146. 83. In Variol. Reg. Confluent. quid contingat. 83.

— primo, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. ubi Morbus pertinacior, restituti erant. 137.

— Octavo in Febr. Epid. An. 1673. ad 1675. qui Comate adfecti erant, sæpe reconvalescere incipiebant. ibid.

— Tricesimo in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. qui Comate laborabant, reconvalescere aliquando tantum incipiebant. 137. 142.

Diemerbroekius Venæ sectionem, in Peste, damnat. 70. Refutatur cum aliis, qui Diaphoresin culpant, ac si inde ægri debiliores fierent. 76.

Differentia inter Febres Continuas Autumnales, & Intermittentes Autumnales, quomodo consideranda. 27.

— Specifica, ne quidem ulla, à Philosophis enodari potest. 187.

Differentiæ inter Morbos Acutos, & Chronicos, percepta causa, ad inve-

inveniendas veras Indicationes horum Morborum, magni momenti est. 315.
Digestiva in Podagra vocantur, quæ Naturæ opem ferunt in muneribus suis ritè fungendis, sive Pharmaca, sive Dietetica, sive Gymnastica, fuerint. 313.
 — *Media, vid. Medicamenta Digestiva.*
 — *in Chronicis Morbis debellandis, quare adeo valeant.* 317. *Quamdiu in eorum usu perseverandum.* ibidem.
 — *in Febribus Intermitt. Const. An.* 1661. *ad 1664. ob materiæ crassitiam Evacuationi erant præmittenda.* 100.
 — *in Podagra quantum conducant.* 317. *Et quando usurpanda.* 318.
Digitum, in Podagra non Regulari, quomodo adficiantur. 305.
Digitorum Articuli in Rheumatismo, vid. Articuli Digitorum.
Discrimen, vide Periculum.
Distinctio Februm Intermitt. in Verna-les & Autumnales, quàm necessaria Medicinam excolenti sit. 48.
Divites à Variolis quare interficiantur magis quàm Plebs. 92.
Diuretica in Hydrope, loco Purgantium, ubi vel Constitutio debilis, vel Hysterici Adfectus, hæc vetant. 343.
Hic tum præ ceteris omnibus inserviunt Salia lixiviosa. ibid.
Dogmatici quomodo tam in dignoscendis Morborum essentiis, quàm in Medicamentis, quibus eos adgrediuntur, hallucinentur, constitit invento Cortice Peruviano. 332.
Dolor, in Ileo, unde. 44.
 — *Penis, in Gonorrh. virul. dum erigitur, noctu præprimis vexat;*

estque signum Pathognomicum. 206.
Dolor in Pleuritide punctorius, quo tempore incipiat, & quem Thoracis locum occupat. 163.
 — *in Podagra, Pharmacum Naturæ est amarissimum; quo enim ille vehementior fuerit, eo citius transit Paroxysmus.* 306.
 — *in Podagræ irregularis Paroxysmo, toto tempore non perdurat, modo pars adfecta quiescat.* 305.
Minimus motus contrarietate accersitur, sed subito iterum evanescit. ibid.
Podagræ Regularis ingruentis similis est illi, qui Ossium dislocationem comitatur. 303. *Quando, & quomodo, incipiat, procedat, desinat, & recrudescat.* 303. *ad 304.*
Vesperis semper augetur & sub Galli cantu levatur. 304. *Sudoriferorum ope, in Paroxysmo exhibitorum, exacerbatur.* 311. *In Podagræ inveteratæ Paroxysmo, potius leniendus quiete in lecto, quàm Anodynæ usu, nisi nimium sæviat.* 329. *Vegetatione, in Podagræ inveteratæ Paroxysmo, excitatus, quando nam ferendus, ad Mortis periculum effugendum.* 327.
 — *in Scrobiculo Cordis, in Febre Variolosa.* 98. *Variolis Regularibus jam instantibus tantum notus.* 98. 99.
 — *& Variolis, & Febri Variolosa, tunc & Diarrhææ An.* 1668. *communis fuit.* 103. *Sed in Diarrhæa hac ad usque Epigastrium extendebatur ille.* ibid.
Dolores in Hysterica Adf. ex Spirituum animio impetu. 263. *Medicis facile imponunt; cum sæpe aliorum Morborum speciem præ se ferant.* 278. *Exempl. in Paroxysmo Nephritico, & Colica Biliosa.* ibid.

Dolores in Hysterica Adf. Teneritudinem in partibus, tactum refugientem, ac si fustibus fuissent exceptæ relinquunt. 391. Laudano compescendæ, si omnino intolerabiles; quin alias Evacuantiæ prius adhibeantur. 276.

— Luis Venereæ præsentiam initio indicantes. 207.

— in Lue Venerea, progressu temporis, quinam adsunt. ibid.

— Rheumatici, vid. Rheumatici Dolores,

Drake (Joannes) Auctorem, dum manu tremula calamum regere nequit, in conscribendo Tractat. de Podagra & Hydrope, adjuvat. 301.

Dux Hetruriæ quo modo à Peste immunem se servaverit. 65.

Dysenteria propriè habetur, ubi frequentes sunt Dejectiones, cum Ventris torminibus & colluvie mucosa, sive sanguis admisceatur, sive non. 109. Ejus Descriptio. ibid. 509.

— Autumnalis est Morbus. 24. 106. 123. Sed Hyems ipsi obest. 106. 123. Autumni initio fere semper invadit; Hyeme, pro tempore, recedens. 108. ad 109. Sic mense Augusto prognata usque ad hyemem excurrit, vel, duorum mensium spatio, cursum suum absolvit. 23.

— Verno ingrediente, & alio quoque tempore, si aura calidior gelu superveniat, vel annus epidemicè faveat, non nullos adficere potest. 109.

— non rite curata in initio, ad Annos aliquando, licet raro, discruciat, crasi sanguinis infecta; qui curanda. 115.

— dolores summos non tantum, sed ingens quoque vitæ discrimen adfert, si non peritè tractetur. 109.

— quo sensu sit aliquando Febris in-

troversa & versus Intestina determinata. 25. confer. III.

Dysenteria Adultis exitialis non raro. 110. Infantibus benignior; & diu illi hanc ferunt, si modo res Naturæ committitur. ibid. In Infantibus, quomodo curanda. 113.

— Species varias, uti Variolæ & Epidemici alii, diversis Constitut. habere potest. 110.

— Endemia Hybernorum an cum aliis conveniat, quare ignoret Auctor. ibid.

— Epidemica, Constit. An. 1669. ad 1672. an cum aliorum temporum Dysenteriis conveniat, ignorat Auctor. ibid. Ubi per decem Ann. vix comparuerat iste Morbus, post Febrem Variolosam, & Variolas ipsas, harumque comitem Diarrhœam, grassari incipit, mense Augusto. 78. 103. 104. Hanc Novum Febris genus comitatur. 104. Adpetente Bruma recedit, grassante tum Febre Dysenterica; sed Autumno An. 1670. inclementius redit. 105. Hyeme iterum recedit, regnante tum iterum Febre Dysenterica. ibid. Et tertio redit An. 1671. sed mitior, & iterum superveniente Hyeme, cedit; regnantibus iterum Febre Dysenterica cum Variolis. ibid. Tandem An. 1672. Augusto redit, non pauca sed mitior, & hyeme recedit. 105. 106.

— Febris sui generis, in Intestina introversa, Auctori videtur. 25. Calidos & acres ibi deponens humores, & impetu vasa sanguinea aperiens, dum simul Intestina, suo nisu hos expellere satagentia, cum naturalem exprimunt. III. confer. 25.

Dysen-

Dysenteria Epid. Symptomata quænam habuerit. 109. Primo ingressu Symptomata uti alii Epidemici, atrociora habuit, quàm in statu; licet tum plures adgrederetur, mitiora tamen erant, uti & in declinatione. 111. Tormina recedebant pro gradu adolescentiæ Constitutionis. ibid.

— primo Anno, ut alii Epidemici, Naturæ subtilioris fuit. 110. ad 111. & 114. Humoralis quoque magis, sub finem Constitutionis erat: in initio enim nullæ dejectiones molestant; stercorosæ ita non erant, tormina atrociora; ubi fatigante Constitutione omnia contrario habebant. 111. Humoralis, in suâ declinatione, magis quod fuerit, quid circa Epidemicorum naturam denotet. ibid.

— iisdem, quibus primo Anno sanata, sequente Anno non curatur. 115. Curatio, primo Anno, differt à Curatione generali; & qualis fuerit. 114. In principio Sero lactis frigide hausto, & calide per Enema quater injecto, post V. S. institutam; dein ut Cholera, diluentibus, curabatur; sed Sero Lactis loco Jusculi vel Zythogalæ. ibid. Quæ Methodus repudianda, licet fastuoso Remediorum apparatus non ornata. ibid. Per V. S. iterum curatæ Exemplum. 115. Catharticis primo Anno, quam diluentibus & temperantibus, quare non ita cedebat. 114.

— hæc & Febris eam concomitans, à Doctore Butler in Africa sanatur, eodem modo ac ab Auctore, in Britannia. 114. ad 115.

— Constit. An. 1670 ad 1672. Epidemicè sæviebat, una cum Variolis

Anomalis, Autumno semper primas tenens. 123. 124. Variolis in pares concurrebat ultimo Autumno, ceterum primas Autumno tenens. 123. In Variolis Anom. An. 1670. ad 1672. regimine calido tractatis, sæpe inserviebat materiæ eliminationi, singulari eventu. 125.

Dysenteria An. 1673. Novembri mense, post acré gelu, succedente calore, hinc inde spargitur adhuc; nec postea amplius istius speciei adparet. 134.

— Autumnali An. 1675. potius Symptomata quàm Morbus essentialis erat. 135. 137. & 142.

— in Febr. Epid. An. 1675. Symptomata, quomodo curabatur. 142. In Febre nova Epid. 1685. ex Torminibus Ventris oborta, Laudano solo curatur. 364. Quare hæc potius ita compescenda, quàm vulgari Methodo tractanda. 364. Sed, Dysentericiæ ubi Epidemicæ grassantur, primo Evacuationes in usum revocandæ. 365.

— Symptomata. 135.

Dysentericiæ variæ. 104. ad 106.

— species, in Variol. nigris pessimis, neglectu V. S. oborta. 148.

— Curatio in genere. 111. ad 113. 509. ad 510. Indicationes curativæ sunt; Venam secare ad revellendum impetum; Humores temperare, eosque per Catharsin subducere. 111. Sed Laudano solo aliquando tuto curatur. 116. 364. 510. Ubi Morbus contumacior, quid agendum. 112. ad 113. Symptomatum Curatio. 115.

Dysentericorum Febres Symptomata habuere simillima iis Febris Dysentericiæ. 118.

In Dyſenteria ætas ſi florida, quid mali contingat. 109.

—— Aphthæ mortem denunciantes, à Cathartico neglecto, & calefacientibus, adstringentibus adhibitis ortæ. 117. 109.

—— Calefacientia quæ mala producant. 109.

—— Dejectiones mucosæ cum vel ſine ſtriis Sanguineis, quales ſe habeant. 109. Unde ſiant. 111. Stercorosæ aliquando interponuntur, ſine dolore inſigni, in initio. 109. Mucosæ, progreſſu morbi, in eodem ægro, dolorem in Intestino recto excitant. 110.

—— Stercorosæ, progreſſu morbi, in eodem ægro, quare per Intestina tenuia, dolorem vehementem excitent. 110.

—— Conſt. An. 1669. ad 1692. circa finem, Dejectiones Stercorosæ magis erant, quàm Mucosæ. 111.

—— Diæta. 112.

—— Frigus manuum ac pedum Mortis periculum infert. 109.

—— Gangræna Intestinorum aliquando. ibid.

—— Potus frigidus admittitur. 112. Potus tepidus. 114.

—— ubi Recidiva quid agendum. ibid.

—— Sanguis ſincerus progreſſu Morbi aliquando, cum Mortis periculo, exit. 109. Unde illud. 111. Sudores Anomali concomitantes, cur nullius fuerint emolumenti. 158.

—— Tenefmus quando, & unde, vid. Tenefmus.

Dyſpnœa in Hydropicis, unde. 334. In Morbillis An. 1674. recedentibus, major erat, & magis in Peri-

pneumoniam vergens, quàm in aliis.

114. In Morbillis, Infantibus, poſt Morbi reſeſſum, letalis acciſens, V. S. curanda. 122. Calefacientibus hic inducta, V. S. quoque curanda. ibid. In Pleuritide eſſentiali, Tuſſi ſuppreſſa, V. S. neglectu, aliquando fere ſuffocat. 163.

E.

E Bullitio Febrilis, ſeu ſecundum Intermittentium Paroxyſmi tempus, unde fiat. 46.

Ebullitionis atque Fermentationis vocabulis, cur non æquè, ac Commotionis, in exponendis Febris utatur Auctor. 29.

Eclegma, vid. Linctus.

Ethymata, vid. Exanthemata.

Effluvia Aërem contaminare poſſunt ad Epidemicos ſuſcitandos Morbos, eoſque aliquamdiu propagandos. 146.

Elaterium quid ſit, ejus doſis, & quomodo exhibendum. 337. In Hydrope præſentiſſimum Medicamentum, in iis qui ægrè purgantur. ibid.

Electuarium ad Aphthas & Singultum, è Cortice Peruviano, in Febre nova Epidemica. 358. In Apoplexiæ Paroxyſmo ſublato exhibendum. 507. In Chorea Sancti Viti roborans. ibid. In Diabete. 192. In Diarrhœa adſtringens. 113. 510. In Febr. Interm. ex Cortice Peruviano. 56. 189. 193. 494. In Febre nova Epidemica, roborans. 358. In Febre Tertianâ duplici, corroborans. 55. In Febre Quartana ex Cort. Peruv. 561. 495. In Fluore muliebri. 192. 282. In Hydrope, digeſtivum, ad roborandum quale. 345. In Hyſterica Adfectione Cha-

Chalybeatum. 270. *Aliud corroborans.* 492. *In Ictero.* 134. *Ad Lochia suppressa ex Hysterica Adf.* 280. *In Mania communi, post evacuationes factas Cerebrum corroborans.* 62. *In Mensium Fluxu immodico adstringens.* 282. 192. *In Mictu cruento ex Febre Acuta.* 253. 254.

Electuarium in Podagra, quo Auctor tamquam Digestivo uti solet. 314. *Quo nomine Theriacæ Andromachi præferendum.* *ibid.* *Ad ejus compositionem Simplicia, palato quæ minus ingrata, sunt eligenda, cum ad omnem fere ætatem in ejus usu perseverandum sit.* *ibid.* *Quando præcipuè exhibendum; & quare.* 321. *In Pruritu ferino.* 175. *In Rheumatismo Scorbutico.* 174.

Emetica, vid. Vomitoria.

Emmenagoga in Lochiorum suppressione, Hystericis mista. 280.

Empirici, Morborum Historiæ & Methodi medendæ ignari, de corio humano ludunt & majorem edunt stragem, quam Morbi eorum auxilio destituti. 196.

— *in Podagra, ex Catharticis, quæ adstute celabant, existimationem sibi, cum damno ægrorum, quomodo compararint.* 311.

— *armis instruuntur, quibus Medicorum opera imitari queant, ubi scriptores potius in Remediis tradendis, quam in Genuinis Indicationibus expiscandis occupantur.* 16.

Empiricus insulsissimus Medicamenta Medicamentis æque adjicere novit, & solet magis, quam Medicorum prudentissimus. 158.

Emplastra Epispastica cervici, in Fe-

bribus caput petentibus, cum fructu adplicantur. 138.

Emplastrum pedale in Choreæ Sancti Viti. 362. 506.

— *in Hysterica Adfect. umbilicale.* 270. 490. *Hystericum Umbilico adplicandum ubi Lochia suppressa.* 280.

— *ad Lumbos in Mensium fluxu immodico, post primam Purgationem adplicandum.* 282.

— *è Mucilagin. Præputii labiis tumidis imponendum.* 211.

Empyema, post Pleuritidem essentialem, quandonam. 164.

Emulsio in Angina qualis exhibenda. 177. *In Febre acuta cum Mictu cruento.* 253. *In Febre hiemali qualis.* 349. *Refrigerans, in Gonorrhœa virulenta.* 210. *In Hæmorrhagia Nasarium.* 177. *In languore Febrili, cardiaca.* 37. *In Mictu cruento, ex Febre acuta.* 253. *In Mictu sanguineo in Variol. Confl. ex quibus.* 441. *In Pleuritide essent. leniens, & refrigerans.* 165. *In Rheumatismo qualis.* 171. *In Sputo Sanguineo in Variol. Confl. ex quibus.* 441.

Enchymoma, vide Vibices.

Enema in Alvi dejectionibus quibuscvis, anodynum. 112. *In Calculo ex Podagra diuturniore.* 328. *In Cholera Morbo, ex jusculo tenui, & Syrupis lenioribus.* 107. *In Diarrhœa quodnam.* 113. *In Diarrhœa Febrium contin. adstringens.* 43. *In Dysenteria præfractiore anodynum.* 510. *In Dysenteria Conflit.* 1669. *ex sero Lactis puro, post V. S., & largiter adsumtum per Os serum Lactis frigidum, quater injectum, initio Constitutionis, Tormina, & Dejectiones sanguineas, tollebat.* 114.

In Febre acuta cum Mictu cruento & Petechiis. 253. In Febribus contin. Sanguinem refrigerans. 34. In Febre Cont. An. 1661. &c. quandonam. ib. In Febre Contin. pro Pauperibus, ex Lacte Saccharato. 37. In Febre Contin. postridie Emetici exhibiti, quando, & quale, adplicandum. 34. In Febre Erysipelatosa quando & quale. 175. In Febre Variolosa. 101. In Gonorrhœa virulenta. 209. In Hæmorrhagia Narium, quotidie injiciendum, quale. 177. Ex Tabaci fumo commendatissimum in Ileo. 365. 512. In Lochiorum suppressione ex Lacte saccharato; semel tantum est adplicandum, uti de Narcotico dictum. 280. In Mictu cruento ex Febre acuta. 253. In Paroxysmo Nephritico à Calculo. 446. In Nephritide ex Podagra diuturniore. 328. In Rheumatismo quale, quando, & quamdiu, exhibendum. ib. Enemata in Angina, qualia & quando injicienda. 177.

- *carminantia, in Colica biliosa, crabrones irritant & Morbum diuturniorem reddunt. 129. In Colica Hysterica plus nocent, quam prosunt. 133. In Diarrhœa, adstringentia, parva quare ut sint mole, oportet. 43.*
- *& Refrigerantia Medicamenta, in causa esse possunt, quo minus Despumatio Febrium, spatio 336. hor. h. e. 14. dierum persolvatur, sed in longum evagetur. 52.*
- *in Febribus quibuslibet, fractis Morbi viribus, non diu repetenda sunt, præsertim in Hystericis & Hypochondriacis; & quare. 152.*
- *in Febribus continuis quando parcè, vel & neutiquam, adhiben-*

da. 34. ad 35. Quando largiter adhibenda. 34. In Febre Epid. An. 1673. ad 1675. propter diatesin inflammatoriam & stuporem sensuum, sæpe iteranda. 138. In Febr. Intermitt. Cortice Peruviano curatis, sine metu Recidivæ, etiam lenissima, non admittuntur. 191. In Febre Morbillosa, non conducebant. 144. In Febre Scarlatina quare deneganda. 162. Febr. Tertianas vernaes sæpe tollunt. 51. In Febre Tertianâ duplici interdicens. 55. In Febre Variolosa ubi Ptyalismus adest vitanda. 103. In Gonorrhœa virul. si ægri à Catharticis abhorreant, vel iis pertinaciter refragantur, in auxilium vocanda: at cum non æquetuto, vicissim hinc tum Catharsis, tum Enema, exhibenda, ne Lues exoriat. 209. confer. 210. Qua Methodo hoc fiat. 209.

Enemata in Ileo vero, per os rejiciuntur; quod Morbi hujus signum indicivum. 44. ad 45. In Iliaca Passione licet acra, in Emetica abeunt. 44. 128.

- *inter Laudani usum, ex Lacte saccharato modo si fuerint, istius effectum destruunt. 277. confer. 278.*
- *in Nephritide ex Calculo, vel Arenulis, necessaria, ut laxentur & dilatentur meatus. 278. In Nephritide ex Hysterica Adf. potius nocent. ibid. In Soporosis Adfectibus valde utilia. 138. In Pleuritide essent, ex quibus conficienda. 166. In Tussi Epidem. ubi Febris &c. adsunt, quotidiana. 152. In Variolis, evacuantia, initio an conducant. 88.*
- *Refrigerantia Sanguinis robur, & tonum,*

tonum, relaxant. 35. Quandonam loco Venæ sectionis in quibusdam Febribus continuis, substituenda. ibid.

Enemata in Febribus continuis, quo usque, & in quibus, iteranda. ibid. Vetantur post largam Venæ sectionem, & in ætate protractâ. ibid. Senibus minus quam aliis conducunt. ibid.

Epidemica Constit., vid. Constit. Epidem.

Epidemici Morbi, vid. Morbi Epidem.

Epilepsia Adultorum an forte curari posset, ut Chorea Sancti Viti, adaugendo dosin Venæ sectionis & Purgantium. 362. 506.

— Puerorum. 520.

— ex Hysterica Adf. caput obsidente, in Fœminis sanguineis, & fere virginibus, Uteri strangulatus dictus, describitur. 257.

— Infantium dentientium, nono vel decimo mense, aut à septimo ad decimum, supervenientes, ubi inflammatio Gingivarum, V. S. exigunt. 122. Hæcque, in hoc casu, quibuslibet aliis specificis sola anteferenda. ibid.

Epileptici Adfectus Infantium dentientium Materiam viridem biliosam, ut in Hysterica Adf. exprimunt. 262. 520.

— Infantium non amplius dentientium, Variolas, Morbillos, vel Febrem Scarlat. indicant. 243. Hi quomodo tractandi. ibid. Et cavendum ne pro Convulsionibus essentialibus habeantur. ibid.

— Febrium Intermit. Paroxysmos aliquando, sed raro, præcedunt. ibid.

Epileptici Adfectus in Febre Scarlatina Infantium, quomodo tractandi. 162.

Epileptici Paroxysmi, in Variolis, Discretis præsertim, jam jam prodituris, Infantes vexantes, indicant plerumque hunc morbum mitem, & boni moris, futurum. 80. Hi Variolas Discretas præcedentes, sæpe, Infantium damno, pro Essentialibus Adfectibus evacuantibus tractati, unde Pustularum eruptio fuit impedita. 243.

Epispasticum in Angina, cervici vel nuchæ quando adplicandum. 177. In Febre Epidem. An. 1673. ad 1675. ad Comatosum Adfectum superandum nuchæ imponendum. 138. Nuchæ in Febre nova Epid. Infantibus adplicandum. 366. In Febre Scarlatina quandonam adplicandum. 162. In Tussi Epid. ubi Febris &c. admista. 152. In Variolis, ad Epilept. Adfectus Infantium. 243.

— Pedibus in Variolis Confluent. ex Allio, in Adultis, adplicandum, à die octavo, omni die renovando, donec periculum absit. 250. Confer. 251.

Epistolæ Brady ad Th. Sydenham. 180.

— G. Cole ad Th. Sydenham. 230.

— H. R. Paman ad Th. Sydenham. 201.

Epithemata in Podagra, adplicita, sæpe nocent, prosunt numquam. 329.

Epocha, Febrium Intermit. Autumn. certa, est mensis Julius. 106. Febrium Intermit. Vernal. mensis Februarius est. ibid.

— in Variolis, primi insultus dies est. 80.

Equitatio firmat Sanguinem, ac spiritus, quam maxime. 274. Effectus

in nobis egregios illos præstat, quatenus impetum omnem in Ventrem, ubi vasa excretoria plura, determinat; illaque mille succussionibus ingeminatis exagitat; tumque calorem excitat; dein humores stagnantes adsimilat, dissipat per totum, & eliminat: tandem perpetuo motu Sanguinem exagitando permiscet, renovat, ac vigere facit, ibid.

Equitatio in Morbis Chronicis, & Phthisi præsertim, cur ita conducat. 316. In Colica biliosa, aut vectio in Curru, unicum remedium, (exhibito interim anodyno ad Dolorem recidivum Colicæ biliosæ extirpandum,) post debitas Evacuationes, si aliquamdiu continuantur. 130. In Hypochondr. & Hystericis summi momenti, & sanitatem præ ceteris conciliat; Et hujus rei exemplum. 274. ad 275. Idem in Phthificis, Tabidisque, præstat. 275.

— in Phthificis curandis magis efficax, quàm Cortex Peruvian. in Intermitt., vel Mercurius in Lue Venerea, si observanda observentur. ibid. Viribus ægrorum adcommo- dari debet, ut primo sit modica non violenta, sic gradatim adscendendo pro ratione virium incrementum. ibid. In Phthificis non juvat, nisi longa itinera emetiatur æger. ibid. In Adultioribus ad Phthisin sanandam multo diutius, quàm in Junioribus, continuanda. ibid.

— & Vectio in Curru in Chronicis quam pluribus præstantissimum remedium, modo quis in illo improbius perseveret; Et hujus rei ratio. 131.

— sed constans & assidua, in Morbis Chronicis, ac

Podagra, si grandior ætas, vel Calculus, non intercedant, adeo præstans est Medicamentum, ut si huic simile quis haberet, quod celare vellet, opes inde amplissimas facile adcumularet. 324.

Equus ad ætatem suam pertingit septem annorum spatio. 47.

Eruptio Pustularum, in Variolis, tardior celeriori præferenda. 90. Sæpe impeditur & supprimitur à violentia Morbi & à nimio impetu, Pustulas se mutuo opprimentes nimis urgente. 239. confer. 243. Adeoque non acceleranda (ubi de Variolis quædam suspicio) calidis & cardiacis, utut graviter ægrotent; nam non necant Variolæ quia tardius erumpunt, nisi calefacientibus impeditus fuerit egres- sus; hicce tum temperantibus allien- ciendus. 90. Verum ubi calefacientibus nimis acceleratur, pessimum, & ex Discretis in Confluentes inde sæpe mutantur Variolæ. ibid.

— adjuvari quarto die aliquando, si pro voto non succedat, poterit; sed per Cardiacæ blanda, paregorica, quæ æstuantis Sanguini frænum injiciunt; ante hunc diem verò non. 90. ad 91.

— Anomal. Discret. non quarto, ut in Discretis Regular., sed tertio die, ut in Confluent., contingit. 124.

— Confluentibus Regularibus ut plurimum tertio die, ante illum aliquando, rarò post, contingit. 81. 124.

— Discretis Regular. naturaliter, & ut plurimum, die quarto contingit. 80. 90. Rarò citius, sed aliquando ferius. 80. Quænam Symptomata tam in Adultis, quàm Infantibus;

tibus, præmittat. *ibid.* In laxiori temperamento, aliquando, sine insigni ægritudine prægressa, sensim ad expulsionis periodum pervenit. *ibidem.*

Eruptio Pustularum Regularibus, Evacuationibus opportunè institutis, aliquando promovetur. 87. ad 88.

Eruptiones Cutis, *vid.* Cutis Eruptiones.

Eruptionis Pustularum tempus, in Variolis, dicitur, ubi Natura separatam, priori tempore, materiam parvorum Abscessuum, seu Pustularum, ope, amandat, atque expellit. 88.

———— ab eo in Morbillis adeo discrepat, ut Morbus erumpens uterque, inde, facile discerni queat. 82. 125.

Erysipelas, *vid.* Febris Erysipelatosa.

Evacuantia ubi roborantibus Curatio innititur officium prorsus. 317.

———— in Apoplexia Febris Intermitt. superveniente mortem inferunt. 191. In Cholera, tuta non sunt. 108. In Dysenteria Epidemica, *vid.* Purgantia. In Febre nova Epidemica, licet convulsivi motus, aut subsultus adsint, idcirco non deneganda. 360. In Febr. Intermitt. Morbum protrahunt. 186. In Febr. Intermitt. Cortice Peruviano curatis, quæcumque vitandæ, metu Recidivæ. 191.

———— iterata in Febris, licet necessaria, corpus debilitant; unde fracto quasi Spirituum systemate, Symptomata leviora, quasi Februm reliquæ, remanent; quæ tempore recedunt, vel Paregorico superantur. 368.

———— in Hydrope quomodo agant, & quænam sint. 334. ad 343. In Hystericæ Adf. curatione, quænam ini-

tio instituenda, & quare. 207. Inter Paregoricorum usum non exhibenda, ne motu excitato, Symptomata revocentur. 277. 278. In Nephritis specie, Febres Intermitt. concomitante, summo opere vitanda. 201. In Podagræ Curatione non modo infructuosa, sed & nocua. 309. confer. 312. & 309. ad 312. Paroxysmum Podagricum cur excitent. 311. In Variolis, ut V. S. Enemata, Emetica, &c., in initio vitanda, si fieri potest. 88. Quo sensu nocere possint. *ibid.* In quibusnam requirantur. 243. ad 244. in quibusnam verò denegentur. *ibid.*

Evacuantia in Variolis non minori cum periculo motum requisitum retardare possunt, quàm calefacientia eundem nimis accelerare. 88.

———— opportunè adplicata aliquando Eruptionem Pustularum promovent. *ibid.*

Evacuationes justo copiosiores, in Morbis, quidnam producere valeant. 60.

———— Sanguinis indebitæ Adfectum Hystericum excitare valent. 133.

———— sponte à Natura fieri solitas, imitari velle sæpe stolidum est. 140.

Eventus in Variolis à Curationis fundamento, primis diebus jacto, pendet. 236.

Exanthemata in Morbillis An. 1670. faciem primo, in Morbillis An. 1674. humores primo occupabant. 145.

———— nigra, in Morbillis, Adultis contingentia, & interitus signa, quomodo tractanda. 121.

———— Pestilentialia imminentis leti sæpe indicia, à Sudoriferorum; in tenuiori humorum portione, Morbi

nempe sede, impetu facto, fibris fractis & comminutis, excitantur, in iis scilicet qui difficulter sudant. 72. Et in iis, qui facile sudant, Bubonum materia intropulsa & furiente, itidem producuntur. ibid.

Exanthemata in Variolis, vid. Pustulæ.

Excrementorum alvinorum liquidissima consistentia indicat Diarrhæam non criticam. 44.

Exercitium corporis, inter ea, quæ humorum indigestionem impediunt, hinc sanguinem roborant, ac firmitudinem conciliant, facile palmam præripit. 323. Et Calculum quoque prohibet. 324.

——— justo vehementius Spiritus dissipat, hinc Concoctiones lædit. 323.

——— in Hydrope loco Purgantium quando. 343.

——— validius in Gonorrhœa virul. scroti inflammationem excitare potest. 206. Vel recidivam, si reliquæ quædam adfuerint, producere valet. 208.

——— in Morbis Chronicis, vide Exercitium corporis in Podagra.

——— in Podagra & Chronicis plerisque, sive Equo, sive Curru, constans & assiduum, adeo præstans est Medicamentum, ut si huic simile quis haberet, quod celare vellet, opes inde amplissimas accumulare posset. 324. Pro Podagricis primum est Equitatio, ni grandior ætas, vel Calculus major, obsint; tum verò Vectio in curru utendum. ibid. In Podagra tam in Paroxysmis, quàm eorum interstitiis, commendatur, licet ægro displiceat. 326. In aëre rusticano, potius quàm in urbano, instituat. 324. Licet ægro

durum videatur, propter senium, & socordiam huic Morbo naturalem, neutiquam omittendum, aut ex aliis adhibitis nihil frugis reportabitur. 323. 327. Sed justo vehementius non sit, tale verò quale senibus, qui primum sunt subiectum, competit. 323.

Exercitium in Podagræ Paroxysmo, Curru vectio, ægro brevi multo minus dolorosum videbitur, quàm quies domi in Cathedra ipsi molesta est: & præterea somnum placidum illi in subsequentem noctem conciliabit: Calculum quodamtenus præcavebit: Impotentia artuum ad motum occurret: In senibus materia inconcoctilis adsimilationem parum adjuvabit. 326. Quandonam verò vetatur, & lectulus ejus defectum supplere debeat. ibid. ad 327. Ubi verò ægritudo, animi deliquia & similia adsint, ut Libitina evitetur, cubiculo æger non includatur, sed molestiam vectationis in aëre liberiorē sustineat; & dolorem, amarissimum licet Naturæ remedium, ut vitæ prospiciatur, ferat. ibid. Non modo Tophorum generationem impedit, verum & Tophos veteres, atque induratos, solvit, modo cutim nondum destruxerint. 323. In Podagræ inveteratæ Paroxysmo, ad ventriculi languorem confer. 327.

——— in Podagra & Chronicis Morbis, quotidianum esse debet, cum totius corporis habitus sit immutandus: quin in Podagra exercitatio per vices intermissa, fortassis nocere poterit, Paroxysmum accersendo, ubi quis ab ea desuevit. 323. confer. 317.

Exer-

Exercitia corporis modica in Tussi Epid.
An. 1675. conceduntur. 151.

Exercitio calefacti sollicitè vitare debent frigus. 160.

Exhorrescentiæ febrilis tempus, est illud in quo pereunt, qui ex Febr. Interm. moriuntur. 46.

— in Febribus Interm. ratio. ibidem.

Exomphalos in Hydropicis unde. 333. ad 334.

Exostoses, seu Tubera Ossium, in Lue Venerea quales. 207. Quomodo curandæ. 215.

Expectoratio in Pleuritide essentiali liberior facta, Symptomatibus finem imponit. 163. Tamen ad Curationem attingendam non proponitur, ab Auctore, sed V. S.; quia expertus est Methodum hanc non modo tædiosam, sed & periculo plenam esse, quia aliquando pars quædam materiæ non coctæ Expectorationem suppressere potest; tum quia expulsionem materiæ morbosæ, pro suo arbitrio, melius per aperturam Venæ, quàm per Tracheam, dirigere potest. 166.

Experientia Medicorum & Magistra. 208.

Expulsionis tempus in Variolis, idem ac Eruptionis.

Externa, vide Topica.

Extractum Absinthii & Centaur. min. in Febr. Tert. Vernal. An. 1678. 193.

F.

Faciei flacciditas, in Variolis Regul. Discret. ex calefacientibus, & sudoribus nimis, producta, Pare-

goricis, V. S., & aura frigidior, tollitur. 95.

Faciei Tumor, vid. Tumor faciei.

Facies in Variolis, Cicatricibus ne deturpetur, an aliquid agendum, præter Regimen temperatum. ibid.

— Confluentibus, ultimis diebus ob Pustulas crustosas, rigida, Ol. Amygd. dulc. inungitur, & quare. ibid.

Facultates humanæ non majores, quàm quæ percipiendæ vel Theologiæ Naturali, vel Philosophiæ morali, vel Arti Medicæ, Mathematicæ & Mechanicæ, inserviunt. 187.

Fama Medici, vid. Medici Fama.

Faucium, in Variolis Discretis, dolor incipit cum Pustularum eruptione, & cum harum incremento augetur. 80.

Febres duas partes, è tribus, in faciunda Medicina occupant. 196. 256.

— id solemne habent, quod cum rigore & horrore, quas totius corporis calor sequitur, adgrediantur. 66. 109.

— pro causa externa, quamplurimum, Vestium præmaturam abjectionem, vel refrigerationem post incalescentiam ab Exercitio, habent. 160. Atque tum pro Constitutione Anni, vel humorum dyscrasia, variæ exoriuntur. 160. 161. Et ab his duabus causis, plures quam Gladio, Peste, Fame, simul sumtis pereunt. 160.

— novæ, quot Annis sub eadem Constitutione, quare enatæ vulgo sæpe videantur, quæ tamen eadem sunt. 117.

— Constitutioni generali propriæ, æstate, ubi corpora excalefacta sunt,

sunt, invadunt; sed Autumno, Principi Epidemico iterum cedunt. 117.

Febres & Morbi Epidemici simul grassantes, miram habent affinitatem. 157.

— novæ speciei Auctori ubi sese, jugiter sibi invicem succedentes, obferunt, quæ ad eas pertinent, & ab eis pendent, sedulo congerit. 3.

— in specie sua præcipue distinguuntur, tum sudatione tum siccitate, hoc illove morbi tempore; modo illæ sibi fuerint permixtæ, nec incongrua Methodo tractatæ. 157. Exempla vide 158.

— quædam sunt, quæ singulæ suam sibi Methodum medendi à reliquis diversam postulant. 196. Quædam per Diaphoresin, aliæ per Catharsin, eliminandæ veniunt; quædam à Naturæ peculiari Methodo, sine evacuatione sensibili, ablegantur, & quomodo. 140. Per Diaphoresin quænam, per Catharsin quænam sint curandæ, Experientia docet, non Ratio. ibid.

— Diaphoresin licet à Natura curentur sæpe quam optimè; id sibi privilegi adrogare Ars nequit, sine discrimine, ob plures rationes. 369.

— Sudoriferis sæpe accenduntur, quæ vel sponte, vel V. S. abivissent. 370.

— quæ in *Septuaginta* Sudorem criticum postulant, sunt Febres Intermittentes, quarum Paroxysmi particulares id postulant; tum Febres talis Constitutionis, quæ ad Intermitt. Epid. producendus unicè facit: Et nisi in iis Methodus eo dirigatur, pejores fiunt. 140. Febris Pestilentialis vero causa quia subtilis, jam

primis diebus, Sudoribus diffuari potest. ibid.

Febres tenui Diætâ, modo Intermittentes non sint, absque alia evacuatione aliquando solvuntur. ibid.

— quam plurimæ per V. S. & Purgationem multo melius, quam per ullam aliam Methodum curantur. 369. Præsertim quam per Diaphoresin. 369. 370.

— ubi curandæ, non modo duabus Indicationibus, uti vulgo obtinet, satisfaciendum venit; ut nempe Sudoriferis materies morbofa evacuetur, tumque Symptomatis supervenientibus obviam eatur, hoc equidem Empiricus novit; sed Historia Morbi esse debet, ut noscatur cujus speciei Febris sit; tum an Phænomena ex ipso Morbo, an ex curandi Methodo nascantur. 196. Errat, qui non continenter attendat ad Constitutionem Anni, alicui Morbo faventem, & reliquos in ejus similitudinem detorquentem. 153. Maximi momenti est scire, quam Evacuationis viâ Materia febrilis sit excludenda. 162. 369.

Febrilis Materies solo ipsius Febris calore, fere ad Concoctionem ut sudore expellatur, duci potest, ut calefacientibus iis fervidis, forinsecus adlatis, non indigeamus. 140. Istius Concoctionem, jam ab initio promovendam vulgo clamant Medici, licet temperantia tum exhibeant; unde quid sibi velint, ignorat Sydenham. 35. Ejus Concoctio quid sit. 35. 36. Quid ipsam promoveri revera sit. 36.

Febris Instrumentum, seu sollemnis Machina Naturæ est, dedita opera fabricata, ut ejus adjumento partes impu-

impuræ & nocuæ, à puris & sanis, secernantur, & per emunctoria corporis dein expellantur. 20. 35. 67. 100. 239. 314. Hujus ope si Natura critice Materiam morbificam solvere norit, sanitas insequitur; vel Mors, si ab eadem materia oppressa Natura fatiscat. 20.

Febris cum Apostemate quamnam habeat Analogiam. 100.

— *Naturæ Methodus est, qua materia peccans ex Sanguine amolitur, uti Abscessu eadem ipsa partes firmas ab extraneis liberat. 236.*

— *in Morbis Malignis cur mitior adpareat, quam Morbi violentia, ex Virium prostratione deducenda, exigere videtur. 155. 371. Quomodo ex V. S. emicuerit hæc, Casus singularis. 371. In Peripneumonia notha vix reperitur ob interceptam Circulationem, arctato nimis Pulmone. 168. Sic in Peste Febris aliquando non adparet, dum perit æger. 155.*

— *Primaria Naturæ videtur illa, qua Intermitt. Autumn. Constit. 1661. ad 1666. cæteris prædominabantur; & soli hujusmodi Febri quæ Depuratoria vocanda, adaptari debent Axio-mata Hippocratis & aliorum Veterum, de præparanda materia Febrili, ad Crisin per sudores ritè faciendam. 156.*

— *Morborum Intercurrentium primarius Morbus est: & reliqui Adfectus, à quibus illi Morbi nomen mutantur, ut Angina, Pleuritides, &c. Symptomata modo sunt, à materia Febrili, à modo criseos, à parte in quam ruit, pendentia. 159. confer. 165.*

— *unius Anni, ab altera, ita dif-*

fert, ut qua Methodo jam ab ea ægros liberaveris, alio Anno eadem ipsa forsan è medio tolles: hocque pendet à varia Constitution. Epidem. natura. 21. Nam Febris quædam propria ac peculiaris, cuilibet Constitutioni peculiari competit. 79.

Febris in Infantibus non facile semper distinguitur, an à dentitione, an verò alterius speciei, sit. 367.

— *Commotionem in corpore ponit, pendentem à Natura, quæ vel materiam inimicam excernere, vel sanguinem in novam diathesin immutare, tentat. 29. Ex quolibet horum verò fiat, Indicatio semper erit, Commotionem febrilem ita dirigere, ut vel non exorbitet, vel etiam non langueat. 30.*

— *una eademque, diversa sua periodo, diversimodè tractanda sæpe est. 197.*

Febris alba idem ac Chlorosis, species Hystericæ Adf. ex Humoribus depravatis, est. 266.

— *ex Cholera malè tractata, Emetico tantum tollitur. 32.*

Febres Continuæ varias, pro varia anni Constitutione Epidem., Species ponunt. 21. ad 21. Et uno anno aliam longe, & diversam à præcedenti, pro anni Constitutione, medelam postulant. ibidem. Febris Continuæ verò species varia expi-scatur, licet singulæ Symptomatis communibus implicentur; Primo ex aliorum Epidemicorum Morborum, tum tempore grassantium, Genere; ut qui speciem Variolarum regnantium quamdam cognoscit, illi satis constabit de specie Febris cujusvis, per id temporis grassantis. 156. ad 157. Secundo, ex Symptomatibus

Febri cuilibet, præter communia, singularibus. *ibid.* Febres quælibet Symptomata, præter communia, alia habent certa, tamquam Distinctionis notas, quas singulis speciebus impressit Natura. *ibid.* Et distinguuntur sic præcipue, tum sudatione, tum siccitate, hoc illo-
ve Morbi tempore; modo illæ sibi fuerint permissæ, nec incongrua Methodo tractatæ. *ibid.* Exemplum vide 158. At Febris nova cujus speciei sit, surgente primo Constitutione, cum nulli adhuc Epidemici Morbi, quos Febris prævertere solet, adparuerit, ut indagetur arduum est. 158.

Febres sine Evacuationibus, sola Diæta, si in initio tractentur, quomodo sæpe curantur. 140.

— Epidemicæ quæ vel Putridæ, vel Malignæ, vel Petechiales &c. dici solent, licet denominationem eam obtinuerint hæcenus, ab insigni alteratione sanguini impressa, vel Symptomate quodam evidentiore; potius Nomina sua sortirentur à Constitutione. 24. Quare verò ita censeat Auctor. *ibid.*

— Verna tempestate, præsertim quæ æstatem propius adtingit, quare paucæ occurrant, nisi Constitutio fuerit epidemica. 49. Circa Veris finem, & Æstatis initium, minus producuntur, verum illa tempestate, vel in Intermittentes, vel in Pleuritides, & id genus inflammationes, sua sponte dissiliunt. 73. In Intermittentium castra, maxime Autumno pendente, migrantur. 373.

— ex Intermittentibus Autum-

nalibus, defectu purgationis in fine morbi, sæpe enascuntur. 35.

Febres Contin. Autumnales & Intermitt. Autumnales quodnam discrimen habeant. 52. Continuæ, æque ac Intermittentes, conceptam effervescentiam (licet hæc uno tenore, illæ partitis vicibus, eadem defungantur) spatio 336. hor. h. e. 14. dierum absolunt; si scilicet Naturæ negotium permittatur, neque medicamentis Refrigerantibus aut Clysteribus, hujus ordo interturbetur, aut corporis debilitas ipsa impediat. *ibid.* Sed non nullæ harum, quæ ex levi offensa, ex 6. R. N. N. oriuntur, transeuntis & incerti genii, neque ad destinatam periodum pertingunt. *ibid.*

— atque Intermittentes principatum obtinere, durante Constitutione Ann. 1661. 62. 63. 64. iisque Variolæ cedebant. 62.

Febris Continua Compendium quoddam est Intermittentium, uti harum singuli Paroxyfmi hujusce sunt Compendium. 27.

— Epidemica Const. 1661. ad 1664. aliarum quotquot sunt, cur præcipua & Coryphæa habeatur. 28. Unica species in rerum natura tum temporis Auctori nota. 29. Intermittentibus subsecuta, ejusdem fuit genii; & Intermittentium Autumnal. Compendium, uti harum singuli Paroxyfmi istius sunt, compendium, videbatur; nec, nisi ratione durationis differebat. 27. Hanc Februm unica facile in Intermittentium Castra transibat; sed sequentium Annorum Febres rarissime. 156. Unde patet quod cum Intermittentibus istius Constit. natura conveniret. *ibid.* Ad Inter-

Inter-

Intermittentium Autumnalium Classi sem quare referebatur. 27. Et quum raro surgente anno comparebat, liquet altera ratio, cum Febr. Intermitt. Autumnalium Classi adnumeretur. ibid. In quibus à Tertianâ ejusdem Constit. differebat? ibid. Quartanis Autumnalibus succedit, ad usque Ver debacchatur, ubi tum Intermitt. Vernal. locum cedit. 28. Quamdiu ex propria indole perdurabat? nam malè tractata diutius adfligebat. ibid. Ubi hujus despumatio circa diem Decim. quart. foret, refrigerantibus ad diem Vigess. prim. & ultro, protrahitur. 36. 39.

Febris Epidem. Constit. 1661. ad 1664. Symptomata sibi singularia quænam habuerit. 29. Plura si malè tractabatur superveniebant. ibid.

———— quomodo curabatur. 31. ad 34. In quibusnam V. S. instituebatur, in quibusnam non, & quâ copia; quandonam repetenda. ibid. V. S. præcedat Emeticum. 31. ad 33. Vomitorium quandonam erat exhibendum, ad avertendam instantem alias Diarrhæam. 31. ad 32. Quo tempore morbi exhiberi poterat. 33. Paregoricum post Vomitorium vesperi exhibendum. ibid. Diascordium pro Cardiaco quandonam exhibendum. ibid. Clyster quandonam exhibendum. 34. In quibusnam vetatur. ibid. Cardiacæ ante evacuationes quare non exhiberet Auctor. 35. Quibusnam suo tempore, evacuationibus peractis, uteretur. 36. ad 37. Quâ ratione omnia illa media dirigebat. 37. ad 41. Quandonam post Morbum purgationem celebrabat. 38. Curatio Febris hujus, in Pauperibus, quomodo cum successu,

ab Auctore instituta. 37. Recrudescere solet, quod notatu dignum, post usum Clysterum & Cathartorum, quæ Febrē prius quasi profligaverant. 36. Quomodo tractanda tum. ibid.

Febris Epidem. An. 1667. ad 1669. cur Variolosa dicta. 99.

Febres Continuæ Depuratoriæ An. 1661. ad 1664. quare feces Intermittentium videbantur. 198. Epidemicè grassari nequeunt, nisi retusa acie Constitutionis Intermittentibus faventis. 198.

Febres à Dentitione. 521.

Febris Depuratoria vocatur, ubi Natura omnia Symptomata ita moderatur, ut Materiam febrilem rite concoctam, certo suo tempore, vel per διαφύεσιν, vel διαπύλω, expellat. 156. Et talis fuit Febris Constit. An. 1661. ad 1664. ibid. & 493.

———— quare Naturæ primaria Febris. 156.

———— non illico ut Intermitt. sed post dies tredecim tantum, materiæ concoctæ signa exhibet, per diaphoresin eliminandæ. 197.

———— quomodo curanda. 31. ad 50. & 493.

Febris Dysenterica, novi generis Febris, Constit. 1669. ad 1672. Dysenterias, & Tormina Ventris sicca, concomitans, eos etiam adficiens, qui hisce Morbis non laborabant, Dysenterica quare dicta. 104. & 116. Hæc Evacuationibus per alvum exceptis, per Constitutionis decursum, Dysentericæ in omnibus, simillima fuit. 104. 116. Subducebat se paululum, dum alii istius Constitut. Morbi prævalebant, nec tamen omnino desinebat. 118. Symp-

tomata ejus eorumque varietates describuntur. 116. 117. Febris hæc in Aphthas, plus quam ulla nota Febris, propensior erat; quare. ibid. Dysenteria absente, vel se subducente magis grassabatur, (confer. ibid.) una cum Variolis mitioribus hinc inde concomitantibus. 105. Et An. 1669. Dysenteria hieme repulsa, vigeat. 104. Sed An. 1670. Julio mense jam prævalebat, & Dysenteriis hieme repulsis, grassabatur iterum. 105. Hunc verò An. 1671. fugarunt Tertianæ Intermitt. sed Julio mense de novo repetebat, Autumno iterum Dysenteriis cedens, & his frigore fugatis, hiemem totam denovo contristans. ibid. Tandem An. 1672. Julio rursus invadebat, Autumno iterum Dysenteriis cedebat. ibid. & hieme, fugata Dysenteria, redibat. 106.

Febris Dysenter. An. 1671. pluribus differebat, ab ea An. 1672. ejusdem Constitutionis; utraque tamen, facie, tempore invasionis & Methodo medendi, in eadem Febre specifica, concurrebat. 118.

— Dysenteriam Epidemicam, in aliis locis itidem, concomitatur, ut docet Dysenteria in Africa, quam tractavit Dr. Butler. 114. ad 115.

— curatur irritando Evacuationes, quæ in Dysenteriis contingunt, ut expellantur humores acres. 118. Hinc V. S. & Purgationes, ut in Dysentericis; sed abstinendum à Paregoricis; & quare. ibid. Qua occasione Methodum hanc adripuerit Auctor. 119. Nullis aliis indigebat. ibid.

In Febre Dysenterica Paregorica post

Curationem, ubi vires non redeunt, ut sæpe in Hystericis, quare conducant. ibid. Quoties & quando exhibenda. ibid.

In Febre Dysenter. Adolescentes, præcipue si in initio sudores iis extorserant, non numquam delirabant, non uti Phrenitici, sed stupore, quasi Caro adfecti: Et nulla arte sublevari poterant. ibid.

Febres Epidemicæ sunt vel Stationariæ vel Intercurrentes seu Sporadicæ. 21. 22. 159. ad 162.

— Regulas ad curationem Generales non admittunt. 25. Hinc quid Medico ubi grassari incipiunt, ut curationem dirigat, agendum, 26. Neque juxta varias annorum crases, aut ejusdem anni varia tempora, adhuc dum distingui potuerunt, à Sydenhamo. 27. 28. Et Febrium Epidemicarum diversarum ratio, ubi arcanæ annorum Constitutioni hæ innituntur, non videtur à causa morbifica, in homine aggesta, deduci posse. 25.

Febris Epidemica speciei cujus sit, quomodo noscatur. 118. Et uti ex Epidemico tum temporis grassante, dignoscitur ejus species; sic ex Febre quadam conspecta, quisnam ei jungatur Morbus Epidemicus, sive Dysenter. sive Morbilli, &c. noscitur. 157. Quod tamen, in Nova Febre specie, vertente primum Anni Constitutione arduum. 158.

— cujus species perspecta & indoles, eadem Methodo, qua semel sublata fuit, curatur semper, donec extincta illa specie, novum genus oboriatur. 21. ad 22.

— Morbos alios hac Constitutione

tionem itidem prodituros, ut plurimum prævertit. 158.

Febris Epidem. alicujus Constitut. repentina aëris quadam manifesta alteratione, materiam morbificam in Petus deponere potest, eadem ipsa interim remanente, sed Symptomata istarum partium tum simul producente. 150. 153.

— Continua Constit. An. 1661. ad 1664. ubi Intermittentes Autum. prædominium habebant, unica fuit, in qua Natura Symptomata sic mitigabat, ut materia Febrilis, debita Coctione præparata, per diaphoresin suo tempore expelleretur. Et videtur hæc Naturæ primaria Febris, duplici de nomine. 156. De eadem reliqua vid. Tit. De Febre Cont. Epidemica 1661. ad 1664.

— Constit. 1673. ad 1675. An. 1673. ingreditur, circa initium Julii, alterius Constitutionis Morbis nondum planè expulsis, & pari passu cum illa procedentibus, neutro Morbo admodum grassante, & per illum Autumnum, ac Hiemem, progrediebatur, Dysenterix mense Novembri, sed leniores, hinc inde, post acre gelu succedente calore, spargebantur nec amplius istius speciei adparuere. 134. Phrenitis sine stupore, sed raro, aderat. 142. Initio magis erat Inflammatoria, ut patuit ex Symptomatibus Pleuriticis. 136. Variolarum nigrarum An. 1670. reliquias referebat. 137. ad 138. Symptomata hujus Febris propria. 136. Quibusnam comitata quando desinebat? 136. 137. Hanc comitabatur Coma quoddam aliquando in Aphoniam desinens.

137. Et qui ita adfectus vigesimo octavo, vel trigesimo die tantum convalescebat. 137. 142. Delirium leve in Adultis aderat; & in Pueris somnus abruptus cum stertore. 137. Delirium hoc Coma potius stupore æmulabatur. 141. Hæc Comatosa Auctori vocatur, ob insignem stuporem comitantem. 143.

Febris Continua An. 1675. initio Julii, longe lateque depopulata, circa Autumnum in viscera cepit converti, specie Dysenterix & Diarrhoeæ se prodens, per quam viam sibi fugam quærere adfectabat. 135. 137. Vel caput petebat Stuporem inferens. 135. Sed tum temporis Anni prædominio potiebatur, ita ut Diarrhoea & Dysenteria potius Symptomata, quàm Morbi essentiales, essent. 135. ad 136. & 137. 142. Catarrhi & Tusses se huic Febri adjungunt, post subitam tempestatis mutationem. 136.

— curatur. 137. ad 143. Quare ad Methodum invenientiam hic diutius hærebat Auctor. 138. Quæ ratione Medelam adsecutus fuit. ibid. Post V. S. pro viribus ægri semel institutam Epispasticum largum nucae adplicandum. ibid. Sequenti die Enema in tempore adplicandum, & quotidie reiterandum, sed non post decimum quartum diem. ibid. Post hæc Morbus sibi committendus. ibid. Nec ulla Evacuatio violenter instituenda. 139. Diæta sit tenuis. ibid. Lecto quotidie abstinendum, vel ei vestibus indutis incumbendum, capite elato. ibid. Si à lecto, diutius quàm par est, abstineant, Rheumatici dolores, vel Icteri species, suboriuntur;

tur ; & quid tum agendum. *ibid.* In declinatione autem Morbi, ubi mitior est, potius lecto decumbat, ut vitentur dicta mala. *ibid.* Solvuntur Objectiones eorum, qui existimant hanc Methodum tantum sufficere, ut impetus à capite divertatur, non verò, ut materia Febrilis concocta per Sudores eliminetur. 139. ad 140. Sine Sudoribus hæc Febris species sæpissime fugatur; hinc non sine discrimine sollicitantur illi, capite tum gravato. 140. Si verò sponte prodeant, & levant, non contemnendi. 140. ad 141. Per V. S. & Enemata felicius succedebat Curatio; nam Diaphoretica, plura Anomala Symptomata, & discrimen, inducebant. 141. Coma & Stupor huic Morbo comes, quibuslibet remediis tentatis, debellari non poterat, sed Naturæ si committeretur tuto, licet tardè, recedebat. *ib.* Aliquando ad Tricesimum diem defertur convalescentiæ primum signum; quo tempore absurda licet adpetant, concedenda. 142. Confirmatur Historia. *ibid.* Phrenesis sine stupore, quæ aliquando sed rarò aderat, inducias non ferebat, sed cito nocebat, nisi Vitrioli Spiritus cum Cerevisia tenui propinaretur. *ibid.* Diarrhœa, & Dysenteria Symptomata, V. S. & Narcotico sanabantur; addito aliquando Cardiacis. *ibid.* Diarrhœa tamen cum minus afficiebat, non multum curabatur, nisi cum periculum inducebat, tumque Narcoticis erat reprimenda. 143. Sudores nocturni convalescentibus supervenientes, in debilibus & emaceratis, Tabem

aliquando inducentes, Vino Malacensi, nocte & aurora, ad cochl. v. vel vj. adsumto, profligebantur. *ibid.*

Febris Continua An. 1679. oboritur similis illi An. 1675. hiemali (242.), ex Tussi imperitè tractata; quæ tamen ut Tussis curabatur. 197.

— novæ speciei, An. 1685. primo ex solvente gelu, mense Februario, exorta est, dissimilis illi, quæ ab An. 1675. ad 1684. per octennium scilicet, invaluit. 354. Per omnes Angliæ Regiones latius vagata est, longè magis tamen Epidemicè in aliis locis, quàm Londini sæviens. 355. Hæc eadem est, quam Auctor, in ea tum temporis hallucinatus, nomine Febris Hiemalis & Febris Peripneumoniciæ tradidit, ac ad Intercurrentes relegavit, & quam deinde, æstate superveniente, ad novam Constitutionem redigendam omnino censuit. 355. confer. 356. Et Hiemalem, quam olim à colluvie serosa oriri putabat Auctor (vid. pag. 348.) postea invenit nihil esse, quam simplicem Sanguinis Inflammationem, ad quam jam Indicationes Curativas dirigendas, suadet. 356. Hanc Febrem novæ speciei, Cortice Peruviano, quare non nulli Medici profligare tentarint. 363. Sed successus raro votis respondit. *ibid.* Unde liquido constitit hanc Febrem, ab istis Constitutionibus 1677. ad 1685. toto cælo distare. *ibid.*

— Infantes æque ac Adultos afficiebat. 367.

— ne primordium sit Febris Depuratoriæ, olim Pestem imma-

immanem prægressæ, metuere videtur Auctor; & quare. 373.

Febris hæc licet Continua prorsus esset, tamen ingruente nocte exacerbescebat. 355. 362.

Qualia habuerit Symptomata. 355. ad 356. confer. 348. ad 349. Quæ Sudore spontaneo nocturno aliquando mitigantur. 358. Æstivo tempore, ventris Torminibus, præcipuè se manifestabat. 363. Nihilominus V. S. & Catharsi repetitis curanda erat; exhibendo Pilul. Cochias, loco Potionis, si hanc stomachus non fert. ibid. Si Dysenteriam ex iis Torminibus nanciscatur, hæc consuetæ Methodo tractari non debet, sed illico Laudano compescenda, & quare. 364.

Vomituritione æstate etiam se prodit. 363. In quo casu quid agendum. ibid. ad 364.

Cerebrum, præ aliis quibusque, petere apta nata est. 358. Phrenitis inde nascitura avertitur, regimine refrigerante, abstinentia à lecto, excepto Puerperii initio. 359.

Curatur Evacuantibus, ut V. S. Purgationibus, iteratis; Epispasticis; Paregoricis insuper, adhibitis. 357. Interponuntur temperantia. 358. Aphthæ & singultus si adsunt, Cortice Peruviano curantur. 358. Diæta quali utendum. 359. Non ita tamen tractanda, ut Evacuantia ad Symptomatum omnium sublationem exhibeamus, letale hoc foret; hæcce, equidem, leviter hinc inde remanentia, tempore disparent sponte sua, pro ratione, qua redit sanitas; sunt enim modo Evacuationum rei-

teratarum, & à Cibo potuque assuetis abstinentiæ, quæ corpus debilitant, progenies: unde Vapores, haud secus ac in fæminis, elevantur; qui etiam Paregoricis superantur. 368.

Febris Continua, licet aliquando alia Methodo, quàm V. S. & Purg. curetur, non statuendum inde, illam Methodum præstantiorem aliis; & quare. 372. Quanam verò sit optima Method. quomodo dijudicetur. 372. ad 373.

per poros cutis eliminantibus, minus certo & tardiùs, & non sine periculo, tractatur. 368. ad 369. Unde Sudoriferis non libenter cedit; hincque constat curam Diaphoreticam non convenire. 371. Huic verò non fidendum, quia post ipsam Febris redit. 359. Hujus ratio. ibid.

Methodo traditæ omnino non cedens, ad Corticem Peruvianum, ut certissimum medium recurrendum. 368.

in Hystericis evacuantibus protrahitur, hincque Paregorica & Hysterica adhibenda; & victus pro lubitu concedendus. 362.

recidivam unde habeat, & quomodo hæc prævenienda. 357. Est tantum Symptomata tum, & ab Aphthis nata. 357. ad 358.

Quomodo in Infantibus curanda. 366.

Febris Erysipelatosa Rusticis Syderatio audit. 174. Speciei duplicis est. Una vulgaris cujus Phænomena antecedentia & præsentia describuntur. ibid. Altera species rarius occurrit; & describitur quoad causas

fas antecedentes, & phænomena præsentia. ibid.

Febris Erysipel. tempore quolibet, præsertim tamen exeunte æstate incessit. ib. Partem quamlibet, at præ reliquis faciem, occupat. ibid. 499.

———— Cum quibus Phænomenis incipiat. 174. In Gangræna aliquando terminatur. ibid. Pustulæ apparent, ac si apes aut vespæ aculeis suis punxissent. ibid.

———— Vulgaris, & non vulgaris, eodem modo curantur, nisi quòd ultima species externis mediis minus egeat. 175. 500. Venæ sectio una, & subsequens Catharsis, in tempore adhibitæ, plerumque curant. 175. Venæ sectio quando & quibus intervallis sæpe iteranda. ibid. Diæta. ibid. Julapium quale & quando exhibendum. ibid. à Lecto, per horas aliquot, quotidie temperet æger. ibid.

Febris Hectica Infantium qualis, & quomodo curanda. 367. 521.

———— post. Pleuritidem essentialem quandonam. 164.

Febris Hiemalis quolibet Anno, ab Hieme ingruenti, usque ad Ver adultum, invadit, in Febrium Intercurrentinm Classsem recensenda. 348. Unde oriatur. ibid. Peripneumoniam notham (pag. 184. descriptam) quæ Febris hujus species est, producit aliquando: non numquam Symptomata excitat quæ hic describuntur. 348. confer. 355. ad 356.

———— à Peripneumonia notha ut ex causa, & symptomatis, patet, non nisi gradu differt. 348.

———— si malè tractetur quænam Symptomata, tandem letalia, adipiscatur;

quæ tum falsò Malignitati adscribuntur. 349.

Febris Hiemalis curatur V. S. & repetita Catharsi, ut exundans pituitæ colluvies, ob hiemis analogiam congesta, revellatur, tumque subducatur. ib. Exhibitis interim Paregoricis, & Decoctis ac Eclegmatibus Pectoralibus, &c. 349. Rarò adeo sævit, ut non post unicam V. S. & tres Purgationes cedat. ibid. Si errante diagnosi, pro Stationaria habeatur, plurimorum interitus causa erit. ibid.

———— & Peripneumonia hæcce in Forma Postscripti delineata (pag. 348. ad 349.) illa est quam postea Auctor tradit, Titulo de Novæ Febris ingressu (pag. 354. & sequ.), simul agnoscens suum errorem, & quæ ratione in eum inciderit, referens. 355. confer. 356.

Febres Intercurrentes vocantur Febres Continuæ quædam, quæ omnibus in universum Annis (160.) qualibet sub Constitutione, competunt, & ab hoc illove aëris temperamento, tamquam causa productiva, ortum ducunt. 21. & 22. A Stationariis differunt, quòd hæ ad certam Annorum seriem & Constitut. determinantur, Intercurrentes omnibus Annis communes sint, qualiscumque sit Constitutio. 160. Conveniunt verò cum Stationariis sæpe quoad causas externas ac Procatareticas, licet quoad causas ab aëre subministratas longe dissideant. ib. Febres Intercurrentes omni fere Anno invadunt. 133. Plures simul non corripiunt, quia non à causa generali ab Aëre pendente, quemadmodum Constitutio universalis, verum à partu-

ticulari, corporum particularium
 ἀνωμαλία, qua Sanguis atque hu-
 mores vitiantur, oriuntur. 21.

160. 315. Tamen Epidemice non
 numquam, quamvis non ita fre-
 quenter, haud minus ac Stationa-
 riæ, grassantur, quando earum
 causa mediata generalis, quædam
 aëris manifesta qualitas est, corpora
 ita disponens, ut certæ Sanguinis &
 humorum oriantur dyscrasie, quæ
 illarum causæ immediatæ fiunt. 160.
 Exempla. ib. Hæ Febres jam parcius
 jam inclementius sæviunt, & cum
 Stationariis, & secum invicem, eo-
 dem Anno indifferenter commiscen-
 tur. 159.

Febres Intercur. præcipuæ sunt Angina,
 Febris Erysipelatosa, Febris Scarla-
 tina, Peripneumonia nothæ, Pleuri-
 tis, Rheumatismus. 22. 159. 160.

Febres quædam Intercurrentibus jure
 merito essent adnumerandæ, quæ vul-
 go non Febres, sed Symptomata mo-
 do habentur, quoniam cito transeunt,
 & in hoc vel illo symptomate desi-
 nunt; quod Symptoma tamen revera
 tantum ex illis Febribus sequitur.
 177. Tales sunt Hæmorrhagia Na-
 rium & Hæmoptoe. ibid.

Febres Intermittentes per 13. An. fere
 exulantes, Epidemicæ rursus, anno
 1678. audiunt. 185. Anno 1677.
 in Autumno primo exsertæ, quotan-
 nis increbrescentes, Epidemicæ pa-
 ctæ sunt, donec ad ἀκμὴν perventæ,
 jam iterum decrescientes rariores ita
 factæ, ut tandem An. 1682. 1683.
 vix Epidemicæ viderentur. 354. Et
 jam An. 1678. Vere denuo subortæ,
 Æstate & Autumno ita sæviebant,
 ut omnes Epidemicos fugarent alios,
 quorum nulli reperiebantur: Hieme

Variolis & aliis Epid. locum cede-
 bant, donec apta tempestate redierint.
 185.

Febres Intermitt. An. 1677. &c. Ter-
 tianæ erant, vel Quotidianæ; nisi
 hasce Tertianas duplices adpellare
 velimus. 185. ad 186. non amplius in
 ἀπορρηξία desinebant, præsertim cali-
 dis adhibitis. 186. Et Remissionem
 loco Intermissionis concedentes, ad
 speciem Continuarum perventæ,
 tacto Cerebro, jugulabant. Inte-
 rim ad Intermitt. Classem erant re-
 ferendæ, & Cortice Peruviano iti-
 dem, sed majori dosi, debellandæ.
 ibid. 190.

Apoplexiam aliquando
 comitem habebant, quæ ipsa Febris
 erat, caput impetens. 191. In quo
 casu, ab omnibus Evacuantibus re-
 vulsionis fine, ut in Apoplexia essen-
 tiali requiritur, cavendum erat. ibid.
 Diabetis in senibus causa aliquando
 fuere, Morbo jam curato. 192. Quo-
 modo hæc vero curanda. ibid. Ne-
 phritidis speciem aliquando comitem
 habuere; quæ ut ipsa Febris, neuti-
 quam V. S. aut aliis evacuationibus,
 curari debebat. 201.

nec Sudorifera nec
 alia evacuantia, ut V. S. & Ca-
 tharsin, admittebant, cum ex illis
 in Continuas mutarentur. 186. Ex
 hisce verò in longum protraherentur.
 ib. Unde ad Corticem Peruvianum
 confugit Auctor, ex quo nihil mali,
 sed plurimum boni, vidit. ibid. Et
 nulli magis, quàm hoc Herculeo
 Medicamento confidebat, si iusto
 exhiberetur. 188. Periculum infert,
 & Recidivam concedit intra qua-
 tuordecim dies, quando ante Paro-
 xysmum exhibetur. ib. Quæ duo in-

H h h h

com-

commoda removit Auctor sua exhibendi Methodo. ibid. vid. Cortex Peruvianus.

Febres Intermitt. quolibet Anno resurgentes, usque ad Annum 1685. perdurarunt. 197. Continua nulla, Constitutione generali An. 1678. ad 1685. durante, & Febribus Intermitt. favente, ab Auctore visa, nisi ex perversa Curatione. ibid.

— An. 1679. eadem erant An. 1678. jam Julio redintegrantes & Autumno debacchantes, Novo Epidemico tandem sub mense Novembris locum cedentes. 194.

— An. 1680. (ut solent Epidemici) illis Morbis certa tempestate, quibus nempe ista favebat, ut hieme Tussi, Febribus Peripneumonicis, Variolis, postquam Autumno debacchata fuerat, cedebant; verè autem redibant; donec An. 1681. minus Epidemicæ factæ Variolis locum integrè cesserint. 233.

— quæ An. 1681. regnabant adhuc dum erant illæ, Anno 1677. quæ regnaverant. ibid.

Febres Intermittentes Epidemicæ unde Nomina sibi desumunt varia, & discriminantur. 24. Exquisitè describuntur. 46. ad 62.

— Epidemicè sæpius grassantur, quàm aliæ. 156.

— rarò Londini comparuere, à quo tempore Pestis regnavit. ibid.

— inter Morbos Acutos, quo sensu relegandæ. 20.

— calidioribus mediis, citius exhibitis, vel duplicantur, vel in Continuarum speciem permutantur; & exinde in letales, verti possunt. 57. 186. Tum ex Continuis, circa

Veris finem, & Æstatis initium, sæpe producuntur. 73.

Febres Intermitt. æquè ac Continuæ suam depurationem spatio 336. hor. h.e. 14. dierum, naturaliter, absolvūt. 52. Materiam à Sanguine sejungendam adeo crassam habent, ut sine prævia digestionem, ad Evacuationem debitam disponi nequeat. 100.

— & Continuæ quamvis quoad tempus, quo materiam suam expellere solent, non differant; quod ad earum tamen speciem, atque Naturæ proprietatem, adtinet, & à Continuis & à se invicem plurimum differunt. 53.

— Materiam febrilem, diebus liberis, adgregant, quam Natura Paroxyismi novi impetu expellit. 188.

— tria quasi diversa tempora, uno Paroxyismo, involvunt. 46. Horum ratio. ibid. Paroxyismi exquisita descriptio. 47. 494. In Paroxyismo qui moriuntur, tempore Exhorrescentiæ fato funguntur. 46. & 50. & 56. Sudore prorumpente, inquietudo & alia evanescent, atque ἀπυρεξία succedit. 186. Quare redeant Paroxyismi, vid. Paroxyismus.

— in Infantibus, vel ætate florentibus, non attingendæ, sed Naturæ committendæ: quin aliàs Morbus in longissimum tempus procurrit, & mille symptomatibus periculosis gravatur, si præsertim vel purgantia, vel Venæ sectiones, adhibeantur. 56. In Infantibus sive Tertiana Autumnali, sive Quartana, laborent, plerumque, sanguine sua depuratione defuncto, sponte evanescent. ibid. Senibus verò, Autumna-

tumnales præsertim, periculosa. *ibid.*
 Febres Intermitt. diuturniores, Humores sua mora ubi depravaverint, non tamen curandæ per ea, quæ humores expurgant, sed per Specifica. 266.

53.

non oppugnandæ tempore Paroxysmorum, sed horum æstu consopito. 325.

Corticis Peruviani ope, ægrorum magno emolumento, per duas, tresve, septimanas delitescunt. 55.

Febres Intermitt. ad duo Genera revocantur, quorum unum Vernales, alterum Autumnales complectitur. 48. Quæque in tempestatibus intermediis oboriuntur, atque minus frequentes, ad hæc reducendæ. *ibid.* Quæ distinctio quam necessaria Medicinam excolenti est. *ibid.*

cum Autumnales tum Vernales, quamvis respectu Paroxysmorum, & typorum discriminis, haud adeo dissimiles, interim essentialiter distinguuntur. *ibid.* Illarum Historia. 51.

Febres Intermitt. Autumnales unde oriantur, juxta Auctorem. 51. ad 52. Invadunt circa Junium (quæ earum est Epochæ. 174.) si Constit. datur Epidemica; alias Mense Augusto, vel Septembris initio; serius raro. 51. Post se varios relinquunt Morbos, ut Hydropem, Rachitidem, Tonsillarum dolorem & inflammationem, Maniæ quamdam speciem. 50. 59. ad 61. Diuturniores, in Infantibus, si fuerint, non discedunt, quin Abdominis tumor progignetur. 494. 60. Et Crurum tumor aliquando in Adultis. 60. Senibus periculosa. 56. 494.

in variis, plerumque

una eademque diei hora contingunt.

51.

Febres Intermitt. Autumn. non uti Vernales, Typum genuinum statim induunt, sed Continuas Febres ita aliquando imitantur, præsertim Epidemicæ, ut nisi prudentissimo distinguantur, donec, exeunte Autumno, larvam adjiciant. 24. 51. Febris Intermittentis Autumnalis An. 1661. singuli Paroxysmi compendium Febris Continuæ, uti hæc compendium harum, videbantur. 27.

cum ratione durationis, tum & periculi, longe aliter se habent Vernalibus. 50. Si Tertianæ, sed Epidemicæ non sint, atque sanos invadant, benignæ satis tum sunt aliquando, instar Vernalium. *ibid.* At si Epidemicæ, & senescentes, aut cachecticos, feriant, non vacant periculo, & forte in futurum Ver protrahentur. *ibid.* Si Quartanæ fuerint erunt Tertianis omni ratione pejores. Seniores aliquando brevi jugulant: in senectutis modo qui sunt confinio, licet non in eodem sint discrimine ut brevi exstinguantur, non nisi vertente anno liberantur à Febre & extenuati non oriuntur. *ibid.* Juniores morbum hunc melius ferentes, aliquando circa solstitium Brumale, ac frequentius verno Æquinoctio, liberantur. Catharsi verò, vel Venæ sectionis ope in Autumnum insequentem ipsam illam Febrem deducunt. *ibid.* Sic Infantes tenelli in cunis, licet cum ea Febre per Menses sex conflictati, de ea tamen triumphant. *ibid.*

ab Auctore nulla adhuc dum certa praxi curantur, antequam statas suas fermentationes,

h. e. despumationis opus, peregerint. 53. In cursu suo inhibere eadem, non solum, sed & eas abrumperere, Methodo aliqua certa, aut specifico medio, qui noverit, Civis officio, humano generi rem illam patefacere tenetur. 54.

Febres Intermitt. Autumn. non tam facile ac Vernales amoventur. 51. Curationem quare tam difficulter admittant, perpenditur. 52.

———— quomodo curentur. 54. & sequ. Quare eadem in iis utatur Methodo Auctor, ac in Continuis. 53.

———— Quartanæ præsertim, non attingendæ, nisi postquam sanguis tempus illud exegerit, quod ad despumationem suam perficiendam requirit. 56. ad 57. Ubi curandæ veniunt, Indicationes sumi debent; vel ex sollicita observatione Methodi, qua se Natura liberare tentat; vel ex causæ specificæ morbi perceptione, ut specificum medium adquiratur. 53.

———— maxime Epidemicæ, Venæ Sectionem, non, absque Morbi prolongatione, & senescentium morte, admittunt. 54.

———— quomodo tractandæ, si Cortici Peruviano non cedunt. 56.

———— penitus sublata, nec ante, ad alios morbos periculosiores vitandos, præsertim in provectioribus ætate, purgantia exigunt. 57. Hæc autem citius exhibita Morbum contumaciorē reddunt. 58. Hæc verò qualia, quando, quo tempore, & quoties, adsumenda. ibid.

———— vel Tertianæ sunt, vel Quartanæ. 51. Sed ita connexæ, ut sæpe vices permutent, mox tamen ad pristinum genium redituræ. ibid.

Quotidianæ non sunt, ut quidem Vernales. ibid.

Febres Interm. Quartanæ, Quotidianæ, Tertianæ suo loco videantur.

Febres Intermitt. Vernales ad Mensem Februarii; ad mensem verò Augusti referuntur Autumnales. 48. aut Julii. 106. Aliquando tamen maturius, aliquando tardius invadunt: Quod ab uberiore, parcioreve, in aëris temperie, ad has Febres producendas, apparatu, pendere videtur. 48. & 49. Quo verò maturius vel tardius invadunt, eo magis vel minus Epidemicè deprædantur. 48.

———— oriuntur à spiritibus prius concentratis, jam calore excitatis viscidos humores, hieme in sanguine congestos, ut sese ex iis extricarent, dissolventes, per ebullitionem hanc vernam. 49. Harum Historia. ibid. ad 51.

———— semper salutare, raro diuturnæ. 49. Numquam letales. 50. Possunt tamen ob perversam medellam moras trahere ad tempus Autumnalium usque: licet inde letales non fiant. 49. Incipiunt mense Februario. 106. Mala cura, ad tempus Autumnalium protractæ, ipsa illa tempestate, ipsis contraria, extinguuntur. 49.

———— vel Quotidianæ sunt vel Tertianæ. 48.

———— paucioribus stipantur, in sui declinationis statu, concomitantibus Symptomatibus, quàm Autumnales. 58.

———— qua de causâ sæpe mora sua Autumnales æmulantur, quamvis facilius cedant. 51.

———— quomodo curandæ. 50. & 51. Febres

Febres Interim. Vernales suo arbitrio permittendæ; & quare. 50.

— Evacuantibus quibuscumque pertinaciores fiunt. 50. Et diuturniores. 49.

— Constit. 1661. &c. succedunt Continuis, & circa Calendas Maji Variolis locum cedunt. 28.

à Febribus Intermitt. Vernalibus, licet protractis, iis tamen gravibus Symptomatibus, quæ Autumnales sequuntur, non excruciantur convalescentes. 49. Sed si nimis debilitati, adhuc Evacuationibus extenuentur ægri, in Maniam, brevi tamen evanescentem, aliquando incidere possunt, ibid.

Febres quædam tum Intermittentes, tum Continuæ, transeuntis & incerti genii sunt, nec ad periodum destinatam pertingunt; hæque præsertim ex vitio in 6. R. N. N. ortæ. 53. Hisce Morbis correpti subito convalescunt. ibid.

Febris ex Lochiorum suppressione, in Puerperis tenerioribus incautis. 279.

— mali moris ob Choleram intempestive laudano, vel adstringentibus, cohibitam, Emetico solum curatur. 33.

Febres Malignæ quænam vocentur. 370.

Febris verè maligna, ab aliis speciebus tota idea, ac ingenio, dissidet; nec est omnium dierum Morbus. 63. Cum Peste specie convenit; nec ab ea, nisi ob gradum remissiorem, discriminatur. ibid. ad 64.

— in Malignis admodum Morbis, aliquando parca adparet, tum ob miram particularum subtilitatem,

ut in Peste; tum à particulis conclusis; tum quod genus nervosum, vel humores extra sanguinem, per Metastasin, sint adfecti. 155.

Febris Malignitas aliquando plus à Therapeja perperam administrata, quàm à venenosa morbi indole, profiscitur. 63. & quare. ibid.

— Maturationis, Secundaria dicta, vel & Putrida, in Variolis Confluent. uti & in aliis Apostematibus fit, à Pure in sanguinem resorpto, quando contingat. 154. 234. 238. 249. 376. Quomodo excitatur. 236. confer. 238. 249. 545. & seq. In mitiori specie die undecimo, in mediocri genere decimo quarto, in peiori, decimo septimo, fieri solet. 234. 376. Quo parcius sanguini Pus admiscetur eo levior. 236.

— Morbillofa An. 1674. duobus primis mensibus, quibus hi Morbilli prodierant, intercurrentes, in quibus à Morbillis differebat. 144. Immanior erat, ad 14. dies, & plures, perdurans. ibid. Curabatur ut Morbilli. ibid. V. S. nec Enemata admittebat. ibid.

— in Morbillis, die Secundo, consummata adest. 120. Octavo die augetur. 121.

Febris Peripneumonica hieme sæpe oboriuntur. 233. Febris Peripneumonica quædam, nullo non hieme, occurrit. 355.

Febres Pestilenciales, uno vel altero, post graviolem Pestem, anno grassantes, ejusdem ac Pestis, cujus reliquæ habendæ, indolis sunt, & similem sibi medelam vendicant. 64. confer. 66. Et sic, Peste Londin. jam parum moderatione, ejusdem generis Febris ab Auctore reperitur,

- quam quæ jam ante Pestis invasionem grassabatur. 74.
- Febris pestilentialis per diaphoresin universalem expellit materiam morificam, quam Pestis ipsa per Abscessus eliminat; unde qui Febrem hanc aliter, quam per Diaphoresin curat, via à Natura diversa insistit. 69.
- An. 1665. verno tempore, mense Martio, post hiemem frigidam, & siccum gelu caput extulit; eo modo, ac si Febris Continua Epidemica novi generis fuisset; sed à Continuis præcedentibus valde diversa erat, neque cum ipsa Peste exstincta, verum in Ver An. 1667. usque excurret. 62. ad 63.
- hæc singularis speciei, An. 1665. & 1666. Pestem Londinensem prægressa, an Pestis nomine insignienda dubitat Auctor, Symptomatibus equidem iisdem, ac ipsa Pestis, stipata fuit. 74. Et non nisi ob gradum remissiores discriminabantur. 63. ad 64. Quænam habuerit Symptomata. 63. 72. & 73. Omnibus ab Auctore rite perpensis, consideratur tamquam Inflammatio circa partes spiritales delitescens. 73. Subsequentium omnium Inflammationum se ducem præbuit, & Chorum duxit. 156. 158.
- illa insoliti genii, Auctoris animum exagitat, ut ejus naturam, ad concinnandam medelam, adsequatur. 73. In initio, ubi nondum cognita, Vomitorium ad præservandam Diarrhæam, propinat Sydenham, & eventu contrario, nec expectato, stupefactus, aliam, quam in Febribus adhibere, per aliquod tempus solebat, medelam requiri percipit. ibid. Exstincta prius Fœmina nobili, in homine altero & aliis quampluribus, Methodo ad Pleuritidem usitata, curatur. ibid. 74.
- Febris Pestilent. post Pestem, quam Methodo alia, quam Phlebotomia frequentiore, ut cûretur, ab Auctore desideratur. 73. ad 75. Qualem invenerit Auctor. 75. ad 77. Hujus Methodi tam felix successus, ut nullus æger desideratus fuerit. ibid. Curabatur juxta Auctoris inventum, V. S. semel instituta, Sudoriferis & dein Purgantibus. 75. 76. Quæ sudorifera cura quomodo dirigenda. ibid.
- In Pestilentiali Febre Diaphoresis quantum prodest, patet ex levamine, quod persentiscitur dum sudore diffuunt ægri; ubi simul ac sudor abrumpitur, omnia iterum in pejus ruunt. ibid. Sudores diffuentes jussulis, ovis sorbilibus, & aliis cardiacis, refocillandi. ibid. Sudor post artificialem, quasi naturalis, levans, &c. ib. Sudores nulli sponte prorumpébant, at cum omnium Symptomatum levamine vel primis Morbi diebus excitari poterant; in quo quam maximè differebat à Febre Constit. præcedentis. 158.
- Febris Putrida Variolis Confl. superveniens. vid. Febris Murationis.
- Febres Quotidianæ, pro lubitu, Duplices Tertianæ appellari possunt. 185.
- improprie aliquando adpellantur, quæ vel Tertianæ duplices, vel Quartanæ triplices, sunt. 51.
- Febres Quotidianæ An. 1678. vid. Febres Intermitt. An. 1678.
- Febris Quotidiana quænam dicatur. 47.
- Febres Quartanæ olim frequentiores erant.

- erant, sed An. 1678. Tertianæ aut Quotidianæ grassabantur. 185.*
- Febres Quartanæ soboles Autumnæ genuinæ sunt. 51. confer. 12.*
- *Autumnales Epidemicæ, usque ad hiemem excurrunt, vel, duorum mensium spatio, cursum suum absolvunt. 23. Qua ratione curandæ. 55. & sequ. Æquæ ac Vernales, in Infantibus præcipuè, tum in ætate vigentibus, Naturæ potius commendandæ, nec mali quid perpetrant. 56. In Senibus verò sunt periculosæ, præsertim Autumnales. ibid.*
- Febris Quartana quænam dicatur. 47. Triplex quando dicatur. ibid.*
- *sub Autumno semper ingreditur. 12. Et vix ante Vernalium Equinoxium fugari potest. ibid.*
- *Sanissimum corripere potest, si modo duos, tresve, dies in locis paludosis egerit. 266.*
- *qualia parit Symptomata. 50. Diuturnior humores inquinans, uti Hysterica Adfectio diuturna, Cachexiam, aliaque mala, inducit. 266.*
- *Medicorum opprobrium. 55. Et cur. 187.*
- *quem semel, cujuscunque ætatis vel temperiei fuerit, cruciarit, alia vice, quod scitu dignum, non multum fatigabit, sed brevi discedet. 50.*
- *Constit. 1661. &c. Autumnali tempore aliis prædominatur, tumque vela contrahit. 28.*
- *quomodo in Senes, senescentes, agat. 50. ad 56. Quomodo à Junioribus, Infantulis tenellis, feratur. 50. confer. 56.*
- *Qua ratione per Corticem Pe-*

- ruvianum curetur. 188. ad 189. Cortici Peruviano soli licet cedere videatur; tamen hicce illi morbo potius inducias impetrat, quàm quod eum debellat. 55. Nec à repetito sæpius medicamento, nisi longo temporis tractu expugnatur. ibid. Cortice Peruv. quasi sopita, post duas, tresve, septimanas recrudescens, haud segnius quàm prius laceffit. ibid.*
- In Febre Quartana Catharsis æquè fere nocet ac Venæ sectio, non tamen usque adeo, nisi crebro repetatur. 54. Venæ sectio adeo nocet, ut in Junioribus morbum ad 6. menses & ultro producat, in senioribus non modo protrahat, sed & in mortis periculum conjiciat. ibid. Aëris mutatio, post illud tempus, quod Sanguis ad suam despumationem proficiendam exigit, tantummodo convenit, nec prius. 57. Quare ante illud tempus non conveniat. ibid. Aëris mutatio suo tempore si non concedatur, quid agendum. ibid. Et quo Medicamento utendum. ibid.*
- Febris Scarlatina describitur, juxta Phænomena sua. 162. Multos, sed Infantes præ ceteris, infestat. ibid. Omni tempore, sed Æstivo præsertim incidit. ibid.*
- *Curatur abstinendo à V. S. Enematibus, Cardiacis; à Carnibus, Spirituosis, Aura nimis libera, Purgante cessantibus Symptomatis exhibendo. ibid. Si Convulsiones, vel Coma initio Eruptionis, Infantibus præsertim supervenerint, Epispastica cervici adplicanda; Paregorica singulis noctibus exhibenda; Hydrogala præscribenda. 163.*
- *decedens squamas farinosas relinquit. 144.*

Febris Secundaria Variolis Confluent. superveniens. vid. Febris Maturationis.

Febres Stationariæ dicuntur, Febres quædam Continuae quæ Constitutioni alicui propriæ ac peculiare sunt, suo ordine invalescunt, neque extra illam usquam comparent. 22. Hæ à particulari quadam, at nondum satis cognita cujusdam Anni Constitutione pendent, & ceteris Morbis dominantur, per totam Constitutionem. 159. 160. Non ab Aëris manifestis Qualitatibus uti Intercurrentes producuntur. 22. 160. Verum ab Aëris Qualitatibus sensibilibus jam promoveri, jam retardari possunt (Constitutione Universalis interim ejusdem Naturæ manente) prout illis favent vel adversentur prædictæ Qualitates. 117. confer. 22. Unde se exserunt, ea tempestate, ad quam dictæ Qualitates eas destinaverint, donec alteri Morbo, seu Febri Epidem. quem aliæ subsequentis Tempestatis Qualitates advocaverint, cedere cogantur. 117. confer. 22. Ab Intercurrentibus Epidemicis differunt, quòd hæ omnibus Annis communes sint, Stationariæ verò ad certam Annorum Constitutionem determinantur. 160. Conveniunt verò cum Intercurrentibus sæpe, quoad causas externas ac Procatarticas. ibid.

—— Symptomata habent differentia, ratione intensiōis vel remissionis, pro modo quo se varia Constitutionis tempora, ad quam pertinent, habent. 118. Symptomata diversa à Constitutionis Natura, ex manifestis alicujus mensis aëris qualitatibus quoque mutuuntur: un-

de quibuscumque annis novæ apud vulgum, propter Phænomena diversa existimantur, licet eadem sint. 117. Exemplum, in Febre Dysenterica An. 1671. & 1672. quæ differebant respectu qualitatū sensibilibus temporum, in quæ incidebant. 118.

Febres Stationariæ sunt Morbi plerique omnes, qui à pag. 27. 156. fuerunt descripti. 160.

Febris Stationaria, est Febris Epidemica Constitutionis generalis. 348. 349.

—— quælibet, si Julio potissimum sæviat, Autumno adveniente, magno Epidemico, à quo Annus insigniri solet, & cui omnes Epidemici ad hanc Constitutionem pertinentes cedunt, cedere debet. 117. Et quare. 118.

—— An. 1675. Tussibus superveniens Autumno, & symptomata Pleuritica & Peripneumonica excitans, eadem erat, quæ Julio An. 1673. ingressa fuerat. 136. Sed in Pectus illa tempestate determinabatur. ibidem.

Febres Tertianæ An. 1671. grassantur, verno tempore, & Febres Dysentericas, ac Variolas, parum reprimunt. 105.

Febris Tertiana quænam dicatur. 47.

Febres Tertianæ, Autumnales, Epidemicæ, usque ad Hiemem excurrunt, vel, duorum mensium spatio, cursum suum integrè persolvunt. 23.

—— Autumnales, præmature h. e. Julio ingressi, non uti Venerales, genuinum Typum statim induunt, sed continuas Febres simulant ita, ut ab invicem difficile discriminari queant: sed Autumno exeunte, larva abjecta

abjecta, Intermittentes vel Quartanas, vel Tertianas, se esse palam fatentur: quod observatu necessarium. 24.

Febres Tertianæ Autumnales Constit. An. 1661. ad 1664. quibusnam Symptomatis, ab Intermitt. Tertian. aliis, discriminabantur. 27.

Const. An. 1661. initio Julii, invasere. ibid. At superveniente, hiemis frigore extinctæ sunt. ibid. Et ubi desinere incipiebant, insequerentur aliæ. 28.

quomodo curandæ. 54. Purgantia hic Sudoriferis mista, quibus, contrarios motus excitando, Paroxysmi processus confunditur atque turbatur, multum commendat Auctor. ibid.

duplex quomodo curetur. 55. Enematibus in ea interdendum. ibid. Sudorifera, ut in Tertian. simpl., itidem, sed sine Purgantibus exhibenda. ibid.

æquæ ac Vernales, in Infantibus, & ætate vigentibus, Naturæ potius commendandæ, nec maliquid perpetrant. 56. Sed Senibus sunt periculosæ, præsertim Autumnales. ibid.

Febres Tertianæ Vernales licet, modo invadant mense Februario, tamen circa Solstitium Æstivum pariter se subducunt. 23. 105. Quartanarum typos numquam induunt; ut faciunt Autumnales. 51.

An. 1678. Cortice Peruviano non indigebant; sed curabantur, si æger præsertim Sanguineus, V. S. Emetico, & Antifebrilibus amaris. 193.

Febres Tertianæ An. 1678. vid. Fe-

bres Intermitt. An. 1678.

Febres Variolosæ ex Constitut. pendentes, si Variolæ prioribus seculis nusquam comparuerint, neutiquam antea exstiterunt. 149. Hinc non ita culpandus Auctor, si in Methodo ipsas curante aliquid immutaverit; cum eo Recentiorum Observationibus tantum adversetur. ibidem.

Febris Variolosa potius à nudo calore, & sanguinis æstu seu inflammatione violenta, quàm ab humore delitescente, & coctione antequam expellatur indigente, pendere videtur. 100.

ac Variolæ Regulares, ab eadem Constit. aëris pendentes, si non eadem, saltem ejusdem Naturæ fuere, & prosapiæ, excepta eruptione. 61. 99. Iisdem cum Symptomatibus adgreditur, se exonerat. ibid. Et simul cum Variolis Regularibus maximè fuit. ibid. Hinc Febris Variolosa meritò habetur Variolarum soror. 102. ad 103.

Ptyalismo quomodo fugam sibi quærebat. 99. 103.

minus rectè tractata, quibusnam cum Symptomatibus ad septimanas sex vel octo, nisi mors intercederet protrahebatur. 99.

quia per Salivationem, non per Abscessulos, eliminatur, alia Methodo quàm Variolæ, licet Morbus satis similis, curanda. ibidem.

ubi curanda, quibusnam fundamentis Indicationes Curativæ superstrui possint. 100. Cum materiam crassam, prævia digestionem antequam evacuetur indigentem,

- non habeat, sed contra materiam facile inflammendam, nec Natura Evacuationes per modum Eruptionis constituat; rei summa erit Inflammationem sedare Evacuantibus & contemperantibus.* 101.
- Febris Variolosa curatur Venæ sectione, Enematibus, Julapiis, Sero lactis ac jusculis farinosis, ibid. Regimine refrigerante tractanda, quamvis Sudores frequentes adsint.* ibid. 103.
- *An. 1668. in Diarrhœam, introversione ad Intestina, mutata est.* ibid.
- Febris in Variolis quandonam adsit, remittat, redeat.* 81. 83. *In Variolis Confl. verò, etiam ad multos dies, ab eruptione, discruciat; in Discretis contra.* 81.
- — *tempore invasionis unde.* 358.
- *intensior, in Variolarum initio, eas Confluentes fore prædicat.* 243.
- In Febribus Variolas Anomal. concomitantibus, cur Sudores Anomali qui simul copiosiores adfuere, nihil emolumenti præstiterint.* 158.
- Femur in Podagra irregulari quomodo adficiatur.* 318.
- Fermentatio quamnam mutationem liquidis inducat.* 29.
- *liquidorum in quibus differat à Commotione massæ Sanguineæ febrili.* ibid.
- *in sanguine, (quæ & Commotio vel Ebullitio Auctori dicta) Naturæ solemnis est Machina in Febribus, qua sanguinem, ab intestinis inimicis, liberare conatur.* 46.
- Fermentationis atque Ebullitionis vocabulis cur non utatur potius, quam Commotionis, Auctor.* 29.
- Fermentationum genera plura & Putrefactiones humorum ultra modum retentorum, Classem unam Caussarum universalium, Morbos producentium, constituunt.* 19.
- Festinatio in Morbis curandis quam pessima, plures ægros vita spoliât.* 158. confer. 141.
- Flatus Abdominis Tumores, ac si à collectione Aquarum productos, excitare valent, ubi Hysterica Adfectio Purgantium tumultuosa actione advocatur.* 342.
- *in Hysterica jam Acidi, jam Nidrosi, unde.* 259.
- *ex Hysterica Adf. sine ulla sæpe causa.* ibid. *Non modo in Fœminis, sed etiam in Viris.* 264.
- Fluor albus.* 519.
- *Muliebris, seu Mensium fluxus immodicus curatur Venæ sectione, dein Catharsi, Corroborantium usui præmissis.* 192. confer. 282. 519.
- Focus in Variolis Discret. hieme tantum exstruendus.* 92.
- Fœditas Cicatricum in Variolis Confluent. Regimine temperato quomodo præcaveatur.* 95.
- Fœminæ Hydrope, ubi parere desinunt, præprimis adficiuntur.* 334.
- Ubi Steriles sunt licet juniores quandoque occupantur.* ibid.
- *paucissimæ ab Hysterica Adfectione, nisi quæ multum laborant, liberæ sunt.* 256. *Ratio hujus traditur.* 261.
- *Nobiles quædam Charitatem suam in pascendis Pauperibus potius, quam in iis medicandis, collocare deberent.* 164.
- *Podagra rarò, nisi Vetulæ, vel Viragines, fuerint, adjiciuntur.* 307.

Fœminæ in Variolis minus periclitantur quàm Adolescentes. 234. In Variol. Anomal. Menstruorum fluxu, tempore non solite adfectæ, unde periclitentur; & qua ratione à Regimine calido, & adstringente, sæpe extinctæ fuerint. 126.

Fœtor in Variol. Anom. nigris pessimus. ibid.

Fomentum in Febre Erysipelatosa. 175. Quando & quomodo adplicandum. ibid.

Fontanella in Rheumatismo inveterato, post V. S. iterata, cruri adplicanda. 173.

Formulæ ut conscribantur, non ita Medici officium videtur, quam ut veræ Indicationes eruantur, ad quas Curationes sint dirigendæ. 314.

— Medicamentorum in Praxi magis familiares. 567. ad 569.

Formularum seu Remediorum ingentem Sylvam quare non tradat Auctor. 16.

— pomposa apud Practicos expositio, Agyrtis modo favens, utilitati ac splendori rei Medicæ plus obesse, quàm prodesse, solet. ibid.

Fetus emolliens, in Gonorrhœa virul. præputio tumefacto adplicandus. 211. Ad Uteri procidentiam. 283.

Foveæ, Variolis Discretis deciduis, nec ulla cutis inæqualitas, in facie primis diebus adparent, propter squamulas pustulis succedentes. 81.

Fracastorius de Felicitatis modo, laudatus. 5.

Fraxini semen virtute lithonriptica laudatur; unde Mannam eadem vi pollere concludit Auctor. 443.

Frigida tempestas, in Variolis Discretis, ægro aliter fatis cessuro, ob

perversam medendi Methodum, per Regimen calidum, sæpe salutaris. 92.

Frigus cadaverosum partium externarum, in Hysterica Adfect. Symptomatis sæpe viam quasi sternit. 259. confer. 262. 264. Et periculum non infert, nisi ab Evacuatione enormi procedat. 262.

— in Dysenteria, Mortis periculum infert. 109.

— ab Exercitio calescentes sedulo vitent. 160.

— humidum, calorem placidum, An. 1675. mense Octobri, subito excipiens, Tusses numerosiores producit. 150.

— magnum, mense Octobris, tepidæ, instar æstatis placidæ, tempestati derepente subsequens An. 1675. Catharros & Tusses inducit. 135. ad 136.

— subitaneum post excalefactionem Rheumatismum inducit. 170.

— in Variolis, neque Calor, Eruptionis tempore excedant. 151. Utriusque Excessus periculosus. 89.

— utriusque Generis, nocet admodum, & multa mala producit. 97. & 89.

— retrocessus Pustularum, & Faciei ac Manuum detumescentiæ, causa esse potest. 89.

Fructus Horarii Cholæræ ansam præbent. 108.

Furfur seu Porrigo Capitis quomodo curetur. 524.

Fuscitas in Variolis Confluentibus eo major, quo morbus atrocior. 82.

G.

Γαλακτοπνοσία in Podagra. 318. ad 319.

Iiii 2

Qua

- Qua ratione magis obest quam prodest.* 319.
- Galenus *Calefacientia Febres Intermitt.* irritare, jam observaverat. 57.
- In Galliam migrare, qui *Salivationis Mercur.* effectu debilitati, & exhausti, cur sæpe debeant. 216.
- Gangræna ex *Erysipelate.* 174. Intestinatorum in *Dysenteria* aliquando. 109.
- Gargarisma in *Angina* quale. 177. Non vulgari modo usurpandum, sed sine agitatione contineatur, donec incalascit. *ibid.* In *Aphthis* post *Ileum à Torminibus ventris* in *Febre nova Epid.* 366. In *Variolis Confl.* salivam spissam & viscidam diluens. 96.
- Generationes Rerum *Natura* certissimis ubique legibus, ac artificio sibi soli intellecto, exsequitur. 66.
- Genistæ Sal *lixiviosum* in *Hydrope* quare commendandum. 343.
- Genu in *Podagra irregulari* quomodo adficiatur. 305.
- Glandulæ *Mesenterii*, in *Infantibus*, ex *Purgantium* frequentiori usu, sæpe indurescunt; quod *Strumæ Soboles*, & *Mortis præludium.* 269.
- Glans, in *Gonorrhœa virul.* præputio tumido, duro, si contegatur, *Purgantia* non juvant, ni simul *Emollientia* adplicentur.
- Globuli & *Argentum vivum* plus mali, quam boni, inferunt, in *Ileo vero.* 45.
- Gonorrhœa Virulenta* est *stillicidium liquoris* cujusdam *feminis* instar in initio *diei* flavescentis ac si *Vitelum Ovi* dilutum esset; in *virulentiore* viridescentis, admisto sæpe *aqueo humore sanguine tincto.* 206. *Morbi genus*, quo à centum retro annis sese primum *Lues Venerea* manifestare solet, & per quam ni *virus suum* ejiciat, *Sanguinem* inficit. 205.
- Gonorrhœa Virulenta* quomodo adoriatur & procedat. 206. ad 207. *A virgæ carnosæ substantia* primum infecta quomodo exoriatur. 205. Hinc *virulenta materia*, ut *substantiam glandis porosam*, non per *Urethram* exstillare ab *Auctore* visa. *ibid.* Si *Scrotum* à motu violentiori vel à percussione *materiæ*, inflammetur, lenius procedit. 206.
- *Symptomata varia* habet, ut *Doloris sensum* in *erectione* præsertim nocte, quod signum hujus *Morbi Pathognomicum*; *Incurvaturam* penis à fræno contracto, *Ardorem Urinæ*; & ab *erosa urethra* *Carunculas*, plurium malorum causam. 206. confer. 217.
- diuturnior, vel *adstringentibus* suppressa, quomodo *Luem veram* producat. 207.
- si cum *Lue Venerea* confirmata concurrat, curata prius *Lue*, curanda venit. 215. *Lue Salivatione* sublata, quomodo *Gonorrhœa* tractanda. *ibid.*
- *Salivatione* non curatur. *ibidem.*
- Curatur præcipue *Catharticis*, in quibus *Curationis cardo* vertitur; hocque tum *ratio*, tum *experientia* dicunt. 208. confer. 210. *Hydragoga* præ ceteris conducunt. 208. Singulo die, ad quatuordecim, vel plures, donec color *materiæ flavus* evanuerit, continuanda. 208. 517. Si nimis cito relinquuntur, *ichore* adhuc manente, in *summitate colis* adparente, minima

ma occasione recidiva fit. 208. Si Purgantibus non cedat lenioribus, fortiora dentur. 209. Denique Balsamica. ibid. 517.
Gonorrhœa virulenta Diætam refrigerantem quare expostulet. 208. Quales Cibos vetet; quales admittat. 210. 518.
— facile mutatur in Luem, si æger à Catharticis abhorreat; vel si pertinaciter purgantibus refragetur. 209. Tumque V. S. & Clysmatibus succurrendum, licet non æque tuto fiat. ibid. 517. Hinc vicissim exhibenda tum Cathartica, tum Enemata. 209. Qua Methodo hoc fiat. ibid. confer. 210. 517.
— V. S. in sanguineis quando exigat. 210. Aquas Minerales non admittit. ibid. Adstringentia intempestiva vetat. 207. 210.
— ex Decoctis Lignorum exsiccantium plus mali, quàm boni impertit. ibid.
A Gonorrhœa virulenta, qui purgantur ægrius, difficilius curantur. ibid.
In Gonorrhœa virulenta, qui ichor, mane præsertim guttatim adparet. vid. Ichor in Gonorrhœa virulenta.
Goodall (Carolus) M. D. Auctoris in Curatione comes, qualis fuerit. 184. Auctori Casum singularem communicat. 252. Auctorem semper tutatus est. 254.
Guttæ D. Goddard, è D. Goodall quæ parantur, ceteris Spiritibus volat. præferendæ. 15.

H.

H Abitus totus corporis mutandus, & resingendus, in Podagræ Cu-

ratione, datur. 325.
Hæmoptoë ejusdem indolis cum Hæmorrhagia Narium Auctori habetur. 178. Cum nominis Discrimen modo pendeat à loco, per quem Morbus sibi viam fecit. ibid. Quo sensu Febribus adnumeranda. 177. Febris quoque est, quæ Nomen habet à crisi, qua soluta fuit. 178. Quos & quando præcipuè invadat. ibidem.
— curatur iisdem ac Hæmorrhagia Narium, excepta Catharsi. ibid. 523.
— in Variolis. 85. 378. 506. Ejus Curatio. 379. 506.
— & Mictus Sanguineus, in Variolis, mortem certò prænuntiant. 85. 97.
Hæmorrhagia Narium, describitur. 178. 522.
— tamquam Februm Continuarum Symptoma, unde. 42. Et quomodo tractanda. ibid. Quo sensu Febribus adnumeranda. 177. Febris ut plurimum, in initio, præ se fert indicia, quæ sibi per Nares viam facit. ibid. In Variolis Phrenitidem levans, V. S. indicat. 95.
— quomodo curetur. 178. Remedia Interna. ibid. 522. Extèrna. 178. 522.
— in Febribus non semper sistenda, verum sæpe permittenda; & quare. 42. Sistentia vulgo, in Febribus Continuis, cur sæpe non minus juvent, quàm si gladio ignem extinguere satageremus. ibid. In Variolis pessimis Vitrioli Spiritus usu, in Cerevisia tenui, coërcita. 148.
— recidivam singulis annis minuitur, si modo æstuet corpus. 178.

In Hæmorrhagia Narium Catharticum quandonam exhibendum. *ibid.*

— æque ac Hæmoptysi, calor & dolor sinciput torquent. 178. 522.

Hæmorrhagia quælibet immodica, nisi, ea sedata, Purgatio Leniens exhibeatur, recurrere solet. 42.

Hæmorrhagiæ Hystericam Adf. sæpe invitant, ubi contrarium foret, si ejus fomes in materia aliqua involveretur. 265. confer. 263.

Hæmorrhoidales Venæ, in Podagræ irregularis Paroxysmorum intervalis, dolent. 305. ad 306.

Hæmorrhoidum Dolor & Curatio. 520.

— Fluxus immodicus. *ibid.*

Halitus Magni Hystericæ Adf. non sunt caussa. 265.

— Putridi, in Variolis Discretis, à materia purulenta prodeuntes, circa finem, Pustulis crustosis retropelluntur. 92.

Hauftus Emeticus. 32. 488. 493.

— in Febre Quartana, languentem sanguinis depurationem promovens. 57.

— in Hæmorrhagia, Sanguinis impetum sistens, in Febribus Continuis, 42.

— in Mictu cruento, unus & alter. 253.

— in Pleuritide essent. refrigerans, post V. S. exhibendus. 165. 497.

— Paregoricus in Cholera, post ablutionem Stomachi. 177. Fortior ubi necessitas urget. 511. In Cholera, An. 1676. 184. In Chorea Sancti Viti post Catharsin. 361. 506. In Colica biliosa. 129. In Diarrhœa. 113. 510. In Dysenteria ex Torminibus ventris, in Febre Nova Epid.

oborta. 364. In Febre nova hiemali, post Catharticum. 357. Post Emeticum in Febribus Continuis. 33. 493. Et Emmenagogus in Lochiorum suppressione. 280. Ad Tussim in Morbillis. 121. In Phrenitide. 41. In Podagræ Inveteratæ Paroxysmo, ubi Mortis metus ex recessu materiæ. 327. In Variol. Regul. Confl. exhibendus, post plenam Eruptionem. 94. In Variol. Anomalis. 148. In Variolis Confluent. sexto die exhibitus. 251. In Variol. pessimis. 148. Post V. S. in Mictu, vel Sputo, sanguineo in Variolis Confl. 441.

Hauftus Purgans in Colica biliosa, ex quibus fiat. 129. In Dysenteria. 112. In Gonorrh. virulenta, plurimum conducens. 209. In Ileo vero. 45. In Peripneumonia notha. 168.

— ad Vomitus compescendum, in Corticis Peruviani usu. 190.

Herbæ Amarescentes & acres, ad Podagram utiles, qua cautione usurpandæ. vid. Vegetabilia ad Podagram.

— Excalefacientes, ipsa hieme, calorem æstivum Sanguini communicant. 316. Si æstate usurpantur, præcaventur mala, quæ à tempestate pendent; aliàs sæpe nimis sero veniunt. 316. In Chronicis æque ac Podagra, maximo ægrorum commodo adhibeantur; hac cum differentia, quod in Chronicis Catharsis sit præmittenda. *ibid.*

Hieme exeunte, Podagræ Paroxysmus invadere solet. 305. confer. 303.

Hiems rigidissima An. 1683. ut nemo tum viventium illi parem, vel frigoris gradu, vel temporis tractu, viderat. 354.

— Dysentericis contraria. 105. 123. Hiems

Hiems Morbos Chronicos potius gignit
quàm Æstas. 316.

Hippocrates laudatus. 20. In Medici-
næ bonum quid præstiterit. 6. De
Methodo medendi laudatus. 196.
confer. 10. Medicæ Artis Basin
quidnam posuerit. ibid. Quamnam
habuerit Theoriam. ibid. Eos repre-
hendit, qui plus Speculationi,
quàm Naturæ judicio, h. e. Obser-
vationibus Præcticis, sive Phænome-
nis Naturalibus, ut & Juvantibus
& lædentibus, dare solent. 339.
Quomodo intelligendus, ubi, in
Libro de Prisca Medicina, ait,
quod, quæ de Natura à Sophistis
dicta aut scripta ad Artem Medi-
cam minus spectant, quàm ad Pic-
toriam. 338. ad 339. De Morbis
Chronicis laudatur. 203. Ubi in
Ileo Follium usum, & in Cancro
nihil agendum præcipit, non minus
de Medicina meruit, quàm si pom-
posis Remediis omnia implevisset.
16.

— Combustionem, in Podagra,
ope Lini crudi, ad dolorem miti-
gandum jam instituebat, uti in In-
dia Orientali per Moxam, nec non
in Europa, hodie facere solent.
329.

— Variolas non cognovisse videtur.
149.

Hippocratis & Veterum Aphorismi, de
paranda materia Febrili ad Crisin
per Sudores, Febris seu Morbis
Intercurrentibus adcommodari ne-
queunt, sed aliis. 156.

Hirudines, in Febre nova Epidemica,
Infantibus adplicandæ. 366.

Historia Morbi alicujus si diligenter
perspecta habetur, par malo reme-
dium adferri potest. 9. ad 10. Sola

veram medendi Methodum indicare
potest. 197. confer. 196.

Historia Morborum ad Praxin quam
utilis. 9. Hactenus in Sylvam im-
mensam, sed fructu perexiguo, quare
excreverit. 7. Adcurata deficit hac-
tenus, quia Symptomata haberi so-
lent confusi Naturæ, de suo statu de-
jectæ, effectus, quæ vix adnotatio-
ne digna videntur. 9. Ubi describen-
da, ad plura advertendum venit,
quam vulgo putatur. 7. Quæque ad
Quatuor reducuntur Capita. ibid.
ad 9.

— Genuina ubi tradenda, 1^o.
Morbi omnes ad definitas & certas
species revocandi: 2^o. Hypothesi-
bus sepositis Morborum circa Phæno-
mena, ac Naturalia utcumque mi-
nuta, adnotentur: 3^o. Phænomena
naturalia seorsim ab Accidentalibus
enarrentur: 4^o. Anni tempestates
huic illive generi faventes obser-
vandæ. 7. ad 10.

— Acutorum, ab Auctore,
non tam ut metam figat, quàm ut
aliis animum addat, traditur.
15.

— Hystericæ Adfect. quare difficul-
ter describenda. 260.

— Naturalis pessimè tradi solet, ut
docet Verulamius. 7.

— Variolarum vera, earumque Me-
thodus medendi, describenda, ex
quonam Genere harum fieri debeat.
79.

Historia Singularis, seu Casus, Viri
Cholera An. 1676. laborantis. 184.
Baronis Annesly Colica biliosa la-
borantis & Narcoticis solis ab Auc-
tore curati. 130. Pauperis Colicæ
biliosæ doloribus vexati, Equitatione
sanati. ibid. Viri Hypochondriaci,

tandem Diarrhoea colliquativa correpti, diuturna Equitatione perfecte curati. 274. ad 275. Viri, à Dysenteria acuta Constit. 1669. Methodo Auctoris curati. 113. Viri, Dysenteria Const. 1669. ad 1672. laborantis, & Methodo Auctoris, initio Constitut. instituenda, curati. ibid. Fæminæ Dysenteria inveterata laborantis, & curatæ. 115. Juvenis Febre Acuta violenta, cum Pettechiis & Mictu Sanguineo, An. 1681. laborantis, per D. Goodall. Auctori communicata. 252. ad 253. Comit. Salisburienfis Febre Dysenterica laborantis, & curati. 119. Juvenulæ Febre Dysenterica laborantis, Dysenteria jam prius adfectæ, & curatæ, ibid. Pueri, Febre Epidem. An. 1674. laborantis, Auctoris Methodo curati; Et à Comate vel stupore, quo laborabat tempore restituti. 142. Dominæ Febre Epid. An. 1675. laborantis, & Dejectionibus Symptomaticis adfectæ, Methodo Auctoris curatæ. ibid. Pueri Febre Epid. & Pleuritide Symptomatica An. 1675. laborantis, & Methodo Auctoris curati. 153. Fæminæ nobilis, mortuæ ex Febre maligna, Pestem Londinensem An. 1665. prægressa. 73. Juvenis, Febre maligna laborantis & post V. S. tantum validiore facta. 371. Juvenis Febre Pestilentiali laborantis, defectu Phlebotomiæ copiosæ, defuncti. 75. Juvenis Pestilentiali Febre laborantis, in quo leni excitato madore, Medicamenta diaphoretica, ilico retinebantur. 76. Medici Morrice, Febre Variolosa laborantis. 102. Hydropicæ ex incarceratione, ab Auctore cu-

ratæ, notatu digna; tum ob copiam aquarum, quam diebus à Purgatione liberis reddebat; tum ob intumescientiam Abdominis, ex Hysterica Adfectione excitatum; denique quod Vetula, Menstrua diu non passa, de novo eadem habuerit. 341. ad 342. Hydropicæ, initio Auctoris praxeos, ipsius curæ commissæ, & Syrupo Spinæ Cervinæ curatæ. 337. Hydropicæ Syrupi Spinæ Cervinæ ope pejus habentis. ibid. Viri Hypochondriaca Colica, ad Iliacam accedente, cum Urina limpidissima, laborantis. 263. Viri Hypochondriaci flentis immodicè. 264. ad 265. Comitissæ Adfectu Hysterico, Calculum Vesicæ simulante, laborantis, Narcotico curatæ. 132. Viri ab Ileo, Auctoris Methodo curati. 366. Fæminæ, cui, Lochiis ex Hysterica Adf. suppressis, Auctor postquam sua Methodo nil profecerat, nulla Remedia amplius adplicuit; atque Muliercularum tum consilio, V. S. in pede instituta, interiit. 281. Maniæ ex temperamento frigido, & infirmiore. 61. Fæminæ Morbillis, calefacientibus exasperatis, laborantis, Methodo Auctoris curatæ. 123. Infantium Morbillis An. 1674. ægrotantium, & curatorum Methodo Auctoris. 144. Viri, Mercurio sublimato corrosivo adsumpto, solo Aquæ, per superiora & inferiora injectæ, usu, ab Auctore curati. 200. Chirurghi, Venæ sectione audaci ac liberali, in Castro Dunstar, Milites à Peste sanantis. 71. Pharmacopolæ Rheumatismo laborantis, & Diæta ex sero lactis absque V. S. curati. 199. Pueri Variolosi Methodo Auctoris, è Lecto

Lectio nempe eximendo & Paregorica exhibendo, restituti. 246. Fœminæ nobilis Variolis Anom. nigris, Const. 1670. laborantis, & Mensium profluvio tempore insolito affectæ, Auctoris Methodo felicissimè curatæ, mitescente adeo Morbo, ut nec delirium adfuerit, & nigredine quasi depulsa, in flavedinem potius abierint Crustæ. 126. Filii Auctoris Variolis Anom. distinctis laborantis & Methodo Patris restituti. 127. Infantis Variolis Anom. nigris Const. 1670. cum Vesiculis in femoribus pessimi ominis, laborantis & extincti. 124. Infantium Variolis nigris pessimis laborantium. 148. Juvenis Variolis nigris pessimis, post computationem largam, laborantis. ibid. Juvenulæ ex Variolis insigniter Confluentibus, undecimo die extinctæ, primum V. S. sæpè iterata à Rheumatismo sanata. 238. Juvenis à Variolis Confluent. Methodo Auctoris, integrò ibi deducta, sanati. 250. ad 251. Juvenis Variolis Regular. laborantis, qui mortuus adstantibus visus, nudus mensæ imponitur & resurgit. 96. Variolosæ ex Syrupo de Meconio pessimè habentis, sed Laudanum cum levamine ferentis. 271.

Homo variis malis obnoxius. 19. Ad æmulum suam pertingit spatio 21. Annorum. 47. Exterior uti conspicitur ex partibus sensibilibus, sic & Homo interior datur, spiritualis fabricæ, rationis lumine tantum concipiendus. 261.

Hooping Cough seu Pertussis Infantum V. S. juvatur, plus quàm ullis Pectoralibus. 121.

Horæ medicinales, pro Remediis adsumendis, quales. 345.

Humores speciem quamdam contrahunt in corpore nostro, vel nimia in eo mora, vel constitutione aëris morbosa, vel contagio venenoso; unde Effectus cum essentia speciei istius convenientibus, sive Symptomata singularia, producuntur. 12.

Hydragoga in Gonorrhœa virul. primaria sunt. 208.

— varia. 337. 338.

Hydrogala in Colica biliosa, pro Potu, vel Cerevisia tenuis. 131. In Dysenteria. 112. In Febre Scarlatina Infantum, ubi Convulsiones vel Coma. 163. In Gonorrhœa virulenta. 210. In Morbillis. 121. In Morbillis Anom. An. 1674. pro Potu. 145. In Tussi Epid. ubi Febris &c. adsunt. 152. In Variol. Anom. 146. In Variol. Anom. grata & utilis. 125. 126. Præsertim tempore Maturat. ibid. In Variol. Anom. quatenus æstus fervidum temperat, Salivationem insuper promovet. 125. & 126: Finito morbo. 148.

Hydropici Juniores, Aquis expulsis, aliquando roborantibus cur non indigeant. 344. Seniores, vel debiles, roborantibus, post evacuatas aquas, opus habent. ibid.

— Tumores unum ex gravissimis Symptomatibus, Intermitt. Autumnales, diuturniores, insequentibus. 49. & 50.

Hydrops omnem Ætatem & Sexum infestat: Fœminas verò magis quàm Viros. 333. 515. Tumore furarum mane evanescente, primò cognoscitur; præsertim in Viris; nam in Gravidis, vel iis quibus menstrua deficiunt, hoc fallit; & in Viris

- Asthmaticis*, ab eodem derepente liberatis, itidem decipiet. 333. confer. 515. Hunc subsequitur Abdominis Tumor, aquæ congios plures sæpè continentis, à quibus Exomphalos. 333. ad 334. Qui vero Tumores Abdominis in Fæminis contingunt, ab excreſcentia Carnium in Abdomine; vel à flatibus; præſertim in viduis, aut ſero nubentibus, & graviditatis idea ipsis imponunt, ad hunc Morbum non ſpectant. 334.
- Hydrops Symptomata tria primaria habet; Dyspnœam, Urinæ paucitatem, Sitim intenſam. 334. 345. 515. unde hæc oriantur. 334.
- ubi adest, pro rata, qua partes obſeſſæ tument, reliquæ gracileſcunt. ibid.
- necat, ubi Abdomine aquas non amplius continere apto, nobilia viſcera & vitalem arcem ipſæ invadunt. ibid.
- pro Cauſſa habet Sanguinem debiliorem: cujus debilitatis Cauſſa præſertim V. S. nimia; vel Morbus quidam diuturnior; vel liquorum ſpirituſorum ingurgitatio. ibidem. Teſtes Fœminarum alio modo adſciuntur hoc Morbo. ibid.
- pro Cauſſa proxima habet Aquas abundantes. 343.
- Indicationes Curativas duas abſolvendas ponit; tum Aquarum evacuationem, tum ſanguinis roboris reſtaurationem. 335. 515. Evacuatio, prima Indicatio, quomodo perſolvatur & quibuſnam mediis. 335. ad 343. Purgantia quæ, & quando, eo inſervientia. 336. ad 337. 515. 516. Per Vomitum & Seceſſum ſimul agentia. 337. ad 338.
342. Corroborantia loco Evacuantium, quando. 343. 516. Diuretica loco Purgantium & Emeticorum, quæ & quando. 343. 516.
- Hydrops non ſemper curatur, licet utrique Indicationi ſatiſfactum ſit; ſed ad ſupremum gradum provectus, corruptis partibus, artis ſubſidia ſpernit. 345. ad 346. Curationem tamen adgredi debet Medicus, & quare. ibid.
- Aquis expulſis, media parte tantum curatus erit: hinc ſecunda Indicatio per Roborantia, tum perſolvenda, ad novum proventum præcavendum. 343. ad 344. 516. Juniores hoc auxilio ſæpe non indigent. 344. Perſicitur iſdem, quibus in Podagra, paucis additis. 344. 516. Tum nullo modo purgandum. 517.
- Purgantia validiſſima & celerrima, præ ceteris omnibus Morbis poſtulat. 335. 516. Evacuantibus ἀνω γὰρ καίτω, quibuſnam in Caſibus non tantum non juvatur, ſed peior fit; verum, ſanguinem ac viſcera roborantibus, & æris mutatione, ac exercitio, tractandus venit. 343.
- Purgantibus ſolis, non Vomitoriis, curandus venit, ubi collectio Aquarum non ingens. 342.
- qui vel Pedes tantum, vel etiam Ventrem, ſed modicè, inflavit, non ſtatim per Cathartica & Emetica, ſed calefacientibus & roborantibus curandus. 345. Et in eo caſu cavendum ab omnibus Catharticis, quæ illico tumorem recedentem revocant. ibid.
- Liquores tenues & refrigerantes cur non ferat, & è contra liquores generoſiores tamquam efficax medium admittat. 344. Pro Potu conce-

- cedit Vinum, ad roborandum; sed non adsumendum antequam meatus parum reclusi, & portæ aquis datæ fuerint. ibid. Cerevisia generosior loco Vini. 345.*
- Hydrops Topica Medicamenta non plurimi facit. 346. Unguenta è Catharticis, & Vesicatoria præprimis, damnat. ibid.*
- ibi incipit, ubi desinit Scorbutus, quomodo hoc dictum intelligendum. 172. ad 173.*
- ex Febris Intermitt. Autumn. 58. Februm Autumn. Interm. Symptoma, unde enascatur. 59. Juvenes raro obsidet, nisi Catharticis accersita. ibid. Si recens, Aperientibus & Catharticis facile curatur. ibid. & 578. Cathartica verò ante discessum Febris frustra dantur: sed Antiscorbuticis expellitur. ibid. & 495. 516.*
- Scorbutum quo sensu aliquando mentiatur. 172.*
- ex V. S. in Podagra mox à Paroxysmo. 309.*
- ex subita Spiritus Vini interdictione, in adsuetis, oriri potest. 169.*
- Testium in Foeminis quid, & quomodo ab Humorum depravatione, ex spirituum ἀταξία, in Hysterica Adf. diuturna, oboriatur. 266. confer. 334.*
- Hydropicorum sitis quomodo fallenda. 345.*
- Hypercatharses sæpe natæ à purgationibus etiam lenitivis, quod Medicus non inquisiverit, utrum æger facile aut difficile expurgaretur. 335. A Purgantium violentia, hodie non metuuntur, cum Remedium hoc certissimum, Laudanum, habeamus. 336.*
- Hypercatharsis insanabilis ab Unguentis purgantibus, abdomini illinitis. 346.*
- Hypochondriaca Adfectio in Fœminis Hysterica vocatur. 259. 261. 490.*
- Splenis, & viscerum, Obstructioni imputata, in omnibus convenit cum Hysterica Adf. Uteri vitio adscripta. 256. Animi Pathemata atrocissima fovet. 259. ad 260.*
- quæ mala tum in Corpore, tum in Anima, excitet; vid. Hysterica Adfectio.*
- Hypochondriaci quomodo sint animo constituti. 259. 260.*
- Hypotheses speculationibus Philosophicis innixæ, quare omnino sint fuitiles: illæ verò, ex Phænomenorum naturalium & Practicorum Observatione natæ, stabiles manent. 340. confer. 8.*
- Hypothesis Philosophica, quævis, in scribenda Morborum Historia, sepouenda. ibid.*
- Hysterica Adfectio Chronicorum omnium, frequentissimè occurrit, horumque pars media est. 256. Post Febres, Morborum frequentissimus. 233. In Maribus Hypochondriaca vocatur. 259. 261. 490.*
- Uteri vitio ab Antiquis fuit adscripta: convenit in omnibus cum Adfectione Hypochondriaca, splenis & viscerum obstructioni imputata. 256.*
- Fœminas tamen multo crebrius quàm Mares corripit; licet Uterus non peccet, ut voluit Antiquitas. 256. Ratio hujus datur. 261. Fœminis paucissimis, nisi laboribus*

adsuetis, parcit: Viros quoque sedentarios tentat. 256.

Hysterica Adfectio quomodo corpus malè adficiat, & conquasset, adeo ut instar ædis ruinas minitantis tantum non corruat. 250. ad 259.

— Animam adhuc magis ægrotare facit quàm corpus. ibid. Cujus Ægritudo traditur. ibid. ad 260. Desperationem de sanitate recuperanda sollet in animum inferre. 259. ad 260. confer. 258. Animi Pathemata atrocissima fovet. 259. ad 260.

— Frigus cadaverosum partium externarum, Symptomata præcedens, sæpè habet. 259. confer. 262. Et periculum non infert, nisi ab evacuatione enormi fuerit. ibid. 264.

— Diagnosin difficilem, præ ceteris quibuscumque Morbis, & perobscuram, habet. 256.

— Apoplexiam inducere potest; & in Puerperis magna Hæmorrhagia passis, vel partu laborioso cruciatibus, vel animo commotis, satis frequens. 257. Calculum Renum aliquando, aliquando & Vesicæ, exquisitè simulat. 132. Flatus excitare valet hujusmodi, ut Abdomen, tamquam ab aquis collectis, intumescat. 342. Flatus jam Acidus, jam Nidorosus, è ventriculo eruere cur faciat. 259. Lacrymas nunc, nunc risum, sine ulla causa, excitat. ibid. 264. Lochiorum suppressionem cum diris & letalibus Symptomatibus, inducit. 279. Quomodo occurrendum. 280. ad 281. Podagram, in Fæminis gracilioribus adolescentibus, vel constantioris ætatis, aliquando mentitur; nam

vetulas tantum vel viragines Podagra infestat. 307.

Hysterica Adfectio Pulsum sanorum similem sistit, utut æger strangulari videatur. 262.

— Sudores nocturnos quomodo eliciat. 264.

— Urinam limpidam tamquam Pathognomicum signum habet. 259. 261. 490. Exemplum. 263.

— Salivationem Mercuriali similem, quomodo excitet. 264.

— varietate multiformi se ostendit, & nullum non æmulatur adfectum. 256. confer. 260. Pro parte corporis quam occupat, Symptomata parti competentia statim producit; adeo ut Medico sagaci opus sit, ne ista, à Morbo essentiali hujus illiusve partis, pendere arbitretur. 256. 490.

— Caput externum occupans, Dolorem vehementem in quadam parte pollice tegenda, Clavum Hystericum dictum, adfert, præsertim in iis, quæ Chlorosi laborant. 257. Quid sit iste Clavus, & quomodo fiat. 263. 490.

— Caput internum occupans, producit Apoplexiam; quæ frequens in Puerperis; ubi sanguinis multum misere, vel partu laborioso cruciatæ, vel passione animi commotæ fuere. 257. Producit spasmos persimiles Epilepsiæ, qui Uteri strangulatus dicuntur, & describuntur. ibid.

— partem quamlibet corporis, sive internam, sive externam, adficere valet. 132. 258.

— partes externas, ut Crura, Humeros, Manus, Maxillas, Tibias, occupans, nunc Dolores, nunc

nunc Tumores, excitat. 258. confer. 257.

Hysterica Adfectio Dentibus non parcit, quos, nulla alia caussa concurrente, crudeliter adficit. 490. In Dorso dolorem vehementiorem aliquando excitat. 259. Intestina occupans Diarrhoeam excitat cum rejectione materiae viridis, sed sine dolore. 258. Colicam biliosam imitatur, ubi partes Colo adjacentes occupat. 132. In Colon, & regionem Scrobiculo Cordis subtensum, impetum faciens, dolorem, similem Iliacae Passioni aut Colicae biliosae, infligit, cum vomitu enormi; subsequente dein Ictero, Paroxysmum quasi solvente; accedente desperatione de recuperanda sanitate. 257. ad 258. confer. 262. Fit praesertim in laxis, crudisque habitu, vel quae Fetus grandiores sunt enixae. 258. Hic Adfectus docet Morbum ex ἀταξία Spirituum ortum. 262. Pulmones obsidens, Tussim Hystericam excitat, non adeo tamen frequentem, & pituitosas exagitantem. 257. In Renes incursans parit dolorem, Nephriticum Paroxysmum omnino mentientem, ut vix an à Calculo, an ab hoc Morbo, sit, nisi aliquando Vomitu materiae viridis, vel nota adfectione animi, distinguantibus, dignoscatur. 258. Ventrículum adficiens Vomitiones excitat, rejecta materia viridi, sed sine dolore. ibid. Vesicam adficiens Calculum æmulatur. ibid. in Vitales partes incidens Cordis Palpitationes excitat, praesertim in macilentis, vel Febre alba pallescentibus. 257.

— ubi discesserit à parte adfecta, teneritudinem in ea relinquit, ac si ipsa verberibus fuisset

petita. 132. 258. 490.

Hysterica Adfectio, sive Vaporum, sive Convulsionum particularium partium, ratione agat, eodem modo solvuntur Phænomena; & pro parte quam occupavit Symptomata, isti parti adcommoda, parit: unde plerisque Morbos homines vexantes simulat, quamvis sua Natura, unus idemque Morbus sit. 132.

— in Materiae viridis, Bili Porraceae similis, excretionem, tantum quam αἷμα, ægros sæpè incitat. 262. confer. 257. 263. Hoc tamen, Morbum in humoribus, horumque acrimonia, residere non magis indicat, quam Vomitus persimilis, navigantibus in irrequieto mari, vel Infantibus in Paroxysmis Convulsivis, superveniens, illud indicaret. 262. Nec magis sequitur quod viride est acre esse, quam quod acre est viride esse. 263. *Hysterica & Hypochondriaca Adfectio non à Menstruo sanguine, aut semine, corruptis, halitus excitantibus; nec à Succorum depravatione; nec ab humoribus acribus, enascitur. 265. Quod si verum esset Purgantia, Vomitoria, Hæmorrhagiæ & alia, quæ Morbum invitant, potius eum fugarent. 265. confer. 262.*

— — Causas Procatarticas, seu externas, agnoscit, α. Corporis & animi motus vehementiores. 261. Sic & in Puerperis tenerioribus, nimis cito è lecto surgentibus, invitatur. 279. β. Stomachi vacuitatem ab inedia. 261. Quæ & à Carnium abstinentia sæpe invitatur. 265. 325. confer. 264. Unde & Carnium usus hocce Morbo adfectos restaurat. 264. γ. Evacuationes nimias, sive Sanguinis,

guinis, sive humorum per Emetica vel Catharsin. 261. Sic à Sanguinis jactura ingenti, corpus debilitante, excitatur. 342. Itidem Purgantibus allicitur. 341. 342. Sed violentius Vomitoriis advocatur. 341. Si verò Morbi fomes in aliqua involveretur Materia, tum Evacuantibus, ut Hæmorrhagiis, V.S., Purgantibus, Emeticis, non invitaretur, sed contrarium foret. 265. confer. 262.

Hysterica Adfectio ex Uteri procidentia, post partum laboriosiore. 283. Quomodo curetur illa Procidentia. ibid.

— Caussas Προνυμμένας seu internas efficientes ex Αἰταξία Spirituum Animal. in hanc illamve partem, nimia copia, & nimio impetu, ruentium, unde tum Symptomata producuntur, deducit. 261. ad 262. confer. 278. 279. 133. Et quod ab hujusmodi inordinato motu, potius quàm ab humorum aliquo vitio, licet ipsos inficere valeat, producat Morbus, Caussæ occasionales probare videntur. 133. 265. Et Argumentis pluribus firmatur. 261. ad 265. Istius αἰταξίας originaria causa debilior crasis Sanguinis. 275. ad 276. Et præsertim debilior crasis, sive nativa, sive adscititia, Spirituum; unde facile dissipantur aut perturbantur hi. 261. 265. Eorum systemate fracto & debilitato. 282. 341. 368. Et hinc Hystericæ ferè omnes de subsidencia Spirituum conqueruntur. 259.

— ex Spirituum debilitate, non nativa, sed adventitia, oritur, si Mensium fluxus fuerit immodicus, sive in Puerperio sive extra. 282. Quid agendum si in Puerperio. 281.

ad 282. Quid si extra illud. ibidem.

Hysterica Adfectio diuturna Humores corporis inficere valet, licet ipsa ex iis non immediatè pendeat; eodem modo ac Quartana diuturnior. 266. 267. Et quinam Morbi ab hac humorum depravatione. 266.

— periculo per se vacat, nisi perversa cura exasperetur. 132. Hinc non letalis sua Natura, sed vi malorum subsequantium, aliquando necat. 279.

— curatur, imminuendo prius humores vitiatos diuturnitate Morbi, si ægri vires concesserint; tum corroborando Sanguinem, quæ præcipua est Indicatio: sed si Symptomata, ut Dolores, Vomitiones, Diarrhææ urgeant, nec inducias ferant, Anodynis sopiendum, priusquam aliquid peragatur. Symptomata leniri solent mediis, fætida exhalatione Spirituum impetum reprimantibus. 267. 490. ad 493.

— V. S. & Catharsin quando exigat. 267. 490. 492. Chalybem, quandonam expostulet, & qua ratione hicce adsumatur. 268. ad 270. 491. Theriacam Andromachi non deneget pro roborando. 273. 492. Corticem Peruvianum auxiliatricem novit. 273. Foetidis quomodo delectetur; quænam illa sint. 493. 276. Clysterum frequentiore usum renuit. 152.

— Chalybe si curari nequit, Aquæ Minerales adeundæ. 272. 492. Quæ si necdum juvant, Aquis Sulphureis calidis utendum. 272. 492.

— Lacte solo, omnibus aliis frustra tentatis, sæpe curata fuit, in tem-

temperamento bilioso ac tenui. 273. 493.

Hysterica Adfectio levior, sine V. S. Catharsi, Chalybe, sed solis Pilulis Hystericis, sæpe curatur. 271.

— extra Paroxysmum quomodo tractanda, ut causæ originariæ occurratur. 267. ad 274.

— in Paroxysmo quomodo tractanda. 276. ad 281. 492.

Hystericæ aliquando ita abhorrent à Medicamentis Hystericis, ut ex iis in vitæ periculum conjiciantur: quæ tum omittenda. 271.

In Hystericæ Adfectionis Curatione quibusnam Formulis Remediorum usus fuerit Auctor. 270. 490. 493.

Hystericorum Adfectuum Classi Rheumatismus Scorbuiticus fere referendus videretur, nisi ipsum remediis Hystericis minimè cessisse comprobatum fuisset. 173.

I.

J *Alapa radix in Gonorrhœa Virul. sæpius sola Pauperibus profuit.* 208.

Ichor in Gonorrhœa virul., qui mane præsertim, urinæ ardore & stillicidio disparentibus, in summitate colis, digito compressi, guttatim adparet; non est à debilitate, ut vulgo putant, sed à reliquiis contagii, minima occasione, uti post nimiam potationem, exercitium validius, novas tragædias excitantibus. 208.

— in Variolis Confl. loco Puris, si sanguis exæstuet, adparet. 245.

Icterus ex Colica Hysterica, nullis Catharticis, vel solo Rheobarbaro, curandus; & quare. 133. Si pertinaciter

adhæreat, quomodo curandus. 134. 514.

Icterus, à lecto, nimis quam par est, abstinendo, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. aliquando, sed raro, & in declinatione Morbi, oriebatur; hinc tum potius lecto decumbat æger; & quare. 139.

— ut curetur. 134. 514.

Idiosyncrasia in Adfect. Hyster. Curatione, ratio habenda. 271.

Ignis Sacer qualis Morbus apud saniores Medicos. 66. Ferè ut Pestilentia invadit. 67.

— *Latinorum, Pestis imago non obscura videtur.* 66. Suspectus de malignitate Auctoribus, ut ex methodo tractandi liquet, 67. A Peste quomodo differat. ibid.

— *Naturæ ope discutitur in corporis partem quamdam externam, specie Tumoris (vel eo deficiente macula rubra Rosa dicta) ad alas & inguina, haud secus ac in Peste, sicque solvitur Morbus criticè.* ibidem.

Ileus seu Iliaca Passio quid sit, & quomodo fiat ex Intestinorum inverso motu. 44. 605. Hujus Inversionis causæ duplex; vel Obstructio, scilicet; vel Irritatio. ibid.

— duplex ponitur, verus scilicet, tum Iliaca Adfectio notha. ibidem.

Ileus verus tamquam Februm Continuar. Symptoma, quomodo excitatus. 45.

— *totius tractus Intestinorum, à Ventriculo, choream ducente, ad majora Intestina usque, inversum motum ponit.* 44. ad 45. Hinc Clysteres per Os rejiciuntur. ibid.

Ileus

Ileus verus habetur Sydenhamo, qui ex humoribus acribus, primo Ventriculum invertentibus, nascitur. 44. Eum curandi Methodus nulla ferè cognita Auctori habebatur. ibid.

— qua Methodo ab Auctore tractetur. 45.

— ex usu Argenti vivi & Globulorum, plus mali quàm boni accipit. ibid.

— Colicam biliosam insequens. 128.

— à Calefacientibus, in Febre nova Epid. quomodo excitetur. 365. Non ut de Torminibus ventris dictum (363.), tractandus ac ipsa Febris: nam ultra unam V. S. progredi nequit Medicus, & Cathartica Emetica fiunt. 365.

— hicce curatur, si post V. S., Clyisma ex fumo Nicotianæ exhibeatur, tamquam optimum. ibid. Quo non juvante Purgans fortissimum exhibendum. 366. 606. Sublato morbo, quamdiu à Purgatione abstinendum. 363. Paregorica quando exhibenda. 366. confer. 512.

In Ileo vero primo, erit corroborandus Ventriculus, quam exhibendum Catharticum, quod alias Emeticum sit. 45. 128. 512.

— Catulus vivens nudo ventri quamdiu accumbendus. 45.

Iliaca adfectio Notha vocatur Sydenhamo, illa, quæ ab Obstructione fit; quia in hoc casu motus contrarius ingestorum, potius, quàm intestinorum, est habendus. 44. Non totius Intestinorum ductus, sed illorum tantum, quæ supra sedem Obstructionis sunt, inversionem ponit. ibid.

— ab Hysterica Adfect. in laxis & crudis habitu, vel foetum

grandiorem enixis, Ictero quasi solvitur, subsequente desperatione de recuperanda sanitate. 257. confer. 262. Hic adfectus docet Morbum ex ἀταξία Spirituum ortum. 262.

In Iliaca Passione Cathartica Medicamenta in Emetica transeunt, nec non Enemata. 45. 128. 512.

Imaginationis læsæ per Cardiaca restitutæ Exemplum. 61.

Indicationes Curativæ bonæ, ac certæ, non ex speculatione Naturæ principii corporis, sed ex observatione exquisita φαινομένων Morborum, & eorum quæ ex Juvantibus & Lædentibus sequuntur, tum & Remediorum, atque Medendi Methodi, qua utimur, tandem in se diligenter collatorum, petuntur. 340. Hinc ad Phænomena Naturalia Morborum diligenter advertendo, maximè eliciuntur, & veræ. 3. Adeoque Symptomatum peculiarium perceptione, deprehenduntur. 9. Et quidem ex minutissimis Morbi circumstantiis. 9.

— ex Caussis conjunctis & proximis, quæ solæ à nobis cognosci possunt; non ex remotioribus, quæ inscrutabiles, sunt mutuandæ. 11. Quod demonstratur. 12. confer. 13.

— genuinas plus præstat solertes veros Medicos expiscari, quàm Remediis excogitandis inhærere. 16.

Indigestio illa Morborum Chronicorum quid sit, in corpore ipsam considerando. 315. ad 316. Quod Argumentis stabilitur. 316.

— Humorū Podagræ primaria causa. 523.

Infantes Convulsivi Materiem biliosam viridem, similem isti Hystericarum, ἀνω καὶ κάτω rejiciunt. 262.

Infan-

Infantes Convulsi Corticem Peruvianum quomodo adsumere possint. 190.
 — Evacuantibus vexati quomodo restaurandi. 269.
 — Febre, sive Tertianæ Autumnali, sive Quartana, laborantes, sanguine depuratione sua defuncto, sponte sanantur sæpissimè. 56. Ettenelli de Febre Quartana in cuneis sæpè triumphans jacent. 50.
 — Purgantibus, in Tumore Abdominis, sæpe repetitis, quamplurimi interempti. 269. Hujus Tumoris, & duritiei, medela, per Linimentum. 59.
 — ubi Spasmodis corripiuntur, qui à dentitione non amplius procedere possint, de Variolis, Morbillis, aut Febra Scarlatina, cogitandum. 243. 502.
 — in Variolis multum dormiunt. 245.
 — Confl. quali sustentantur Diæta. 94.
 — Diarrhœa adficiuntur, uti Salivatione Adulti. 83. & 94. Diarrhœa tamen non ita certo ac Salivatio discruciat. 83. Licet certo satis. 94. 503.
 — Discretis erupturis, Epilepticis Paroxysmis ubi adfiuntur, semper Variolas boni moris, & majores, indicantur. 79. ad 80. 502.
 — Sudoribus, ut Adulti, neutiquam vexantur. 80. 502.
 In Infantibus V. S. æquè tuta, & necessaria, aliquando est, atque in Adultis. 122.
 Inflammatio Tonsillarum. vid. Tonsill. Inflamm.
 Inflammatio specialis Variolas consti-

tuit. 86.
 Inflammatio in Variolis, in interstitiis Pustularum, octavo die incipiens, bonum; si cito recedit, malum. 80. 84.
 Infusio Croci Metallorum, in Hydrope, præsentissimum Medicamentum, in iis, qui ægrè purgantur. 337. Ad quam dosin exhibenda & iteranda. ibid. ad 338. confer. 341. Quomodo operetur. 338. Quænam ipsi Purgantia non numquam, & quando, admiscenda. ibid.
 Infusum Corticis Peruviani, cum Vino Rhen. 190. 495. Hujus ℥iv. Corticis in substantia drach. unius virtutem continent. 190.
 — Rad. Serpent. Virgin. contra Tertianas, cum Vino albo. 495.
 Ingravidatio sæpè habetur, quod nil nisi vel Carneæ excrescentiæ in Abdomine, vel Flatus distendentes, præcipuè in viduis, vel sero nubentibus, sunt. 334. ad 335.
 Injections in Gonorrhœa virul. præsertim acres, ab Auctore non commendantur. 210.
 Inquietudo, in Variolis Discretis, & Vigiliæ, Phrenitidem minitant. 92. Paregorica ibi indicantur, & juvant. ibid.
 Infania ex Lochiorum suppressione, ab Hysterica Adf. in Puerperis teneris, nimis cito surgentibus. 279.
 Intercurrentes Febres. vid. Febres Intercurrentes.
 — Morbi Acuti. videantur Morbi Sporadici.
 Interstitia Pustularum, in Variolis Discretis, die octavo, inflammantur, & colorem Rosarum Damascen. æmulum exhibent; si è contra albescent, malum. 81. 84. confer. 147. 502.
 LIII Intu-

Intumescencia *Faciei & Manuum in Variolis, frigore nimio decedit.* 147.

— *Faciei ac Manuum in Var. nigris pessim.* 1674. *itidem salutaris,* 148.

Inunctio in *Lue Venerea ad Salvationem excitandam, ex quibus & quomodo, at quamdiu, fieri debeat.* 212. 214.

Julapia refrigerantia *Salivationem in Febre Variolosa inferunt.* 99.

Julapium in *Apoplexia.* 507. *Cardiacum.* 488. *Roborans in Choreia Sancti Viti.* 362. 506. *In Dysenteria, Cardiacum.* 112. *In Febre hiemali.* 349. *In Febre Tertian. dupl. corroborans.* 55. *In Febre nova Epidem. unum & alterum.* 358. *Ex Cortice Peruv. in Febre nova Epid. pro Infantibus.* 366. *Ex Cortice Peruviano pro Infatibus in Febr. Intermitt.* 305. *Diaphoreticum in Pestilentiali Febre* 75. *In Febre Contin. Variolos.* 101. *In Hæmorrhagia Narium quale debeat esse.* 178. *In Hysterica Adfect.* 270. *Cardiacum in languore Febrili.* 36. *Ad Lochia suppressa ex Hysterica Adf.* 280. *Adstringens in Mensium Fluxu immodico.* 282. *In Mictu cruento.* 253. *Adstringens in Mictu sanguineo in Variol. Confl.* 379. *Perlatum.* 488. *In Pleuritide.* 165. *In Pruritu ferino.* 175. *In Rheumatismo refrigerans & incrassans.* 171.

Juniores ætate *Febrem Quartan. quomodo ferant.* 50.

Juscula Avenacea *omnibus antepont* Auctor. 38.

— & *Hordeacea in Febr. Contin.* 37. 38.

— *in Variolis Confl.* 250.

— *farinosa non carnea in Morbillis conducunt.* 121. *In Morbill. Anom.*

An 1674. *commendanda.* 144. *In Rheumatismo proponuntur, carnea rejiciuntur.* 171.

Juscula in *Dysenteria, ex Ovinis car-nibus.* 112.

— *In Febr. Tert. duplici qualia exhibenda.* 55.

Jusculum in *Cholera Morbo.* 107.

— *Avenaceum in Podagra non regulari tempore Paroxysmi commendatur.* 325.

— *in Podagra, idem ferè præstat, ac Lactis solius usus.* 319.

Juvenes *Athletico habitu, & Sanguinei, in Febribus, illico Venæsectione, ne periclitentur, indigent.* 31.

— *diuturno morbo confecti, Pueri, Senes, Venæ sectionem in Febribus vetant.* 31. *Et quare.* ibid.

— *Hydropem sibi, in Febribus Autumn. usu nimio, & inconsulto, Catharticorum, accersere possunt.* 59.

— *Podagra genuina non adficiuntur; licet qui ex Podagricis nati, illa ætate aliquid præsentiant.* 308.

K.

D. **K** Endrinck Auctori amicissimus. 284.

L.

L Ac Cerevisiatum, *vid.* Zythogala. — *crudum tepesactum, in Dysenteria quando exhibendum.* 114.

Lachrymæ ex *Hysterica Adf. sine ulla sæpe causa.* 259. *Etiam in Viris.* 264.

Lactea Diæta in *Hysterica Adf. quando usurpanda, in temperamento bilioso & tenui; & ubi Narcotica sæpius*

pius repetita ; ubi recidiva fit Colicæ Hyſt. non amplius juvant. 273. In quibusnam non conducant. 274. In Podagra. 319. Qua ratione magis obeſt quàm prodeſt. ibid.
Lactis Natura & Proprietates , reſpectu Nutritionis & inſtaurationis. 274.
Lactis ſerum. vid. Serum Lactis.
Laudanum nimis repetitum Diſtiones vitiat , & Functiones naturales debilitat. 277. Ubi frequentius exhibetur , intra ſingulas doſes , tantum ſpatii interjiciendum , ut quid prior præſtiterit , ante noſcamus , quàm aliam repetamus. 277. Ejus Uſus non immediatè Nervis nocet. ibidem.
— ad Corticis Peruviani vim purgativam ſiſtendam. 189. In Infantibus. 190. Dyſenteriam ex Torminibus ventris , in Febre nova Epid. obortam celerrimè , & certiffimè , ſiſtit. 364. In Dyſenteriis Epid. prius Evacuationes inſtituendæ. 365. In Hypercatharſi , à nimia purgatione , certiffimum eſt Remedium. 336. In Hyſtericæ Adf. Paroxyſmo , ubi dolor urget , quam cum circumſpectione exhibendum ; & an ipſi Evacuationes præmittendæ vel non , & quando, 276. ad 277. confer. ib. 492. Ubi Vomitus enormis , illico exhibendum , pro ratione Symptomatis. 277. Exhibutum ſemel , continuandum in ejus uſu , donec Symptoma debellatum ; ſed interim Evacuantiæ nulla adhibenda , ne motu excitato Symptomata revocentur. ibid. In Nephritido Paroxyſmo poſt V. S. & Enema. 446. In Podagra inveterata , ſi dolor intolerabilis. 329. In Podagræ inveteratæ Paroxyſmo , ubi Mortis metus ex reſeſſu materiæ. 327. Podagræ Paroxyſmum à Purgantibus oboriturum reſeſſum : Quod Auctori in mentem nondum venerat , dum Tract. de Podagra ſcripſit. 444. Ad Vomitum compeſcendum in Corticis Peruviani uſu. 190.
Laudani liquidi Auctoris deſcriptio. 113. Quare aliis formis ſit præferenda. ibid. Hujus guttæ xvj. idem valent ac Syrupi de Meconio 3j. 248.
— In Infantibus , doſis. 243.
Laudanum liquidum , ad Diarrhœam in Salivatione Mercuriali. 213. In Variolis ad Epileptic. adfectus Infantium. 243.
Laudano liquido Auctor tandem anteponit Syrupum de Meconio , in Variolis. 245. Laudanum liquidum tamen propinandum , ſi Syrupi frequentior uſus naſeam creaverit. 248.
Laudanum ſolidum Londinèſe , quare anteponatur Laudano liquido , & Syrupo de Meconio. 379. Illius doſis. ibid.
Leſti calor non prodeſt in Uſu Corticis Peruviani pro fuganda Febre. 332.
— Febres Intermittentes in Continuarum ſpeciem tranſmutare valet. 186. 190. Et Corticis Peruviani ſalutarem effectum turbat. 190.
— nimius in Febre Eryſipelatoſa rejicitur. 175.
— quomodo ſanguinem exagitet , & in caput mittat. 359. ad 360.
— in Variolis Morbum ferociorem reddit. 243.
Leſto in Angina quotidie abſtinere qua-

re

re debeat æger. 177. In Comate Febrili abstinendum, vel cum vestibis incumbendum. 360. In Hæmorrhagia Narium, quotidie per horas aliquot abstinendum. 178.

Lectio Defixi ægri, Febris continuis laborantes, post Purgationem adsumtam, non amplius detineantur. 38. Ex eo surgendum quotidie in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. & si debilitas vetat, vestibis indutis, ei incumbendum, capite elato. 139. Si nimis tamen abstineant, præsertim in declinatione Morbi, quid fiat. ibid. Hinc caveant, ne nimis pro una vice surgant. ibid. In Febre seu Nova Epidem. incarcerandi ægri: Non sine periculo etenim detinentur in eo. 355. confer. 349. ibid. Miliæres eruptiones exinde nascuntur. 356. In Febre Scarlatina perpetim non adfigatur æger. 162. In Febre Variolosa non continendus æger. 101. Licet Sudoribus æger vexetur. ibid. Fæmina illico addicenda simulac Lochia suppressa. 280. In Mictu sanguineo abstinendum. 252. In Morbillis quando & quamdiu æger adfigendus; non tamen præter modum tectus sit. 121.

— in Morbillis An. 1674. addicebantur. 144. Indefinenter adfigi, præsertim æstate, in omnibus Morbis inflammatoriis, per V. S. & Refrigerantibus, curandis, nocuum. 101. In Phrenitide instante, vel jam calefacientibus invitata, in Febre nova Epidemica, abstinendum, vel cum Vestibis decumbendum. 360. In Pleuritide quotidie, pro Viribus, eximendus æger; quod plurimi momenti, quin alias Medicamenta vix proficiant. 166. In Pleuritide, præ-

sertim æstate non continendus æger. 101.

Lectio in Rheumatismo, præsertim æstate, non continendus æger. ibid. Sed aliquot horis de die abstinendum. 171. Abstinendum in Tussi Epid. quotidie ubi Febris &c. adsunt. 152.

— in Variolis primis diebus Lectio non adfigendi ægri. 237. 91. Et illi non addicendus æger ante Eruptionem Pustularum, & priusquam hæ integre sese in conspectum dederint. 233. 243. Lectio ante diem quartum pertinaciter addicere ægrum, æquè malum, ac intempestive Cardiaca ingerere. 90. Junioribus præsertim, nimis cito illi adfixis, Symptomata letalia, ut Mictus Sanguineus, Maculæ purpureæ, oboriuntur. ibid. Sed eo primis diebus abstinere Maculas purpureas & Mictum sanguineum, præcavet. 241. confer. 90.

— in Variolarum initio, quibusnam Symptomatibus præsertim abstinere cogatur æger. 243. ad 244. Quid tunc agendum. 244.

— in Variolis abstinendo primis diebus, Eruptio, negari nequit, utcumque impeditur, quæ tamen sufflaminatio, & Symptomata inde sequentia, tutius feruntur, quàm mala, ex Pustularum & inde subsequentis puris abundantia obortura. 238. confer. 239. Lectio in Variolis adfigere ægros Incautionibus necesse videbatur ideo, quia sudores, ipsi proclives, inde plus manantes, Febrilem æstum levabant; quod tamen ipsum letalitatis sæpe causa fuit. 239. ad 240.

— in Variolis, post V. S. ægrum committere pessimum. 238.

Lectio

Lecto in Variolis quo die addicendus æger. 90. 160. 233. 243. 505. In Variolis, initio, etiam ante Eruptionem, quandoque addicendus æger. 242. Infantes primis diebus tutius committuntur, ubi Convuls. præcedunt; quia, post eas raro multum confluunt Variolæ. 243.

—— commissi qua ratione ibi se gerere debeant, respectu motus vel quietis, copię stragulorum, atque sudoris. 250. 505.

— In Variolis Anomalis Discretis, quandonam addicendus. 127. Quare addicebatur. 146. Lecto quandonam adjudicandus in Variol. Anom. nigr. pessimis. 148.

— in Variolis Confl. primis diebus, non adfigendi ægri. 237. 238. 239. 240. 241. Et ubi, initio, eas Confluentes fore prævidemus, non nisi nocturno tempore committendus æger; & quare. 244. Atque, ut minori copia prodeant, & coeant, non nisi Sexto die ab invasione, ægrum addicendum, quomodo Natura digito monstret. 235. 376. Nec abstinere die sexto ægri amplius valent. 251. A die sexto in eo se contineat, usque ad decimum septimum. 505. Infantes in Cunis nunc jaceant, nunc istinc auferantur. 95.

—— æger adjudicandus, tam ad promovendum manuum & faciei Tumorem, quam Pustularum elevationem &c. sed modicè tegatur, & corpus hinc inde transferat, ad Sudores vitandos, præsertim exeunte morbo, adpetente jam Febre Maturationis, 93. confer. 505.

— in Variolis Discretis oborituris,

an primis diebus abstineant vel non, idem erit. 240.

è Lecto surrectionem quænam contra indicant. 243. ad 244.

Lectuli, initio in Variolis, nimius usus quomodo Morbum exacuat, & Pustularum numerum adaugeat. 91. 236.

Lectulus in Podagræ inveteratæ Paroxysmo Exercitii defectum aliquatenus supplet. 327. Quandonam, Exercitio dimisso, æger in eo fovendus, adhibita tenui Diætâ. 326. ad 327. Quandonam verò ipse ille Decubitus enecat. 327.

Lectum Podagrici hyeme mature petant. 322. Hoc enim, bruma præsertim, Solis vicem gerit. ibid.

—— Puerperis tenerioribus quodnam emolumentum adferat. 279. ad 280.

Leprosus Morbus est ex iis, qui olim existere, jam occiderunt, vel ætate confecti exolevere, & raro comparent. 150. Apud Medicos depingitur, ac si esset Lues Venerea, respectu crustularum latiorum partes occupantium. 207.

Lienis regio Infantum, in Febr. Autumna. intumescens Febris fugam prænunciat. 60. Intumescentiæ hujus descriptio. ibid.

Linctus in Febre Hyemali. 349. In Pleuritide essentiali. 165. 498. In Tussi. 526. Incrassans. 488. Ad Tussim in Morbillis. 121.

Lingua nigra & sicca in Febr. Contin. 1661. &c. 28. In Febre hyemali alba. 348. Arida, si malè tractetur. 349. In Febre nova hyemali, quomodo se habeat. 356. In Febre Variolosa qualis. 98. & 108. In Febre Variolosa à Regimine calido quantum mutata. 102. In Variolis

- Regularibus incipientibus similis ac in Febre Variolosa. 99. sed vide 98.
- Linimenta in Hydrope, Abdomini illinita ad discutiendum, nec obsunt, nec profunt. 346.
- Linimentum in Pleuritide ad latus inungendum, superimponendo Brassicæ folium. 165. 166. 498. In Pruritu ferino. 175. 500. In Rachitide. 59. 521. In Tumoribus Abdominis Infantium, ex Rachitide vera, vel ex Scrophulis. 269. Hoc etiam Axillis adfricandum. ibid. Ad Ulcus Glandis, vel Præputii, φύμωσιν creans. 211. 518.
- Linteamina Lecti, pro Phthisicis Equitantibus, calefacta esse debent. 275.
- Linum crudum in Podagra ad partem adfectam leniter ustulandam, idem præstabit ac Moxa. 329.
- Liquor in Febre Erysipelatosa parti læsæ adplicandus. 175.
- niger in Variolis Confluent. loco Flavi humoris, si sanguis exæstuet effluit. 245.
- Liquores generosi in Hydrope, modo non sint Spiritus destillati, Morbum incipientem sæpe soli curarunt, præsertim si Aromaticis imprægnati fuerint. 344. 516. Liquores refrigerantes & tenues, licet ægris ob sitim grati, quare non concedendi. 344. Et si eorum usui indulgendum sit, parce iis utendum. ibid.
- Spirituosi in Tussi Epid. 1675. vitandi, 151. 154.
- in Variolis Anom. temperantes, & Salivationem promoventes. 125. 127.
- Lochia supprimuntur per Hystericam Adfect. in Puerperis tenerioribus

- excitatum, quod nimis citò, è lecto surgant. 279. Suppressa per Hystericam Adf. dirissima Symptomata, cum magno vitæ periculo, inducunt. ibid. Quomodo occurrendum. 279. ad 281. confer. 515. Quibus Indicationibus tum satisfaciendum. 280. Medicamento fortiora non usurpanda, nec in mitiorum usu perseverandum. ibid. Ubi Emplastro Emmenagogis, Paregoricis, Enemate, adplicatis, non redeunt, nihil amplius agendum; sed tempori res committat prudens Medicus. 280. ad 281.
- Lochiorum fluxus nimius quomodo sistendus. 515.
- Lock (Johannem) Elogiis quibusnam dignum censuit Auctor. 5.
- Lucianus in Τετραποδάρχεια Podagræ Personam introducit eos adloquentem, qui Arcana habere jactant. 330. Tum & eos, qui cum eo Morbo diu conflixere. 331.
- Lues Venerea, ex India Occidentali, An. 1493. primum in Europam adpulsa, antea cognita non erat. 204. Endemius Morbus Americanis putatur: sed Auctor potius è regione aliqua Nigritarum Guineæ conterminorum ortum putat; quia Morbus illis populis, Luis nostræ simillimus, & fortem idem, Yavvs dictus, Endemius est. 204. Hinc Hispani in America videntur hanc contraxisse ex Africanis ibi delatis. ibid. 205.
- non ea celeritate ac ante grassatur; quod si foret extincta brevi esset Gens humana, vel in Nosocomiis langueret. ibid. Sed instar Vegetabilis transplantatæ, Europæo solo non lætata, languet indies. ibid.
- in initio Symptomatis quibusnam

busnam prodierit. ibid. Gonorrhœæ virulentæ specie, ulcusculis in pu- dendis aliquando concomitantibus, à centum retro annis, se primum of- tendit; per quam, ni virus probè ejiciat, sanguinem inficit. ibi- dem.

Lues Venerea propagatur vel per ge- nerationem: vel per Contactum, quod aut lactatione, aut concubitu in eodem lecto, præsertim in Infan- tibus, rarè in Adultis; tum coitu, fit. ibid.

—— oritur sæpe à Gonorrhœa vi- rul. diuturniore; vel à Materia vi- rul. adstringentibus intempestivis co- ercita. 207. 211. Facile illos ægros adoritur, quorum corpora, ubi Go- norrh. laborant, Catharticis fortius obsistunt. 209.

—— Crustulas & Porrigines in va- riis partibus, sed flavescentes, & ali- quando latiores, uti Lepra describi- tur, habet. 207. Et quo majori copia adsunt, eo dolores in corpore mino- res. ibid. 518.

—— Dolores, in initio, quos- nam, ejus præsentiam designantes, habeat. 206. 207. Dolores, pro- gressu temporis, quales habeat. ibid. 518.

—— Exostoses, excrecentiis in ti- biis Equorum similes, habent. 207. 518. Ulcera Phagedenica, tempo- ris progressu, quænam, & ubi, ha- beat. 207. 518.

—— Symptomata quænam in sum- mo gradu habeat. 207. 518.

—— cujus Naturæ, quam essen- tialem vocant, sit, ignorat Auctor. 207. Videtur inflammationis parti-

ceps. ibid.

Lues Venerea quomodo curanda veniat, non nulli indicare æquum non æsti- mant. 204. Auctor contrariæ est sen- tentiæ. ibid.

—— Vacuantibus curari vult; qua- lem quoque vim possident, quæ huic curandæ primaria. 207. ad 208. Et ut à Gonorrhœa adhuc longè distat, sic Evacuatio quâ hæc ejicitur differ- re debet. 208.

—— per Salivationem ab Hydrar- gyro tantum exstirpari posse, ubi confirmata, putat Auctor. 211. Hæc autem quomodo instituatur. 212. ad 217. 518. ad 519. Si Gonorrhœam comitem habet, prius Salivatione tollenda, Lues, tumque Gonorrhœa faciliùs curatur. 215.

—— Specificum nullum habet Re- medium, cujus ope sine evacuatio- ne curetur. 208. Hincque sudori- fera quælibet æque valent ac Ligna illa exsiccantia: Et si aliud Medica- mentum daretur, quod Salivatio- nem moveret, pariter ac Mercuri- us ad sanandam Luem valeret. 207. 208.

—— quare in Gallia faciliùs sanetur, quàm in Anglia. 216.

—— non sanatur Mercurii aut Sar- saparillæ virtute specifica, sed vi- evacuandi. 68. ad 69. & 207.

—— Recidivam unde habeat. 213.

Lumbago Rheumatica Rheumatismi species est, licet vulgo non credatur. 170. Describitur. ibid. Ejus Cura- tio, eadem ac Rheumatismi. 171. &c.

—— Nephriticum Paroxysmum

ment-

mentitur, excepta vomitione.

170. Ejus dolor imponit Medico tamquam Sabulum vel calculus adesset. ibid.

Lumbago causam materiam Rheumatismi inflammatoriam; eas solas partes urentem, adgnoscat. 170. ad 171.

Luxus Animo & Corpori quantum lædat. 320.

M.

Macula Gonorrhœæ virul. initio, vid. Pustula.

Maculæ in Febre Scarlatina, quales & ut à Morbillis differant. 162.

— purpureæ, unde. 370.

— Petechiæ, tum Virium subita prostratio, signa habentur Malignitatis, quæ Phænomena solvuntur ab Auctore. 370. ad 371.

— Febrium augentur Calefacientibus, & contra. 155.

— In Febre nova, Hyemali, à Calefacientibus. 359. 356.

— In Febre Scarlatina, quando. 237. ad 238. 241.

— In Febre Variolosa, Ptyalismo disparent. 103.

— In Morbillis quando. 237. ad 238. 241.

— In Morbillis V. S. & refrigerantibus sublata. 123.

— Pestis sub adventu. 370. ad 371.

— In Peste præsentanei interitus nuntii, raro sine Febre contingunt. 65.

— In Peste vera, Bubonibus retrocedentibus succedentes, certissimi mortis indices. 69.

— In Peste ob V. S. non satis ira-

tam, cur erumpant. 74.

Maculæ in Variolis, interspersæ Pustulæ, Mortis prænuncia, æque ac in Peste. 85. 234. 378. Confluentes ut plurimum comitantur. 234.

— In Variolis Confl. ubi Mictus sanguinis vel Sputum sanguineum, adesse solent. 378. Aliquando, vix adhuc adparentibus, vel paucis modo Variolis, comparent, & præmaturam Mortem accersunt. 234. In Variol. Confl. An. 1681. Eruptionem sæpe præveniebant. 234.

— & Mict. Sang. in Variolis unde. 237. ad 238. 370. ad 371. 378. Causa harum vel Constitutio aeris favens. 85. 234. Vel à Lecti sæpe calore, præsertim in junioribus. 90. Vel ex Regimine calido. 97. 234. Tum ex Sanguine inflammato. 370. In Variolis à Regimine calido, præsertim æstate, & in Juvenibus. 237. Quomodo fiat. 237. In Variolis An. 1681. ex Siccitate Anni inaudita. 234. Avertuntur V. S. tempestiva; Vel Regimine temperato. 97. 241. 371.

— & Mictus Sanguineus, Regimine temperato, non curantur amplius, ubi jam adsunt. 237.

Magnitudo Morbi, in Variolis Confluentibus, pro quantitate, & more, Variolarum, quæ Faciem, non quæ reliquum corpus, obsident, æstimari debet. 82. 503.

Malignitas in Morbis, quid. 154. ad 156. confer. 370. In Epidemicis plerisque satis conspicua, & cum Veteribus tum etiam Neotericis notata, quomodo ab Auctore intelligatur. 154. ad 156. Hujus quænam signa

- signa haberi soleant. 370. ad 371.*
- Malignitas Morbi non in omni specie per Sudores eliminatur, licet in Peste propter subtilitatem partium fieri queat; nam in Morbis ubi sunt minus subtiles, & crassioribus inviscatæ, Diaphoreticis adgravantur mali. 154. Quælibet in Morbis, Evacuatione eadem, qua Morbus ipse Epidemicus, cui inhæret, tollitur; sive id fiat per Sudores post concoctionem, ut in Autumn. Intermitt. vel Continuis; sive per alias vias ut in Variolis per Abscessus; sive per Artis præsidium Evacuaciones fiant. 155. ad 156.
- Morborum in quibusnam partibus, quæ in propriam indolem, illas quæ obsistunt inflectunt & adsimilant, consistat. 154.
- aliquando plus à Therapeia perperam administrata, quàm à venenosa morbi indole, proficiscitur. 38. ad 39. 63. confer. 349. Hujus rei ratio. 63.
- per Sudorifica, aliaque calida Medicamenta, non numquam augeatur. 154. 370. Et sæpe contemperantibus edomatur. ibid.
- Malignitatis notio, vel verbum, ab hominibus inventum, ipsis, Pyrii pulveris inventionem, letalius fuit. 370.
- præsentiam Medici petunt vel ex Maculis purpureis & Petechiis, vel ex Virium prostratione, ubi Febris Symptomata non vehementiora. 370. & 371.
- Malthus, Pharmacopola, Rheumatismo laborans, Sero Lactis curatur. 199.
- Mane corpus magis firmum & robustum cur sit. 322.
- Mania communis. 61. 523. In Vegetis hominibus oritur. 61. Causa ejus nimis exaltata & vivida sanguinis crasis. ibid. 523. Curatio hujus diversa longe ab illa alterius speciei à debilitate. 61. Quomodo instituenda. 61. ad 62. Absolvitur α. Evacuantes, ut humores à capite derivarentur. 61. ad 62. 523. ad 524. Sed β. Quæ Cerebrum ac Spiritus roborant non omittenda. 61. Hinc Roborantibus utendum. 62.
- Mania peculiaris ac sui generis, à debilitate, post Febres Intermittentes, Quartan. præsertim ex perversa medela, Evacuationibus nempe, nimis diu protractas, aliquando nascitur, in Stultitiam non numquam degenerans. 49. 60. 523. Hujus apud Auctores nulla mentio. 60.
- Ejus à Mania communi differentia respectu causæ planè opposita. 61.
- Evacuaciones, ut V. S. & Catharsin, uti alia Amentia species, non fert. ibid. Verum ab illis vires sibi acquirit. 60. Imo ex solo Enemate è Lacte Saccharato fere sanata recrudescit. ibid.
- Ejus curandæ Modus. 523. ad 524. & 61. Metus hic à Febre, ob Regimen calidum, vanus. ibid. Quomodo aliquando pro ratione Virium incrementi recedat. 84.
- Mania particularis altera, debilitate, Febribus non prægressis, ex frigido, & infirmiori temperamento. ibid. Curatur eadem Methodo ac altera particularis species. ibid. Exemplum in Gravida. ibid.
- Manna quid sit. 443. Lithonriptica vi
Mmmmm quare

- quare prodita existimetur ab Auctore. ib. In Calculo purgans lithonripticon; in Podagricis tamen non innocuum, nisi insuper Paregoricum adsumatur. ibid. 444.
- Manna quomodo adsumta in Mictu Sanguineo à Calculo, ab Auctore. 443. ad 444.
- in Aquis Mineral. Catharticis adsumta, in Calculosis, quomodo noceat. 446. Cum Sero lactis & Succo Limonum, in Calculo, usurpatur ab Auctore, cum levamine. 443. Et ad menses singula hebdomade iteratur; dein bis in septimana adsumitur. ibid.
- Manus, in Variolis Confluentibus intumescere solent, cum Faciei tumor & Salivatio cessant. 83.
- Mapletoft Med. D. Auctoris in medendo socius. 149.
- Mares Hypochondriacæ Adfectioni minus obnoxii sunt quàm Fœminæ. 276. Ratio hujus redditur. 261.
- Martialia vid. Chalybeata seu Chalybs.
- Materia Febrilis in Intermittentibus quando adgregetur. 188.
- excreta, post febrilem commotionem, vitiosa esse potest, licet Sanguis antea bonus. 30. Expellitur quoque, quia Natura ejus consortium ferre amplius non potest. ibidem.
- Materiæ Febrilis concoctionem promoveri quid, re ipsa, sit. 35.
- concoctæ signa post dies tredecim vel quatuordecim adparent. 127.
- Materia Medica cur adeo immensa. 8.
- Morbi in Podagra irregulari, in Paroxysmorum intervallis, numquam perfectè dissipatur. 305.
- Materies viridis Bili porraceæ similis, in Hysterica Adfect. sæpe rejicitur. 257. 258. 262. 263. Et licet Purgantibus fuerint deteresa Intestina, tamen Paroxysmo ingruente, talis subsequitur materies: imo quo frequentius hæc fuerint exhibita, uti & Vomitoria, eo uberior istius materiæ seges. 262.
- Maturation Variolarum Discretarum Regular. octavo die incipit, & quibusnam cum Symptomatibus. 80.
- Maturationis Febris seu Secundaria vel & Putrida dicta, in Variolis Confluent. 93. 125. 374.
- Meatus cæci, ex Abdominis cavitate in Intestina, dantur. 338.
- Medica Ars, vid. Ars Medica, vel Medicina.
- Medica Praxis si scribendi vel docendi ordinem respicias, ex Hypothesibus orta licet videatur; nihilo minus ipsæ Hypotheses, si modò Regulæ certæ ac solidæ fuerint, Praxi originem debent; quod Exemplo confirmatur. 340.
- Medicamenta præstantissima à Natura præcipuas vires accipiunt, quum ipsa illas suo igne elaboraret, atque evehat; quod docent Cortex Peruvianus, & Opium. 267. ad 268.
- Specifica quænam intelligenda juxta Auctorem. 13. ad 15. Quo simpliciora eo meliora. 313. Specifica nulla, uno Cortice Peruviano excepto, cognita. 14.
- ad Morborum magis insignium curationem, in patrio cujuscunque solo, data, verosimile videtur. 15.
- ex Plantis desumpta, reliquis, uti ex Animalibus nimis similibus, vel ex Mineralibus nimis distantibus, palmam præripiunt. ibid. Ex alia Tribu

Tribu desumta prodesse tamen possunt. ibid.

Medicamenta simplicia adeo tradit Auctor, ut ad Materiam Medicam vix possint referri; & ab Hippocratis Methodo in eo non deflectit. 16.

— *simpliciora à levioribus tantum ingeniis vili penduntur. 179.*

— *vilissima quoque habita Hominibus, ab Orci faucibus liberandis, quomodo inservire queant, si Medici solertia dirigantur, Exemplo comprobatur. ibid.*

— *optima Chemicorum nimis officiosa sedulitate enervantur sæpe. 267.*

— *calidiora, in Febris Continuis, quando concedenda. 35.*

— *Concoctionem Materie febrilis promoventia, Medicis dicta, non intelligit Sydenham. ibid.*

— *Refrigerantia & Clysteres in causa aliquando sunt, quo minus Despumatio Februm spatium 336. hor. h. e. 14. dierum, persolvatur, sed in longum evagetur. 52.*

— *Febrim Continuum, ad diem decim. quart. soluturam, in vigesimum diem & ultro, protrahunt. 36. 39.*

— *Hysterica roborantia. 127. Hysterica foetida quænam dicantur. 267. 276. Dum roborantia adhibentur interim exhibenda. 270.*

— *Quædam sunt Naturalia ex Plantis & Animalibus; quædam Artificialia, ut præsertim spiritus færentes, ex Animalium partibus, qui omnes Creaturæ ignis sunt. 276. Medicamenta Hysterica, ubi Fæminæ ab iis nimis abhorrent, sunt omitenda. 271. Diutius agunt si forma solida, quàm liquida deglutiuntur. 269. ad 270.*

Medicamenta roborantia in Hydrope loco Purgantium, quando necessaria. 343.

Medicamenta in Morbis Chronicis, Digestiva, sunt tam Pharmaca, quàm victus ratio, Exercitatio, & similia. 313. 316. 318. Quæcumque fuerint, plus præstant, quàm quis existimare possit. 317.

— *eadem sunt quæ in Podagra. 316.*

— *in Chronicis plerisque, æquè ac in Podagra, ex calefacientibus quæ amarescunt, vel linguam leviter feriunt, quare conducant. 314. confert. 316.*

— *Pharmaca, strictè dicta, sola Morbos Chronicos, & Podagram non curant, sed victus ratio concurrere debet. 318.*

Medicamenta in Podagra Digestiva quænam. 313. &c. Qua Cautione, ne fomes Morbi irritetur, in eorum usu procedendum. ibid. In Paroxysmorum intervallis, & quàm fieri potest longissimè ab insecuturo, in usum revocanda. 318. Constantè & assiduè usurpanda, quia corporis habitus omnis alio traducendus est, atque homo integer quasi nova incude refingendus, ut Coctionum robur & firmitudo partium pedetentim reducatur. 317.

— *externa in Podagra an dentur. 328. ad 329. Aliquando nocent, prosunt numquam. 329. Si Refrigerantia & repellentia fuerint, periculosa. ibid. Ubi experiunda, sub initio Paroxysmi sunt tentanda, non sub declinatione ejus, ne fucus nobis fiat. 328.*

Medicamentum externum in Podagræ
M m m m 2 Pa-

- Paroxysmo quod solum bonum fuit, quale.* 329.
- Medicamentum ex pluribus Simplicibus mistis constans, quandonam potentius operetur.* 313.
- Medici in Morbis depellendis non satis lente festinant.* 141.
- Medici Fama in Variolis tractandis, ubi de caloris gradu Expulsionis tempore adplicando agitur, in angusto versatur, ob vulgi non modo, sed & ipsius artis Professorum, calumniam.* 89.
- Medicina jam multis seculis ante Æsculapium Ægyptium, qui mille annis Græcum antecessit, quare necessario excoli debuerit; licet ejus natales, uti & aliarum Artium, indigitari nequeant.* 6. *Quam antiqua, haud minus ac Xili fons investigatur;* cū ab initio exstiterit, jam diligentius, jam frigidius exculta. *ib.* *Varie exculta etiam fuit, pro vario tempore & varia regione; & dein pluribus mediis ampliata.* *ibid.*
- *quomodo ulterius promoveri queat, Auctor Tract. de Morbis Acut. post longas Meditationes, ac fidam plurimorum Annor. Observationem, in medium proferre decrevit.* *ibid.* *Incrementum, duobus mediis, nempe, Historia Morborum graphica & naturali, tum Methodo curandi, seu Praxi, stabili ac consummata, capere potest.* *ibid.* *confer. II. His verò tertium accedit, Specificorum Remediorum scilicet inventio.* 13. *Primum traditur.* 7. *ad 10. Alterum traditur.* *ibid.* *ad 13.*
- *Chemiæ utilia Medicamenta non nulla, debet; sed errant, qui Medicinam nulla re magis, quam Chemicorum inventis, promoveri posse,* volunt. 339. *ad 340.* *Non deficit in eo, quod indigeamus mediis, Indicationibus satisfacere aptis; sed quòd Indicationes quibus satisfaciendum est, ignoremus: Hocque non nisi ab exercitato, pari certitudine noscitur.* 307. *Quomodo verò hæc cognitio acquirenda.* 340.
- Medicina cur uti reliquæ Artes incrementa sumere potest, sine priscorum Hominum injuria, quidquid dicant illi, qui prætextu reverentiæ pro Antiquioribus, ab iis discedere nolunt.* 347. *Duplici hominum genere in progressu suo impeditur; primum est eorum, qui nullum symbolum ad artem suam conferentes, aliis, qui vel minimum conferre videntur, succensent, ac si ab Antiquioribus, specie reverentiæ, discedere non auderent; Alterum est eorum, qui Speculationes, ad Morborum curationem nihil facientes, molestè ingerunt, & sic ignibus fatuis Medicos in errores ducunt, potius quàm ipsis viam præmonstrant.* 347. *ad 348.*
- *ad Experientiæ leges & normam nisi exerceatur, exsulanda potius.* 196. *Cum laude non exercetur, si ad subtiliores in Praxi minutias non attenditur.* 254. *Non rectius quàm ab ipsius usu addiscitur.* 3.
- *accessionem Practicam quantulamcumque longè pluris facere debet, quàm inanem subtilium speculationum pompam.* 77.
- *ubi Methodum quamdam certam, vel levissimi Morbi debellandi prodidit, majoris felicitatis est, quam Tantalii vel Cræsi Thesauros adculasse.* 183.
- *Practica in Indicationibus genuinis expiscandis, non ita in Remediis* exco-

excogitandis , præcipuè stat. 16.
 Medicina in Variolarum genere , ubi
 Exanthemata pauca & discreta, nul-
 lius est momenti. 244.
 Medicinæ Pompa , & dignitas , non
 tam in Formularum elegantia, quàm
 Morborum Curatione cernitur.
 347.
 Medicus & Chirurgus structuræ huma-
 ni corporis probe gnarus quare de-
 beat esse. 338. & 339. Tamen Mor-
 bis inest τὸ Θεῖον quod ex ejus contem-
 platione indagari nequit. 339.
 — curam omnem in expiscanda Mor-
 borum Historia , & adhibendis Re-
 mediis quæ Magistra Experientia
 indicat, debet collocare, rejectis Spe-
 culationum commentis. 187.
 — & Formularum Præscriptor toto
 cælo differunt. 249.
 — peritissimus æquè probus , ubi ali-
 quando nihil aget , & alio tempore
 efficacissima adhibebit Remedia; li-
 cet à vulgo ignaro negligentiae vel
 ignorantiae tum reus habeatur. 158.
 Bonus ac probus ubi fuerit , suo pul-
 chrè defungitur munere , tam in A-
 cutis , quàm Puerperarum Morbis,
 cum , ubi de successu certior non
 fuerit , nihil potius tentat , si æger
 de die in diem pejus modo non habet,
 quàm quod ægrum in geminum dis-
 crimen , cum ex ipso morbo , tum ex
 suo experimento , conjiciat. 281.
 — ad Hystericas Adfect. à Morbis
 essentialibus partium distinguendas,
 sagax , & arte peritus , sit oportet.
 256.
 — in Variolis Discretis nihil habet,
 quod agat , nisi sibi & aliis imponat :
 si verò jactet , tum in Variolis Con-
 fluent. tentet , quantum in Arte va-
 leat , præsertim , in Juvenibus , &

vino potatis. 252. In Variolis inci-
 pientibus , in eo tantum ægro suppe-
 tias ferre potest , ut Pustularum nu-
 merum coerceat , ne confluant.
 235.
 Medicus in Variolis , ubi sanguis edu-
 cendus , vel aura frigidior adplican-
 da , ad conscientiam suam potius ,
 quàm ad incertam famam , se compo-
 nat. 96.
 Meditationes nimiae Podagricis nocent.
 318.
 Melancholia Podagræ , præ ceteris co-
 mes semper adhæret : & profundas
 cogitationes producendo , hinc lædit.
 323.
 Melancholici quo animo sint constituti.
 259. ad 260. 266. Ingenio ceteris
 præstant. 260.
 Membra in Rheumatismo , motu omni,
 cessatis jam doloribus , ad mortem
 usque sæpe privantur , digitorum ar-
 ticulis inversis. 170.
 Menses in Hydropica quinquagenaria,
 easdem diu non passa , quasi flumine
 denuo erumpunt. 342.
 — quo tempore ætatis desinere sole-
 ant. 282.
 Mensium Fluxus immodicus , sæpissimè
 fœminas invadit , paulo ante tem-
 pus , quo Menses omnino cessaturi
 sunt. ibid. In Puerperis , post Par-
 tum plerumque laboriosiore natus ,
 brevi quoque se proripere solet. ibi-
 dem.
 — — Hystericam Adf. , quam
 Vapores vocant , excitare valet.
 ibid. Quid agendum si in Puerpe-
 rio contingat. 315. Quid , si extra
 illud , 282.
 — — in Variolis Anomalis ,
 tempore non solito superveniens ,
 quare periculum inferat. 125. ad 126.

- Et Calefacientibus, Cardiacis, adstringentibus, sæpissimè letalis Morbus factus. ibid. Hinc temperantibus & diluentibus tractandus. 126. ad 127.*
- Mensium Suppressio ea Methodo ac Hysterica Adf. sanatur. 271. ad 272.*
- Mensura Venæ sectionis, in Febribus continuis. 31.*
- Menthæ aqua stillat. in Ileo vero. 45.*
- Mercurius, in Lue Venerea curanda, evacuando forte potius, quàm vispecifica, agit. 68. confer. 14. Vim specificam, ad debellandam Luem Veneream, non majorem habet, quàm scalpellum Chirurgicum ad Pleuritid. sanandam, vide 215. Specificum mediatum in Lue Venerea tantùm dici potest. ibid.*
- dulcis ad salivationem exstimulandam, in Lue Venerea. ibid. Ad Salivationem sustinendam, quando usurpandus. 213.*
- Metastasis Podagricæ materiæ in Pulmonis lobos, ex frigore in Paroxysmo suscepto, aliquando, licet rarò contingit: in quo casu Podagræ nulla ratio habenda, sed Morbus tamquam Peripneumonia curandus. 328.*
- Methodus vera Artis Medicæ tradendæ, vid. Medicina.*
- Methodus medendi vera est, quam recta ratio, non speculationum commentis, sed trito & naturali cogitandi modo innixa, dicat. 348. Et vera ex Historia Morbi sola peti potest. 197. confer. 196.*
- Auctoris ad Morbos curandos fuit, ut diligenter & adcuratè ad Phænomena Morborum Naturalia adverteret, indeque Indicationes Curativas eliceret. 3. Exemplum in*

Observat. circa Febres & Methodo has curandi. ibid.

Methodus Hippocratis medendi, Causarum conjunctarum, & immediatarum, cognitioni superstructa, Artis Medicæ damno, derelinquitur, dum remotioribus Causis speculatores vani incumbunt. 11.

— ab Auctore quæcumque tradita, non cerebri quoddam figmentum, in musæo excogitatum, sed constanti pragmatica stabilita. 16.

— medendi certa, ac consummata, quænam sit. 10. Confirmatam undique, in quovis Morbo, stabilire difficile. 11. Quænam præferenda in Curatione Morborum sit, quomodo dijudicetur. 372. In Morbis Acutis ea ad sanationem maximè confert, quæ Evacuationis modo, quem Natura statuerit, opem fert. 13.

— curandi Febres per V. S. & Purgationem, in Febribus quam plurimarum specierum, plus præstabit, quàm alia quædam Methodus. 369. Præsertim quam illa per Diaphoresin, quæ admodum incerta, ac dubia. 369. ad 370.

— Pestilenciales Febres, ab Auctore reperta post Pestem, adeo salutaris fuit, ut ex suis ægris nullus desideratus fuerit. 76. ad 77.

— diversa ab ea, quam hætenus cum successu usurpaverat Auctor, novæ Febri cuidam dein Pestis est reperit ac adaptari debet. 73.

— Febrem Variolosam præ cæteris optima, Auctori videtur Regimen temperans & refrigerans. 102. Contraria Methodus, licet sæpe resurgant ægri, magnum infert Discrimen & Symptomata auget. 102. Me-

Methodus curandi Variolas, & Historia ipsarum vera, ex Variolis Constitutionis An. 1667. ad 1669. est desumenda, qua Regulares, & in suo genere omnium perfectissimæ, fuerunt. 79.

———— ab Auctore proposita, non ipsius iudicii auctoritati innititur, sed Phænomenis practicis, postquam sedulo fuerit observatum, à quo Regimine mitius aut sævius Variolarum genus producat, superstructa fuit. 240.

———— Auctoris in Variolis Confluentibus tractandis, Symptomata pessima præoccupat, & benignum reddit Morbum. 95.

———— Variolas Discretas tractandi, ab ea Auctoris diversa, quænam Symptomata producat. 95. ad 96.

Methodus Naturæ varia & adcurata, quam ad Morborum generationem adhibet à nemine hætenus pro rei dignitate satis observando est adsecuta. 25.

Miasma Pestiferum vel immediatè, vel mediatè, suscipitur. 64.

Miasmata Epidemicos Morbos producentia, oriuntur, vel à Vaporibus è Terræ visceribus, mutationes quasdam passis, aerem inquinantibus; vel ab Atmosphæræ alteratione propter corporum quorundam cælestium Conjunctionem. 315.

Mictus Sanguineus à Calculo Renibus impacto. 442. 508. In Calculosis curru vehendis per vias, lapidibus stratas, quomodo præcavetur. 445. Ex Calculo Renum post ambulationem subortus. 442. Motu Currus, excitatus. ibid.

———— quomodo tractandus: & quali Diæta in eo utendum. ibid.

&c. confer. 508. Plurima Remedia sine successu adhibet Auctor. 443.

Mictus Sanguineus Mannæ usu curatur in Auctore. ibid. 444.

———— in Febribus plerumque letale. 254. In Febre Scarlatina quando. 237. ad 238. 241.

———— in Morbis Acutis unde, & quid indicat. 252. 253. In Culcitra corio tecta æger dormiat. 252. ad 253.

———— in Morbillis, quando. 237. ad 238. 241.

———— in Variolis Confluentibus æque ac Discretis, quare Adolescentibus, Vegetis, & Vino potatis, contingat. 85. Sub initio Morbi, sæpe nullis, vel paucis hætenus, erumpentibus Pustulis, plerisque adhuc latitantibus, prodit, & ægrum ante plenam Eruptionem è medio tollit. 234. confer. 371. 378.

———— unde. 239. A Lecti sæpe calore, si nimis cito ei adfigantur, præsertim juniores ægri, excitatur. 91. In genere, Regimen quodcumque calidum illum provocat. 236. ad 237. Quomodo hoc fiat. ibid.

———— incurabile plerumque malum, Mortem prænuncians. 97. confer. 85. 234. 237. ad 238. 378.

———— quomodo præveniendus Regimine temperato, ex Sydenhami Methodo. 157. 241. V. S. tempestiva sæpe præcavetur. 91.

———— & Maculæ purpureæ, Regimine temperato non amplius curantur, ubi jam adsunt. 237. Quomodo adhucdum curari possent. 378. ad 379.

Miliares eruptiones, in Febre nova, hiemali, Morbillis non absimiles, nisi quod rubeant magis, & squamulas

- las furfuraceas non relinquunt, à Cardiacis & Læti calore.* 356.
- Millington Medicus Doctissimus unicum Sydenhamo ægrum Variolis nigris infectum visitat. 126.
- Minera Ferri, ignem nondum passa, in Hyster. Adf. & Chlorosi, ipso Ferro an plus præstaret. 267. ad 268.
- Mineralia, in usum Medicum adplicata, Indicationibus potentius, quàm Vegetabilia vel Animalia, quare respondeant. 15. Specificè tamen non medentur. ibid.
- Minutiæ subtiliores in Praxi indagandæ, sine qua Medicina cum laude neutiquam exercetur. 254.
- Mistura Cardiaca in languore Febrili. 36. In Tertian. Autumn. Sudorifera. 55.
- Morbi ab omni ævo cur adfuerint. 6.
- regnant hiscè temporibus quidam, aliquando interituri, & novis cessuri speciebus. 149. Sic & exstiterè olim, qui vel ætate pene confecti exolvere, & rarò comparent; vel occidentes penitus novis cedunt speciebus. ibid.
- species novas, prioribus exstinctis, cur habere possint. 150.
- ad certas species, ubi eorum tradenda Historia, quare revocandi. 7. Complures, sub eodem titulo, citra speciei distinctionem tractati, dissimillima sunt indole. ibid.
- facie sæpe variant, pro vario medicandi processu; adeo ut non nulla Symptomata non tam Morbo sæpe, quàm Medico, debeantur. 8.
- qui certum aliquem typum agnoscunt, ut v. g. Febr. Quartana, sub quo genere comprehendantur. 12.
- Tempestates Anni, nec pauciores,

- sequuntur, occulto quodam Naturæ instinctu; non nulli sunt omnium horarum. 8. Hujusque rei notitia Medico in quibusnam multum prodest. 9.
- Morbi alii Acuti, alii Chronici, duobus principiis sibi invicem contrariis, dantur. 20. ad 21.
- Acuti & Chronici in quibusnam differant. 20. ad 21. 315. ad 316. Quomodo essentialiter differant, & quænam sint specificæ humorum depravationes, quæ, in his ab indigestione tanquam causa generali, in illis à sanguinis inflammatione, tanquam universali causa, pendent, ignoramus; & in extimo Morborum cortice tantum hæremus. 344.
- Morbi Acuti ut plurimum Deum Auctorem habent; Chronici nos ipsos. 242.
- quinam vocentur. 20. 315.
- plus quàm duas tertias Morborum partes comprehendunt. 339.
- vel ab aëris inquinamento, vel à particulari corporum anomalia, gignuntur. 21. Hincque distinguuntur in Epidemicos, & in Intercurrentes seu Sporadicos. 21. 315.
- pro causa externâ quam plurimum, Vestium præmaturam abjectionem, vel refrigerationem post incalescentiam ab Exercitio, habent. 160. Quique tum specie varia, pro Anni Constitutione, vel humorum Dyscrasia, exoriuntur. ibid. confer. 161. Et ab his duabus causis plures, quàm Peste, Gladio, fame, simul sumtis pereunt. 160.
- Morbis Acutis omnibus, & Chronicis plerisque, τὸ Θεῖον inest, quod, ex Contemplatione exactissima corporis humani, indagari nequit. 339.

In Morbis Acutis Medendi ratio non comprobatur ex eo, quod feliciter cedat, (nam Muliercularum temeritate aliquando curantur) sed quod suoapte genio quasi recedat Morbus.

119.

Morbi Chronici quinam vocentur. 21.

315.

— & Acuti in quibusnam differant. 20. ad 21. 315. ad 316. confer. 344.

— non Aëri ita immediate, ac Acuti, suam originem debent, sed Humorum Indigestioni; ad quam causam universalem eandem omnes referri debent. 314. 314. Quæ quomodo concipienda. ib. ad 316. Quodque Argumentis stabilitur. ibid.

— non facile describuntur, quia apud Auctores (Hippocratem & paucos alios si demas) nulla reperiuntur vestigia ad iter faciendum; horumque subsidia potius oberrare faciunt (quoniam Hypotheses tantum, & lascivientis ingenii luxuriæ, sunt) quam quod mentem, in genuina Naturæ Methodo indagantem, dirigant. 203.

— Scorbutum sæpe, quamdiu vel adhuc nascuntur, neque Typum certum cuderunt, vel pro parte fugati, neque omnino debellati sunt, existimantur esse. 172.

— Hyeme potius quam Æstate gignuntur. 316.

— ut curentur, Habitus totius corporis, uti in Podagra, immutari debet; hinc Remedia diu continuanda, & corporis exercitium quotidianum præprimis colendum. 317. & 323.

— & Podagra, Medicamentis solis non curantur, sed Victus ra-

tio concurrere debet. 318. Herbis excalefacientibus cur sanari debeant. 316.

Morbi Epidemici sunt illi Morbi Acuti, qui durante arcana quadam aëris Constitutione, hominum corpora inficiente, gignuntur, & laceffere pergunt, plures adficientes, neque alio ullo tempore invadentes. 21. confer. 64.

— à Causa generaliori, sive externa, ex aëre pendente, h. e. ex aëris occulta quadam diathesi, sive arcana alteratione, non à peculiari Humorum crasi, nisi, quatenus ab aëris Miasmatibus inficiuntur hi, pendent. 21. 22. 25. 26. 64. 117. 315. confer. 159. 160. Causa hæc Productiva, Conditio certa recondita, & inexplicabilis Constitutio, dicitur, quia hanc dispositionem planè ignoramus. 21. 64. 117. 184. Quæ ratione Aer ita inficiatur, ut Effluviis, Morbos hosce Epidemicos, alicujus singularis Constitutionis, producentibus, scâteat. 146. 150. 315. 355.

— varii, quæ de causâ in eandem Constitutionem incidant. 117.

— ab Aëris occultis Qualitatibus licet magis pendeant, quam à manifestis (21. 22. 89. 117. 184.) Tamen pro tempore illi eos talem habent potestatem hæ Manifestæ Qualitates, ut illos intromittant vel excludant, varia tempestate, prout ipsis favent, universali Constitutione interim prorsus eadem manente. 117.

— quidam, quoad Symptomata non nulla, ab aëris quoque manifesta Diathesi pendere solent. 184. Exempla hujus asserti, Morbil-

li: & Cholera An. 1676. tradunt.
184.

Morbi omnes ea maximè tempestate
grassantur, quæ cum eorum indole
magis facit; &, aliena tempestate
adpetente, iis Epidemicis cedunt,
quibus illamagis favet. 233.

— faciem suam planè dissimilem
habent, non tantum respectu Anni
tempestatum, sed & respectu Con-
stitutionum diversorum Annorum,
à quibus pendent, ab invicem dis-
crepantium. 21. Longè plus ab invi-
cem diversitatis ex diversorum An-
norum Constitutione, quam ex va-
riis Anni tempestatibus, habent.
ibid. Externa quadam specie, &
non nullis Symptomatibus, licet in-
cautioribus convenire videantur,
interim, tum ratione Symptoma-
tum, tum medendi modo, discre-
pant, & alienæ sunt indolis. ibid.
Hacce disparitate diversorum ab in-
vicem annorum Constitutiones, à
quibus pendent, referunt. ib. Con-
stitutionem hanc generalem si re-
spicias, adeo diversi reperiuntur
diversis Annis, ut qui jam hac Me-
thodo ab iis, puta Febribus Conti-
nuis, liberantur ægri, aliis Annis
eadem Methodo forte è medio tollan-
tur. ibid. Hinc in initio Constitutio-
nis, aliquando vita primi pericli-
tantur ægri, donec Morbi genium
perspectum habeatur. 22.

— Plures uno eodem Anno gras-
santur; sed Unus eorum prædomi-
nio reliquorum potitur; illis tum
parcius sævientibus, cum hic auge-
tur, & vicissim. 24. Et hujus Vicif-
situdinis aëris temperies, huic illi-
ve favens, in causa est. 24. 117.

Unde in eadem Constitut. hic Mor-
bus aliquando se exserit, alteri lo-
cum cedens, prout aëris sensibilis
qualitates, hoc illo tempore, il-
lud destinavere: Sed Constitutio
universalis eadem manet, sive Epi-
demici, ad illum, qui eo Anno re-
gnat, adtinentes, aëris quadam ma-
nifesta qualitate, promoveantur vel
retardentur, hac illave tempestate.
117. confer. 24. Exempl. in Febre
Stationaria Constit. An. 1669. ad
1672. hæc Julio propter calorem
aëris sævit, & Autumno, Morbo
magno, à quo insignitur Annus, Dy-
senteriae sc. cedit. 117.

Morbi ab invicem ut clavus à clavo
pelluntur. 106. Qui tamen cedunt non
omnino evanescunt, sed rariùs inva-
dunt. 106.

— alii continua quadam serie,
ceu facto circulo, alios an semper
excipiant? an verò omnes indiscrimi-
natim nulloque ordine, pro oc-
cultæ aëris diathesi, mortales inces-
sant? vix unius hominis brevis ætas
perquiret. 21.

— Quo ordine sese excipiant, ut
dignoscatur, quænam Auctori com-
moda videatur Methodus. 26.

— quibus annis varia specie
grassantur, tamen omnes, modo
quo adgrediuntur, atque invadunt,
consentiunt. 25. Nam Morbi ea
tempestate prædominantis, genio
σύνχεροι se accommodant, quotquot
illo Anno invadunt. 24. In generali
verò Causa, singularum specierum
productrice, quamvis quoad Typum
&c. distent, omnes conveniunt. 25.
Nam Constitutio singularum specie-
rum materiam ita effingit, & for-
mat,

mat, ut in pluribus congruant. ibidem.

Morbi Epidemici quilibet suos habent Periodos, Augmentum, Statum, & Declinationem. 106. Sed Morbi diversi, tempore diverso ad statum perveniunt. 23.

— omnes emergentes è Naturæ sinu, subtilioris principii sunt, quàm ubi adolevere: & quare. 110. 136.

— initio atrociora quàm ubi Constitutio adolevit. 110. 123. confer. 106. Exempl. in Peste & Dysenteria. III. ad 112. Et cum ad ἀκμὴν pervenerunt licet plures adficient, tamen Symptomata eorum mitiora sunt, quàm in principio; ut in Dysenteria Constit. 1669. &c. contigit. 112. Ubi jam statum suum transgressi, quoad Symptomatum vehementiam, & ægrorum numerum imminuuntur. 123. confer. 106.

— multo plus quàm unius Medici ætatem, priusquam eorum species, Characteres, medendi ratio singularis, &c. rite percipiantur, exigunt. Et quare. 26.

— à Natura eleganti & subtili artificio in natalibus suis extruuntur, ut patet in Cholera Morbo, qui alio mense quam Augusto, non invadit, licet eadem dentur causæ; ac si in aëre illo mense aliquid, quod specificam hanc alterationem producit, consideret. 108.

— alii sunt Regulares, & ex his Epidemicorum Historia ediscenda est; Alii Anomali nulli Typo adstricti, tam quoad Symptomata, quàm medendi Methodum, & mali moris sunt. 23. Unde illa dispari-

tas. ibid.

Morbi dantur vel Autumnales, vel Vernales: quique alia tempestate subnasci videntur, ad eam tamèn relegantur, quam proximè contingitur. ib. Hinc de ipso Æquinoctio, ubi dicitur, statim ad amussim non intelligendum. ibid. Nam aëris quoddam temperie ita alliciuntur aliquando, ut maturius invadant; & è contra. ibid.

— Autumnales, intra duorum mensium spatium & nomen, & Epidemicorum naturam, omittunt. ibid. Exorti Augusto mense, sæpe intra unius mensis limites concluduntur aliquando, ut Cholera; non nunquam ad Hyemem excurrunt, ut Dysenteria, Quartana, &c. ib. d.

— Vernales quo tempore se ingerant, & cursum absolvant. ibid. Mature h. e. Januario invadentes, circa Æquinoct. Vernum ad statum perveniunt, dein imminuti circa Solstitium æstivum, fere evanescent; ut Morbilli & Tertianæ Vernales, quæ licet seriùs paulo, ut Februario, emergant, tamen circa Solstit. Æstiv. pariter se subducunt. ibid.

— Alii interim Vere orti non nisi sub Æquinoct. Autumn. statum adipiscuntur, nec ante brumale frigus vertuntur in fugam, ut Pests & Variolæ. ibid.

Morbi Epidemici varii Annorum 1661. ad 1685. vid. Constitutionum Genera quinque.

— An. 1677. ab Auctore propter Morbos ipsum eo tempore cruciantes, non describuntur. 185.

Morborum Epidemicorum Historia ex
Nnnn 2 quo-

quonam eorum genere addisci queat.

23.

Morborum Variorum, qui à specificis aëris alterationibus oriuntur, species tradere impossibile. 26. ad 27.

— Observationes aliquot annorum succedentium, quo fine, in humani generis emolumentum, ita tradiderit Auctor. 27.

In Morbor. Epidemicorum generatione Natura quomodo ludat. 79.

Morbi Fientes dicuntur Auctori, qui nullum adhuc certum induerunt Typum. 173.

— ab Humoribus depravatis, ex Spirituum ἀταξία, in Hysterica Adf. diuturna. 266.

— Infantium. 367.

— Inflammatorii plurimi, verno tempore, Lond. Ann. 1665. post hyemem frigidam, & siccum gelu, grassantur. 62.

Morbi Intercurrentes seu Sporadici vocantur, qui non à causa adeo generali, sed ab hac aut illa peculiari sanguinis inflammatione, ex particulari corporum ἀνωμαλία, seu intemperie, producta, oriuntur, plures simul non corripunt ut Epidemici; nullo non tempore, quo Epidemici grassantur, indifferenter invadunt, & Annis fere quibuscumque occurrunt. 21. 22. 315. confer. 159.

160.

— aliquando sunt Essentiales; aliquando Februm Stationariarum Symptomata, sive Adfectus quidam hos Morbos omnino referentes, & Febris Stationariis supervenientes, modo sunt. 160.

— distinguuntur quatenus Essentiales vel Symptomatici, quod Hi talia habeant Symptomata, qualia

Febres Stationariæ, quarum Accidentia sunt, habere solent. 161. α. Illi verò quolibet Anno pari modo adgrediuntur, nec aliquid commune, cum Stationariis istius temporis, habent. β. Symptomata habent perspicua, nec aliis naturæ φαινομένοις obscurata. γ. Suo Invasionis tempore tandem quoque dignoscuntur. 161.

Morbi Essentiales si fuerint, & aliquis eos tamen Symptomata tantum esse voluerit, considerari modo poterunt, ut Symptomata Februm ad quas spectant propriè, & quæ semper ac necessario talia Symptomata producant. ibid. Exempla in Angina & Pleuritide. ibid. Essentiales à peculiari sanguinis inflammatione cum pendere videantur, curari poterunt eundem refrigerando & contemperando, tum materiam morbificam eliminando. ibid.

— Symptomata si fuerint Stationariarum, aliquam Constitutionem spectantium, tum ex his Febris per accidens tantum, & non necessario, producantur. ibid. Symptomatici si fuerint, curantur ista Methodo, qua Febres cujus Symptomata sunt: si enim ad Anni Febris curationem non attendamus, cum ægri discrimine ingenti erramus. 160.

Morbi Intercurrentes ut Pleuritis, Angina, &c. Febrim pro Morbo primario habent: & reliqui Adfectus, à quibus hi Morbi nomen mutuuntur, tamquam Symptomata considerandi, quæ, pro materia Febrili modo criseos, parte in quam materies ruit, variant. 159.

Morbi Historia. vid. Historia Morbi.

— Natura non ex speculatione natu-

ræ principii corporis, sed ex Observatione exquisita Φασιμένων Morborum, & eorum, quæ ex Juvantibus & Lædentibus sequuntur, tum & Remediorum, atque Medendi Methodi, qua utimur, tandem diligenter inter se collatorum. 340.

Morborum causas generales binas putat Auctor; particulas nempe Aëris sanguini peregrinas, ipsique admixtas; tum humorum fermentationes, nec non Putrefactiones, humorum, ultra modum retentorum. 19.

— Curationes non ad Essentialem eorum naturam, sed ad causam ipsorum magis generalem, à nobis diriguntur; curandi Methodum variantes, vel pro indicio Naturæ spontaneo; vel Experientiæ filum insequentes: Et fit hocce, quoniam essentialem Morborum differentiam ignoramus, & communem causam, quæ in Acutis sanguinis inflammatio, in Chronicis indigestio est, tantum cognoscimus, neutiquam specificam humorum depravationem, ex hisce prognatam, percipere idonei. 344.

— Historiæ, eorundem Phænomena continentes, ab Auctoribus ex Hypothesew officina deducuntur, maxima parte. 204.

— Acutorum Historia quare ab uno homine, imo decem, non facile tradatur. 203.

— Phænomena, an à curandi Methodo, an à Morbo ipso, perscrutandum est. 196. ad 197.

— species quælibet, æquè ac animalium aut Vegetabilium, adfectiones sibi proprias, ab essentia sua promanantes, sortitur. 66.

Morbilli ex Epidemicis Vernalibus Ianuario plerumque invadentes,

circa Æquinoct. Vern. statum ad-
quisiti, ingravescentes, adpetente
Solstitio Æstivo, fere disparent.
23. 184.

Morbilli Infantes plerumque adgrediuntur, & qui iisdem mœniis includuntur omnes. 120. confer. 135. & 501.

— periculo omni vacant, si modo peritè tractentur; sed Calefacientia plura mala inferunt. 120. confer. 121.

— à Variolis ex Eruptionis die discerni possunt. 125.

— Symptomata quænam habeant ubi ingrediuntur. 120. 501. Quænam die secundo. 120. Lacrymarum in Oculos effusio ingruentis Morbi certissimum signum. ibid. Maculæ rubræ in pectore alterum certissimum indicium præbent. ibid. Sternutatio eruptionem præcedit. ibid. Diarrhœa subviridis in Infantibus dentientibus accedit. ibid. De quarto non numquam quinto erumpunt. ibid. Eruptionis tempore Maculæ rubræ ubinam & qualesnam adpareant. ib. Symptomata tum non deliniuntur ut in Variolis, excepto Vomitu. ibid. ad 121. 501. Die sexto quid fiat. ibid. Die Nono jam in facie & undequaque disparuere, delinquentes ubique quasi farinosum quid. 121. Cum Octavo die fere evanuerint: putat vulgus deceptum, quia Variolæ diutius manent, eos intropelli, præsertim cum Symptomata quædam tum temporis superveniant, ut Febris, Dyspnœa, Tussis molesta. ibid. Symptomata hæc à Calefacientibus producuntur, & præsertim Peripneumonia, quæ plures jugulat, quàm ullum Symptoma. ibid. Regimen calidum autem quænam mala ultro

- inferat, vide. ibid.*
- Morbilli quomodo curentur. *ibid. ad 123. 502.*
- *An. 1670. ingrediuntur Januario mense, & aucti usque ad æquinoc- tium vernum, omnes infantes infe- stant, & iisdem sensim gradibus re- cedentes, Julio mense evanescunt, nec tota vigente Constit. nisi semel parumper comparent. 120. 104. Hi Variolas Anomalas Constitutionis Dysentericæ, introduxerunt. 105. 123.*
- *An. 1674. initio Januarii, spe- cie diversa, ab iis An. 1670. ingre- diuntur. 143. ad 144. Omnes fami- lias, præ ceteris Infantes, adficien- tes. 135. Usque ad Æquinoct. Ver- nale increscebant, dein paulatim recedentes, elapso solstitio Æstivo, evanuerunt. 135. 144. Anomali ma- gis & Typum minus servantes, res- pectu Eruptionis, quam An. 1670. erant. 135. & 144. Et utraque spe- cies Variolas nigras introduxit. 135. Die quarto erumpebant. 144. Diffe- rentia insuper erat, quod illi faciem primo, hi verò humeros & cæteras partes prius, occupabant. *ib.* Des- quamatio farinosa hic quoque, ut in aliis, non aderat. *ibidem.* Febris & Dyspnœa, recedentibus Morbil- lis, accidentes, pejores erant. *ibid.* Periculosiores erant, si malè tracta- rentur. *ibid.* In reliquis, cum Mor- billis *An. 1670. conveniebant. ibid.* Horum Curatio, eadem ac Morbil- lorum *An. 1670. quod Historia pro- batur. ibid.**
- *An. 1676. non adeo Epidemici, longius tamen solito procurrebant, & ad Æquinoctium ferme Autumna- le pertingebant; quod forte à calore*
- istius Anni. 184.*
- Morbilli *An. 1676. curabantur, ut alii. ibid.*
- In Morbillis Symptomata ex Calefacien- tibus nata, quomodo tractanda. 123. Symptomata, Infantibus ex Calefa- cientibus supervenientia, quomodo *V. S. curanda. 122.*
- recedentibus Symptomata quæ- nam, ex calefacientibus producta, superveniant, & quomodo *V. S. cu- randa. 121. ad 123. 502.*
- Nigredo Exanthematum A- dultis modo contingit, ex Regimine calido, eosque interficit, nisi succur- ratur *V. S. & temperantibus. 121. confer. 501.*
- Morbus quodnam Naturæ conamen, ab Auctore, ponatur. 19. 29.
- quomodo detegendus, ut ad suam familiam relegetur, quando post ve- la irregularium Symptomatum latet. 172. ad 173.
- idem facie sæpe variat pro vario medicandi processu. 8.
- indole sæpe omnino invertitur, ul- tra consuetum morem, alia meden- di ratione temere instituta, quàm Na- tura sibi ad Morbi solutionem propo- fuerat. 63.
- Epidemicus dicitur, qui unus idem- que, certa aliqua tempestate, plures homines simul adficit. 64. Idem in eadem Constitutione, facie diversa pro ratione principii, status & de- clinatione, se ostendit; quod notare magni momenti. 23.
- Princeps Anni vocatur, qui sub Æquinoctio Autumnali, domi- nium arripit. 24. Circa Æquinoc- tium Autumnale maximè furens, Constitutioni Anni istius nomen im- pertit, & reliqui tum grassantes Morbi,

*Morbi, huius ingenio, quantum possunt, se adcommo-
dant: Exempl. in
Variolis & Febre Variolosa, &c. 24.
Autumno invadens, hyemis frigore
pressus recedit; & Epidemici sub eo
merentes tum ingravescent, donec
Anni Princeps eorum vires denuo
frangat. 25. confer. 117.*

*Morbus novus in fine An. 1679. ex
manifesta aëris crasi oboritur. 194.*

— *Malignus qua ratione in aliam
transferatur. 154.*

— *Specificus qualis Adfectio habeatur. 12.*

Morrice M. D. Febre Variolosa laborat. 102.

*Mors ex Febre, cum Naturæ molli-
entis vires, Materiæ morbificæ virtute
suppressæ, fatiscunt. 20.*

— *in Variolis Confluent. plerumque,
Undecimo die, ubi ex hoc Morbo moriuntur, contingit. 84.*

— *Salivatione suppressa,
quibusnam cum Symptomatibus con-
tingat. 84. ad 85.*

— *Discretis, plerumque,
die Octavo, si ex hoc Morbo moriuntur, contingit. 84.*

Morsus Canis rabidi. 524.

*Motus violentior in Gonorrhœa inflam-
mationis Scroti sæpe causa. 206.*

*Moxa in Podagra ad partem adfectam
leviter ustulanda, ut committige-
tur dolor, Indiis Orientalibus ac-
ceptum refertur, & Europæis no-
vum Remedii genus habetur, licet
Hippocrati jam ante bis mille annos
vulgare fuerit, cum Lino crudo ad
hoc uteretur. 329.*

— *non plus præstabit, quam Linum
Crudum Hippocratis. 329. In Poda-
gra verò incipiente tantum prodest,
non ubi inveterata, vel perversa*

cura intus repulsa. ibid.

*Mulierculæ Puerperam V. S. intempe-
stiva jugulant. 281.*

— *Sciolæ Artem in hominum perni-
ciem, quam non didicere, sæpe exer-
cent. 92.*

— *in Variolis, Confluent. Diarrhœam
sistendo, Infantium millia necarunt.
94.*

Mulcus Indicus. vid. Moxa.

N.

N Arcotica. vid. Paregorica.

Natura Sydenhamo habetur com-
plexus naturalium causarum, quæ
sic à supremo Numine fuere dispo-
sitæ, ut ad Opera destinata se cer-
to quodam ordine, atque methodo,
adtingant. 78. Generationes Rerum
certissimis ubique legibus, ac artifi-
cio sibi soli intellecto, exsequitur. 66.
Hæcque omnia altissimis tenebris ob-
velat. ibid. Quo profundius intue-
tur, eo plures ejus lusus, ingens va-
rietas, & divinum artificium ope-
rationum ejus, quæ captum nostrum
superant, conspiciuntur. 110. In
Operationibus suis subtilior, quam
alia quælibet Ars. 196. Quid fa-
ciat, & quibus in Operationibus
utatur Organis, quamvis depre-
hendamus; modus verò quo operatur
semper latebit. 255. Noctes atque dies
nostris rebus invigilat, consulitque,
& sponte sua machinatur, quo ægrum
à Morbi reliquiis tueatur, ac mu-
niat. 346.

— *optima Morborum Medicatrix.
10.*

— *Artis adminiculo ubique non in-
diget; ut probatur. 142. In Mor-
bis sanandis aliquando paucissimis
ali-*

aliquando nullis, Remediis indiget.

10. *Sed, ubi deficit, ei succurrendum; ubi effroenis coercenda, juxta Hippocratis Regulam, in Arte Medica primariam. 10.*

Natura in Morbi causa expellenda, sæpe invita in aberrationes dilabitur, ut doctè ab adsistente Medico ei subveniatur. 13. ad 14.

— *in Acutis Morbis producendis adeo multiplex, incerta, & delicata, ut unius hominis, imo decem, non sit eorum Phænomena Graphicè depingere. 203.*

— *in Chronicis Morbis non habet Methodum tam efficacem, ad materiam ejiciendam morbificam, ut cum eadem manus jungentes Morbum debellare valeamus. 14.*

— *in Febribus non minus, quàm ubique, methodo quadam certa, atque ordine, progreditur. 47.*

— *à materia febrili eodem modo exhorrescit, ac à toxicis deglutitis. 46. Symptomatibus quibusnam tamquam remediis, licet ingratis, utitur, ut materiam peccantem, &c. excludat. 20. Quod opus, ab ignaris, sæpe interturbatur. 20. Quo munere alioquin nunc tardius, nunc celerius, fungitur, pro varia, qua nititur, methodo. 20. Particularum, quas semel excernere, & exterminare, in Febribus, cæpit sanguis, consortium cur amplius ferre nequeat. 30.*

— *repugnat sibi permissa, in Febribus Continuis æquè ac Intermittentibus, Massam Sanguinem, spatium 336. horarum. 52. Cardiacis in debilibus adjuvanda, ut Febres spatium 336. hor. h. e. 14. dier. depurationem suam absolvant. ibid.*

— *cum Materiam morbificam, vi*

sua, criticè norit solvere, sequitur ex Febre Sanitas. 20. Si, viribus Materiæ morbificæ suppressa, fatiscat, Mors ex Febre sequitur. ibidem.

Natura in Epidemicorum Morb. generatione quomodo ludat. 79. Et in eorum productione, quodam artificio, (manifestis aëris qualitatibus scilicet) triumphat. 117.

— *in Febribus Intermitt. Autumn. à Medico sublevando, ut negotium peragere possit. 56.*

— *plus festinare, & tempora materiæ Morbi subigendæ, & despumandæ, citius, quàm in aliis, percurrere videtur. 198.*

— *per Cortic. Peruvian. quo minus materiam febrilem, tempore augeas adgregatam, Paroxysmi impetu eliminat, quandonam impediatur. 188.*

Natura Podagræ est Morbi fomitem semper in Articulos rejicere. 310.

Natura, in Variolis, per se maxime valet Morbum suo ordine ac via præsertim in junioribus & vegetis, tum secernere, tum etiam expellere. 87.

Naturæ conamen quodnam Morbus dicatur Auctori. 19.

— *ductum in Morbis curandis, at neutiquam in Peste, sequi debet Medicus. 70.*

— *intentio, qua Morbos ea solvere cupit, si alius medendi rationis institutione temeraria, uti sæpe contingit, invertitur, mutatur integrè Morbi facies, & ultra consuetum ejus morem accidentibus stipatur anomalis. 63.*

— *Judicia rerum veritati superstructa, non nisi cum ipsa Natura intercident. 340.*

Naturæ Methodus varia & adcurata, quam ad Morborum generationem adhibet, hæcenus à nemine pro rei dignitate satis observando est adsecuta. 25.

Needham (Gualterus) M. D. Auctorem ad Observationes de Morb. Accut. edendas instigat. 4.

Nephriticus Paroxysmus ex Hysterica Adfect. seu Spirituum nimio impetu versus Renes, omnino par & similis videtur illi, qui ex Calculo vel Arena; tamen diversa omnino Methodo uterque curatur. 278. 508. Ex Hysterica Adfect. quomodo dignoscitur ab eodem ex Calculo. 258. Eum aliquando mentitur Adfectio quædam Lumbago Rheumatico dicta. 170.

Nephritis quædam Febres Intermitt. Constit. An. 1678. &c. aliquando excipiens, ut ipsæ Febres curari debebat, & V. S. aut aliis evacuationibus exasperabatur. 201.

— in Podagra inveterascente, in statu vel declinationis, Paroxysmi generalis, vulgare Symptoma. 328. Quid tunc agendum. ibid.

Nicotianæ fumus, in Ileo, inflatus specie Enematis, præstantissimum remedium. 365.

Nigredo in Morbillis. 121.

— in Variolis Anomal. Confl. An. 1670. in subiecta carne, sub Vesiculis nigris quasi ambustis, conspicitur. 124. Superatur malum in Nobili ægra Hydrogala, Vino Canarino, & Paregoricis. 126. ad 128.

— An. 1674. tanta, ut Pusculæ fuliginem æquarent. 145. Sed usu Spiritus Vitrioli diluti malum superatur. 147.

———— Discretis An. 1670.

in externis crustis, ultimis diebus adfuit. 124.

Nigredo in Variolis Regularibus An. 1667. in Puscularum summitate, aciculæ capitis instar, inter Symptomata Anomala, adfuit. 85.

Nodulus naribus adplicandus in Hysterica Adf. Puerperarum, ex immo-dico Mensium fluxu. 282.

Nutrices in Variolis, quàm sæpe errant, nimis officiosæ, ubi caloris gradum, Expulsionis tempore, requisitum definire volunt; cum res illa earum iudicium superet, propter ea, quæ consideranda, & sagacem Medicum expostulent. 89.

O.

Objectiones Dogmaticorum ab Auctore solvuntur, de ægris Lecto, in Variolis, primis diebus adfigendis vel non. 237. ad 240.

Observationes Morborum Epidemicorum, aliquot Ann. succedentium, quo fine, in humani generis emolumentum, ab Auctore traditæ. 27.

— sive Casus. vid. Historia singularis.

— particulares, in Medicina, non magnam adferunt utilitatem, præsertim quæ ad fidem Medicamentis quibusdam conciliandam, institutæ. 11.

Obstetrix rudis, vel jactabunda, quomodo Puerperæ lædere possit. 278.

Obstructiones Mulierum dictæ, ea Methodo ac Hysterica Adf. sanantur. 271. ad 272.

Odontalgia ex Hysterica Adfect. 258. ad 259.

Oleum Amygdalarum dulc. quasnam habeat Facultates. 41. In Febribus

sine noxa potest adsumi. ibid. In Peripneumonia notha. 169. In Pleuritide post V.S. 165. Præstantissimum, in Tussi Febrili, medium. 41. Et Bechicis aliis anteponendum. ibid. Parcè autem, sed frequenter adsumendum; & quare. 42. Variolarum aridarum crustis illinitur. 95. Viribus attritis subvenit. 42.

Oleum Lini seminis recens expressum, in Pleuritide post V.S. 165.

Ophthalmiæ Curatio. 508.

Opiata, vide Conditum.

Inter Opiata quoad vim ipsam nullum fere est discrimen. 179.

Opii egregia virtus & mirandi Effectus non artificis singulari, quam vocant, præparationi, sed nativæ ipsius Plantæ bonitati, debentur. 113.

Opium adeo præstans Medicamentum, sed in hominis periti manu, ut sine eo claudicet Medicina. 113.

— & Opiata in tribus Adfectibus indicantur; in vehementi dolore; in Vomitu vel Dejectione enormi; in Insignioribus spirituum Animalium ἀταξίαις. 185.

— Cardiacum est, omnium fere in Natura præstantissimum; neque tantum somno conciliando, demulcendis doloribus, ac Diarrhææ sistendæ inservit; sed majora præstat, quàm ab ullo Remedio facile speratur. 114.

Ordo quo Morbi Epidemici Constitutionis An. 1661. &c. Tertianæ Febres, scilicet, Variolæ, Quartanæ Febres, & Continuæ se mutuo insequabantur. 28.

Os exulceratum post salivationem Mercurialem, nullis Remediis leniendum. 213. Et quare? ibid. Sic & sponte evanescit, ubi auræ liberiori commis-

sus æger. ibid. Si tamen ferri nequeat, quid agendum. 215.

Os exulceratum est Symptoma totius curæ Salivationis molestissimum. ibid.

Oscitatio matutina in Podagricis jam multum eam passis, quid efficiat. 306.

Ovaria Foeminarum, vid. Testes.

P.

P*Alpebræ in Variolis Discretis jam maturantibus, ita inflantur, ut æger luce aliquando privetur. 80. Quod & ante hoc tempus non nunquam, ob numerum Pustularum, contingit. ibid.*

Palpitatio Cordis ex Hysterica Adf. quasnam præprimis vexet. 257.

Paludosa loca Febrem Quartanam procurare possunt. 402.

Panatella in Dysenteria. 112.

Paracenthesis, in Hydrope, non minus, quàm Vesicatoria, periculi infert. 346.

Paralysis ex Vini usu immodico. 319.

Paregorica in Adfectibus tribus indicantur. 185. 245. Ubi exhibenda, Remedii vis & repetendi vices, cum Symptomatis magnitudine sunt conferendæ; & quare. 185.

— quonam modo tutissimè exhibenda, ut definiatur dosis. 245. ad 246. Ubi frequentius exhibentur, intra singulas doses, tantum spatii interjiciatur, ut, quid prius præstiterit, ante noscamus, quàm aliam repetamus. 184. 246. 277. 513.

— nimis sæpius repetita Digestiones vitiant, & Functiones naturales debilitant. 277.

— exhibenda plerumque post Purgantia, cum, vel mitissima hæcce, tumultum excitent. 58.

Pare-

Paregorica in Cholera Morbo post ventriculi ablutionem. 108. Quid, in initio, mali præstent. 107. Post horas 10. vel 12. Vomitus & defectionis, frigescentibus extremis, Medicus accersitus ilico exhibeat: atque mane & sero aliquamdiu in iis continuandum. 108. In Cholera Morbo An. 1676. fortiora, & frequentiora solito, requirebantur. 184. In Cholera Sancti Viti post Catharsin. 361. 507.

— in Colica Biliosa Cathartico, ubi Vomituritio tanta, ut purgans retineri nequeat, sunt præmittenda; & certo temporis intervallo. 128. Post Catharsin, & quolibet die à purgatione libero, mane & sero exhibenda. 129. Post V. S. 128. 510. Post Vomitorium ex Zythogala, quando. 128. Quandonam, aliis quibuslibet omissis, præmittenda. 129. ad 130. Rei Exempl. traditur. 130. Continuanda adhuc post usum Cathartorum, sed largiore dosi mane & sero, donec cessarint Dolores; nec ultro adsumere tutum. 129. Et nisi dolor summus adsit, sufficiet mane & sero adsumere; si plus requiritur, qua ratione cautè pergendum. 129. Ad dolorem recidivum expellendum. 12. In Colica Hysterica, Ad moderandas Spirituum perturbationes omnino requiruntur quamvis viridis vomitu rejiciatur materies. 132. Ubi Evacuationes præmittendæ erant, minori dosi efficiunt post has, quod prius majori non valebant. 133. 273. 276. 513. Coma, quod à tumultu, quem Purgantia in Febricitantium sanguine excitant, amoliuntur; de quo Auctor nondum cogitaverat, cum in Febre Coma-

tofa Enemata præscribebat, Purgantia exhibere non ausus, 357. In Comatosi adfectibus Variolas præcedentibus. 243. In Dyarrhoea. 113. In Dysenteria, in principio. 112. Infantibus qua dosi exhibenda. 113. Diu hic usurpata, non nocent adeo ac inexperti credunt. ibid. Diebus à purgatione liberis, mane & sero, quare exhibenda. 112. Post Cathartica singula, sed temporius, quàm aliter, quare exhibenda. 112. In Dysenteria præfractiore, quoties de die exhibenda. ibid. In non Epidemica, omissis Evacuantibus, tuto exhibetur. 116. In Dysenteria Febris novæ Epid. ex Torminibus ventris orta, quomodo exhibenda. 364. In Febr. Contin. post Vomitorium. 33. In Febre Dysenterica, Purgationibus interjecta, nocent. 118. Ea curata, languentibus viribus, ut præsertim in Hysterics, quare conducant. 119. Quoties verò & quando exhibenda. ibid. In Febre Epid. An. 1673. ad 1675. non facile in usum erant revocanda, ob stuporem comitem; nisi Diarrhoea periculum inferat. 143. In Febre Epid. nova ubi Tormina ventris & vomituritio adsunt, post Cathartica, qualia. 363. Diacodium tamen præfertur. 364. Si Purgantia non adsumta, hora somni non danda; & quare. 357. In hujus exitu, ad expellenda Symptomata leviora, ab evacuationibus repetitis excitata. 368. In Febribus Intermitt. post Cathartica quare exhibenda. 58. In Febre Scarlatina Infantium quando exhibenda. 162. In Febribus tutius & certius, post Purgantia, officio suo funguntur. 368. Post Emetica in Febr. bus Ver-

nalibus danda. 51. In Hæmorrhagia Narium, quādo, & quare. 177. & 178. In Hydropica, ad tumorem Abdominis, post aquas expulsas superandū, quā ratione exhibita. 342. In Hysterica Adfect. si Chalybis usus corpus perturbet. 271. Curationis hujus initio, quare & quando. 266. 276. Ubi Dolor vel Vomitus, Paroxysmo urgente, quānam cum circumspectione exhibenda; & an ipsis Evacuationes præmittendæ vel non, & quando. 276. ad 277. In Vomitu enormi ilico exhibenda, pro ratione Symptomatis. 277. Forma solida, potius quā liquida, quāre exhibenda. ibid. In Vomitione hac ubi adsumuntur, quiescendum summopere. ibid. Post Vomitionem superatam, mane & sero post paucos dies continuanda. 278. Post V. S. & Catharsin, si hæc requiruntur, multo minori dosi efficiet, quod prius majori non persolvisset. 276. ad 277. 133. In Ileo, ante Purgantia, quando exhibenda. 365. Purgantibus exhibitis, horum operationem deorsum, licet paradoxon videatur adjuvat. 366. Casu confirmatur. ib. In Lochiorum suppressione ex Hysterica Adf. tentanda semel, ubi alia non juvant. 280. Et Emmenagogis addi possunt. ibid. Sed non ultro repetenda, ne nimis obstipent. ibid. Verum ad Emmenagoga redeundum. ibid. In Mensium Fluxu immodico omni nocte sumenda. 282. In Morbillis omni vespera, ad Tussim Infantium qualia. 121. In Nephritico Paroxysmo, post V. S. & Enemata. 446. In Nephritide ex Hysterica Adf. fere sola conveniunt. 278. In Nephritide ex Podagra diuturniore. 328. In Phrenitide non in

initio, sed quo tempore, & quā largā dosi, propinanda. 40. Formulæ horum. 41. In Phrenitide à Variolis quibuslibet. 504. In Podagra inveterata si dolor intolerabilis. 329. Post Purgantium usum in Podagricis Calculo laborantibus, id efficiunt, quod hæc Cathartica tuto adsumantur, contra quod ante censuerat Auctor. 444. In Rheumatismo, vesperi post Purgationes, quare exhibenda. 172. 200. In hoc Morbo frequentioris Venæ sectionis causa esse possunt, quia figant Morbum, non tam facile dein Venæ sectioni cessurum, 171. Hinc vitanda per omnem Morbi cursum, quamdiu Venæ sectione tantum curatio expetitur. ibid. Neque in vigore Morbi Ἀναλγησίαν promissam præstant. ib. At tamen tempore didicit Auctor quoque, ipsa Morbum non figere, si Cathartica sæpius iterentur, post tertiam V. S. 200. In Tussi Epid. 1675. non sine periculo exhibebantur. 152. Paregorica in Variolis, ubi Alvi fluxus, Dolores atrociores, Spirituum motus inordinatus. Vomitus enormis adiunt, præcipuè sunt exhibenda. 246. Adultis tantum, Infantibus autem non, exhibenda. 94. 148. Infantibus equidem non ita conducunt, quia somnolenti &c. nisi periculum adsit. 245. 248. ad 249. confer. 94. Quando ergo exhibenda. 249.

———— Anomalis nigris exhibenda. 125. 127. 148. Omni nocte quamdiu exhibenda. 148.

———— Confluent. adeo specifica, ac Cortex Peruv. in Febris Intermitt. 245. Et quare. ibid. Spiritus consopiant aliquando, licet non dormiant ægri, & hoc sensu profunt.

sunt. ibid. Sed ad Spiritus compe-
scendos non juvant, ni æger è lectu-
lo eximatur. 247. Pacato sanguine.
95. Eruptionem perficiunt. 91. Som-
num conciliando Phrenesin aver-
tunt; Tumorem partium requisi-
tum, ut Faciei ac Manuum præser-
tim, promovent & protrahunt, ac
certiorem illum, & diebus requisi-
tis majorem, præbent. 248. Saliva-
tionem præ aliis promovent, nec non
suppressam revocant. 93. ad 94. 96.
Et si hæc ad horas aliquot iis quasi si-
statur, mox felicius & magis coctare-
surgit. 94. 248. Et salivationem li-
cet supprimerent, tutius esset illud
ferre, quàm à Narcoticis abstinere.
248. Post V. S. in Mictu, vel sputo
sanguinis in hoc Morbo requiruntur.
378. Adultis utiliter, sed moderatè,
post plenam Eruptionem, ad Morbi
finem usque exhibentur. 94. 504.
Missa necessitate alio tempore exhi-
bendi, sexta nocte ab invasione dan-
da, & sic omni vesperâ ad decimum
septimum diem, & ultro. 247. con-
fer. 504. Ratio hujus. 247. Hora
verò sexta, vel septima, vespertina
sumenda. 94. Undecimo die tempo-
rius, h. e. hora quinta, quare propi-
nanda. 247. Aliquando bis de die,
aliquando ter, ea exhibere opus.
248. In Infantibus non modo non
conducunt, sed & Diarrhœam iis
necessariam, supprimunt. 94. con-
fer. 245. 248. ad 249.

Paregorica in Discretis ubi inquietudo,
& vigiliæ, Phrenitidem minitant;
usu veniunt. 92. 504. Faciei subsi-
dentiam & inter Pustulas pallorem,
ex calefacientibus, & sudoribus ni-
miis, ortum, tollunt. 95. & 96.

Paregoricum Auctoris in Dysenteria.
112.

Paroxysmi Februm Intermittentium
descriptio. 47. Ejus tria diversa
tempora. 46.

Paroxysmorum Februm Intermitt. re-
duplicatio ex duplici causa, quarum
una efficit, ut adventitius antevertat
primarium; altera ut primarium in-
sequatur: & quare. 48.

Paroxysmus in Febris Intermitt. re-
dit, quia, eliminato per sudores ul-
timi Paroxysmi hocce, quod diebus
liberis accumulatam fuerat; de novo
adgregari talis materies incipit, die-
bus liberis, donec eam Natura Pa-
roxysmi impetu iterum eliminat. 186.
ad 187. confer. 188. 189. Qua de caus-
sa revertatur statis temporibus. 46.
ad 47. Sed cur in una Febre Interm.
plus temporis, quam in alia exigat,
antequam revertatur, ignorare se,
cum aliis, fatetur Auctor. 47.

———— Corticis Peruviani o-
pe sensum, non illico, opprimendus.
56.

—— Podagræ cur ab Evacuantibus ex-
citetur. 311. Non est unus, sed ex
serie Paroxysmulorum constans Pa-
roxysmus. 304. 305. 312. 326.
522. Et brevior aut diuturnior est
pro ætate ægri; jam ad quatuorde-
cim dies, jam ad duos menses ad-
scendens, jam non nisi æstate recedens.
304.

—— Irregularis quomodo, ab eo
Regularis, differat. 305.

—— Regularis major recedens,
pruritu vix ferendo, furfurum deci-
dentia, & desquamatione, pedem
adfcit. 304. Quo mitior fuerit, eo
citius redibit, & si sævior fuerit,

O. O. O. O. 3 non

non nisi post annum revertitur. ibid.
Particulæ, quas semel excernere & ex-
terminare cæpit Sanguis, cur à Na-
tura ferri amplius nequeant. 30.

Partus laboriosus in Apoplexiæ speciem
Puerperas Hystericas haud infre-
quenter conjicit. 256.

Passio Hystérica, vid. Hystérica Ad-
fectio.

Pauperes à Gonorrhœa virulenta sæ-
pius liberati fuere sola Jalapii radi-
ce. 208.

Pectoralia Medicamenta vulgaria Tus-
sim quare non curare possint, quin
potius iis tempus teratur, & Tabes
aliquando inducatur. 194. ad 195.

Pedes in Podagra Materiæ peccantis
sedes sunt genuina; hæcque si alias
occupat partes, quid indicet. 305. In
Podagræ irregularis Paroxysmorum
intervallis, vix umquam doloris
sunt expertes, & ubi ambulando mi-
nus dolentes fuerint redditi, morbi
fomes Visceribus periculosius immi-
net. ibid. In Podagræ Paroxysmi re-
cessu, pruritu vix ferendo, fursurum
decidentia, & desquamatione, adfi-
ciuntur. 304.

Pellicula in Variolis Anom. Confluent.
An. 1670. alba, resplendens, unde-
cimo die faciem obtegens, describi-
tur. 124.

Penis curvatura, vid. Curvatura Penis.
 — *Dolor. vid. Dolor Penis.*

— *Tumor in Lue Venerea quomodo*
discutiendus. 518.

Pestilentiæ Remedia idem ac Digestiva.

Peregrinatio in Regiones Australes cur
plures Morbos sanat. 316.

Periculum in Variolis pendet ab Exan-
thematum multitudine & è contra.
234. Ratio. ibid.

Periodus Febrium tum Continuarum,

tum Intermittentium, comprehen-
dens effervescentiam, qua Natura
earum materiam expellere solet, ea-
dem est. 53.

Peripneumonia Notha est Febris In-
tercurrentis species, Symptomatis
Peripneumoniacis pluribus ditata;
quotannis emergens, initio Hye-
mis, vel sæpius ea exeunte, na-
scente Vere; usque ad Ver adul-
tum persistens, si Morbi materia
copiosa fuerit. 168. 348. 498. A
Febre Hyemali, ut ex causa & sym-
ptomatis liquet, non nisi gradu dif-
fert. 348. Habiliores ac crassos, vi-
rilem ætatem adsequutos, sed præfer-
tim prætergressos, Spiritui Vini mul-
tum addictos, adgreditur. 168. Hu-
jus ratio. ibid.

— *oritur à Colluvie pituitosa in*
sanguine adgesta & in Pulmones de-
terminata. 169.

— *cum Asthmate sicco in pluribus*
conveniens, in multis tamen differt,
ut Febre, quæ in Asthmate abest.
169. 498.

— *cum Febre incipit, quæ ex*
frigore & calore noscitur. 168. Ve-
rum Febris, & inflammationis si-
gna minora ac obscuriora, quam Pe-
ripneumonia vera habet. 169. 498.
Aliquando ob arctatos Pulmones non
percipitur hæc, & abesse videtur.
168. Febris pro Morbo primario ha-
benda; & reliqui Adfectus, à
quibus mutuatur Morbus, tam-
quàm Symptomata, quæ à mate-
ria febrili, à modo criseos, à par-
te in quam hæc ruit, pendent. 159.
164. ad 165. Hinc consideratur
tamquàm suæ Febris Symptoma ex
Materia febrili in Pulmones deposi-
ta; quo sensu ita gradu majori à
Pleu-

- Pleuritide differt.* 159. 165.
- Peripneumonia Notha Symptomata quænam habeat, exponitur.* 168.
- Qualia Signa habeat Pathognomonica.* 355. 356. 498.
- *Curatur, V. S. ut Sanguis à Pulmonibus revellatur; sed in omnibus non est repetenda.* 168. *Quomodo in lecto potius instituenda.* ibid.
- Tum, secus ac in Peripneumonia vera (169.), Catharsi post V. S. crebriore, in iis præsertim, ubi non repetenda V. S.* 168. confer. 498. 328. *Diæta refrigerante.* 168. & 169.
- Peripneumonia Vera à Pleuritide tantum differt, quod Pulmones universalius adficiat.* 169.
- & *Pleuritis essentialis eodem modo, V. S. scilicet & refrigerantibus, curantur, non adhibita tamen Catharsi, ut in Peripneumonia notha.* ibid.
- *in Morbillis, letalis magis quam ullum Symptoma, à calefacientibus inducitur.* 121. 122. *V. S. curanda etiam post Morbum.* 122.
- Peripneumonix, desinente Vere, unde.* 49. *Verno tempore, Lond. An.* 1665. *post Hyemem frigidam, & siccum gelu, grassantur.* 62.
- Pertussis seu Hooping Cough Infantum V. S. plus quam ullis Pectoralibus, juvatur.* 122. 123.
- Pestilenciales aëris Constitutiones, vid. Constitutiones Pestilenciales aëris.*
- Pestilentialis Febris, vid. Febris Pestilentialis.*
- Pestis, & Arthritis, nec non plerique alii Morbi, Naturæ Medicatricis Instrumenta sunt.* 20.
- *Epidemica ubi invadit, ea Anni parte, quæ inter Ver & Æstatem*

- ambigit, h. e. surgente Anno, exoritur.* 62. 64. *Et quare. ibid. Crescente Anno invalescit, ut circa Autumnale æquinoctium æxplu attingat; dein collabascit, & Brumali frigore evanescit.* 63. 65. confer. 23. *Rarò alia tempestate ingreditur, aut tum non multum debacchatur. Hinc ubi Sporadicus modo Morbus existit, nullo tempestatis discrimine paucos adfligit.* 64.
- Pestis cujus Essentiæ sit Auctor ignorat.* 65. *Sed ab Inflammatoria diæstortum suum ducit; quod argumentis evincitur pluribus.* 64. 67. *Videnturque Febris peculiaris ac sui generis, ab inflammatione particularum spirituosiorum Sanguinis.* 66. confer. 72. *Et pendet ejus ferocia à majori, vel minori, subtilitate hujus inflammationis.* 66. & 67.
- Ubi inflammatione minori existit, Pestilentes Febres producit.* 66.
- *ab occulta planè aëris quadam crasi pendet.* 63. ad 64. *Sed ut excitetur & propagetur, non modo aëris diæstors, ceu causa communis, verum & alia procatactica nimirum, prædispositio & susceptio, à pestifero aliquo corpore, accidat oportet.* 64. & 65. *Quin alias vicina loca haud ita immunia se præstarent.* 65. *Ubi vero locum quemdam devastavit, non amplius vel fomite, vel personali consortio indiget; verum quemlibet vel semotum, modo corpus ad adflatum excipiendum paratum habeat, aër, tum laborantium halitibus, tum mortuorum cadaveribus, contaminatus, inficere valet.* 64.
- *tempora Incrementi ac Declinationis sua habet.* 65. *E genere Epide-*

micorum Vernalium usque in brumale frigus protrahitur. 23. Frigore brumali domatur. 63. 65. Neque unquam hujus Morbi daretur finis, si Anni Vicissitudines, & aëris mutationes in ejus virus nihil imperii exercerent. 65.

Pestis Britanniam vix frequentius, quam post Annorum circiter quadraginta revolutionem, summo vigore, adoritur. 64.

— Italiam occupans, excepta Hetruria. 65.

— An. 1665. Londini debacchari incepit, circa exitum Maii & initium Junii postquam Febris Pestilent. jam à Mense Martio grassata fuerat, & invalescens quotidie circa Æquinoct. Autumn. statum attigit, tumque sensim recedens, brumali frigore fere deleta, circa Ver An. 1666. omnino fuit abolita, remanente adhuc Febre Pestilent. 63. confer. 64. Et, quod notandum, idem Annus mitissimus & saluberrimus fuit; qui nempe à Peste immunes erant, numquam saniores fuerant; &, qui ab ea sanati, postea saniores quam ante erant. 67. Hujus exortum præcesserunt, per aliquot septimanas, Pleuritid. Angin. aliæque Adfectiones inflammatoriæ. ibid. Unius septimanæ decursu circiter 8000. hominum delevit. 63. confer. 74.

Pestis cur tam cito necat, si Naturæ non concedatur tempus febrilem motum excitandi. 67. Sed non nisi circa initium ejus, vel incrementum seu statum, tam subito necat. 66. Et quare. 66. 67. At non nisi in ejus popularis, ac funestæ quidem, exordio, hoc contingit. 65. Pri-

mis enim mensibus, dicta Pestis omnes inopinantes fere exstinguebat; adolescens vero non necabat, nisi Febre prius & aliis Symptomatibus laborassent. 110.

Pestis ingruens Symptomata quænam habeat. 65. Raro citra Febris præsentiam ingruit. ibid. Aliquando tamen Tumores erumpunt, Febre non prægressa; licet Auctor suspicetur semper horrorem præcessisse. 65. Febris quoque aliquando non adparet, dum perit æger. 155.

— non nullos adeo leviter aliquando adficit, ut per publicas plateas ambulare queant. 65.

— Curatur vel Natura, vel Arte. 68. Natura alia ratione Pestem veram, alia ratione Febrem Pestilentialem, curat; quos modos nos quoque insequi oportet. 69. confer. 100. Si sua Methodo Natura pergat, nec aberrat, Pestem veram per Abscessum, & Febrem Pestilentialem per Diaphoresin, sanat. 69. Abscessus illi sunt Tumores Glandularum, Bubones dicti in suppurationem abeuntes. ibidem. Sed hunc Curationis modum sequi non possumus, quia illa Apostemata, arte nostra, excitare nondum valemus. 69. 77. Cardiacis enim tuto hoc non tentatur. 69. Sudores quoque multum obsunt, licet post illos in conspectum aliquando veniant Bubones, cum inde sæpe retropellantur incepti hi Tumores. ibid. Et sic Sudoribus extorsis plures jugulati. ibid. Nam huic materiæ retropressioni, forte imputari posset, quod Malignitati adscribitur. 70. Hinc aleæ plena res hanc tentare Methodum, quam Natura sola perficere potest, si non perturbetur. 69. 77. Quare, in Peste curan-

curanda, Naturæ ductum non sequi, ut in aliis Morbis, sed ei renunciare debet Medicus: cuius Effati neglectu Pestis Tumulus non parum fuit ad-auctus. 70.

Pestis Artis, non Naturæ, Methodo ubi curari debet, dupliciter id fieri potest; vel per V. S. vel per Sudores. ibid. Pestis equidem Alexiterium proprium in Naturæ sinu abditum adhuc delitescit; quare eadem nisi ratione quadam Mechanica tolli potest. 69. Per V. S. Curatio. 70. ad 72. Hæc, ubi instituitur, debet fieri in Lecto, & quare. 75. Debet dein fieri nondum adparente Tumore. 70. 75. Et tandem debet esse lar-ga: parca enim, vel tumore jam conspicuo, ubi instituta, semper damnosa fuit, & Phlebotomiæ, ita perverse administratæ, contrariæ sententiæ Patroni, inter quos Diemerbroekius, argumenta sua debent. 60. Plures Doctores V. S. hîc instituendam, jam pridem censuerunt, qui recensentur. 71. Sed cum uno L. Botallo totum Curationis negotium, in copiosa V. S. collocavit Sydenham. 70. ad 71. Et hujus Metho-di Exemplum singulare in Castro Dunstar. ib. Et in Peste Lond. quo-que, nisi liberalior foret V. S. potius nocebat. 73. Curatio per Sudores, isti per V. S. anteferenda videtur Sydenhamo; tum quia non æquè vi-res prosternit, tumque Curationis modum infamiæ periculo non objicit. 72. Sudor spontaneus quidam valde salutaris. 76. Quare hic Morbus Su-doribus facile curetur, & alii Mor-bi maligni pejores fiant? 154. Quo-modo dirigenda illa Cura Sudatoria.

75. ad 77. V. S. prius semel, insti-tuenda. 75. Sudor continuus & pro-lixus requiritur, non interpola-tus. 76. Refelluntur Diemerbroe-kius & alii, quod Diaphoresin in-terpolandam suadeant. ibid. No-tatu dignum Auctor habet, quod, diaphoresi, materia morbifica ver-sus ambitum corporis exporrecta, ili-co Excretiones Ventriculi sedentur, adeo, ut Medicamenta adsumta reti-neantur: quod Historia confirmatur. 75. ad 76. Per Sudorem Cura quas-nam adhuc dum habeat difficultates. 72.

Pestis & Febris verè Maligna specie non, sed tantum gradu discriminan-tur. 63. ad 64.

— ab Igne Sacro quomodo differat. 67.

Pestis Historiam Auctor scribit, quod alii qui adfuerant toto tempore Me-dici, de eo nihil divulgabant. 68.

ad Pestis Prophylaxin non conducunt calida, ut deprædicatur: imo Vinum, & fortiora, Morbum advocarunt. ib. in Peste, Bubones quomodo fiant pro-pter materiam Morbi subtilissimam, & maximè inflammabilem. 100. Ubi erumpunt bonum. 65.

— Materia Morbi à Sanguine segre-ganda subtilissima & maximè inflam-matoria est. 100. confer. 68. Tamen Alexipharmaca, calidiora licet, au-xilium præstant; quatenus scilicet diaphoretica sunt. ibid. Verum illa ipsa, si sudorem forte non moveant, pessima. ibid.

— Maculæ purpureæ, malum signum. 65. 69.

— Tumores prorumpere bonum. 65.

— Sudores artificiales an Aposte-mata

- mata desiderata provocent ?* 69.
Quandonam sæpe funesti. ibidem.
Horum eruptio sine Sudore magis fuit salutaris. ibid. *Ad magnos equidem Sudores Bubo non numquam disparet.* ibid. 72.
*In Peste per Apostematum maturati-
 onem, Curatio admodum incerta ac fallax.* 77.
Petechiæ & Maculæ purpureæ, tum Virium subita prostratio, Malignitatis signa habentur, in Morbis; & solvitur ab Auctore, unde fiant. 370. & 371.
 — *in Febre nova hyemali à calefacientibus.* 356. 359. *In Febre Variolosa.* 98. 99. *A Regimine calido auctæ.* 101. 102. *In Morbis Acutis unde, & quid indicent.* 252. 253. *Pestis sub adventu.* 540. *ad* 371. *In Variolis Confl. unde.* 370. *ad* 371. 378.
Petechiarum & Mictus Sanguinei singularis Casus à D. D. Goodall communicatus. 252. *ad* 253.
Phænomena in Hysterica Adfectione eodem solvuntur modo, sive ipse Morbus tamquam Vapores elevati, sive tamquam Convulsiones partium particularium consideretur. 132.
 — *Morborum Accidentalium, à Methodo curandi sæpe pendent.* 8.
 — *Naturalia, qui rectè perceperit, ille Indicationes Curativas veras eliciet.* 3.
 — *clara ac naturalia, utcumque minuta, Hypothesibus sepositis, ubi illorum Historia tradenda, accuratissimè notanda.* 8. *Hoc autem fecit Hippocrates.* 10.
 — *peculiarioria & perpetua seorsim ab accidentalibus, & adventitiis, enarrentur.* 8. *Et quare hoc ita fieri debeat.* ibid.
Vid. Morborum Phænomena.
Philosophia in Medicina quid mali attulerit. 255.
 — *Medici quænam esse debeat.* 348.
Moralis quid sit. 187. *Naturalis specificam differentiam nullam enodare potest.* ibid.
Philosophus Empirico, in Medicina, quod famuletur, demonstratur. 341.
 — *quare nemo mortalium evadere possit.* 348.
Phlebotomia, vid. Venæ sectio.
Phrenitis Cardiaca non admittit præsertim ante usum Narcoticorum. 70.
 — *in Febre Epid. An. 1674. quomodo curanda.* 142. *Vitrioli Spiritus hîc primas tenet.* ibid.
 — *ex Febre nova hiemali à calore lecti.* 356. 359. *Immo non numquam per se, at non ita vehemens, ac in Variolis vel aliis Febris, ut potius lene sit Delirium.* 355. *ad* 356. *Ubi invaluit, nulla restant Febris indicia, sed pulsus tandem pessimus fit.* 356. *Et Apyrexia adesse videtur, si linguæ albedinem excipias.* 360. *Quomodo regimine refrigerante & abstinentia à lecto, avertatur.* 359. *Calefacientibus inducta, curatur regimine refrigerante, Capillorum Abrasione.* 360. *confer.* 97. *In Febre Variolosa ex sudoribus nimis à Regimine calido.* 99. 101. *Sudore coacto, in Febris, quandonam excitari queat.* 163. *A Venæ sectione neglecta in Febris, quando.* 30. *Tamquam Symptoma Febrium Contin. unde oriatur: quænam ejus signa; qui curetur &c.* 40. *Ex Lochiis suppressis per Hystericam Adf. in Puerperis tenerioribus nimis*

- nimis cito surgentibus, nascitur.*
 279. *In Pestilent. Morbis, inferri potest, nimia vi ad sudores proliciendo excitata, in iis qui difficulter sudant.* 72.
- Phrenitis in Variolis frequens Symptoma.* 95. *Sed anomalum, ex nimio Sanguinis calore.* 85. *Et plerumque ex calefacientibus ortum.* 87.
- *Confluentibus, nata ex calefacientibus, Methodo contraria ut præcaveri, sic etiam tolli, potest.* 97. *Paregoricis quomodo cohibeatur & præcaveatur.* 94.
- *Discretis, copiosè manante Sudore, & sponte sua repulso, oboritur.* 95. *Instans metuitur ex inquietudine & Vigiliis; & tum Paregorica juvant.* 92. *Mortem indicat in propinquo, ubi ægritudo vehemens, urina pauca ac frequens, simul adsunt.* 95. *Curatur unicè vehemens ubi fuerit, V. S. larga, aura frigidior, narcoticis, ibid. V. S. quod exigat docent Hæmorrhagiæ narium subitanæ.* ibid.
- *omnibus, V. S. non semper indicat; sed in Distincto tantum genere, ubi facies tumet, Pustulæ magnæ sunt, & Regimen calidum fuit adplicatum, præcipuè.* 95. ad 96.
- Phthisis duos fere Trientes eorum, quos Morbi Chronici jugulant, interficit.* 275. *Describitur.* 527. *Hujus Curatio.* 526. 527. & sequ.
- *Hydropis causa, Evacuantiæ aut seu κατὰ, prohibet.* 343.
- Phthisici Equitatione sæpe sanantur.* 275. *Estque in iis primum Medicamentum.* 526.
- Phymosis quomodo curanda.* 211.
- Pilulæ Chalybeatæ, in Hysterica Ad-*
- fect., duplicis generis.* 270.
- Pilulæ Cochis laudantur.* 129.
- *Ad ð.j. exhibitæ semper alvum laxant.* 363. *In Febre nova. Epid. ubi stomachus Potionem non fert exhibendæ.* 363. *Potio tamen præferenda.* 364. *Tempore quo sudor, in Tertiana Autumn provocatur, dandæ.* 55. *In Tussi Puerorum convulsiva dantur.* 195.
- *ex Cortice Peruviano.* 188. ad 189.
- *ex Elaterio & Pil. ex Duob. in Hydrope.* 337.
- *foetentes Hysterica.* 270. *Tales Ventrem minimè turbantes.* ibid.
- *Matthæi loco Paregorici in Nephritico Paroxysmo, post V. S. & Enema.* 446. *In Nephritide ex Podagra diuturniore.* 328.
- *Paregoricæ & Emmenagogæ in Lochiorum suppressione.* 280.
- *purgantes finito Apoplexiæ Paroxysmo, exhibendæ, 507. In Colica biliosa, quænam optimæ.* 129. *In Fluore Muliebri.* 192. *In Gonorrhœa virul.* 192. 208. *In Hysterica Adfect.* 270. *In Ileo, ex Torminibus ventris, in Febre nova Epid.* 565.
- Plantæ Medicæ omni palmam præripiunt, & omnium maximè de Remediis, ad insigniores Morbos, inveniendis spem faciunt: & hoc quoniam Animalium partes cum nostro corpore nimium conveniunt, Mineralia nimis dissident: Hincque Plantæ magis explorato nobis innotescere deberent.* 15.
- Plebs, à Variolis, cur minus trucidatur, quàm Divites.* 92.
- Pleuritides, Anginæ, aliæque sanguinis inflammationes Adfectiones,*

- frequentissimæ fuere, per aliquot septimanas, quæ Pestis Londin. exortum antecesserunt. 67.
- Pleuritides post Febr. Continuas, circa Veris finem, & Æstatis initium, sæpe grassantur. 73. Verno tempore Lond. An. 1665. post hiemem frigidum, & siccum gelu grassantur. 62.
- desinente Vere, unde. 49.
- Pleuritis Essentialis, vera, Morborum frequentissimus, describitur juxta Phænomena. 163. ad 164. 497. Quo tempore Anni præprimis infestet, & grassetur. 151. 173.
- Quosnam, præ reliquis, adgrediatur. 73. 63. 163.
- Febris pro Morbo primario hic habenda; & reliqui Adfectus à quibus nomen mutuatur Morbus, tamquam Symptomata, quæ à materia febrili, à modo criseos, à parte in quam materia ruit, pendent. 159. 165. Initio cum horrore, & ceteris Symptomatibus adest. 163. Cum aliis Symptomatibus progreditur, & ab his, quæ ex illa prius nata, adaugetur. ibid. Et tandem pro ratione liberioris expectorationis, una cum reliquis, ægri salute, minuitur. ibid. Sed redit Hæcticæ specie si res in Apostema vergit. 164.
- Dolorem punctorium, quo tempore adquirat, & quo Thoracis loco. 163. Tussim qualem habeat. ibid. Darrhœam unde habeat. 99.
- Expectoratione sputi subcruenti plerumque sensim solvitur, nullo redeunte Symptomate. 163.
- In Suppurationem quandonam abeat. 164.
- Sanguinem post primam saltem viem eductum, instar sevi liquati in superficie, purulentum quasi, habet.

165. 497. Cuticula hæc tenax in sanguine, si hicce recto flumine non profilierit, haud ita adest, & minus tum etiam levaminis à Venæsectione persentiscitur. 164.
- Pleuritis Inflammationi sanguinis propriæ, ac specificæ, ortum debet. ibid. Ex Sudoriferis, in Tussi exhibitis, An. 1679. oborta quoque est. 195. Ubi tamquam Symptoma Febris, ad quam propriè spectat (160. ad 161.) consideratur, ex præcipitatione (164.) materiæ suæ Febris in Pleuram itidem oritur, ut docet sanguis eductus. ibid. confer. 165.
- à subito calore, intensum frigus subito excipiente, sæpe oritur. 22.
- periculosior aliis Morbis, facile vincitur, & tam certo ac tam brevi tempore, quam alius quidam, debellatur, si peritè tractetur; quin contra, inter potentissimas orci januas recensenda. 165. 167.
- Indicationes curativas quales admittat. 165.
- Curationis spem præcipuam ponit in Venæ sectione. ibid. 168. Larva V. S. itidem non nocet. 167. Et Darrhœa, hic aliquando superveniens, eadem V. S. sistitur. 166. Hæc autem quomodo instituenda, & iteranda, & ad quam dosin, tum in Adultis, tum in Pueris. 165. 166. 498. Levatur V. S. ultima, si non ante; tumque Catharticum exhibeatur. 166. Notadū interim, quod Pleuritis vera & Essentialis, qualibet Constitutione indifferenter infestans, repetitam V. S. indicat; non verò si aliqujus Febris Symptoma est, sed, ratione istius Febris tum, reiteranda modo. 153. confer. 160. ad 161.
- per Expectorationem materiæ coc-

tæ quare non vult, ut curetur; uti per V. S., Auctor. 166. Et Pleuritis sicca ab Hippocrate quamvis damnetur, tamen per V. S. potius quam per expectorationem Pleuritis Curationem instituendam suadet Auctor. 167.

Pleuritis Diætam qualem exigat. 165.

— Medicamenta quænam ferat. 165. ad 166. 498. Enemata non admittit, aut lenissima tantum; & quando. 166.

— Lecti Calorem nimium vetat; adeo quidem ut, nisi ex eo quantum potest eximatur æger, nec V. S. nec refrigerantia, multum proficiant. ibid.

Pleuritis à Peripneumonia vera gradu minore differt tantum, quod hæc Pulmones universalius adficiat. 165. 169. Eodem tamen modo, V. S. scilicet, & refrigerantibus, curantur, excepta Catharsi, quam Peripneumonia vera renuit, sed Peripneumonia notha admittebat. ibid.

Pleuritis Symptomatica, per accidens Febris superveniens quibuscumque, oritur ex materia febrili, adhuc cruda, in Febris initio, ad separationem debitam nondum præparata, in Thoracem præcipitata. 164. confer. 153. 161.

— infertur sæpissimè ex usu Calefacientium intempestivorum, in Febris exhibitorum. 164. Vel ex Sudore, initio Februm coacto, præsertim tempestate, & ætate faventibus. ibid. Vel à V. S. in Febris neglecta. 30. Aliquando ex Aëris manifesta alteratione, materiam Febrilem in Pectus deponente. 153.

— An. 1675. Tussi superveniens,

maligna erat quam maximè. ib. Neque V. S. præsertim iteratam, ut aliter solet, ferre poterat. ibid. Nec, ultro eam admittebat, quàm requirebat Febris, cujus Pleuresis hæc symptoma erat; uti semper contingit, ubi Febris Epidemica, ex repentina aëris quadam manifesta alteratione, in Pectus materiam deponit, ipsa eadem interim remanente; hinc si Febris repetitam V. S. respuat, nocebit & eadem in hac Pleuritide. 153. confer. 161. 164.

Pleuritis An. 1675. curabatur ut Febris Constitution. hujus, in pectus determinata. 152. 153. & confer. 161.

Podagra Articularis Morbus etiam vocatur. 307. Fomittem Morbi quoque semper in Articulos rejicit, ex sua Natura. 310.

— Quosnam invadere soleat, tam respectu vitæ generis, quàm habitus & structuræ corporis, nec non ætatis, ac labis hereditariæ. 302. ad 303. Juniores admodum occupans, initio nec Regularis, nec crudelis; sensim tamen castra metatur, typum sibi format, & ferocissima fit. 303. Divites plures interemit quàm Pauperes, plures Sapientes quàm Fatuos, 307.

— Insipientes paucos occupat. 323. Fœminas raro adficit, nisi Vetulas vel Virgines. 307. 553.

— pendere videtur à Concoctione, seu Digestione, tam in partibus, quàm succis corporis, præcipuè Nervosis sive Spiritibus, labefactata. 308. ad 309. confer. 319.

— Causam habet duplicem juxta Auctorem; nempe Causam antecedentem, quæ est humorum indigestio à calore & Spirituum defectu orta;

tum Caussam continentem, quæ propriè fomitem Morbi constituit ortam à mora humorum in corpore (quæ mora ab inconcoctione dicta pendet) eos acriores & quasi putridos reddente, unde calentes & exæstuentes Paroxysmum constituunt. 312.

Podagra ex Vini usu immodico oriri potest. 319.

— Regularis & Typum servans quo tempore Anni, diei, ingruat, quænam præmissa incommoda; qualem Pedis partem primo occupet; & quo ordine dein laceffere pergat, describitur: 303. ad 304. 552. ad 553. Primo unum Pedem adficere solet. 303. 552. Brevi post Pes alter eodem cruciatu adficitur. 304. 552. Rarò utrique Pedes in initio simul adficiuntur. 304.

— Seniores ubi adoritur, nec tam immaniter sævit, nec tam statas habet Periodos, quàm si ætate Juniores occupaverit; & hujus rei ratio. 303.

— Paroxysmum habet vel breviorum vel diuturniorum, pro ætate ægri, vel diuturnitate Morbi; & qua ratione hoc differat. 304. Paroxysmus hujusmodi major, seu generalis, dicitur, qui quasi unus ad duos, tres, menses extendere se videtur: sed non est unus Paroxysmus, verum ex serie Paroxysmorum se mutuo succedentium, & quorum posterior quilibet priore, & mitior, & contractior, semper est. 304. 305. 312. 326. 552. Hoc tamen ubique servant quòd dolor noctu recrudescat, mane verò remittatur. 304. Recedente tandem Paroxysmo Pes adficitur pruritu, surfures decidunt, & desquamatio fit. ibid. Tandem in ægri,

& appetitus, redeunt. ibid. Si jam vehemens fuerit Paroxysmus, non nisi post annum revertitur. ibid.

Podagra regularis Dolores habet inclementiores, quam Irregularis Podagra, verum hinc quoque Paroxysmos breviores, & Intervalla inter eos longiores, & magis perfectæ. 306.

— nec Juvenes nec Pueros adficit; sed Juvenes, qui ex Parentibus Podagricis nati, aliquid modo præsentunt istius Morbi. 307. ad 308. confer. 553.

Podagra non Regularis seu Anomala vocatur, cujus Phænomena diversa à Regulari. 304.

— talis fit vel ob perversam Medelam, vel ob subjeçti debilitatem, propter Morbi diuturnitatem. 303. 305.

— describitur. 304. ad 307.

— Paroxysmos particulares, majorem constituentes, multo longiores habet, non ad unum vel alterum diem, sed per quatuordecim, perdurantes. 305. 552. Symptomata, diversa ab iis Regularis Podagræ, qualia. 305. 552.

— In Paroxysmorum Intervallis jam non, ut Regularis, valetudinem concedit; sed plura mala ægrum vexant; quæ mala exponuntur. 305. 307. & 552. Tandem, Natura materiem ad extremitates relegare non amplius apta, Symptomata quoad dolorem fiunt mitiora, sed Paroxysmi longiores; & artuum dolor, loco articulorum, ægritudo quædam, cum quadam propensione ad Diarrhœam, vexant: quæ omnia ubi Articulorum dolores vigent iterum recedunt; hocque alternatim.

306. Interim Morosi fiunt Ægri, animo etiam contagio adflato, sibi aliisque graves. 307. Et ultimo, visceribus infarctis, Materia ad extrema non amplius pulsa, vitam cum morte commutant. 307.

Podagra quomodo curanda. 313. ad 330. 553. ad 554.

— à nemine radicaliter extirpari hactenus potuit; sed Remedium adhuc inventum iri, credit Auctor. 332.

— ergo, una cum ejus tractandi Methodo, ab Auctore, quum eam curare se posse non jactet, cur tradatur? ibid.

— quare non adgredienda tempore Paroxysmorum, sed in eorum Intervallis. 325. Nam Fomitem, seu materiam talem morbosam, habet, quæ Naturæ inviolabili lege semper in Articulos rejici debet, nec inde sine discrimine revellitur, aut alia Methodo, quàm ea quam Natura præmonstrat foras ejicitur, cui soli permittenda, cum ipsius omnino Opus sit, quod sua Methodo sola peragit. 310. 313. 325. Adeoque ipsa Materiam peccantem suo modo exterminat; in Articulos deponit, & per insensibilem transpirationem diffiat: quare nobis non licet eam, vel V. S. vel Catharsi, vel Sudoribus, ejicere. 309.

— non curaretur etiam, quod Symptomata ejus coercerentur ac remorentur, cum contra Curationi hoc adversaretur. 325. Sed illis Symptomatibus occurrendum tamen est, quæ falsa medendi Methodus produxit. ibid. Tum & iis, à quibus æger de vita periclitatur. 327. 554. Adeoque Symptomata quædam tamen habet, quibus in Paroxysmo occurrendum; ut præprimis sunt

Ventriculi languor, Tormina ventris. 327. 554. Sic non Podagra Regularis, sed quæ mala cura exacerbata, in Paroxysmo tractanda; & quomodo. 325. 327. 554.

Podagra incipiens per Moxæ, vel Lini crudi, Ustionem, tantum levatur; sed non attingit hoc causam Morbi antecedentem, h. e. Indigestionem; nec in Morbo inveterato, aut perversa cura intro repulso, juvabit. 329.

— ubi radicaliter curanda, Coctioni, indigestionibus sublatis, præprimis consulendum; ita tamen, ut interim, data occasione, quæ humores acres leniunt, itidem adhibeantur. 313. ad 330. confer. 553. Hinc curatu perdifficilis, quia duabus Causis, admodum contrariis, ut quæ huic prosint alteri obsint, obviam eundum est; nempe Antecedenti, seu Indigestioni humorum; tum Continenti, seu Humorum calori & exæstuationi, quæ propriè fomitem Morbi constituit, dum Articulos obsidet, vel quæ post Paroxysmum adhuc in sanguine delitescit, separationi inepta. 312. 313.

— ergo ubi sananda, exigit Concotionum restorationem; sanguinis, & partium, roborationem; quæ omnia totius corporis Habitus immutationem & redintegrationem semper ponunt. 308. 312. 317. 318. 320. 323. 325.

— Evacuantibus non attingenda, & quare. 312. confer. 309. Venæ sectio quantum noceat. ibid. ad 310. Catharsis quantum lædat. 310. ad 311. Verum in iis qui Mictu cruento ex Calculo Renum laborant, Manna

- Manna omni Septimana est concedenda.* 444. 553. *Sudorifera quomodo obsint.* 311. 312. 553.
- Podagra ut curetur, Corporis habitus omnis alio traducendus est, atque homo integer, quasi nova incude, refingendus; hinc diu, constanter, & assidue, in Digestivorum usu continuandum, ut Coctionum robur, & partium firmitudo, pedetentim reducatur.* 317. ad 318. confer. 323. 553. *Digestiva hæc, quid sint.* 313. *Quænam talia suppeditet Materia Medica, & quâ ratione usurpanda.* 313. ad 314.
- *Pharmacis solis non curatur, sed Diæta seu victus ratio concurrere debet.* 318. *Hæc in Podagræ Intervallis, Cibi Quantitatis, Qualitatis, Temporis, respectu, qualis.* 318. & 553. *Respectu Lactis solius usus.* 318. 319. *Respectu Potus, ut Cerevisiæ, Vini.* 319. ad 320. & 321. 554. *Aquæ puræ.* 320. *Potus Diætetici seu Decoctorum ex Lignis.* 320. ad 321. 554. *Somni, & Vigiliarum, temporis.* 322. *Animi Adfectuum.* ibid. ad 323. 554. *Respectu Motus & Quietis.* 323. ad 324. *Respectu Veneris usus.* ibid. 554. *In Podagræ Paroxysmis, respectu Cibi & Potus quantitatis, ac qualitatis, tum Exercitii.* 326. ad 327. 554. *Ubi æmpulæ suam attigit Morbus, ob Paroxysmi, primo insultu, atrocitatem, Exercitium, ceterum adeo salutare, vetatur; & decubitus in lecto, ad certum tempus, una cum tenui Diæta requiritur.* 326. ad 327. *Quandonam verò, in Podagræ inveteratæ Paroxysmo à lecto abstinendum, ut Mors vitetur; molestiam potius vestationes sustinendo, & dolorem,*
- amarissimum licet Naturæ remedium, ferendo?* 327.
- Podagra inveterata Diarrhæam excitat, si materia in Artus non eliminatur; quomodo tum occurrendum.* 328.
- *à Cathartico, etiam leni, accersetur.* 443. 444. *Minitans verò tum Paroxysmus, ob Purgantia data, Laudano reprimitur: Hocque nondum animadvertenter Auctor, cum Tractatum de Podagra scripsit.* 444.
- *per Metastasin aliquando, licet raro, materiem morbi in Pulmones deturbat, cujus causa Tussis brumalis, ex frigore in Paroxysmo suscepto: in quo casu nulla Podagræ habenda ratio, sed Morbus tamquam Peripneumonia curandus, Sudores, hic nocuos, cautè vitando.* 328. & 554.
- *retrocessa quomodo cognoscatur.* 445. *Et quomodo, à periculo inde imminente, se liberaverit Auctor.* ib. *Retrocessio hujusmodi materiæ morbosæ periculosa admodum.* 69. ad 70.
- *Scorbutum quandonam mentiatur.* 172.
- Podagricis Cogitationes nimie admodum obficiunt.* 233. *Hincque plures, indebita Meditatione, quam ipso Morbo, fuere perempti.* 329.
- Pompa Remediorum in Moribundis sæpe malè collocatur.* 199.
- Porrigo seu Furfur Capitis.* 524.
- Porrigines in Lue Venerea. vid. Cru- stulæ.*
- Possetum. vid. Zythogala.*
- Potatio nimia in Gonorrh. virul. recidivam quando producat.* 208.
- Potatores Hydropici, aliis frequentius, fiunt.* 334.
- Potio Cardiaca in Variolis, ubi Symptomata ex nimio frigore vel Evacuationibus indebitis.* 97.

Potio purgans *Auctoris*. 38. 488.

— purgans in Colica biliosa, aliis anteferenda. 128. In Febr. Continuis. 38. In Febre nova hyemali. 356. Quando iteranda. 357. Ad subducendam materiem revulsam. 349. Quando iteranda. ibid. In Hydrope, pro robustis in quibus alia non operantur, una & altera. 337. Simul calefaciens inter purgandum & corroborans, alia. ibid. Purgans & Vomitum ciens, 338.

— vid. Haustus.

Potter Capitaneus Londini Cortice Peruviano occisus. 187.

Potulentorum, in Podagræ Regularis Paroxysmo, tertia pars tantum per vesicam redditur. 304.

Potus in Dysenteria qualis. 112. Frigidus in Dysenteria qualis. ibid. 114.

In Febre Dysenterica. 118. In Hydrope conceditur ab Auctore ad ℥iiss. vel ℥ij. singulis diebus. 342.

In Hysterica Adfect. Puerperarum à nimio Mensium fluxu. 282. In Podagra optimus, qui non nimis Vinosus, nec nimis Aquosus, ut Cerevisia

tenuis Lond. lupulata vel non; vel Aqua cum Vino, præsertim in mitiori. 319. 320. In Podagra, vehementiori, & provectiore, omni spirituositate careat, & Potus Diæticus propinquetur. 320. ad 321. Hicce palato quantum fieri potest gratus fiat. ibid. Adpetitum plus favet aliis liquoribus. ibid. Et hoc commodi habet, quod illi, qui eo utitur, concedat liberiores in cetero victum, quam si

Vino vel Cerevisia uteretur. ib. 151. In Tussi Epid. 1675. absente Febre, &c. 153. In Variolis Anom. temperans & Salivationem promovens, qualis. 125. 127.

Præputio si Glans contegitur. vid. Glans.

Praxis Medica unica vera in Observatione Operationum Naturæ fundatur, h. e. Indicationes ex ipsis Morborum Phænomenis elicit, dein Experientia firmat; ut fuit Hippocratis illa. 196. Lapis Lydius eorum qui Medicinam profitentur, est. 338. Apud plurimos Auctores ad Postulata quædam ex Hypothesibus & lascivientis ingenii luxuriis, deducta, non ad rei veritatem, componitur. 204.

— in Variolis, Eruptionis tempore, ubi de caloris gradu adplicando agitur, in incerto, ac lubrico, loco constituitur. 89.

— vid. Medica Praxis, vel Medicina.

Prognosis, in Variolis, Mortis vel Vitæ pendet à multitudine, vel paucitate Exanthematum. 234. Ratio hujus. ib. Bein Προγνωστικόν in Variolis Confl. raro fallax, & bonum, ex Tumore Faciei & Manuū Salivationi subsequente, desumendum. 84. ad 85.

Prostatæ in Gonorrhœa virulenta adeo tempore adficiuntur, ut in Cadaveribus efferato ulcere depastæ, repertæ fuerint. 205.

Protuberantiæ, in Rheumatismo, ad digitorum internas potius, quam externas, partes excitantur. 170.

Pruritus ferinus quomodo curandus. 175. ad 176.

In Pruritu ferino Sudor, omni mane qua ratione provocandus. 176.

— Venæ sectio, ante Remediorum usum, quare exigatur. ibid.

Ptifana in Peripneumonia notha, pro Potu. 169.

— in Pleuritide essentiali pro Potu. 165.

- Ptyalismus. *vid.* Salivatio.
- Pueri, Senes, Juvenes diuturno morbo confecti, *Venæ sectionem in Febribus vetant; & quare.* 30.
- Podagra non adficiuntur. 308.
- Pueris Febribus Intermitt. laborantibus calidiora exhibere periculosum. 57.
- Puerperæ Apoplexia Hysterica, quandonam frequenter satis adficiantur. 257.
- teneriores lecto decumbentes, quidnam emolumentum inde habeant. 280.
- Puerpera tenerior & Vaporibus obnoxia, ante diem decimum, è lecto se non contineat. 279. Si nimis cito surgat, Hysterica Adf. ex qua Lochiorum suppressio, cum diris & letalibus Symptomatibus, adficitur. *ibid.* Vix decima moritur, ex defectu virium, vel ex doloribus, à partu; sed inde plerumque, quod è lecto cito nimis surgat. *ibid.*
- Pulsus in Febre nova hyemali sanorum non absimilis. 348. 355. Languidus & inordinatus, si malè tractetur. 349. Qualis, ubi Phrenitis adest, & Mors instat. 356. In Hypochondriaca vel Hysterica Adfectione similis sanorum est, ut ut strangulari videantur. 262. In Variolis Confluent. die undecimo vix percipitur, adeo obruitur à Pure sanguis. 249.
- Pulvis adstringens in Mictu sanguineo & Sputo sanguineo in Variol. Confl. 441.
- Cardiacus in languore Febrili. 37.
- ex Cortice Peruviano in Febr. Interm. cum Vino rubro, aliis modis anteferendus. 189. Nec obest Vinum licet ad Continuarum speciem vergant. 190.
- Patrum. *vid.* Cortex Peruvianus.

- Pulvis Pyrius inventus non letalior fuit hominibus, quàm Malignitatis verbi inventio. 370.
- Punctura Tendinis dolorem duodecim horas post V. S. modo infert, qui circa Axillas præcipuè reperitur, tumore vix majore Avellana suborto; ex orificio interim ichore effluente, quod primum signum. 167. 523. Quomodo curetur. 523.
- Purgantia quælibet Naturæ quare inimica dicantur, ab Auctore. 335. Vel mitissimo quoque tumultum plerumque in corpore excitant. 58. Repetita sæpius, in Adfectibus ferre quibuslibet, præsertim in imbecillibus, & Infantibus, plurimum obficiunt, & Tumores in infimo ventre horum excitant. 268. Facilius vel difficilius operantur, pro corporis Idiosyncrasia; quare cautus sit semper Medicus, de ægri corporis, ad Cathartica ferenda aptitudine, vel ineptitudine; nam hujus neglectu Hypercatharses à levioribus etiam Purgantibus quandoque obortæ. 335. Si Correctiva dicta admista habeant, Catharsis redditur laboriosior. 212. Leniora in Robustis aliquando plus præstant, quàm validiora: Sic etiam aliquando teneriores homines fortissimis purgantibus æquè cedunt. 317. Post V. S. omnium maximè refrigerant. 368. Paregoricis viam sternunt. *ibid.* Et iis adjuvari possunt. 366.
- in Angina, lenitiva quandonam, post *Venæ sectionem*, exhibenda. 177. Et quandonam in posterum diem rejicienda. *ibid.* Cum Chalybe, & Chalybeatis, vel ipsorum usus tempore, quare non exhibenda. 268. confer. 272. In Chorea Sancti Viti. 361.

361. 506. Quoties & quando repetenda. 361. & 506. In Cholera morbo damnantur. 107. In Chronicis Morbis ante usum roborantium vel Digestivorum exhibenda. 316. Et ubi semel Corroborantia & Digestiva adhibentur, non intercalanda. 317. In Colica Hysterica, quandonam. 133. In Colica biliosa quando. 128. Ad tertiam vicem non numquam repetenda. 128. Quandonam augenda. 129. In Febricitantibus Coma quomodo inducant; illudque, Paregoricis exhibitis amolitur: quod si Auctori in mentem antea venisset, non Enemata tantum, sed ipsa Purgantia, in Febre Comatosa An. 1673. ausus dare fuisset. 357. In Comate Febrili, Calefacientibus excitato, nocent. 360. Purgantia, & V. S. alternatim iterata Contusiones tutissimè curant. 330. Corticis Peruv. usum ne præcedant. 56. In Diarrhoea, qualia. 113. 510. In Dysenteria, & quoties iteranda. 112. 509. 510. Ultra tertiam vicem Methodo Auctoris raro exigebantur. 112. Quandonam usum Laudani præcedere debebant; & quando non. 116. Post Febres Autumnales magis, quam post Vernales, necessaria; & quare. 37. In Febribus Continuis quando, & quare, tempestiva. ibid. In Febre Dysenterica. 118. Quoties instituenda. 119. Purgantia in Febre Epidemica quacumque, non exhibenda, in principio statu Morbi, nisi V. S. præmissa: quod probè observandum. 357. In Febre nova Epid. V. S. quare, & quandonam iteranda. ibid. Et hinc non

nocent, ut quidam putant, sed requiruntur, quia post V. S. propinata, summè refrigerant, & Narcoticis viam sternunt. 368. In Febre Erysipelatosa qualia esse debeant. 174. Et quale Paregoricum aliquando, hora somni, insuper exhibendum. 175. In Febribus Intermittentibus Diabetem senibus quandonam inferebant. 192. Febres Intermittentes, in Infantibus, ac ætate florentibus, longiores, ac peiores, reddunt. 56. 186. Proveciores ætate in mortis periculum conjiciunt. 56. Et indebitè celebrata Febres Intermitt. Vernales prolongant. 49. Non nisi certa conditione in Febr. Intermitt. Autumnalibus, tentanda. 54. Post Febres Interm. Autumn. penitus sublata, nec ante, ut periculosiores insecuturi Morbi, præsertim in provectioribus ætate, vitentur, necessaria admodum. 58. & vide 60. Eadem vero prius exhibita Morbum contumaciorem reddunt: & quare. 58. & 60. Hydropem quoque accersunt; neque eam natam tollunt. 59. Exhibenda proin tantum mense uno elapso, cum scilicet non modo Paroxysmi, sed etiam ea alteratio, quæ diebus iis, in quos incidere debuerat Paroxysmus, persentiscitur, prorsus evanuerint. 58. Qualia, quo tempore, quibus intervallis, adsumenda; quoties repetenda. ib. Si per Corticem Peruvianum curatæ fuerint, non exhibenda quin inde Recidiva fiat. 191. In Pestilentiali Febre post V. S. & Diaphoresin, quale exhibenda. 77. In Febre Quartana æque fere nocet ac Venæ sectio; non tamen usque adeo, nisi crebro repetatur. 54. Qualia post Febrem Scarlati-

latinam. 162. In Febre Stationaria. 495. 496. Sudoriferis mista, ante Paroxysmum exhibita, in Tertian. Autumn. commendantur. 55. Sudoriferis, in Tertiana duplici non admiscenda, & quare. ibidem. In Febre ex Tussi malè tractata nata, per tres dies instituta sufficiebant. 197. In Gonorrhoea virul. Remedia sunt, in quibus Curationis omnis Cardo vertitur. 208. Hydragoga præ ceteris conducunt. ibid. Diu continuanda; si enim nimis cito relinquuntur; reperta mane adhuc gutta Ichoris in summitate colis, redibit Morbus. ibid. Si ab ægro sumi nequeant, vel si iis pertinaciter refragatur, facile Lues oritur; & quomodo tunc succurrendum. 209. confer. 210. Post Luem Salivatione sublata, quamdiu vitanda. 215. In Hæmorrhagia Narium quandonam exhibenda. 178. 552. Lenientia nisi exhibeantur, post Hæmorrhagiam immodicam, recidiva metuenda. 46. In Hæmoptoe, præsertim repetita, Tabem inferunt. 178. Hydragoga dicta in iis, qui ægre purgantur, vix aliquid efficiunt; & si aucta dosi exhibentur tumultum Sanguinis promovent, & plus augent; hinc, ut bene operentur, leniora Cathartica iis admiscenda. 336. 337. Per *ἰμπεραὶ* quæ agunt, in Hydrope, Tumorem potius adaugent, quàm minuunt. 335. ad 336. In Hydrope præ ceteris Morbis, validissima requiruntur & celerrima; ut Aquæ maxima celeritate, quam ægri vires ferre queant, exantlentur. 335. & 336. Quæ vel segnius vel mitius operantur quare efficiunt magis quàm prosunt.

335. Hinc Curationis cardo in Hydrope pendet ab exacta inquisitione, num æger facile, num difficile Catharticis cedere soleat. ibid. Fortiora, & nimis moventia, justo debilioribus sunt præferenda, quia Laudano occurrere hodie certo possumus. 336. Singulis diebus exhibenda; & quas ob causas. ibid. Non numquam verò dies unus aut alter intercalari potest. ibid. In Hydropicis promptè Catharsi cedentibus quænam. ibid. Varia plura. 515. ad 516. Duo Palmaria, pro iis qui ægre purgantur, cæteris *σπασμώτερα*, sunt Elaterium & Infusio Croci Metallorum. 337. Ubi per roborantia, vel & lixivialia curamus, exquisitè vitanda: revocant eadem ilico jam recedentem tumorem. 345. Frequentiora in Hystericis id modo efficiunt, ut *Materiæ biliosæ viridis*, uberior enascatur seges; & quare. 191. Hystericam Adf. sæpè invitant, ubi contrarium foret, si ejus fomes in materia aliqua involveretur. 265. confer. 263. In initio quare & quando. 267. In leviori specie omittenda. 271. In Hystericæ Adf. Paroxysmo ubi Dolor urget post V. S. quandonam instituenda, ante usum Laudani. 276. & 277. In Ilia- ca Passione fiunt Emetica. 45. 128. 365. Licet fortissima, Intestina non permeant. 365. In Ileo vero non exhibenda prius, quàm roborato ventriculo, quin alias Emetica evadunt. 45. In Ileo ex Torminibus ventris, in Febre Epid. nova, fortissima exhibenda, quænam. 365. Si evomantur Paregorica prius exhibenda. 365. ad 366. Ope Paregoricorum retinentur, & operationem suam deorsum sistunt, licet

licet paradoxon videatur. 366. Pro Infantibus optima quæ ex Rhabarbaro cum Cerevisia. 367. In Lue Venerea quare non exhibenda ad corpus pro Salivatione præparandum. 212. In Mictu Sanguineo, à Calculo, post V. S. 443. In Nervosis Adfectibus repetita, sæpe congrua; ut in Chora Sancti Viti. 360. In Peripneumonia notha post V. S. crebriora, præsertim ubi hæc reiterari non debet. 168. 498. Quo die iteranda. 169. In Peripneumonia vera non conducunt. 169. In Phrenitide, ante Narcotica, assumenda. 41. In Phrenitide à Calefacientibus inducta, nocent. 360. In Pleuritide Symptomatica ad finem. 153. In Pleuritide Vera post V. S. 166. In Podagra cur Empiricis quibusdam, eadem celantia adstute, existimationem conciliarunt cum damno ægrorum. 311. Ad Materiam Morbi ejiciendam, neutiquam conducunt. 309. ad 311. Sed Materiem ab articulis intus repellunt, & Morbum retrocedere faciunt. 310. Hinc Podagricis lædunt. 316. Adeoque nec in Paroxysmo, nec post eum, neque ante ipsum, neque Vere vel Autumno, exhibenda. 310. Paroxysmum sæpe accerunt, etiam lenia; nisi Laudanum insuper adsumatur, tum non nocent, ut tempore observavit Auctor. 443. 444. Inter V. S. exhibenda, quando Metastasis materiæ ad Pulmones adest. 328. Exhibenda quoque Manna ubi Mictus Sanguin. adest. 444. 553. In Rachitide ex Febr. Autumnali qualia esse debeant? Non vero nisi Febre fugata exhibenda, & quare. 59. ad 60. In Rachitide vera quandonam locum habeant. 269. In

Rheumatismo qualia. 200. 499. Post diem octavum ab ultima V. S. qualia exhibenda. 172. Post tertiam V. S., sæpius iteranda, ut Sanguini parceretur, & Paregoricis locus daretur, satius fore, quia tum ab his non figitur Morbus, Auctor tempore didicit. 200. Post Salivationem Mercurial. in Lue Venerea non exhibenda, quia Recidivæ causa esse possunt. 213. & 214. In Tussi convulsiva Puerorum, quomodo juvent. 195. In Tussi Epid. 1679. continuanda donec convalescat. 195. 197. In Rumore Abdominis Infantium nimis repetita, horum plurimos interfecere. 269. In Tumoribus Abdominis Infantium, post Febres Intermittentes diuturniores, indicantur. 60. In Tumoribus Abdom. Infantium, ex Rachitide vera, non nisi semel vel bis, ante usum Alterantium, admittant. 269. In Variolis, initio an conducant. 87. Et quid mali producere possunt. 88. Sanguine nondum inquinato, Variolas distinctas reddunt. 238.

Purgantia In Variolis Anom. 238. Post Variolas Confluentes curatas. 252.

Purgantibus ægrè (209.) Salivatio etiam Mercurialis ægrè plerumque instituitur. 214.

Purgationis Omissio post Morbos Autumnales, plus quam ulla causa, multorum Morborum fons est. 38.

Pus in sanguinem quomodo resorbeatur & Febrem excitet. 233. Post Pleuritidem essentialem Thoracis cavo quando recondatur. 164. In Variolis in sanguinem copiosè regurgitans, in fine Morbi suffocat. 237.

Pustula in Gonorrhææ virul. initio,

dein in *Ulcus Aphthosum* abiens (a *Shanker* 205.) in non *Recutitis*, quomodo incipiat & procedat. 206.

Pustulæ in *Febre Erysipelatosa* non vulgari *Urticarum puncturas* referunt. 174. In vulgari adparent, ac si apes aut vespæ aculeis suis lædissent, & aliquando in *Vesiculas* attolluntur. *ibid.*

— *Variolosæ*, si *Maculas purpureas* interspersas habent, letale. 85.

— in *Variolis*, paucae omnem salutis spem constituunt; & e contra. 234.

Hujus Ratio. *ibid.* Ergo non propellendæ, ut densæ sint, cum ab horum numero discrimen pendeat, sed potius coercendæ. 235. Intempestivè autem & nimio opere prodeuntes, quot malorum causæ. 239. Profusissimæ verò fiunt; vel propter naturam ægri calidiorem; vel ob Calefacientia intempestiva; vel propter in lecto decubitus nimium & præmaturum. 235. confer. 237. Ne copiosæ nimis fiant quomodo præcavendum, aëre liberiore &c. 237. ad 238. 241. Ex frigore nimio flaccescere solent. 146. In *Infantibus sæpè* non prodire, quia *Epileptici* adfectus *Discretas* præcedere soliti, pro essentialibus adfectibus evacuantium ope fuere tractati. 243.

— in *Variolis Anom. nigris* Confluent. *An.* 1670. initio ab *Erysipelate* vel & *Morbillis*, vix, nisi *Eruptionis* die, aliisve signis, discernebantur. 125. *Pustulæ* nigræ augebantur pro ratione Calefacientium, & contra. 249. Materiem eruçant nec flavam nec fuscā, sed rubro saturato concretum sanguinem imitantem. 124.

— *An.* 1674.

nigredine fuliginem æquabant; & perpustillæ erant, ubi numerosæ. 145.

Pustulæ in *Variolis Anom. Discretis* *An.* 1670. quomodo ab iis generis *Discreti Regularium*, determinabantur. 124. Nigræ itidem fiebant, diebus ultimis. 124. ad 125.

— *An.* 1674. paucae ubi erant, non erant minores quam in aliis generibus, & rarissime nigræ. 145. 146.

— in *Variolis Regularibus* subflavum colorem naturaliter habent. 85. Nigredinem, quod Symptoma anomalum est, in summitate aliquando habuere, sed hæc Regiminis temperati ope, sensim per fuscum in subflavum colorem transibant. 85.

— Confluent. *An.* 1667. naturaliter quales; & quid de iis dicendum habuerit Auctor, vide 82. Copiosiores futuræ, quod patet, ex facie, primis diebus, ad instar pulveris & limatura acicularum undique respersa, prædicunt Mortem vel undecimo, vel decimo quarto, vel decimo septimo, involaturam, utut æger & sibi, & adstantibus bellè habere videatur. 234. Majores in manibus ac pedibus, quam reliquo corpore; & quo plus ab extremis distant eo minores 83. Causticam qualitatem, unde Cicatrices fiunt, si Regimine temperato tractantur, non induunt. 95. Crustis factis halitus putridos à materia purulenta in Sanguinem retropellunt. 92. Deprimuntur naturaliter, nec mali quid hoc portentat. 97. Sed tamen ignaros deterret, qui etiam in *Distinct. Variolis* augmentum expectant ante diem, non

non gnari temporis, quod Natura destinavit: Unde natus Rumor, de crebra Pustularum retrocessione. 98. Depressio ex frigore vel evacuationibus indebitis, quomodo superanda.

Pustulæ in Variolis Discretis An. 1667. magnitudinis Pisi grandiusculi fuere. 81. Maturescentes, die octavo in Facie, ex lævibus atque rubris, asperiores evadunt & subalbidae, & tandem magis flavæ: ubi in Manibus & reliquo corpore, progressu Maturationis minus asperæ, & albæ magis, conspiciuntur. ibidem. Desquamazione in facie & reliquo corpore, disruptione verò in manibus, abeunt. ibid. Post mortem ægri, quandonam elevantur adhuc & rubescunt. 84. Repercussæ ex frigore, vel evacuationibus indebitis, qui tractandæ. 97.

Putrefactiones humorum ultra modum retentorum, ut & Fermentationum varia genera, Classem unam caussarum universalium, Morbos producentium, constituunt. 19.

Q.

Quæstio, qui Morborum medela administrabitur, dum eorum causæ latent? solvitur. 66.

Quartanæ Febres, vid. Febres Quartanæ.

R.

Rachitides veræ rariùs occurrunt, nisi Intermittentes Autumnales, ex Constitutione Epid. prædominium habeant, quod nota u dignum. 60.

Rachitis vera, ejusque Curatio. 521.

Post Febres Autumn. nata, qualis; ejusdemque Curatio. 59.

Rachitis quomodo curanda una aut altera Purgatione, Linimentis, Vino & Cerevisia medicatis. 269.

Rationis Momenta adeo varia & subtilia, ut Theoria quæcumque plausibilis, iis innitens, à quodam pulchrè stabilita ab alio, tumque iterum ab altero, majoris adhuc verisimilitudinis specie, invertatur; quod tamdiu fiet, donec ultima humani ingenii potentia consummata sit. 371. ad 372.

Recidiva in Dysenteria, reiterationem Methodi Auctoris expetit. 114.

Febris, notatu digna, post usum Clysterum & Cathartorum, quæ Febrem prius quasi profligaverant. 36. Quid tum agendum. ibid.

in Febr. Intermitt. Cortice Peruviano curatis, ab Evacuantibus, Catharticis, Enematibus, inducta. 191. In Febr. Quartanis post Corticis Peruviani usum rarior, quam in Quotidianis ac Tertianis. ibid. In Gonorrhœa virul. ex Decocto Lignorum sæpe fit. 210. ad 211.

Recutitus seu verpus qui non est, Gonorrhœæ virulentæ initio, sæpe Maculam vel Pustulam, instar Morbilli erumpentis, in glandis quadam parte habet, in Ulcus mutandam, a Shanker dictam. 205. 206.

Refrigerans summum est Catharsis post V. S. 368.

Refrigerantia in Morbis acutis quid efficiant boni. 154. ad 155. In Febribus Malignis propriè conducunt, licet ibi errantes Medici per Calefacientia & Alexipharmaca sua Venenum suum, ita dictum, per cutis poros elimi-

eliminatum velint. 370. In Phrenitide instante, ut & calefacientibus induc̃ta. 359. In Podagra, ut Liquores refrigerantes, quare vitanda. 320. Externè adplicita periculosa. 329.

Regimen calidum, & Sudoris provocatio, in Febre Variolosa licet prodesse posse videantur, tamen, docente Experientia, nocent. 101. Methodo Auctoris planè oppositum, licet cum eo aliquando resurgant ægri, magnum infert discrimen, & Symptomata vehementer auget. 102. Sudores extorquens Phrenitidem inducit. 98. Sæpe Symptomata producit, post Sudores extortos nascentia, quæ Morbi malignitati falsò adscribuntur. 101.

— in Variolis quomodo noceat. 237. Quam mala Symptomata in Constitut. 1674. producebat. 146.

— vide Calefacientia & Cardiaca.

— calidius in Variolis tempore Expulsionis, quid efficiat, vide Calefacientia.

— temperans & refrigerans in Febre Variolosa videtur Auctori Methodus præ cæteris optima. 102. Ptyalismum adjuvabat. 103. Non metuentum, quamvis Sudores copiosi adsint. 101.

— in Variolis Confluent. Symptomata duo pessima, Mictum Sanguineum & Maculas purpureas, antevertit; Quæ duo ni præcaveantur, ubi jam adsunt, non curantur. 237.

— minus adcuratum, in Variolis, Plebi quàm Divitibus, illi Variolas æquiores reddit, quàm his. 92.

Regimen in Variolis quale conducat vel obficiat, non ex Opinionibus, sed ex Practicis Observationibus, deduci tantum debet. 240.

Regula, in Variolis, Venæ sectioni & Evacuationibus, quam obijciunt, à Circumferentia ad Centrum non esse movendum, nullius est; & quare. 88.

Remedia, vide Medicamenta.

Remediorum seu Formularum ingentem Sylvam quare non tradat Auctor. 16.

— Formulæ in Praxi magis familiares. 488. ad 489.

Renes dolore quonam, nascente Calculo, sensim adficiantur. 442.

Repellentia in Podagra, externè adplicita, periculosa. 329. Quid mali præstent. 327.

Res 6. non Naturales peccantes corpora nostra, ad hujus illiusve Morbi Epidemici generationem, non minus ac manifestæ aëris qualitates, magis minusve disponunt. 22. Qui Morbitum Varii exoriuntur pro Constitutione Anni & humorum dyscrasia. 160. ad 161.

Respiratio, in Pleuritide Essentiali metu Tussis ab ægro reprimitur. 163.

Rheum-barbarum in Dysenteria sine alio purgante leni exhibitum, quare non conducat. 111. ad 112. Cum Cerevisia in Infantibus purgans optimum. 367. Quomodo paretur. ibid.

Rheumatici Dolores nimium à lecto, in Febribus Epid. abstinendo, præsertim in declinatione oriri possunt; & quid tum agendum. 139.

— quidam pro Scorbuti Symptomatis habentur, incautis. 172.

Rheumatismus omni tempore, sed maxime Autumno, incessit, & ætate florentes præcipuè adficit. 170.

Hic

Hic morbus à Scriptoribus sicco pede tractatur, vel quod eum pro Arthritide habuerint, ubi sine Febre adparebat, licet examinanti multum differre constet: vel, quod de novo ad reliquam Morborum Iliada accesserit. ib. Frequentissimus nihilo minus est, & licet, Febre depulsa, raro occidat, tamen ob dolorem insignem & diuturnitatem, notatu dignissimus. ibid. 498.

Rheumatismus inflammatoriam causam agnoscit, ut patet argumentis. 171. Ex frigore subitaneo post calefactionem plurimum oritur. 170. A calore lecti intenditur. 171.

— incipit cum Febre ejusque Symptomatum caterva. 170. Quæ sensim evanescens manente dolore, sæpe recrudescit, & quando. ibid. Febris pro Morbo primario habenda; & reliqui Adfectus, à quibus nomen mutuatur Morbus, tanquam Symptomata, quæ à materia febrili, à modo criseos, à parte in quam Materia ruit, pendent. 159.

— non eodem vigore, Febre depulsa, sed, ad instar Arthritidis, subinde laceffit. 170. Et licet, tum Mortem quidem non inferat, quare tamen non contemnendus. ibid. confer. 498.

— Protuberantias in digitorum interna potius, quàm externa, parte excitat. Et membra motu omni, cessatis jam doloribus, sæpe ad mortem usque privat, digitorum articulis inversis. 170.

— sponte sæpe tandem desistit. ibidem.

— Podagram in Fæminis gracilioribus adolescentibus, vel constantioris ætatis, aliquando mentitur. 443.

Rheumatismus Verus quomodo curandus. 170. ad 172. 198. 499. Indicationes Curativæ. 171. Venæ sectio in latere adfecto ilico instituenda. 171. A sola V. S. Curationem sumi debere censebat Auctor. 171. 317. Quoties hæc iteranda, & quando. 171. 499. confer. 171. Calefacientia exhibita Venæ sectionis frequentioris causa esse possunt. ib. Enemata è Lacte Sacchar. diebus à V. S. liberis, injiciebantur. 171. ad 172. 499. Medicamenta incrassantia, refrigerantia, & simile Regimen, nec non Dietam adæquatam, ex Decoctis farinosis, Jusculis carneis tenuissimis, commendabat. A lecto de die per aliquot horas abstinendum volebat. 171. Sed vidit, tempore, Auctor hujus Methodi per V. S. frequentiores incommoda. 198. ad 199. ibid. Hinc eam mutavit. 198. Et per Dietam tenuem, ut Serum Lactis, curare cum successu tentat, in quibusdam. 199. Sed in aliis post secundam, vel ad summum tertiam, V. S. jam Cathartica & insuper Paregorica exhibet. 200. Et sic incommoda à V. S. præcavet. 199. 200.

*In Rheumatismo Paregorica quodam tempore vetabat Auctor, utut sæviret dolor, si per V. S. solam curatio expectebatur, quia, ut putabat, Morbum figebant; hincque V. S. frequentiores postulabant, neque in vigore Morbi *αυαλυντικήν* promissam præstabant. 171. 200. Hinc ipsa non nisi, octo diebus elapsis, post Cathartica, sed lenitiva, exhibita, propinabat; & quare. 172. Verum, ubi Methodum mutavit citius Paregorica quoque exhibere jubet, ubi citius Cathartica exhibentur. 200.*

*In Rheumatismo Dolores V. S. immi-
nuti, non tamen omnino evanescent;
sed tantum ubi Vires refarcitæ; ma-
ximè æstate subsequente. 172. Verum,
si æger perversa Methodo forte tra-
ctatus, tum Dolores vagi, per omnem
vitam sæpe ægrum discruciant, qui
incautis Scorbuti Symptomata haben-
tur. ibid.*

———— inveterato V. S. iterata, Fon-
tanella, & Spiritus volatil., cum
Vino Canarino omni mane & sero ad-
sumti, Curationem absolunt: sed
longius spatium, inter Venæ sectio-
nes reiterandas, est interponendum.
173. Venæ sectione illa iterata Mor-
bus hicce eruitur, vel eo deducitur
ut aliis facile curetur. ibid.

Rheumatismus Scorbuticus quidam da-
tur, licet inter verum Rheumatif-
mum & Scorbutum discrimen inter-
cedat; & quare ita vocetur. ibid.
Describitur cum sui differentia à ve-
ro Rheumatismo. ibid. Protuberantias
tales ac Verus, in partibus raro ex-
citatur. ibid.

———— Fæminas præ reliquis ado-
ritur, tum Viros imbecilliores. ibid.
Hinc fere videtur species Adfectus
Hysterici, sed Hystericiis remediis
non cedit. ibid.

———— Corticis Peruviani longiori
usui ortum sæpe debet. 133. & 186.

———— Chronicorum præcipuorum
ad instar, in diuturnitatem longam
aliquando se protrahit. 173.

———— quomodo curandus. 174.

Risus ex Hysterica Adf. sine ulla sæpe
caussa. 259. 264.

Roborantia, & Cardiaca, in Febrib.
Intermitt. Autumn. ad Naturam sub-
levandam, quando, & cur, conve-
niant. 56.

Roborantia in Hydrope eadem sunt,
quæ in Podagra, paucis additis, tra-
dita. 344. Quando & quare conve-
niant. 343. ad 344. In Hystericæ
Adf. curatione, post Evacuantia,
dentur; inter hæc primarium Cha-
lybs. 267. ad 270.

Rosa, in Igne sacro occurrens, quid
vocetur. 67.

Rubedo, in Variolis, in interstitiis
Pustularum, instar Rosar. Damasc.
octavo die incipiens, bona, si cito re-
cedit malum. 81. 84.

Ructus nidorosi, in Podagræ irregula-
ris Paroxysmorum intervallis, ve-
xant. 306.

Rumor, de Variolarum retrocessione
crebra, unde ortus. 98.

S.

SAL Absinthii cum succo Limonum, ad
Vomitum, in Ileo vero. 45.

Salia lixiviosa, in Hydrope, ad Diu-
resin movendam, præ ceteris optima.
343.

Saliva in Variol. Confl. viscida est un-
decimo die. 83. Quibusnam tum suc-
currendum. 96. 505. Cardiacis dictis
præpropere incrassatur ita, ut per-
niciēs inducatur. 241. Vid. Saliva-
tio.

Salivatio, in Hysterica Adf. similis ac
ex Mercurio. 264. In Febre Dy-
senterica rarò juvabat, uti in Fe-
bre Variolosa solebat. 116. confer.
102. Febrem Variolosam, uti ipsas
Variolas, placidè solvere solebat.
102. ad 103. Et Maculæ purpureæ hac
ope evanescebāt. 103. Quomodo hic sub
finem Morbi excitatur. 99. Estque hic
critica excretio; cujus defectus, nisi
aliam ars suggerat, ad aliquot septi-
manas

manas perseverat Morbus. ib. Numquam non salutaris quoque hic; hinc ubi adest cavendum à V. S. & Enematibus. 103. Aliquando, per ipsam Naturam, in Diarrhœam vel in Sudores profusos, pervertebatur. 99.

Salivatio Mercurialis, in Lue Venearea confirmata, omnem numerum absolvit, juxta Sydenhamum. 211. Sed Gonorrhœam non valet sanare. 151.

———— quomodo instituenda. 212. ad 217. Ad præparandum corpus, Catharticis, Balneis, V. S., non indiget; & quare. 212. Sustinetur melius, si nihil prius agatur, quàm si evacuantibus, ante prælium, quasi incisi sint Nervi. ibid. Quonam Unguento fricandæ partes ad eam excitandam; & quænam fricandæ. ibid. 214. 518.

———— quomodo & quando incipiat à Frictione. 518. Et si non procedat, qua ratione per Turbith minerale provocanda. 212. 214. 519. Antequam bene adsurgat, sæpissimè oritur Diarrhœa, quæ Opiatis reprimenda. 213. Difficulus in iis, qui difficulter purgant (209.) excitatur. 214. Et non nimis obstinatè tum urgenda, quin Dysentericæ dejectiones modo fiant, aliaque horrenda Symptomata. ibid. Quomodo tum procedendum. 215.

———— certis gradibus modificanda, ne ægrum in periculum conjiciat; & ad quamnam copiam evehenda. 212. 519. Lintea, ubi permutanda, sint prius usitata. 212. Si violenta nimis, Cathartico reprimenda paulum. 213. 518. ad 519. Si languescat nimis cito, quomodo Mercurio

dulci exstimulanda. 213. 214. 519. Ubi per Diarrhœam enervatur, quid agendum, ut revocetur. 213. 519.

Salivatio Mercurialis Diætam qualem exigat. 216.

———— convalescente ægro, non cito cohibenda, sed leviter sustinenda. 213. Et Oris post eam exulceratio sibi tantum concedenda. ibid. Vide Os exulceratum.

———— Methodo Auctoris instituta, vario de nomine expeditior, itidem minus periculosa, recidivæ minus obnoxia. 216.

Salivationis Mercurialis effectu, qui debilitati & exhausti in Galliam cur sæpe migrare cogantur. 217.

Salivatio in Variolis Anomalis Confluent. An. 1670. major erat adhuc, quàm in aliis. 125.

———— Discretis An. 1670. adfuit æquè ac in Confl. in hac specie. 124. Quid inde concludatur. ibid.

———— nigris pessimis An. 1674. itidem salutaris adfuit. 148. Hic verò, ante undecimum diem, sine periculi metu, quomodo sisti poterat. 147. ad 148.

———— Regularibus Confluentibus, in Adultis symptoma genuinum, non minoris momenti, quàm Pustulæ, ac partium Tumor, est; & semel tantum ipsam abfuisse norit Auctor. 83. Harum individuus comes esse debet; & quare. 236. 503. Et certius vexat Adultos, quàm Diarrhœa Infantes. 83. 93. 503. ad 504. Omnino non sistenda, sed Naturæ committenda. 94. Eliminandæ quippe Materiæ morbificæ inservit. ibid. Est enim, in iis, è præcipuis Naturæ Evacuationibus,

Et in locum istius, quæ per Pustulas majores in Discretis contingit, substituitur. 93. confer. 83. Et in tuto ægrum ponere solet. 84.

Salivatio in Variolis Regularibus Confluentibus prodit Eruptionis initio, aliquando post. 83. 93. 503. Cessat, vel saltem, saliva spissa facta, minuere *Et* decrescere incipit, undecimo die, licet adhuc dum utcumque perduret. 83. 84. 93. 94. 249. 504. Sed Tumore Faciei ac Manuum compensatur. 78. 84. 93. 248. 249. 503. Ubi integrè cessat, Faciei quoque evanescit tumor, sed Manus tum intumescunt. 83. Aliquando, sed raro, postquam cessavit, recrudescit. *ibid.*

———— ne sistatur ante diem undecimum cavendum; periclitatur enim tum. æger *Et* quare. 93. 84. Si definit sponte sua, undecimo die, neque facies intumescat, aut ejus loco manus intumeant, aut hi tumores ejus vicem subeuntes, evadant, moritur æger. *ibid.* Quibusnam verò cum Symptomatibus. *ibid.* ad 85. Promovenda Cerevisiæ tenuis, *Et* liquorum temperantium usu. 93. 96. ad 97. Sustainenda Narcoticis, præ aliis quibuscumque. 93. ad 94. *Et* 204. A Paregoricis licet parum imminuatur, tamen non penitus cessat, sed, intervallis ab assumpto Anodynis remotis, melior resurgit; tum quia vires ægri restauratæ; tum quia hoc modo melius saliva excoquitur. 248. Protrahenda Narcoticorum itidem ope, quod aliquando ad diem decimum quartum, *Et* ultro, fit. 94. Suprimitur calore nimio, calefacientium usu, *Et* abstinencia à liquoribus Sanguinem diluentibus. 93. 125. Tum à pure re-

sorpto quoque sistatur. 236. Revocanda, si justo citius suppressa, itidem Narcoticorum ope. 94. Suppressa ex Salivæ visciditate, ut æger in suffocationis sit metu, Emeticum juvare solet, *Et* fortius. 96. ad 97. Tamen certius in hoc casu adhuc medium desideratur. *ibid.*

Salus in Variolis pendet ab Exanthematum paucitate; *Et* è contra. 234. Ratio hujus. *ibid.*

Sanguinea massa repurgatur ordinario, in humano corpore, si Naturæ negotium permittitur, spatio 336. hor. h. e. dierum 14. aut circiter. 52.

Sanguinis jactura major Apoplexiæ speciem Puerperis Hystericis, aliquando infert. 257.

Sanguis Spirituum Fons *Et* Origo. 266. Per se imbecillior in pueris. 30. Spirituum copia destituitur in decliviori ætate, atque in Juvenibus diuturno morbo confectis. *ibid.*

———— purus in Dysenteria quando. 109.

———— in Pleuritide vera, V. S. eductus, instar sevi liquati spissus, in superficie quasi purulentus, post primam saltem Venæ sectionem. 164. 497. Esecta vena si recto flumine, ob orificium angustius, non profiliat, cur Cuticulam albam non contrahat, ignorat Auctor. 164. Et tum hujusmodi Sanguis eductus levamen quoque non infert ac aliter. *ibid.* Recens extractus, digito si agitetur, crustam illam tenacem, albam, non contrahit. 165.

Sanguis Pleuriticorum Sanguini V. S. educto similis, respectu cuticulæ albæ, reperitur, in Dysenteria inveterata. 115. In Febre Epid. Const. 1673. ad 1675. in initio. 136. 138.

In

In Febre Erysipelatosa, plerumque semper. 174. *In Febre nova Hiemali.* 349. 355. 357. *In Febre Pestilenti.* 73. & 74. *In Hæmorrhagia Narium.* 177. *In Peripneumonia notha.* 168. *In Pestiferis; ubi simul calorem Sanguinis Pleuriticorum & Rheumatismo laborantium, quoque habet.* 74. *In Podagra.* 320. 322. 328. *In Rheumatismo, ubi tam similis ac ovum ovo.* 171. *In Variolis Confluent. ante Eruptionem.* 251. *Post Variolas Confluentes.* 252. *Post Variolas vehementiores.* 98.

Sanguis in Febre Contin. Epid. 1665. *à Pleuriticorum Sanguine differebat.* 62. ad 63.

Sanitas ex Febre, ubi Natura vi sua Materiam morbificam superans criticè eam norit solvere. 20.

Sarsaparilla, in Lue Venerea curanda, evacuando fortè potiùs, quàm vi specifica, agit. 14. 68.

Scientia intuitiva non datur, qua fretus Principia quis queat substernere, quibus mox superstruat: sed humanæ naturæ abjectior conditio, intra angustos cognitionis, quam de quinque sensibus haurire potest, limites coarctatur. 340. & 348.

Scioli, in speculationibus spem omnem ponentes, majorem edunt stragem, quàm Morbi, eorum auxilio destituti. 196.

Scorbutica Symptomata, non nunquam, vocantur Dolores à malè curato Rheumatismo superstites. 172.

Scorbutus non tam frequenter, apud nos, occurrit, ac quidem vulgo putatur; hoc enim si foret, in immensum cresceret, & omnem ferè Morborum numerum absolveret. *ibid.* *Verum istius nomine plurimi donantur Ad-*

fectus, qui vel Morborum Fientium effecta; vel infelices reliquæ Morbi non perfectè curati, tantum sunt. *ibid.* *Dein illa, quam sæpè Medici Scorbuto scribunt diuturnitatem Morborum, ipsorum tantum perversæ curæ debitam.* 39.

Scorbutus quænam habeat Symptomata. 526.

— quibusnam curetur. 527.

Scorbutus ubi desinit, ibi incipit Hydrops, vulgaris Regula quomodo accipienda. 172. ad 173.

— aliquando Febris Quartanæ Symptoma est. 50.

Scroti inflammatio & tumor, in Gonorrhæa virulentæ adfectione, oritur vel à motu violentiori. 206. 211. *Vel ab adstringentibus, quorsum referuntur Aquæ Minerales.* 206. 210. *Curatur Fotu emolliente, Cataplasmate, Catharticis, & refrigerantibus; tum & V. S. si tumor & dolor urgent.* 211.

Senes, in Febribus Interm. Catharticis debilitati sæpè in paroxysmi primo rigore diem obeunt. 56. ad 57. *Morbis Chronicis quare Juniores magis obnoxii.* 316.

— in Podagra, sine exercitio, nunquam levamen obtinent; sed à materia inconcoctili, eorum naturam Viribus superante, tamquam à Veneno enecantur. 326.

— & Senescentes Febrem Quartanam difficile ferunt. 50.

— Juvenes diuturno morbo confecti, Pueri, Venæsectionem in Febribus vetant. 30. *Et quare.* *ibid.*

Serum Lactis in Dysenteria frigide adsumitur, & tepide per Clysmâ injicitur, Constitutionis 1669. & 1672. *initio.* 114. 510. *In Febre Variolosa, Diarrhœa vexante, usu veniebat.*

102. *Ptyalismum quoque hic promovet.* 103. In Rheumatismo magna copia usurpatum, loco *V.S.* præsertim adeo frequentioris, substituit Auctor. 198. Sed in iis, qui ætate proveciores, vel qui *Vino* & spirituosus potati, nocet multum ac *Hydropem* infert. 200.
- Serum Lactis in Morbis pluribus quam Rheumatismo, *V.S.* loco substitui posset, ni obstarent præjudicia vulgi, quod Remediorum pompa decipi vult, qua ipsos moribundos, ceu bestias immolandas, ornari cupit. 199.
- *Dysenteriam curavit exhibitum in lecto, cum determinatione ad Sudores, per 24. horas.* 114.
- Shanker Ulcusculum est in pudendis ex *Lue Venerea*, primum Morbi indicium. 205. In quibusnam contingat, & in quibusnam non. 206.
- Siccitas & Sudatio, in Febris, hoc illove tempore, species harum præcipuè distinguunt; si modo Febres, sibi permissæ, incongrua Methodo non fuerint perturbatæ. 157. Exemplavide 158.
- partium externarum, in Febre Cont. 1661. qualis fuerit. 28.
- validissima An. 1681. Vere & Æstate invaluit. 233. Hæc Variolas istius Constitut. acutiores quam reddiderit. 234.
- Singultus, tamquam Februm Continuarum Symptoma, consideratum. 42. Senibus plerumque accidit, post evacuationes copiosas: & sæpe mortis prænunciator. 42. Sæpe ex turbis ac tumultu, ab asperioribus Medicamentis, ortum ducit; tum semine Anethi, aliisque, quasi specificis, non curatur; *Diascordii* verò larga dosi tollitur, quod Naturam adjuvat, per se non aptam sedare tumultus.
43. In Febre quadam qualis fuerit, & quando recesserit; si non nimis Remediis excitaretur. 358. Aliquando Cortice Peruviano curatur. ibid.
- Sitis intensa in Hydropicis, unde. 334. Quomodo fallenda. 345.
- Somnolentia in Variolis Regul. Discretis, prodituris jam, in Infantibus præsertim, præcedere solet. 80.
- Somnus in Podagricis placidus tempore Paroxysmi conciliatur vectione in curru. 326.
- Spasmi Epilepsiæ persimiles ex Hysterica Adfect. , in quibusnam fæminis oboriantur. 257.
- ex Lochiorum suppressione post Phrenitidem, lethales. 279.
- Infantum, vid. Epileptici adfectus.
- Species Febris Continuæ quomodo ex aliis expiscetur. vid. Febres Continuæ.
- Februm, Sudatione vel Siccitate, distinguuntur, vid. Siccitas & Sudatio.
- Species Morborum quid constituat æquè ignoramus, ac quid Equum, vel quid plantam quamdam, constituat. 66.
- Morborum unde. 12.
- Specifica Differentia, vid. Differentia Specifica.
- à Nugivendulis, in Morbis Typo indutis, non tantum, sed & in minimè formatis, ut læsionibus externis, itidem deprædicantur. 330.
- neque in Acutis neque in Chronicis habemus; & quare. 344.
- in Contusionibus decantata, id efficiunt, ut vera curandi Methodus divertatur. 330. Talia sunt Sperma

Sperma Ceti, Tegula Hybernica, &c. 330.
 Specifica Medicamenta, *vid.* Medicamenta Specifica.
 ——— desideranda in Morbis Acutis, tam ad evitandas Evacuaciones, quas Natura indicat; quàm ad præcavenda mala seu aberrationes, in quas sæpè dilabitur Natura. 13. ad 14. In Morbis Chronicis requiruntur ad Speciem Morbi destruendam. 14.
 ——— ad Podagram non novit Auctor, ac ea Promissores quoque ignorare veretur. 330.
 Specificum in Febribus Intermitt. est Cortex Peruvianus. 332.
 — in Lue Vener. esset, quod sine Evacuatione eam curaret. 207.
 Sperma Ceti in Contusis non est Specificum. 330.
 Spinæ Cervinæ Syrupus, in Hydropicis facile purgantibus, Aquas solus sufficienter, educit. 336. In difficile purgantibus, summa dosi nihil agit. *ibid.* Hujus in hoc Morbo facultates; sitim tamen excitat inter operandum. *ibid.*
 Spiritus Vini ut in Chirurgia tantum usui veniret, optandum esset. 169. In Ambustis, omnibus remediis anteponendus. *ib.* Quomodo adplicandus. *ib.*
 ——— Nunquam in adsuetis, subito ac derepente est interdicens, sed sensim ab eo abstinendum, ne Hydrops fiat. *ib.*
 ——— Ustulatus in Tussi, *An.* 1675. & Spiritus non modo Pleuritidem & Peripneumoniam invitabant, sed mortis periculum inferebant. 152. 154.
 — Vitrioli, *vid.* Vitrioli Spiritus.
 Spiritus Volatiles foetentes, ex Animalium partibus, facultates habent, quæ subiectis suis haud primitus ine-

rant; sed Creaturæ ignis sunt, easdem possidentes virtutes, ex quacumque etiam parte procudantur. 276.
 Spiritus excitans in Apoplexia. 507.
 Spirituum ἀταξία. *vid.* Α'ταξία Spirituum.
 — copia destituitur Sanguis in Senibus, ac in Juvenibus diuturno morbo confectis. 93.
 — debilitas Hystericam Adf. caussans aliquando adventitia est. 282.
 — Fons & Origo Sanguis. 266.
 — Subsidentia in Hystericis plerumque occurrit. 259.
 Sporadici Morbi, *vid.* Morbi Intercurrentes.
 Sputum in Pleuritide essentiali, *tossien-*do, initio redditum, tenue & parcum; sæpè particulis sanguineis, intermixtum. 163. 351. Progressu copiosius, magis coctum, & Sanguineum. 163. 497. Et pro ratione liberioris expectorationis sanguineum esse cessat. 163. 497. Aliquando verò tenue remanet, (reliquis Symptomatibus non remittentibus) ad momentum interitus ægri usque. 163.
 — Sanguineum in Variol. Confl. quomodo adhucdum curari possit. 378. ad 379. Ex Pulmonibus letale Symptoma, sed rarum; initio tum Variol. Confl. Pustulis nondum erumpentibus, vel plerisque adhuc latitantibus, contingens, & indubitato mortem prænuntians. 86. 97. 371. 378.
 Squamæ, in Febre Scarlatina, furfuraceæ ad instar farinæ, bis terve redeuntes. 162.
 — in Variolis Confluent. eo lentius abscedunt, quo Morbus atrocior. 82. Et furfuraceæ, indolis corrosivæ, foveas excavant, quas prius obtegunt, dein deturpatur inde vultus. *ibid.*
 Squa-

Squamæ in Variolis Discretis, succedentes Pustulis in facie, foveas implent, & impediunt quo minus, primis diebus, cutis inæqualitas adpareat. 81.

Stationariæ Febres, vid. Febres Stationariæ.

Status, in Variol. Regul. Confluent. præcedens Eruptionem. 81. ad 82. Tempore Eruptionis. 82. Eruptioni subsequens. 82. Tempore Desquamationis. ibid.

Discretis præcedens Eruptionem. 79. ad 80. Eruptionis, die quarto. 80. 84. Maturationis incipientis, die octavo. 80. Maturationis progredientis. 81. Maturationis peractæ, die undecimo. ibid. Desquamationis, die decimo quarto vel quinto, & ultro. ibid.

Separationis, in Variolis, quid. 86. Si velox nimis, quid mali inferat. 87. Quare longius tempus ad suum opus exigat, Separatio, quàm Expulsio. 86.

Sterilitas Mulierum ab Hydrope Testium, ex Hysterica Adf. diuturna. 266.

Stillicidium in Gonorrhœa virul. quale. 206.

Stipticus Liquor Sydenhami ad Hæmorrhagiam Narium, & partium externarum. 178.

Stragula in Variolis ne obruant ægrum. 91. Modica esse debent, ut in sanitate solet. 250. 251. Si calefaciant nimis, & auferantur, inde Eruptio sæpe acceleratur. 90.

Stragulis in Morbillis An. 1674. non obruendi erant Infantes. 144.

Strangulatus Uteri docet Hysteric. Adf. ex ataxiæ Spirituum ortam.

261. ad 262. Est Epilepsia, ex Hysterica Adf. caput obsidente, in Fæminis sanguineis, & Viraginibus ferè, quæ describitur. 257. Unde excitatur. 261. ad 262.

Structuræ corporis humani cognitio quo usque pertingat. 339.

Studia Podagricis nocent. 308. 323.

Studio assiduitas nimia Melancholicos sæpe reddit homines. 260.

Stupor, in Febre Epid. An. 1673. ad 1675. in Infantibus major erat quàm Constit. præcedenti. 141. Uterque nullis remediis debellari poterat, & Naturæ si committeretur sensim recedebat. ibid. Confirmatur Historia. 142.

Stygmata in Variolis, vid. Cicatrices.

Succus Limonum cum sale Absinthii, ad Vomitus in Ileio vero. 45.

Plantaginis, & Urticæ, in Mensium Fluxu immodico. 283.

Sudatio vel Siccitas, in Febribus quid nos doceant. vid. Siccitas & Sudatio.

Sudor Naturæ Methodus genuina & accommodatissima, quæ Febrilem materiem digestam, per corporis habitum expellit: quod tamen Ars imitari non audet, sine discrimine, ob plures rationes. 311. ad 312. 369.

artificialis in Contusis adeo extortus, loco quod prodesset, ægrum in periculum vitæ conjicit. 330.

in Febribus quibusdam elici potest, in aliis non. 63. 158.

tum artificialis, tum naturalis, nec non spontaneus nocturnus, & similis, quid boni, quid mali præstiterit, in Morbis, ac quomodo provocandus, in Febre Epid. nova. 349. 356. 358. 359. In Febribus Intermitt. 186. In Febre Pestilentiali. 72. 75. 76.

76. 158. *In Febre Variolosa.* 99.
 101. 102. 158. *In Podagra.* 312.
 328. *In Tussi Epid. spontanei boni,*
alii letales. 152. *In Pruritu ferino.*
 175.
Sudor coactus, in Febribus, Phreniti-
dem, & Pleuritidem Symptomatic.
infert. 164.
Sudores vel Critici sunt, vel Sympto-
matici. 140.
 — *in Morbis non tuto arte Medica,*
sed Naturæ tantum ductu, eliciuntur,
Pestem si demas; quia adsequi non
possumus, quanta materiæ pars ex-
cretioni illi obeundæ est parata. 311.
ad 312.
 — *ante materiæ coctionem, sine pe-*
riculo non expelluntur. 369. *Quam*
Coctionem sola Natura novit, non
ars. ibid. *Et Morbos, vel Febres, le-*
vantes, ii sunt, qui à præviâ dige-
stione, fatiscente Morbo, fluunt,
non qui primis diebus erumpunt. 140.
Qui Febrium initio prodeunt sunt
Symptomatici; unde liquet quàm in-
opportunè Sudores initio Febrium ex-
primantur. 370.
 — *Anomali copiosiores Dysenterias,*
ac Febres Variolarum Anom. conco-
mitantes, cur nullius fuerint emolu-
menti. 158.
 — *In Febribus suo genio permissis,*
eos non expellentibus, temerariè ex-
torquentur. 140. *In Juvenibus, cali-*
dioris præsertim temperamenti, ægrius
proliciuntur. 72.
 — *in omni Malignitatis specie non*
conducunt ad eliminandas partes
morbificas. 154.
 — *Nocturni in Febre Epid. An.* 1673.
ad 1675. reconvalescentibus super-
veniens, quomodo superandi. 143. *In*
Hystericis, unde. 264.

- Sudores in Febre Dysent.* 1669. *rari,*
sed capitis Dolores frequentiores.
 116. *Adolescentibus hic initio ex-*
torfi, Delirium iis infert stupidum.
 119.
 — *in Febr. Intermitt. Paroxysmum*
finientes, materiam febrilem fere to-
tam eliminant, quæ diebus liberis ad-
cumulata fuerat. 186. *ad 187. confer.*
 188. 189. *Quomodo, & quando, in*
Tertian. Autumn. provocentur. 54.
 — *In Peste & Morbis Pestilential.*
quare sanent. 154. *Vomitum & Diar-*
rhæam hic ilico sistunt. 75. *ad 76. Ali-*
quando verò adeo funesti, si Bubones
retropellunt, ut vix tertius evadat.
 69. *In difficulter sudantibus Exan-*
themata pessima quare advocent. 72.
In facile sudantibus Bubonum intro-
cessum caussant: & si nimis tamen ci-
to abrumpanitur, quid mali hic pa-
trent. 72. *Continuandi per 24. ho-*
ras ut omnem Bubonis materiem dis-
sipare valeant. 77.
 — *In Variolis, à calefaciente Regi-*
mine excitati, quantum lædant. 87.
Primis diebus nimium expulsi, impe-
diunt ne Pustulæ bene erumpant,
neque probe maturationem adquirant.
 72. 92.
 — Regular. Confluent. *inop-*
portunè extorti omnia mala pa-
trant. 84. *Vitandi ergo, quia lenem*
humorem, quo diluendæ sunt Vario-
læ, amandant. 93. *In initio nimis ex-*
pulsi quomodo lædant, & Mortem ad-
vocent. 239. *ad 240.*
 — Discretis *ante Eru-*
ptionem in Adultis tantum, copio-
si; in Infantibus numquam ab Au-
ctore sunt reperti. 79. 84. *Atque*
eo tempore Discretas futuras præ-
nuntiant. 81. *In Eruptione iti-*
 dem;

dem; & aliquando in tempus Maturationis usque, Adultos vehementer vexat. 8. Vitandi, quantum potest, Eruptionis tempore, cum non sine ingenti periculo, promoveri possint. 92. Prompti per se satis, cur tam avide ab ægris, eorum damno urgeri soleant. 84. Copiosè manantes, & sponte sua deficientes Phrenitidem inferunt. 95.

Sudores in Variolis Regular. Discretis calefaciente Regimine, & calidis, ubi urgentur, Puslularum & faciei tumorem, quæ octavo die adesse debent; tum Interstitiorum inflammationem; quare impediunt. 84. 95. Et nimis propulsi quare Mortem inferant. 84.

————— evanescentes, octavo die, calefacientibus, eos nimis urgentes adhibitis (ibid.) quomodo revocentur. 95. aliquando nulla arte, instante jam Morte, revocari possunt. 84.

————— Malignis Constit. 1661. ad 1664. octavo die abrupti revocari non poterant. 62.

ad Sudores in Variolis ut ad sacram Anchoram Fæminæ confugiunt. 246.

Sudorifera à Vetulis, & Medicastis quotidie inopportune, exhibita, pluribus lædunt. 396.

———— Methodus ad Curandas Febres quantum Methodo per V. S. & Purgationes, periculosior, & magis incerta, pluribus argumentis stabilitur. 369. ad 371. In quibusnam Febribus prosint, in quibus noceant. 50. 141. 186. 195. 369. 371.

———— Purgantibus mista ante Paroxysmum exhibita, in Tertian. Autumn. commendantur. 55. Sine Purgantibus sunt exhibenda in Tertiana

duplici. ibid. Et quare. ibid.

Sudorifera quæcumque in Lue Venerea æque prodesse possunt, quatenus evacuant, quàm Ligna Exsiccantia. 208.

———— in Malignis quibusdam Morbis, pessima, in Peste bona. 154. Horum, in Peste tractanda, incommoda, ac difficultates, solvit Sydenham sua Methodo curativa. 72. ad 73.

———— in Phrenitide à calefacientibus inducta nocent. 360.

———— in Podagra ad Materiam Morbi ejiciendam, neutiquam conducunt. 309. 311. ad 312. Tamen obficiunt minus quàm V. S. vel Purgantia. 311.

Suppuratio in Pleuritide essentiali, neglectu Venæ sectionis, vigente inflammatione, contingit. 164. Quænam tum sequantur. ibid.

Syderatio Rusticis etiam dicitur Febris Erysipelatosa. 174.

Symptomata quædam media sunt, licet ingrata admodum, quibus Natura materiam peccantem &c. excludit. 20. Quod Opus aliquando, ab ignaris, interturbatur. ibid. Et sæpe haberi solent hæc confusi Naturæ, de statu suo dejectæ, Effectus; hinc ea exquisitè adnotare operæ pretium non videtur; unde Historia Morborum adcurata hætenus deficit. 9.

———— non nulla, in Morbis, aliquando non tam Morbo, quàm Medico debentur. 8.

———— irregularia ubi Morbum aliquem obvelant quomodo hicce eruendus, ut ad familiam suam relegetur. 172. ad 173.

———— peculiaria distinctè percepta in Causarum morbificarum, & Indicationum curativarum, cognitionem deducunt. 9.

———— vehementiora fiunt in Morbis, si Natu-

- Natura, materiae morbificae vi oppressa, fatiscat.* 20.
- Symptomata seu Effectus ab essentia alicujus Speciei &c. *vid.* Humores, Speciem &c.
- Febris Cont. 1661. ad 1664. singularia. 29. *Quenam in his Febribus Emetico, mire, tollantur.* 32. Februm Intermitt. *Autumnalium diuturniorum, pessima quenam.* 49. & 50. Febr. Intermitt. *Vernalium respectu Autumnalium, in declinatione, pauca.* 58. In Paroxysmo Februm Intermitt. *vulgaria.* 47. Februm Tertianarum *An.* 1661. *quanam fuerint.* 27. Februm Stationariarum, *aliquando differentiam duplicem admittunt.* 118.
- in Lue Venerea, ope Salivationis per Frictionem, *quando minuere incipiant.* 212.
- Morbillis decedentibus supervenientia *quanam, & quomodo V. S. curanda.* 121. ad 123.
- Podagræ Regularis, & Irregularis. *vid.* Podagra.
- Symptomata Genuina Variolarum Regularium, *tam Confluentium quàm Discretarum.* 79. ad 84. 502. ad 504.
- in Variolis tempore invasionis *quanam, & unde.* 236. Variolis Discretis *erumpentibus, sua sponte cessant.* 243.
- Variolarum Regular. *pessima, & letalia, tempore Eruptionis, Venæ sectione, in quibusnam hominibus, prævertuntur.* 91.
- in Variolis, *quanam ingentem materiae Variolosae copiam, & discrimen, à Pustulis exitum certatim quærentibus, hasque brevi confluras, indicant.* 243. *Quid tum agendum.* 244.
- Symptomata Anomala in Variolis Regular. Confluent. *æque ac Discretis, Morbi quolibet statu, communia.* 85. *Fiunt vel à calore nimio, vel à frigore, aut frigidiusculo ac debilitato sanguine.* 85. 146. In Confluentibus *undecimo die, & Discretis octavo die, occurrentia, tamquam magni momenti expendenda; & quare.* 84. ad 85.
- in Variolis Regular. Discretis, *ex mala harum tractatione oriuntur.* 84. *Quanam sunt.* 95. *confer.* 87.
- Variolis Reg. Confluentibus & Discretis, *quanam singularia.* 84. ad 85.
- legitima in Variolis Regular. Confluent. *tum Discretis, initio, communia quidem, sed atrociora sunt; & præterea in Confluent. propensio in Sudores multo minor.* 81.
- Variolas Regul. Confl. *solas, ante Eruptionem concomitantia aliquando, Eruptionem non nunquam, sed non sæpe, reprimentia, has quoque Confluentes futuras indicant.* 81. ad 82.
- in Variol. Regul. Confl. *hiscæ jam erumpentibus, ut & etiam Febris, non evanescunt; ut in Discretis.* 82. 80.
- Variolarum Confluentium *duo, non parvi momenti, in Adultis Salivatio, in Infantibus Diarrhoea, quorum prius certo magis, concomitantur.* 83.
- — — *pessimi generis, Paroxysmi instar, vesperi ægrum vexant.* 94. *Quæ Paregoricis præcaventur.* *ibid.*
- — — Letalia, *ubi, Salivatione jam cessante, 11^o. die, exstinguitur*

- æger. 84. ad 85. Letalia in Variolis ut Mictus sanguineus, Maculæ purpureæ, in Junioribus præsertim, quod lecto nimis cito adfigantur, enascuntur. 90.*
- Symptomata Variolarum Regul. Discretarum quibus ab initio, in Adultis æque ac infantibus, stipantur, quænam. 79. ad 80.
- in Variolis Regul. Discretis Mortis prænuntia, quænam. 62. 84. 502. ad 503.
- Variolarum Discret. malignarum Constit. An. 1661. ad 1664. grassantium. 62.
- in Variolis Utriusque Generis à materiæ Repercussione ex Frigore nimio, vel Evacuationis inopportunis, quænam sint, licet oppido rara, & quomodo tollantur. 97.
- in Variolis à calido Regimine, eadem quæ à nimia inflammatione pendere solent. 140.
- — à Regimine frigido nimis, Faciei ac Manuum intumescen-
tiam impediunt, & Pustulas flaccidas reddunt. 146.
- — — quæ ex Frigore nimio, vel Evacuationibus indebitis contingunt, rariora multo, quàm quæ ex Calefacientibus & Cardiacis, licet Vulgus hæcce minus culpet, quàm illa. 97.
- Syrupus Chalybis quomodo fiat. 268.
- de Meconio qualis præferendus aliis. 542. Præfertur etiam tandem ab Auctore suo Laudano. 245. Quadosi exhibendus. ibid. Unica j. hujus idem valet quod Laudani liquidi gtt. xvj. 248. Tamen aliquando ferri nequit, tumque Laudano utendum. 271. In Variolis ad sesquiunciam una vice exhiberi aliquando debet. 248.

Ad Unc. iß. una vice, in puero exhibuit Auctor, iterata vice. 246. ad 247. In Variolis Confluent. Juveni, sexto die, ad Unc. j. propinatur. 251. Decimo die ad Unc. jß. Die undecimo mane & vesperi iterum ad Unc. jß. singulis vicibus. ibid.

Syrupus Spinæ Cervinæ. *vid. Spinæ Cervinæ Syrupus.*

T.

TAbacus in Ileo, fumo inflatus specie Enematis, præstantissimum remedium. 504.

Tabellæ, Apoplexiæ Paroxysmo finito, exhibendæ. 507. In Tussi Epid. 1675. absente Febre &c. ubi à suscepto frigore, exhibendæ. 154.

Tabes. 527.

Tabes Abdominalium partium, in Infantibus sæpe excitatur, nimis frequenti Purgantium repetitione. 269.

— ex Hæmoptoe, à repetito Cathartico, nasci potest. 178. à Medicamentis Pectoralibus quomodo sæpe fiat. 195. Ex Pleuritide essentiali quandonam. 164.

— deplorata Equitatione, tamquam Specifico, curatur. 275.

Tacitus (Titus) quid obtrectanti Metello regerat. 4.

Tegula Hybernica in Coniuvio non est specificum. 330.

Tempestas calida. *vid. Calida Tempestas.*

— frigida, *vid. Frigida Tempestas.*

— Morbis, inflammatoriæ diathesis, producendis maximè idonea, est illa inter Ver & Æstatem ambigens. 64.

Tempestates Anni Morbos haud pauciores,

ciores, Naturæ instinctu, proprios habent. 8. Hujusque rei cognitio Medico, in quibusnam quam pluribus, multum prodest. 9. Huic minus plus illi, Morbo favent; & quare ipsæ notandæ Tempestates. 8. In quibusnam, Ægritudines ingruere consuevere, cur non melius notarint Medici, cum adeo necessarium illud sit, miratur Auctor. 8. ad 9.

Tempora, in uno Intermittentium Paroxysmo, tria spectanda sunt. 46. Horum ratio. ibid.

Tempus Eruptionis, vid. Eruptionis Tempus.

Tendinis Punctura, vid. Punctura Tendinis.

Tenesmus est adsidua desidendi cupiditas. 115. 509. In Dysenteria, quando. 110. In ea non est ab ulcere Intestini recti, sed quod materies morbosa in ipsum devoluta, viribus ipsius expelli nequeat. 115. confer. 110. Adultis exitialis, Infantibus benignus, licet ad menses perduret. ibid. Frustra Topicis, ut Clystere, Fotibus &c. curatur, quia parti adplicata, plus debilitant. 115. Sed curandus per ea, quæ corpori in genere vires addunt, ut Diæta analeptica, & Cardiacis; unde sæpe tolerandus, donec ea pro lubitu ingeri queant. ibid.

Terebinthina Cypria in Gonorrhœa Virul. 209.

Terræ effluvia Morbos Epidemicos varios gignere possunt, infecto prius aëre. 146. 149. 315. 355.

Tertianæ Febres, vid. Febres Tertianæ.

Testes Fæminarum Hydrope quomodo adficiantur. 334.

Testiculorum rotatio quædam, Gonor-

rhœæ Virul. initio percipitur. 206. Testis tumor, in Gonorrhœa, unde, & quomodo curandus. Vid. Scroti tumor.

Thamesis Nobilis fluvijs, An. 1683. prævalido gelu ita compaginatus fuit, ut & currus & officinas, solidi instar pavimenti facile sustentaret. 354.

Theologia Naturalis quid sit. 187.

Theoria Rationis Momentis innixa, quam lubrica, & facilè invertenda. Vid. Rationis Momenta.

— Hippocratis, qualis Medicorum vera debet esse, Naturæ exquisita descriptio fuit. 10.

Therapeia perperam administrata, Malignitatem in Febribus dictam aliquando potius producit, quàm Venenosa quædam Morbi indoles. 62.

Therapeutica solertia Veteribus debetur.

Theriaca Andromachi in Hysterica Adfect. tum in aliis pluribus malis, summe commendatur. 273. In Febre Pestilent. feliciter usurpatur. 75. In Podagra præ cæteris ubinam confertur. 314.

Thomas M. D. cum Auctore Operis socius. 61.

Tonsillarum letalis inflammatio unum ex gravissimis Symptomatibus Intermittentes Autumnales, diuturniores, insequentibus. 49. Quandonam in his mortem præforibus denunciat. 54.

— dolor & inflammatio quandonam mortem imminentem præmonstrent. 60. Et quænam Symptomatis hujus causa. 54.

Tophacæ Concretiones Cretam vel Oculos Cancr. æmulantes, ad Articulos digitorum, cutim destruentes, in Podagra irregulari. 305. 323.

Tophi in Podagra ex quam materia enascantur. 323.

— in Podagricis Exercitio corporis constantiore, præsertim Equitatione, considerandis consideratis, ab incremento inhibentur, non solum, verum & veteres, si modo cutim non destruxerint, solvuntur. 324.

Topica Medicamenta in Hydropes. Vid. Hydrops Topica &c.

— Infantium corpora facile penetrant. 269.

Tormina Ventris sine dejectione, nullis sc. excretionibus stercorosis vel mucosis subsequenter, in Constit. Dysenterica An. 1669. &c. quomodo Autumno grassari incipiebant, & Torminibus istius temporis Dysenteriae respondebant, imò Dysenterias numero ferè superabant. 104. 108. confer. 364.

— hæc curabantur ut Dysenteriae Constit. istius, 108. 364. Quomodo tamen Curatio primi Anni ab ultimorum Annorum, diversa esse debuerit. 114.

— in Febre nova Epid. ubi præcipuè Morbum constituebant, ut ipse Morbus, curabantur. 363.

Tubera ossium seu Exostoses, in Lue Venerea, qualia. 207. Quomodo curanda.

Tumor Abdominis in Foeminis duplex, ad Hydropem non spectans; unus à Carnium in Abdomine ex-crescentia præternaturali: alter à flatibus, Ingravitationis signa produ-cens, plerumque in viduis, vel in iis, quæ sero nupsere; & ipsis sæpè imponens. 334.

— in Abdomine, Infantibus sæpè contingit, Purgantium nimis frequen-ti repetitione, qui eo plus augentur,

quo plus purgatur; Donec istarum partium Tabes & putredo insequatur. 268. ad 269. Ex Rachitide vera, Purgantia quando exigat. 269. Sive à Rachitide vera, sive à scrophulis, quomodo curandus, ib. Reliqua. vid. Abdominis Tumor.

Tumor Crurum in Febribus Intermitt. Autumn. diuturnior, harum sæpè de-cessus signum, in Adultis. 60.

— in Cubitis, ex Podagra irregulari albus, dein ruber inflammatus. 305. In Variolis Confluent. jam curatis, molestus superveniens, iisque fami-liaris, qui curandus. 98. confer. 80.

— Faciei ac Manuum, in Variolis non adeo requiritur, si Pustulæ per-paucæ fuerint. 86. Ceterum Eva-cuatio, insignis admodum habetur. 84. 94. Nec non minus, suo tempo-re hîc requisitus, quam Salivatio. 84. 94. Absens autem peioris est ominis quàm si Ptyalismus intercep-tus fuerit. 248. Primo in Facie, præsertim in Variol. Discretis, exci-tatur; dein Manuum & Digitorum insequitur. 80. 502. Ab octavo die usque ad undecimum reperiri solet, tumque cessante jam Saliva-tione, subsidere, & minui parum, in Facie solet, incipiente jam tumore Manuum, moriente aliter ægro. 84. 248. 250. Nec tamen omnino, il-lo die, in Facie, sed post diem unum aut alterum, recedere modo debet. 85. In Manibus tum Tumor suc-cedit ilico. 83. Quæ proximè à Fa-cie intumescunt. 502. Ab undecimo die illo, usque ad Pustularum, in iis, maturationem, persistat. 248. Et ut serius adhuc, quàm illa Fa-ciei, recedat, plurimi momenti est. 93.

Tumor

Tumor Faciei ac Manuum conservatur
contemperantibus ac diluentibus; Ca-
lidis & Cardiacis vitatis. 126.

— Promovetur Paregoricis non mo-
do, sed ad debitum terminum subful-
citur & protrahitur. 94. Tum Con-
temperantibus Sanguinem, & aura
frigidior. 96.

Tumor Manuum in Variolis, *vid.* Tu-
mor Faciei.

— Pustularum & Faciei, in Variolis
Discret. tum Interstitiorum Inflam-
matio, cur à Sudore, hic naturali,
nimium expresso per calefacientia,
impediatur. 84.

— Surarum, Hydropis licet primum
signum, præsertim in Viris, tamen
sæpè, in his, tum & in Fæminis, fal-
lit. 533.

— Hydropicorum similis, in Vi-
ris Asthmate diu vexatis, & derepen-
te abeunte, oboritur; hyeme, & humi-
do aëre, invalescens magis, atque ad
mortem usque eos concomitans. 533.

— Tibiarum ex Hydrope, quomodo
differat, ab eo ex Hysterica Adf.
258. Tibiarum, & aliarum partium,
in Variolis Anom. quomodo incipie-
bat; & tandem in Suppurationes,
& Apostemata, desinebat. 145. ad
146.

Tumores Externarum Partium quas-
nam præcipuè adoriuntur, in Hyste-
rica Adf. 258.

— in Peste vera, laudabili ritu erum-
pentes, nisi Sudoribus inopportu-
nis perturbentur, boni. 69. Non præ-
gressa Febre, exorti, vix nocent ad-
fecto, neque eum à communibus vitæ
muniis abstrahunt. 65.

Tumulus Pestis, quomodo fuerit ad-
auctus. 69. 70.

Turbith Minerale, in Lue Venerea, ad
Salivationem promovendam, quan-
do, & quomodo usurpandum. 212.
In Gonorrhœa Virul. facile pri-
mas fert, & quomodo exhibendum.
209.

Tusses hyeme qualibet, & sub ejus ad-
ventu sæpè adfligunt. 150. 194. 233.
In Febre nova Epid. eo citius re-
cedebant, quo remotius ab Hyeme
invadebat Morbus. 355.

Tussis quo citius curatur, eo minor in-
secuturæ Tabis motus. 194.

— Quomodo curanda. 526.

— Convulsiva Puerorum Febrem co-
mitem non habet. 194. Curatur V.
S. & Catharticis, repetitis, sed le-
nibus. 195.

— Febrium Continuarum Sympto-
ma, unde fiat, quomodo corrigenda.
41. ad 42. Post Febrim, in Seni-
bus, non tam periculosa, ac existi-
matur. Quomodo curanda. 38.

— Epidemica An. 1675., ex subito
frigore calorem suscipiens, orta, ne-
mini parcens. 150. Numero, non
modo; singularis erat, sed periculo.
ibid. Si Febris & Pleuritis se ipsi ad-
miscebant, quænam præcedere so-
lebant. 152.

causam habet ejus Materiem
antea in caput, jam in Pulmones,
depositam; Febre interim eadem
manente, iisdemque mediis cedente.
150. confer. 152. ad 153.

— curatur hæc, ut & quæ ab ea-
dem causâ nascuntur mala, V. S.,
Clysteribus, abstinencia à lecto, &
refrigerantibus. 151. ad 154. Operam
dando simul, ut Febri, quæ huic pa-
ratissima est, occurratur. 151. Quo-
modo occurrendum. 152. Si Fe-
bris

bris nondum accersita, curatur Tussis, sine V. S., modo calefacientia & spirituosâ calida non dentur; quæ sine periculo, vel Pleuritidis, aut Peripneumoniæ, invitatione, hic non exhibentur. 215. ad 216.

Tussis leniter & non hostili manu, ut copia Remediorum, V. S. iterata, ac similibus, tractari volebat. 152. Catharsis, finito Morbo, exhibebatur. 153.

— Si Pleuritis essentialis adesse videretur, curabatur tantum ut Febris istius Constitutionis. 150. ad 151. 153. Unde liquet Pleuritides, & Peripneumonias, tum enatas, Febris istius Constitutionis Symptomata, & accidentalis Tussis soboles, esse. 150.

Tussis Epidemica An. 1679. ex aëris manifesta crasi, ceu novus Epidemicus Morbus, mense Novembris inferitur; & quare. 194. Vomitus & Vertigines inducit. ibid.

— Sicca prius, humidior dein paulo; & à Tussi convulsiva Puerorum, non nisi Febre, dissidens. ib. Si imperitè tractaretur accedebat Febris similis isti Hiemali, An. 1675. sed quæ ut Tussis curabatur. 197.

— Curabatur V. S. Epispastico & Catharsi. 194. ad 195. 197. Aliquando sponte sanabatur. 194.

— Hysterica, non frequens, pituitosas exagitans, à Convulsiva quomodo differat. 257.

— in Morbillis, fatigat, sed non periculosa, nisi post Morbum. 122. confer. 121. Quomodo tum tractanda. 122. In Morbillis Anom. An. 1674. quomodo curanda veniebat. 144.

— in Pleuritide essentiali, crebra affligit, & valde cruciat; hanc æger præ dolore inflammatorio coercere

tentat. 163. Pro ratione liberioris expectorationis, sensim minuitur, 163. Sed, Venæ sectionis neglectu, sæpe supprimitur, suffocanti Dyspnoæ dominium cedens. ibid.

Tussis in Podagra, materiam in Pulmones alliciens, Metastasin ibi, licet raro creat; in quo casu, Morbus tamquam Peripneumonia tractatur; & quomodo. 388. 554.

V.

V Apores, sive Convulsiones, promiscuè vocari possunt Hystericæ Adfectionis effectus seu Hysterica Passio. 132. 279.

— à Vomitoriis plus invitatur, quàm à Purgantibus. 341.

Variolæ Hippocratis & Galeni tempore, quod cognitæ non fuerint, unde constat? 149. Adcuratè ab Auctore per plures Annos observatæ, quare evulgentur. ibid. Harum essentiam ignorat Auctor cum reliquis hominibus. 86. Inter Morbos calidos cum sint recensendæ, hinc minus peccatur frigore, quàm calore, in iis. 86. 98. Inflammationem singularem à cæteris, ponunt, cujus particulas Natura primo digerit, coquit, tandemque forma Abscessuum eliminat. 86. 236. A quorum ergo Natura non adludunt; nam & eorum varios status percurrunt. 86. Hincque per Abscessus hic, uti in Peste per Carbones, ac Bubones, ejicitur materies. 100.

— Febri, Phrenitidi, Maculis purpureis & similibus, præ aliis Morbis obnoxia sunt. 146. 370. ad 371.

— ab aëris quadam crasi, Constit. Epid. producente, ut cæteri Morbi Epidemici,

demici, oriri videntur. 64.

Variolæ Epidemicæ, & iis Annis, quibus Epidemicæ Constitutionis prædominium obtinent, si Regulares & mitiores, circa Æquinoct. Vernalium invadere solent. 23. 79. Et tandem invalescentes, sub Æquinoct. Autumn. statum adipiscuntur, eoque præterlapso, in brumale frigus usque perdurant, quo tandem vertuntur in fugam. 43. Si Anomalæ, seu Irregulares fuerint, quo tum & periculosiores, maturius nonnumquam quam mitiores, h. e. Januario mense, invadunt. 79. Hyeme aliquando oboriuntur, ut An. 1680. post Febr. Epid., sed non Epidemicæ tunc erant. 233.

— Epidemicæ factæ nemini parcent, nisi prius hoc Morbo adfecto; nec tamen sufficit adulterino quodam Variolarum genere, quod ad hunc Morbum nihil adtinet, laborasse. 79.

— pro Constitutione peculiari, qua incessunt, haud secus ac Febres Epid., vario se habent modo, ac peculiaris Generis sunt: hoc Annorum serie aliam, aliis alteram, Speciem referentes, utut interim juxta Phænomena communia convenire videantur. 62. 79. 157. Ad quodnam singularis fuerit referenda, à die, quo erumpunt Pustulæ, ab harum magnitudine, atque colore, &c. experto facile constabit. 157. Quælibet porro, quod notatu dignum, quo mitioris sunt Speciei, eo citius earum Pustulas ad maturitatem, & Morbum ad finem, perducunt. 145. Sed eo tardius tum quoque erumpunt. 81.

— periculi plus, vel minus inferunt, pro Pustularum numero, quarum

paucitas omnem salutis spem constituunt; & è contra. 234. confer. 235. ad 237. Hinc ubi copiosæ prodeunt, unicum est, in quo suppetias Ægro, initio Morbi, adferre potest Medicus. 234. Ætatis & sexus respectu, periculi plus, vel minus, inferunt. ib.

Variolæ pro diversa Constitut. quemnam etiam diversum periculi terminum habeant. 145.

— in Anomalas seu Irregulares, & in Regulares seu Genuinas vel Legitimas, ab Auctore dispeSCI solent. 79. 98. Regulares & Genuinæ quare ita vocatæ. 79.

— in Confluentes, tum in Discretas sive Distinctas seu Interdistinctas, iterum dividuntur tam Anomalæ, quam Regulares. 79. 374. 502.

— Confluentes & Discretæ licet essentialiter non differant, & quædam Symptomata habeant communia (81.); tamen ab invicem immaniter discrepant, & tanto intervallo distant, ut per illustriora quædam Symptomata facile discriminantur, licet hoc Vultus non animadvertat. 79. confer. 91. 93. 234. 374.

— Methodo nova à Sydenhamo tractantur, quod ægre ferri non posse existimat, cum non Veterum, sed Modernorum tantum Curationibus adversetur. 149. Solebant diro calidorum, tum Regiminis, tum Remediorum, usu, tractari, imo & aliquando curari; contraria tamen hic, ac planè opposita, Methodus, temperata ac refrigerans, feliciter cedit; quomodo itaque dijudicari debeat, quænam optima sit. 372. confer. 92.

Variolæ triplicis Generis præsertim, ab Auctore, hoc Opere describuntur, juxta tres Constitutiones diversas,

per quas gradibus se ita illæ promovebant, ut posterius Genus prius semper exsuperaret, respectu putredinis, & materiæ incoctilitatis. 146. confer 234.

Variolæ Constitutionis 1661. ad 1664. quare non describantur à Sydenhamo, sed de iis tantum pauca tradantur? 62. Diris Symptomatibus brevi jugulabant hæ. ibid.

Variolæ Regulares Constitutionis 1667. ad 1669. illæ sunt, ex quibus, tanquam in suo genere omnium perfectissimis, Variolarum Historia vera, & Methodus Medendi, sunt desumendæ. 79.

— seu Legitimæ, postquam durante Constit. Pestilent. fere delituerant, circa Ver An. 1667. incipere, & auctæ, sub Autumno Epidemicæ factæ sunt; sed, superveniente brumali frigore, parcius lacescebant: proximo Vere iterum invaluerunt, earum impetu Hyeme iterum coercito: tertio demum, Vere surgente, increbrescebant, sed minori impetu; atque Augusto penitus interciderunt, surgente Dysenteria. 78. Benignæ erant, plures infestantes, & paucos jugulantes. 78. Hæc comitabantur Febris Variolosa, & toto tempore. 78. ad 79. 98. ad 103. Et Diarrhœa, ultima æstate. 79. 103.

— Discretæ quædam, Phænomena Naturalia seu Genuina, habent; inter quæ, Statu, seu tempore, Invasionis, notatu digna sunt. in Adultis, ingens in Sudores propensio. 79. ad 80. Hocque Variolas minime confluxuras prænuntiat. 81. 502. In Infantibus Stupor & Somnolentia. 80. Tum & aliquando Epileptici motus; qui boni moris, at-

que eas in procinctu esse, & non confluxuras, indicant. 80. 243. 502. In utraque ætate, uti & Specie, à primo insultu, Febris præcipue dominatur, ad Eruptionem usque: inde dat inducias ad Maturationem; quo elapso desinit. 83. 503. Dolor, in Scrobiculo cordis, admota manu. 80. 98. 99. 502.

Variolæ Notandum interim, quod in laxioribus temperamentis, aliquando, sine insigni ægritudine prægressa sensim, atque gradatim, ad Eruptionis periodum pervenere.

— In Eruptionis Statu (qui tardior quàm in Confluent. 91.) Quarto d. e. ab Invasione, si primum etiam includat, raro citius, non numquam serius (81.) contingente, erumpentes Pustulæ considerandæ veniunt. 80. 90. 502. 124. Symptomata prioris Status minuuntur. 80. 82. 93. 502. Sudores in Adultis persistunt. 80. 82. 91. Faucium dolor cum Pustulis surgit & augetur. 80. 502. In Maturationis Statu, exordientis octavo die, dies in hac Specie fatalis, Pustulæ, præsertim in Facie (nam in reliquo corpore aliter habent) læves & rubræ, asperæ jam, per album in flavum, pro maturationis ratione, abeunt colorem illis tum genuinum; & in eum, quo mitior fuerit Morbus, magis vergentem 81. 72. 82. 85. 125. 502. Tumque maturæ hæ, tandem, similem luteum liquorem evomunt. 81. 124. 502. Intervalla Pustul. in Facie, prius alba, interim, & quo mitiores Variolæ magis, rubent instar Ros. Damni.; inflammata, tensa, dolent, tument una cum Palpebris, quæ si Pustulæ

*Pustulæ copiosæ citius quidam tum-
ment. 80. ad 81. 84. 502. Dein &
Manus, ac Digiti, intumescunt, quod
æque salutare ac Pustularum erup-
tio, si hæ numerosæ. 84. 86. In
Exarescentiæ vel Decidentiæ Statu,
Suppuratione, undecimo die, ad
summum evecta, Pustulæ maximæ
factæ, exarescere & decidere inci-
piunt, recedente Faciei tumore. 81.
502. Die decimo quarto vel quinto
funditus disparent, in Facie, in re-
liquo corpore nondum. 81. 502.
Et in Manibus disrptione, ac in Fa-
cie, & reliquo corpore, desquama-
tione, recedunt. 81. 502. Denique
Cicatrices oboriuntur, quæ tamen in
hac specie raræ, nisi confluant. 81.*

*Variolæ in Eruptionis statu Phæno-
mena Anomala, ipsis singularia à
perversa tractatione habent. 84.
Occurrunt die Octavo, & bene
expendenda sunt, quia moriuntur il-
lo die, qui ex hoc Morbo pereunt.
ibid. Mortis hinc prænuntia quænam.
ibidem. Fiunt præprimis ob Cardia-
corum & Regimen calidum, quibus
Sudor, per se promptus satis, nimis
exantlatus, subito cessat, nullis me-
diis revocandus; unde tumor par-
tium requisitus denegatur; hinc plura
mala, & quæ tumere, rubere debe-
rent, pallent & flaccescunt, Pustu-
lis interim rubentibus atque elevatis,
etiam post ægri mortem. 84. 87. 89.
90. 95. 502. ad 503. Non enim
moritur æger ob retrocessum Pustu-
larum, sed quod Facies non turges-
cat. 95.*

*Anomala cum
Confluent. Variol. communia, quoli-
bet Morbi Statu occurrentia, habent.
85. Et producuntur ex Calore San-*

*guinis proprio, vel ex causa exter-
na; & sunt Phrenitis satis frequens,
Coma. 85. 502. Tum Maculæ pur-
pureæ, leti nuntia, Pustulis intersper-
sæ. 85. 234. 502. Pustularum subsi-
dientia & flacciditas, cum maculis
nigris in harum summitate depressa.
85. 502. Mictus cruentus in Adoles-
centibus, quibusdam, & Sputum San-
guineum, quod tamen raro; bina Sym-
ptomata mortis certa prænuntia, initio
Morbi plerumque contingentia, Pu-
stulis nondum vel vix erumpentibus,
& in tali Specie occurrentia, quæ
in maximè Confluentes adolesceret,
nisi ante morerentur. 85. 97. 502.
Urinæ suppressio, præsertim in Juve-
nibus, & in Discretarum declinatio-
ne. 86. 97. 502. Dein ex Frigore
Sanguinis, ab aëre, vel V. S. inop-
portuna, aut Catharsi nimia, inducto;
quæ mala rariora, quàm quæ à nimio
Calore. 86. 98. Attamen Pustularum
retrocessus, una cum Diarrhæa, A-
dultis periculosa, & partium detu-
mescentia, aliquando ex eo consequi-
tur. 86. 97. 146.*

*Variolæ Regulares Confluentes quæ-
dam Phænomena Naturalia & Spe-
cialia, habent; quædam cum Discre-
tis Communia, & hæc præprimis
habent Tempore Invasionis. 81. Sed
ea vid. supra. Hæcque atrociora ubi
reperiuntur, quàm in Discretis, ut
Febris & alia, de Confluentibus fu-
turis tum constet. ib. 243. Sudor Spon-
taneus tantus non adest, ut in Discre-
tis. 81. 503. Jam Specialia ipsis, non
multa, tamen quæ quo graviora, eo
certius indicant eas Confl. fore, nec
sine magno periculo. 81. ad 82. Ut
Diarrhæa Eruptionem præcedens,
& aliquando protracta post illam.*

81. Unde oriatur? 91. Tum Dolor acutissimus, in lumbis, latere, artubus, ventriculo, Vomitus enormis, Anxietas, Aegritudo, Vertigo. 81. ad 82. 243. 503. Tempore Eruptionis, nunc Erysipelatis, nunc Morbillorum, ritu prodeunt; quod fit ut plurimum tertio die, aliquando citius, raro tardius, licet aliquando post contigerit. 81. 82. 252. 503. Et quo citius ante illam, eo magis confluunt. 81. 503. Si ad quartum vel quintum diem defertur, atrox Symptoma est in causa, hinc periculosa futura. 81. ad 82. 503. Hæ Variolæ erumpentes, vix à Morbillis nisi tempore Eruptionis distinguuntur. 82. 503. Post Eruptionem Symptomata priora non desistunt, & Febris ad multos dies adhuc excruciat, & vix desinit ante Maturationem. 82. 91. 504. confer 83. & 504. Et, si vehementior fuerit Morbus, sub vesperam, cum aliis Symptomatibus exasperatur. 84. Præsertim diebus intra undecimum & decimum septimum. 504. Pustulæ non in molem auctæ, ac Discretarum. 82. Et depressiores multo sunt, quàm in illis; unde Medicorum error aliquando, & falsus de Pustularum retrocessione rumor. 97. Pellicula quasi vesicula rubra, dein in album abiens, ex implicitis sibi invicem Pustulis conflatur, nec multum elevatur. 99. 503. Hæc post diem Octavum exasperatur, & in fuscum, non flavum, abit. 82. 503. Sed quo propius ad subfuscum vergit, eo peiores Variolæ, & magis confluentes. 503. Quo in flavum magis vergit, eo mitior Morbus. 85. Pustulæ Manuum, ac Pedum, majores

res quàm Faciei & reliqui corporis, & quo altius ab extremitatibus ad Truncum itur, eo minores. 83. 503. Magnitudo porro Morbi, & periculi, pro Pustularum in Facie numero, tantum æstimari solet. 83. 503. 234. Tibiæ quoque tument in hac Specie. 145. Symptomata interim duo, non parvi momenti, & in hoc genere adeo necessaria, quàm Pustulæ, vel Faciei ac Manuum tumor, adsunt, quæ Adultis Salivatio, in Infantibus Diarrhoea. 83. 94. Illa, si fætorem excipias, Ptyalismo à Mercurio excitato similis est. 83. Cur adesse debeat, quando incipiat, desinat. vid. Salivatio in Variol. Regul. Confl. Ubi incipit desinere, undecimo die, quænam adsint Symptomata. 304. 504. Facies quoque detumescit, sed ejus loco Manus intumescere solent, aut debent, ob Pustularum exiguitatem. 83. 84. 86. 93. Diarrhoea verò, licet certo satis, tamen non tam certo discruciat Infantes, ac Salivatio Adultos. 83. 94. Verum ubi adest, salutem his adfert non periculum. 97. Nec adeo matura eos invadit, ac Salivatio; & ubi ingruit, ni arte sistatur, singula Morbi stadia percurrit. 83. Quare necessaria hæc sit excretio? ibid. Tempore Desquamationis, præterlapso die Octavo, Pellicula in Facie, fuscior adhuc, desquamatur, & aliquando post vicesimum diem separatur. 82. 504. Quo fuscior eo lentius abscedit. 82. 504. Humeri, & dorsi, Cuticula aliquando etiam perditur. 504. 82.

Variolæ Regulares Confluentes Phænomena Anomala specialia, ex perversa

versa tractatione, adipiscuntur. 84. ad 85. 503. Occurrunt hic Undecimo die, & bene expendenda, cum eo die qui ex hac Specie intereunt, pereant. 84. confer 247. In crudiori adhuc genere moriuntur decimo quarto die, in crudissimo decimo septimo; aliquando, sed raro, non ante vicesimum moriuntur. 504. Horum causa Sanguinis nimius fervor, vel Sudor nimis extortus. 84. 125. 235. Primarium est Salivationis subita suppressio, nec Faciei tumore persistente, aut Manuum, istius vices supplente, subsequente. 84. 93. 503. Hoc Symptoma solum omnes ferè jugulat, qui in hac specie moriuntur. 97.

Variolæ Regulares Confluentes Symptomata Anomala communia cum Discretis quænam habeant. Vid. Variolæ Regular. Distinct. &c. confer 235. 245.

Variolæ Anomalæ nigræ Constitutionis 1670. ad 1672.; per Morbillos introductæ, & una cum Febre Dysenterica, & Dysenteria, grassantes, sed his Autumno primas cedentes, Januario mense jam ingressæ, à Variolis Regularibus Phænomenis insignioribus, discriminabantur, atque ad aliam Classsem reducendæ omnino videbantur. 104. 105. 123. 125. ad 145. Et eadem, quod notandum, ut Epidemici solent, primo atrociores, ultimo Anno, remota sævitia, & nigredine, induta flavedine, Benignæ sunt factæ, respectu generis. 123. 125. 145. Cur Variolæ Constitution. Dysentericæ vocatæ. 104.

Phænomena quæ habent Singularia, non quæ Communia, exponuntur. 124.

Discretæ discrimina-

bantur à Regularibus Distinct. Eruptionis Tempore. 124. Pustularum mole, asperitate, colore. ibid. Ptyalismo, qui ut in Confluent. at non semper, aderat: unde constabat ad Confl. naturam magis accedere, & inflammatorias magis esse. ibid.

Variolæ Anomalæ Confluentes discrepabant à Regularibus Confl. admodum. 124. ad 125. Nam Die secundo vel tertio erumpebant. 124. Febris inflammatoria major quàm in aliis. 125. 127. Pustulæ in facie instar Erysipelatis; reliquo corpore congeries ex Pustulis confata. 124. Quomodo à Morbillis, & Erysipelate distinguebantur. 125. Vesiculæ inter Pustulas, in femoribus, in nigredinem abeuntes aderant. 124. Has brevi mors insequabatur. 125. Pellicula alba resplendens, undecimo die, primo in Facie, atque maturitate in nigrorem fuliginosum abibat. 124. Qualis ex ea stillabat singularis materies? ibid. Ægri ad Salivationem procliviores. 125. Discrimen, (ni vesiculæ inter Pustulas, instantem Mortem designantes, aut Calidis mors præcipitata,) die decimo quarto aderat: aliquando decimo septimo expectabat; quo die elapso nullus moriebatur. 125. 145. Furfures diu adhaerebant; & Stygmata fœdiora in cute. 125. Notandum, Dysenteriis tum regnantibus, has Variolas, calido Regimine excitatas, per Dysenteriam sæpè sibi viam parasse. ibid.

Variolæ Anomalæ, Nigræ, Pessimæ, Constitut. 1674. & 75. istis An. 1670. adeo similes, ut eadem renatæ viderentur. 145. 146. Pluribus tamen, ut Putredine (hic longè maxima. 147.) tum incoëtilitate, dissidebant. 145. Hinc

Species nova videtur ex præcedente suborta. 146.

Variolæ Pustulæ immaturæ erant fuscæ; si verò maturæ & numerosæ, quia tum pusillæ, Nigredine fuliginem æquabant. 145. Si pauciores essent, non minores tum, quàm in aliis generibus, & raro nigræ. ibid. Salivatio, nec non Faciei ac Manuum tumor, hîc quoque salutare. 239. Fœtore, ubi maturæ, omnes fugabant adstantes. 145. Periodum suam tardius absolvebant, & diutius hærebant, quàm ulla species nota. ibid. Dies fatalis ne quidem decimus septimus, sed post vicesimum adhuc trucidabant. 145. 146.

— Confluentes plures orco dabant, quam ulla species, & Pestem pernicie ægrorum ferè æquabant. 146. Nec tamen nisi maturæ necabant. 145. Si Discretæ aliquando forent, non pejores erant aliis. 146. Et satis benignæ. 149. Tumores quidam, si ægri evaderent, quod rarò, enati in Apostemata ibant. 145. ad 146.

— Confluentes pessimæ An. 1681. Epidemicæ fiunt Lond. 233. Hyeme incipiunt, An. 1680. pergunt usque in Annum sequentem, ubi Æstate increscentes, tandem Επιδημικώταται factæ, stragem ingentem edunt. ibid. Siccitate inaudita istius Anni acuuntur vehementer. 234. Eruptionis tempore, Exanthematibus nondum planè expulsis, Maculæ purpureæ exoriuntur, præmaturam Mortem accersentes. ibid. Horum confluxus iterum incitabatur aëris intemperie, eadem ratione, qua Scioli ac Medicastri, Regimine calido & Cardiacis suis, illud ipsum facere solent. 234. Post Eruptionem Cor-

pus, ac in primis caput, copia Pustularum calēsiebat adeo, ut æger, nisi Infans, Vigiliis & inquietudine vexaretur. 245. Quo sedatior erat Sanguis, eo majores & minus confluentes Pustulæ; & contra: hinc quo tumultuatior magis, eo tardius ad separationem pertingebant, tumque & ichor, loco puris, fiebat: & Nigricans humor quidam, loco flavi coloris Pustulis continebatur. ibid.

Variolæ curandæ ubi veniunt, Indicationes seu Methodus medendi cui-dam Fundamento superstruendæ. 86. Sed Indicationes contrarias planè suggerit hic Morbus, nam calidum, æquè ac frigidum, nimis justo Regimen obest. 146. Et quod præcipuè hîc agendum requiritur, præsertim in Speciebus vehementioribus, erit, α. ut Sanguinis ebullitio compescatur, β. Tum ut Pustularum elevatio, atque Faciei & Manuum Tumor, procuretur. 147. Notandum enim est Morbum hunc, duo habere Tempora; primum Separationis est; alterum Expulsionis. 86.

— Indicatio Tempore Separationis, (in quo Natura Ebullitione febrili, per tres vel quatuor dies, partes inflammatas seligit, congregat, & relegat, quod citius etiam persolvitur, quàm sequens. 86.) Curatur ne Ebullitio illa exorbitet, neque nimis langueat. 86. ad 87. Quo enim separatio tardior, modo non langueat, eo melius illa absolvitur. 87. 89. ad 90. Natura enim sibi permissa, in Junioribus præsertim, per se dives, & satis edocta, materiam debito ordine, ac via. secernit, & expellit. 87. Sic Variolæ primo non erumpentes, minùs timendæ, quàm quæ

quæ præmaturè retrocederent. 87. Cavendum itaque sollicitè, tum à Regimine iusto nimis calido, sive fuerit ex stragulis lecti; ex aëre loci calefacto; ex Calidis nimis & Cardiacis Mediis; præsertim vigente ætate, in Plethoricis, vel æstatem inter & ver. ibid. Ex his Variolæ nimis protrusæ, & separatione tumultuario procedente, confluunt. ibid. Vel Sudores fiunt ingentes opus turbantes. ibid. Vel alia plura mala, opposita Methodo numquam observata. 88. confer 82. 87. 88. Cavendum itidem à Regimine refrigerante nimis, ut per Evacuantiæ instituta, ne Ebullitio nimis langueat. 88. Inde enim Pustulæ quasi percussæ detumescunt. 147. Et quare. 88. Si verò Confluentium metus adsit minimus, non modo V. S. sed & Emeticum propinandum. 88. 503. Præmissis his Evacuationibus, aliquando tum melius erumpunt. 88. Indicatio Tempore Expulsionis, curat, ut Abscessus excitati suos modos bene percurrant; unde Curationis summa pendere solet. 86. 88. Ergo præstandum, ut Pustulæ debito modo sustineantur, quo ritè atque ordine destinatam Periodum adsequantur. 87. 88. Hoc tempore, plus adhuc alio, cavendum à Regimine calefaciente. 88. Quomodo verò hæc noceant. 88. ad 89. Quæ mala producant. 82. 87. ad 88. 146. Porro vid. Calefacientia, vel Regimen calidum. Quandonam verò Cardiacæ convenire possint. 89. Exquisitè tamen vitandum, ne ægrum Frigoris injuriis exponendo Eruptionem impediamus. 89. Hinc Calo-

ris Gradus optimus, naturalis est; qui ab hoc deficit, huncve excedit, periculosus est. 89. At hunc definire Gradum ardua res! & quæ prudentem ac sagacem Medicum expostulat, propter plura quæ pensanda, & Nutricum, inde sæpè errantium, iudicium superant. ibid. Quare in hoc casu tum Morbus tum Praxis Medica, in incerto, ac lubrico loco sistuntur; atque Medici fama in angusto versatur; & quare. ibid.

Variolarum Curatio Generalis ante Eruptionem. 89. ad 91. Aura liberior interdicitur. 89. Diæta ex eupeptis, & temperatis; demto potus frigore, commendatur; nec improbatur rustica ex lacte cum pomis cocto. 90. Calefacientibus & Cardiacis ne acceleretur Eruptio, ut ante diem quartum sæpè satagunt. 90. Sæpè hoc illi potius quasi obex; vel, quod malum, Confluentes factæ sunt, quæ per se Discretæ fuissent. ibid. Quo tardius prorumpunt eo melius. ibid. Nemo enim interiit, quod ocyus prodierint Variolæ, nisi Calefacientia impederint; hinc ubi earum suspicio, non illico propellendæ. ibid. Lecto addicere ante diem quartum, æquè malum, ac Cardiacæ intempestiva. 90. ad 91. Cardiacæ sed Paregorica si Eruptio, ex voto, procedat, quare exhibenda, & quando. ibid. V. S. quandonam instituenta. ibid.

— Regularium Discretarum Curatio specialis, post Eruptionem. 91. ad 92. Discretas fore unde constet. 91. Omni prorsus periculo vacant. 92. Regimen calidum absit. 93. Diæta verò tenuis & temperans. 89. 91. E. Lecto quotidie quando, & quare, surgendum. 91. Si ei incumbendum, Stragula

Stragula ut in sanitate sint. 92. *Quomodo vitandi Sudores nocui in eo.* 92. *Focus an exstruendus.* ibidem. *Cardiaca suppurationis tempore, quænam, quando & quare.* ibidem. *Diæta cur tum Cardiaca paulo.* ibid. *Paregorica quænam suadeant.* ibid. *V. S. in hac specie per se nocens, quandonam concedenda.* ibid. *In hac Specie, opposita Methodo tractati tot periere, ut pudeat in tam levi Morbo.* ibid. *Ratio cur ex Plebe, in hoc Morbo, pauciores pereant quàm inter Divites.* ibid.

Variolarum Regularium Confluentium Curatio specialis Ante Eruptionem innititur, ut Pustularum nimis frequentia prævertatur, tum ab hac Multitudine vel Paucitate, dependeat discrimen aut salus. 234. *Post Eruptionem.* 93. ad 95. 234. ad 244. &c. *Hæ periculosæ admodum.* 93. *Paregorica undecimo die temporius h. e. hora quinta exhibita, inopinato, Mortem sæpè anteverunt.* 247. *Vulgus harum & Discretarum malè Curationem ex æquo prædicat.* 93. *Hæ Medici artem verè occupant, non verò Discretæ, nisi Medicus sibi & aliis imponat.* 252. *Hinc vera Medela duobus his innititur; ut initio Morbi præcaveatur, ne materies, nimis fota, seu nimis adsimilata, exorbitet, & Pustularum ingentem frequentiam procreet.* 249. confer 235. 244. 250. 251. *Tum ut Spirituum inordinatus motus, ab inflammatione externarum, & puris acrimonia, excitatus compescatur.* 249. confer 234. 236. 238. 245. ad 249. *Duas has Indicationes qui persolvit, jam ut Medicus*

satisfacit, quamvis nondum ut Formularum Præscriptor. 249. *Hinc Curationis exitus pendet à modo, quo aeger fuerit tractatus.* 244.

Variolarum Regularium Discretatum & Confluentium, Symptomatum Curatio, ex Methodo, diversa ab illa Auctoris, enatorum. 95. ad 98. *Symptomata ex Regimine refrigerante & frigore externo, quomodo tractanda.* 97. confer 86. *Pustularum depressio in Confluentibus non timenda, cum nihil habeat, præter Morbi morem.* 97. ——— post Pustularum recessum Curatio. 98.

—— *Anomalarum nigrarum Constitut.* An. 1670. ad 1672. Curatio. 125. ad 127. *Regimen temperatum, per liquida æstum mitigantia; præsertim Maturationis Febre vigente; tum Hypnotica, opus persolvunt.* 125. 126. *Hi liquores quid faciant, & qui Ptyalismum adjuvent.* 125. *Hi sæpè etiam Variolas Confluentes futuras, in boni moris Discretas transmutarunt.* 126. *Mensium fluxus insolito tempore, hic frequens, qui tractandus.* ibid.

—— *peffimarum Constitut.* 1674. ad 1675. Curatio. 146. ad 149. *Methodum, in aliis Var. Confl. optimè cedentem, hic non profuisse, quæritur Auctor; & plures interibant.* 147. *Unde concludebat præter temperantia etiam, quæ Putrefactioni vincendæ paria, requiri.* ibid. *Hincque Vitrioli Spiritus, tamquam specificum quid, reperitur.* ibid. *Qua ratione exhiberetur.* ibidem. *Ejus porrò dotes.* 148. *Ex eo Saliva undecimo die non ita suffocabat, sed aliæ dejectiones, ut Diarrhœa vices subibant, quæ tum vel sponte,*

Sponte, vel Hydrogala, vel Narcoticis, sanabatur. 148.

Variolarum Regularium Confluentium Peffimarum Curatio. 233. ad 256. *In iis Vitrioli Spirit.* 244. 254.

In Variolis pauci moriuntur, quia tardius erumpunt; ubi contra plures leto dantur, quoties Pustulæ intempestivè, & nimio opere, exiguntur. 239.

———— *Confluentibus Medici solertia quid valere potest, præsertim in Juvenibus, vel Vino deditis, patet.* 252. *Et in hac specie pendet Curationis exitus à modo, quo æger primis diebus, fuerit tractatus.* 244. *Verum exquisitè notandum, quod cum periculum à Pustularum frequentia, modo, pendeat, quod hæ omni ope sint coërcendæ.* 234. 235. & 244.

———— *Discretis vix refert, qua Methodo utatur, qui medebitur.* 245. 252. *Nam Medica ope non indigemus, & Sponte sua, ac Naturæ vi se solvunt.* 374. 252. *Sed perversa cura tamen letales fieri possunt.* 374. ad 375.

———— *à Lecto abstinentia quantum proffit, pluribus indicatur.* 90. 237. ad 243. confer. 233. ad 234.

Vegetabilia ad Podagram Digestiva, qualia sint: Mitiora acrioribus præferenda, ne stimulus Morbi fomitem adaugeat. 313. *Horum aliquot Species permissæ, plus faciunt, quam ex iis unum simplex; ac si quoddam Tertium inde foret.* 313. & 314.

Venæ, in Podagra, membri vexati, vidente dolore, tument. 304.

Venæ Sectio, in Infantibus, æquè tuta, & necessaria aliquando, ac in Adultis. 122.

———— *lecto decumbente ægro, facilius*

multo fertur, quàm erecto corpore. 168.

Venæ sectio in Angina, eodem die iteranda, sine Catharsi, ni Febris & dolor V. S. minuantur. 176. 177. *In Apoplexia, qualis esse debet.* 507. *In Chorea Sancti Viti.* 360. 361. 506. *Quoties, & quando, repetenda.* 361. 362. 506. *In Colica biliosa largior; & aliquando post Emeticum.* 128. 511. *In Colica Hysterica quando.* 133. *In Convulsionibus Infantium dentientium specificum est.* 122. *Corticis Peruviani usum ne præcedat.* 56. *In Diarrhœa non exigitur.* 113. *Sed in Diarrh. Variolosa.* 113. *In Dysentericæ initio.* 111. 114. *In inveterata iteretur.* 115. *In Febribus semper Catharsi præmittenda.* 368. *In quibusdam Febribus prodest, in aliis nocet.* 30. *In Febre Acuta cum Mictu cruento & Petechiis.* 252. 253. *In Febribus Contin. aliquando non prodest.* 34. 97. *Si ex Intermitt. Aut. natæ, nocet.* 34. *Aliquando non necessaria.* 31. *Ejus mensura.* 31. *Quando verò, & in quibus iteranda.* 34. *Emeticum, ubi utroque indigemus, præcedere debet.* 32. *In Febre Dysenterica.* 118. *In ea Const. An.* 1661. &c. *Pueris & Senibus non conducebat; sed in Juvenibus, Athleticis, plura mala ejus neglectu, ut Pleuritis &c. inferuntur: qua copia.* 31. *In Febre Epidem. nova; tantum ubi signa Peripneumonix nothæ adessent.* 357. *Fit tum ad revellendam materiem; & iteratur.* 349. *In Infantibus qualis instituenda.* 367. *In Febre Erysipelatosa, & quando iteranda.* 175. *In Febribus Intermitt. Autumn. nocet, & Morbum protra-*
hit.

hit. 54. 186. Vernales itidem prolongat. 50. 51. Infantibus has Febres peiores reddit; seniores in mortis periculum conjicit. 25. In Febre Morbillofa non ferebatur. 144. In Febre Pestilent. necabat si Tumores jam adparebant, nisi certa sub conditione. 77. Cæterum largissima juvabat, uti in Pleuritide; parciore nocebat. 73. 74. Methodum tamen mutat Auctor. 75. In Febre Quartana, Junioribus & Senioribus nocet. 54. In Febre Scarlatina, cur rejiciatur. 162. In Febre Tertianâ quid efficiat. 27. In Febre ex Tussi malè curata. 197. In Febre Variolosa quando mox necessaria, & iteranda. 101. Quando vitanda. 102. In Gonorrhoea Virul. ad temperandum; & in iis, qui difficile purgantur. 210. Tum ubi scroti tumor & dolor ingens. 211. In Hæmorrhagia Narium, in brachio. 178. In Hysterica Adfect. quare & quando in initio. 267. 270. In leviori specie omittenda. 271. Quandonam & in quibus ante Catharsin & Laudani usum, quod tum certius agit. 276. ad 277. Hanc Adfectionem sæpè invitat; & quid inde deducatur. 262. In Lue Venerea, ante Salvationem, non instituenda. 212. Maniæ aliquando caussa. 66. Et in eadem, nimis repetita, stultitiam infert. 61. In Mensium immodico fluxu, extra Puerperium. 282. In Mictu cruento à Calculo. 442. Ex Febre Acuta. 252. 253. Ex Variolis Confl. 378. In Morbillis & ipsis Infantibus, quare, & quando iteranda, 121. 121. In Morbis Chronicis, aliis sæpè præmittenda. 316. In Morbo

Epidem. quolibet, recenti, ante Catharsin, contra Methodum vulgatum; & quare. 195. In Nephritide ex Calculo quandonam, & quando omittenda. 446. & quare. 278. Si Morbus ex Hysterica Adfectione, omittenda. 278. 132. In Nervosis Adfectionibus repetita sæpè bona. 360. In Peripneumonia Notha, quandonam iteranda; quando non. 168. In Peste & Febr. Pestil. ante Bubonum eruptionem, & in Lecto, quod diaphoresin tutiorem reddit, instituenda. 75. Larga & plus semel iterata nulli funesta fuit, in Peste Londin. 70. Et totum Curationis negotium in ea copiosa V. S. cum L. Botallo, collocat Sydenham. 71. Atque ea in Castro Duntzar Milites servantur. 71. Parca verò, & adparente tumore, instituta ut institui solet, necat, quod plures deterruit. 70. In Phrenitide. quando. 40. In Pleuritide essentiali, qualibet Constit. indifferenter infestante, Curationis præcipuum, ferè sufficiens, & omnem numerum absolvens, si calida non ingerantur, & pro necessitate iteretur. 152. 153. 165. 167. 169. Nec larga quid damni infert. 167. Qua copia instituenda & quoties iteranda in Adultis, & in Infantibus. 166. 498. In Pleuritide Symptomatica sæpè non ferri potest. 153. In Podagra quomodo ingenter noceat. 309. 310. In Juvenibus vero vino excalescentis institui potest. 309. Nec non ubi Metastasis materiæ ad Pulmones. 328. 554. In Pruritu ferino, quandonam. 175. 500. In Rheumatismo in latere adfecto, ilico instituenda, ante Catharsin. 171. 499. Repetenda, præsertim in Juvenibus. 171. 499. Tertio

Tertio tamen celebrata sufficit, & Cathartica potius iterentur, ut Sanguini parcatur, & Paregoricis locus detur. 200. Ejus minori repetitioni supplet Serum Lactis, in quibusdam. 199. In Rheumatismo inveterato, quo modo iteranda, & quid faciat. 173. In Scroti tumore & dolore vehementi, à Lue. 211. 518. In Sputo Sanguin. in Variolis Confl. in Tussi Epid. An. 1679. requisita, & repetenda. 194. 195. In Variolarum initio, non in omni, sed ubi Symptomata graviora eas Confluentes fore indicant. 88. 148. 244. 504. Tum ubi Phrenitis quia facies non tumet. 95. ad 96. Tamen, in hoc Morbo, minus quàm aëris contemperatio, vel Catharsis iterata, Morbi violentiam cohibet; nec ita, ac Auctor prius censuerat, Pustulas intra justos limites coërcet. 238. In initio, ubi celebratur, sit præcipuè, ut Mictus Sang. Maculae purpureæ & alia vitentur. 91. 148. Male, in quodam casu negligitur ab Auctore. 148. Cum Evacuantibus, in initio, quomodo nocere possit; & an vitanda. 88. Si inopportuna fuerit, Pustularum recessum, nec non Faciei ac Manuum detumescentiæ causa esse potest. 89. Si justa, in Confluent. erumpere Pustulas aliquando facit. 88. In Var. Discretis potius nocua. 92. At tamen instituenda ibi, si perverso zelo calefacientibus curatum voluerint ægrum. 92. In Regularibus, si Morbus fuerit vehementior, pustulis jam deciduis, quare instituenda. 98. Post Variolas Confl. pessimas curatas, quare. 252.

Venæ sectio & Purgantia, alternatim

iterata Contusiones tutissimè curant. 330. 524. In Febre Epid. nova, in Adultis, tum in Infantibus, quoties repetenda. 357.

Venæ sectionis non congruentis, in Febribus, Effecta, sanguinem debilitare, ut despumationi impar sit: quod damnum Cardiacis resarciendum. 30.

Venenum Medici supposuere in Febr. Malignis, hocque per Calefacientia & Alexipharmaca, per cutim expellendum putarunt errantes; cum contra in illis tum Refrigerantia omnino conducant. 370.

Venter induratus unum ex gravissimis Symptomatibus, Intermitt. Autumn. diurn. insequentibus. 49. & 50.

Ventris Tormina, vid. Tormina Ventris.

— Tumor, vid. Abdominis Tumor.

Ventriculi debilitas Symptoma Podagræ inveteratæ sequela, quomodo tractanda. 328. In recenti spirituosus excitatur. 327.

Venus in Podagricis cur noceat. 324. Præmatura, & nimia, cur Podagram advocet. 302. 308. 554.

Verpus, vid. Recutitus.

Vertigo, in Variolarum initio, has Confluentes prænuntiat. 243.

Verulamius de Historia Naturali qualis tradi solebat, quid censeat. 7.

Vesicatoria in Apoplexia nuchæ applicanda. 507. In Comatosi Affect. Variolas præcedentibus. 243. In Comate febrili, Calefacientibus excitato, nocent. 360. In Febre, ex Tussi male tractata, nuchæ. 197. In Febre Epid. nova. 350. In Hydrope Gangrænam facile invitant; & quare. 346. In Phrenitide à Calefacientibus, nocent. 282. In Tussi E-

pid. quare nuchæ adplicanda. 195.
 In Variolis Confl. perampla & acria
 quandonam adplicanda, ut die un-
 decimo suum effectum edant, mate-
 riæ peccanti exitum præbendo, Tu-
 mori & Salivationi subveniendo. 249.
 Vesiculæ, in Variol. Confl. An. 1670.
 inter Pustulas, sero limpido distentæ,
 cum subjecta carne nigra. 124.
 Vestimenta consueta non sunt deponen-
 da, nisi mense uno ante Solstitium
 æstivum: nam ab horum præmatura
 abjectione plurimæ Febres enascun-
 tur. 160.
 Vetulæ Sudoriferis suis quàm sæpe no-
 cent. 369.
 Vibices seu Maculæ in cute nigræ quo-
 modo excitentur. 72.
 Victus ratio, vid. Diæta. Incrassans in
 Mensium fluxu Puerperarum immo-
 dico. 282.
 Vigiliæ post Catharsin, & V.S. omnium
 maximè Vires subruunt. 322. Et ve-
 spertinæ plus nocent, quàm diluculo
 surgere. ibid. Post Febres Aqua Ros.
 frigida consopiantur. 41. In Variolis
 Discret. quid indicent. 92.
 Vini Spiritus, vid. Spiritus Vini.
 Vino adsueti, in senio, aquam aut aquo-
 sa sumentes brevi internecantur. 319.
 confer. 320. ad 322.
 Vinum immodicum corpus laxat & e-
 mollit, ac coctiones subvertit, unde bi-
 baces plurimis Morbis obnoxii. 320.
 Modicum autem & Cibi eucepti, ubi
 Cortex Peruv. nihil amplius efficit,
 rem sæpe absolunt. 191.
 — Antidotalis instar Pestem potius
 accersit, quàm præcavet. 68.
 — in Cutis Eruptionibus quibusnam
 concedendum. 175. In Febribus In-
 termitt. licet in Continuar. speciem
 vergant, cum Cort. Peruv. exhibitum,

non nocet. 190. In Gonorrhœa Virul.
 vitandum. 210. In Hydrope condu-
 cit, tum modo, ubi meatus reclusi &
 porta aquis data. 344. In Podagra
 haud concedendum non obstante ada-
 gio: nam fomes Morbi excitat &c.
 319. & 321. In adjuetis tamen dere-
 pente ne interdicator; præferendum
 tum Hispanicum. 322. In Variolis
 Confl. quando exhibendum. 250.
 Vinum Canariense & Hispanicum in
 Diabete. 192. In Dysenteria ex Tor-
 min. Ventr. 364. In Hysterica Adf.
 vel solum vel aromatizatum, omni no-
 cte, hora somni, mira facit. 273. In
 Infantibus purgantibus debilitatis,
 cum herbis roborantibus. 269. In Po-
 dagra quandonam concedendum, sed
 cum exercitio. 322. 327. In Vario-
 lis Anom. semicoctum quando condu-
 cat. 127. 148.
 — Malaganum vel Falernū sive Mus-
 catum, in Tussi post Febr. Contin. 38.
 — medicatum in Chorea Sancti Viti
 roborans. 362. 506. In Diabete. 192.
 In Febr. Tert. Vern. pro pauperibus.
 193. In Fluxu Muliebri. 192. In Hy-
 drope. 343. Pro Divitibus. 345.
 Vir prudens quare quis evadere potest,
 Philosophus autē nemo Mortaliū. 348.
 Viri Hydrope, ætate præsertim ingra-
 vescente, adficiuntur. 333. Sedentarii
 tentantur, ut Fœminæ, Hysterici
 Adf. sic dictis. 256.
 Vires subito prostratæ, Maculæ purpu-
 reæ, & Petechiæ, in Morbis, Mali-
 gnitatis signa habentur; quorum ra-
 tio redditur ab Auctore. 370. 371.
 Virulenta Materia in Gonorrh. per Glā-
 dis substantiā penetrans. 205. ad 206.
 Viscera debilia & putrefacta in Hy-
 drope Evacuantia verant. 309.
 — in Podagra irregulari, si ambu-
 lando

- lando ex pedibus materies dissipatur, periculosè adficiuntur. 305. In inveterata adeo infarciuntur materia, ad extremitates non amplius explosa, ut Mors insequatur. 314.
- Vitri incensorii actio Spirituum exorbitantium impetuositati, in Histerica Adf. comparatur. 263.
- Vitrioli Spiritus, quia stipticus, non convenit in Morbis, quorum Curatio Purgationi innititur. 358.
- cum Cerevisia tenui vel Decocto vulnerario in Febre Acuta cum Mictu cruento, & Petechiis. 253. 254.
- in Phrenitide Febris Epid. An. 1674. unicum remedium. 142. In Variolarum initio ubi, ex Symptomatibus, Confluentes eos prævidemus. 244. 504. In quibusnam omitti possit. 244. In Variolis Anom. nigris, pessimis, ingentis usus. 147. 148.
- Ulcera Phagadenica, in Lue Venerea, quædam. 207.
- Ulcus Glandis, a Shanker, in Gonorrh. Virul. in non recutitis, vel qui numquam eo Morbo laborarunt. 205. 206. Ubi Phymosin excitat, quid agendum. 211.
- Vesicæ quomodo cognoscatur, & curetur. 524.
- Underwood, Senator Londinensis, Cortice Peruv. occisus. 187.
- Unguenta purgantia, in Hydrope, Hypercatharsin insanabilem excitare valent. 346.
- Unguentum in Pleuritide essent. Brasicæ folio imponendo, quale. 165. ad 166. Ad Salivationem excitandam, ex Mercurio, quibus partibus adplicandum. 212.
- Vomendi propensio Emeticum indicat absolute; nec sine ægri periculo, Medicique molestia, omittitur. 31. 73.
- Vomitio in Peste Diaphoretica rejiciens, Sudoribus brevi sistitur, qui certa ratione excitandi. 75. ad 76.
- Vomitiones ex Hysterica Adf. Medicis imponunt, aliorum Morborum præ se ferentes speciem, ut Nephritidem, vel Colicam bilios. 278.
- virides, non semper talem humorum depravationem denotant, cum hic color à Spirituum inverso motu excitari queat. 133.
- Vomitoria ex Croco Metallorum, infra adolescentiam constitutis non propinanda: Adultis verò non nocent, si copiosè diluantur, ope Zythogalæ. 32. 33.
- in Hydrope, ex Croco Metall. Aquas αἰὼν καὶ κάτω potenter evacuant. 341. Non ita promptè Aquas expellunt, ubi levis tantum Abdominis tumor, quàm ubi ingens harum copia adgesta. 342. In Histerica Adf. Paroxysmum sæpe invitant; quod non foret, si Morbi fomes in Materia aliqua involveretur. 265. confer. 507. Sed præterea Materie biliosæ viridis uberiores copiam excitant. 191. In Podagra idem præstant ac Cathartica. 310.
- Vomitorium in Apoplexia quale. 507. In Colica biliosa, ex Zythogala, quando conducat. 128.
- Diarrhœam in Febris, vix adstringentibus obedientem, fugat. 32. Eandem in Febris Contin. quoque arcet; neque nisi raro, aliter evenit. 43. Sed in Febris inflammatoriis eam potius excitat. ibid. Hinc in Febre Pestilent. nondum cognita Emeticum, planè contrario eventu, propinavit Auctor. 73.

Vomitorium in Febre Contin. quando exigatur, ni ætas aut debilitas contradicent. 31. Quænam harum Symptomata, præter Diarrhœam, mirifice eruat? 32. An initio neglectum postea exhiberi queat? 32. 33.

— Venæ sectionem semper insequatur, ubi utroque indigemus. 32. Omni tempore Febris, si occasio jubet, modo vires dentur, adsumendum, & quare. 32. ad 33. 43. Qua hora diei adsumendum. 32.

— in Febribus Intermitt. Vernal. quando adsumendum. 86.

— in Tertiana Vernal. An. 1671. quale. 193.

— in Variolis initio Morbi an conducatur? 88. Ubi Symptomata eas Confluentes fore indicant, initio ægrum refocillat. 244. confer. 251. Hinc in iis, simul una cum V. S. ubi harum suspicio adest, præscribendum. 504. Dein, ubi Saliva spissa facta, undecimo die, quasi suffocat, propinandum. 96. ad 97.

Vomitum & Alvum moventia simul, in Hydrope, proponuntur. 337. ad 338. & 342.

Vomitus Capitis motu, ubi dispositio adest, præ cæteris provocatur. 277.

— e Corticis Peruv. usu quomodo compescendus. 190. Ex Febre Epid. nova, æstate, quomodo tractandus. 363. ad 364. Ex Hysterica Adf. cum rejectione materiæ viridis, sed sine dolore, quandonam. 257. ad 258. Si enormes sunt, Anodynorum usum, horumque dosim sæpe repetitam, forma præprijis solida, exigunt. 277. In Peste, una cum alvi profluvio Sudoribus curantur. 75. ad 76. In Variolarum initio, si enormes, Confluentes eas

fore prædicant. 243.

Urina designare potest operantem Naturam, dum impuras à puris partes secernit, h. e. dum concoctionem Materiæ Febrilis, in Continuis præsertim, & in harum declinatione persolvit. 35. Crassa, vel & tenuis, Cruditatis indicium. 28.

— cruenta à Calculo, ambulatione, vel vactione, excitatur: quomodo se habeat, ubi subsidet. 443. vid. Mictus Sanguineus. In Diabete qualis. 193. 520. In Febre Cont. An. 1661. &c. qualia Cruditatis præbebat indicia; & quandonam prodibant, in ea, Coctionis signa? 28. In Febre hyemali, turbida & intense rubra fuit. 348. In Febr. Intermitt. plerumque rubro saturata, ut Ictericorum, cum pulvere lateritio præcipitato. 191. In Febre Variolosa fallax. 99. In Hydrope suppressa penitus, post Emeticum, sæpe iteratum. 341. In Hydropicis parca, unde. 334. In Hystericis & Hypochondriacis limpida semper & copiosa. 259. 261. 263. In Nephritide nigra, ac sabulosa, V. S. vetat. 446. In Peripneumonia notha turbida est & rubens intense. 168. In Podagræ irregularis intervallis, similis ac eorum, qui Diabete laborant. 441. In regulari Paroxysmo qualis. 304. In Variolis Malignis frequens & pauca, paulo ante Mortem. 62. In Discret. Regular. frequens, & pauca, Paregorica indicat. 95. In Regularibus incipientibus similis ac in Febre Variolosa. 99.

Urinæ ardor in Gonorrh. Virul. qualis. 206. 517. Ejus Suppressio ex Hysteric. Adf. 258. Suppressio in Variolis Confl. in junioribus familiaris. 251. 86.

86. & unde. 97.

Uffulatio in Podagra per Moxam, *vid.*
Moxa.

Uteri procidentia quomodo curanda.
283. 508.

—— Histeric. Adf. sæpe insert, post
partum laboriosum. 283.

—— Strangulatus, *vid.* Strangulatus
Uteri.

Uterum Sexcentarum ærumnarum au-
ctorem statuit Democritus. 260.

Y.

YAUWS, in Insulis Caribes Morbus
Endemius, nostræ Lui Venereæ
simillimus; & uti Lues nostra, sa-
natur salivatione Mercuriali, licet
Guajacum & Sarsaparillam, inte-
gris ibi Viribus, obtineant. 204.

Z.

ZYthogala Emetici actionem facili-
tat. 32.

—— in Cholera loco Jusculi ad diluen-
dum. 107. In Colica biliosa, ante
alia, si Morbus à fructibus, ad
diluendum. 128. 510. In Dysente-
ria. 112. In Febre Acuta, cum
Mictu cruento & Petechiis. 253. Cum
Salvia incocta, in Febribus Inter-
mitt. Autumn. sudoriferum. 54. Cum
rad. Alth. incocta, in Nephritico
paroxysmo. 508. 328. Cum Salvia
alterata in Pestilentialibus Morbis,
ad Sudorem continuandum. 76. Cum
rad. Alth. in Podagra, ubi Nephritis
adeſt. 328.

F I N I S.

